


32069/E


L x 18/1

Barrel
20/11/25
60 ft



in
distinguish

maurice



NOUVEAUX ÉLÉMENTS

D E

MATIERE MÉDICALE,

EXTRAITS des Leçons publiques de M. DE LAMURE, Doyen
des Professeurs Royaux au Ludovicée de Médecine de
Montpellier.

*AVEC des Réflexions judicieuses & importantes pour la con-
noissance des Maladies, & l'application des Médicaments,
dans l'exercice de la Pratique de la Médecine, recueillis &
mis en ordre par M.*** Docteur en Médecine au Ludovicée
de Montpellier.*


Edition revue & corrigée.



A A M S T E R D A M,

Et se trouve,

A MONTPELLIER, Chez FRANÇOIS TOURNEL, Libraire,
Rue de l'Aiguillerie.



M. DCC. LXXXIV.



¶¶¶¶ Ergo fungar vice cōtis ; acutum

Reddere quæ ferrum valet , exfors ipsa secandi.

Munus & officium ; nihil scribens , ipse docebo :

Unde parentur opes ; quid alat formetque Poëtam ;

Quid deceat , quid non ; quò virtus , quò ferat error.

Horatius Art. Poët. Vers. 304.



AVERTISSEMENT.

CE n'est que par une connoissance réfléchie & exacte de la nature , du choix & des vertus des Médicaments qu'on emploie dans le traitement des différentes Maladies ; ce n'est que par leur sage administration dans les cas où ils conviennent , que le Médecin instruit & éclairé l'emporte sur l'aveugle & ignorant empirique. Cette connoissance exclut toute idée de charlatanerie : & comme elle est la base , & l'un des fondements les plus solides de cette branche importante de la Médecine pratique , qu'on connoît sous le nom de Thérapeutique , elle concourt aussi à former le Médecin , ou du moins elle paroît absolument nécessaire pour qu'on puisse le devenir.

On peut établir pour axiôme général & constant , que ce n'est que par une application judicieuse des vrais principes de l'art de guérir , qu'on doit espérer de devenir Praticien ; & que plus nos connoissances s'étendent , plus nous marchons vers cet état de perfection si desirable dans l'exercice d'une profession aussi noble & aussi utile.

Parmi les divers ouvrages que nous avons sur la matière Médicale , c'est-à-dire sur l'histoire raisonnée des Médicaments , il n'en est aucun , de l'aveu d'un grand nombre de Médecins de cette Ville , qui soit rédigé sous un point de vue plus clair , plus méthodique , & d'une manière plus convenable pour pénétrer dans le sentier difficile qu'offre aux jeunes Etudiants l'étude de la Médecine , que les éléments non moins simples que lumineux , qu'on leur présente aujourd'hui ; & que le plus grand nombre d'entre eux desiroient depuis long-temps de voir ren-

dre publics , par la difficulté qu'ils trouvoient à se les procurer en manuscrit.

Les obstacles sans nombre qui s'offrent à chaque pas qu'on fait dans une science qu'on commence à cultiver , rebutent souvent la plupart de ceux qui veulent s'y adonner. Les traités de matière Médicale qu'on leur met entre les mains , ou plutôt dont on leur conseille la lecture , supposent des connoissances préliminaires sur cet objet ; & loin de leur frayer une route facile , ils ne font que les embrouiller , en les éloignant de la véritable voie qu'ils doivent tenir , & en leur faisant perdre par conséquent un temps précieux.

L'application qu'on doit faire de tel ou tel remède dans telle ou telle circonstance d'une maladie , n'est expliquée d'une manière trop vague & trop générale , pour que des Etudiants , & plusieurs même de ceux déjà initiés dans la Médecine , puissent fixer leurs idées sur le choix exact des différents médicaments , sur leur véritable dose , ainsi que sur la plupart des indications & contre-indications à remplir ; ce qui néanmoins doit servir comme de boussole dans leur administration. Nous osons donc les prévenir qu'ils trouveront dans l'ouvrage que nous leur présentons , les moyens les plus efficaces pour saisir avec fruit tout ce que la matière Médicale renferme de plus utile & de plus nécessaire pour la guérison des différentes espèces de maladies ; la nature des médicaments , leurs caractères distinctifs , le pays où ils croissent , leurs principales propriétés constatées d'après la plus saine observation , les doses auxquelles on doit les prescrire , tout y est expliqué avec la dernière précision.

On trouvera aussi dans chaque article de cet important Ouvrage , les précautions qu'il faut prendre pour éviter de faire des fautes dans l'administration de chaque remède ; car

la science de la Médecine consiste autant à connoître ce qu'il faut éviter , que ce qu'il est nécessaire de suivre : tous ceux qui l'exercent saignent , purgent , prescrivent des tisanes , des potions , des lavemens , &c. Mais le vrai savoir consiste à administrer chacune de ces choses dans un temps convenable ; & tel remède qui auroit opéré le plus grand bien dans un temps donné de la maladie , est souvent nuisible , & peut même devenir une sorte de poison , si on le fait prendre dans un autre temps.

Je crois inutile de prévenir le Lecteur , que cet ouvrage est débarrassé de toute théorie vaine & oiseuse , de tout système plus propre à séduire qu'à éclairer. L'Auteur n'a employé de théorie , que ce qui lui étoit indispensablement nécessaire ; rappelant le tout à un discours raisonné & fondé uniquement sur l'expérience & sur le bon sens : en un mot cet homme justement célèbre , est un de ceux qui ont réduit en un art facile , la science qui nous apprend à faire usage des secours jugés les plus salutaires pour combattre les infirmités de l'espece humaine. Les observations qu'il propose sont des faits constatés , & qui méritent d'être distingués de ces futiles productions , que l'esprit échauffé par l'enthousiasme enfante souvent dans les cabinets. Tout y est précieux & de la plus grande utilité ; il peut par conséquent concourir à l'instruction de tous ceux qui se proposent de faire des progrès dans l'art de bien guérir.

La partie chymique est la seule pour laquelle on eût à desirer plus d'exactitude ; mais le Lecteur voudra bien considérer que dans le temps auquel ces leçons publiques ont été faites , on n'avoit pas encore acquis toutes les belles connoissances dont cette science se trouve aujourd'hui enrichie par les travaux vraiment utiles des Rouelle , Margraf , Macquer , Venel , Lavoisier , Bayen , Beaumé , & de tant d'autres grands hommes.

L'on n'a rien négligé pour rendre correct ce corps de doctrine. Les principes qu'il contient sont simples & si bien liés , qu'à l'aide du seul bon sens étayé de la réflexion , l'on fera en état de connoître les différents Médicaments , leurs diverses propriétés , les cas dans lesquels ils conviennent , ainsi que la maniere de les administrer avec méthode & avec utilité pour le malade. Cet ouvrage renferme l'extrait des leçons publiques de matiere médicale , que M. de Lamure a donné dans nos Ecoles pendant plusieurs années , avec le plus grand succès. On espere que l'impression ne fera rien perdre à ces leçons du plaisir qu'elles ont fait à ceux qui ont eu l'avantage de les entendre. Celui qui s'est chargé de la rédaction ose aussi espérer que ce respectable Médecin , généralement reconnu pour un de ces hommes rares , exempts de toute jalousie , qu'on n'a jamais vus enivrés de leur mérite & de leur savoir , ne trouvera point mauvais l'usage qu'on fait ici de ses lumieres. D'ailleurs tout l'honneur en appartient à ce grand homme ; on ne se réserve que le seul plaisir de faciliter aux Etudiants de cette Faculté l'acquisition d'un cours de matiere médicale , dont l'étude réfléchie sera très-capable d'étendre leurs connoissances , & les mettra en état d'employer avec discernement , les divers secours que la nature nous offre pour la guérison des maladies.



E R R A T A.

- Page 5. ligne 6. après le mot *salivation*, ajoutez &c.
 Page 8. lig. 31. le; qui suit le mot *fièvre*, doit être porté après le mot *tierce*.
 Page 10. lig. 7. menstrual, lisez menstruel.
 Page 15. lig. 32. purges, lisez potions purgatives.
 Page 17. lig. 9. & dans diverses autres pages, Bouleduc, lisez Boulduc.
 Page 21. lig. 5. & dans diverses autres pages, Wedetius, lisez Wedelius. même page lig. 25. maniable lisez malléable.
 Page 22. lig. 9. de la regule, lisez du regule; ce mot doit être mis au masculin dans tout l'article.
 Page 23. lig. 27. mortier de fer, lisez creuser.
 Page 25. lig. 6. quatre ou cinq grains, lisez deux ou trois grains tout au plus.
 Page 26. lig. 18. la dose pour les enfants &c. lisez la dose pour les enfants depuis leur naissance jusqu'à l'âge de six ou huit ans, est depuis une goutte jusqu'à six; depuis huit ans jusqu'à l'âge de puberté, depuis six gouttes jusqu'à douze; pour les adultes, depuis douze gouttes jusqu'à vingt cinq.
 Page 27. lig. 12. retranchez les mots *n'ont pas beaucoup d'énergie*.
 Page 30. lig. 31. ne se jettent point, lisez ne se jettent.
 Page 32. lig. 14. une demi drachme, lisez un demi grain.
 Page 34. lig. 14. d'une partie très-grande de sel marin, lisez d'une certaine portion d'acide marin. Même page lig. 22. soit du regne animal, lisez soit du regne minéral.
 Page 42. lig. 15. ou la déclination, lisez & la déclination.
 Page 43. lig. 13. vox, lisez verò.
 Page 47. lig. 5. trois gros lisez un ou deux gros. Même page lig. 9. inclinés, lisez enclins.
 Page 50. lig. 32. inaltérable, lisez inextinguible.
 Page 51. lig. 12. onze livres d'eau, lisez une livre d'eau. Même page lig. 19. occasionnées, ajoutez par *des dents*. Même page lig. 23. il n'est pas permis, lisez il n'est permis.
 Page 59. lig. 5. les ardents, lisez les ardeurs. Même page lig. 17. Ereditius, lisez Fabricius Hildanus.
 Page 66. lig. 11. depuis un grain, lisez depuis un gros.
 Page 67. lig. 15. M. de Chaumelle, lisez M. Chomel.
 Page 75. lig. 25. M. Mesme, lisez Mesvè.
 Page 80. lig. 5. retranchez les mots *ou un gros & demi*.
 Page 84. lig. 32. quinze gros de canelle, lisez quinze grains de canelle.
 Page 100. lig. 8. eaux minérales, lisez eaux épanchées.
 Page 105. lig. 6. une once d'eau, lisez une livre d'eau. Même page lig. 10. Querceton, lisez Quercetan.
 Page 106. lig. 3. les fonds, lisez les fols. Même page lig. 4. antyciam, lisez antyciram.
 Page 123. lig. 16. aux apéritifs, retranchez la particule *aux*.
 Page 125. lig. 2. fatira, lisez fativa.
 Page 126. lig. 24. humeurs, lisez tumeurs.
 Page 129. lig. 26. en l'appropriant à quelque sirop approuvé, lisez en l'associant à quelque sirop approprié.
 Page 130. lig. 18. route, lisez racine.
 Page 133. lig. 24. de même nom, lisez de réputation.
 Page 136. lig. 18. la voix, lisez la voie.
 Page 143. lig. 9. auviatiles, lisez fluviatiles.
 Page 144. lig. 16. les quatre sels d'epson, lisez le sel d'epsom. Même page lig. 22. sel gemme sel marin, lisez sels alkalis fixes.
 Page 147. lig. 12. Sylvestris, lisez Sylvestre. Même page lig. 17. la racine, lisez la semence.
 Page 152. lig. 22. préférence, lisez présence. même page lig. 30. nymphæa tutea, nenuphar tuteum; lisez lutea, luteum.

Page 163. dernière ligne la chaleur , lisez la sueur.
 Page 169. lig. 34. conducendum , lisez cò ducendum.
 Page 176. lig. 11. un quart , lisez deux onces.
 Page 178. lig. 1. Forcet , lisez Forestus.
 Page 180. lig. 21. diascordium , lisez scordium.
 Page 189. lig. 19. bouillon approprié , lisez médicament approprié.
 Page 192. lig. 36. constitution , lisez constriction.
 Page 198. lig. 5. tamarin , lisez tamarisc.
 Page 204. lig. 5. la gomme , lisez la myrrhe.
 Page 216. lig. 30. trois drachmes jusqu'à trois & demi , lisez une drachme jusqu'à trois.
 Page 220. lig. 7. trois onces jusqu'à trois & demi , lisez une once jusqu'à trois.
 Page 224. lig. 28. & dans divers autres endroits , erysinum , lisez erysimum.
 Page 227. lig. 9. retranchez le mot *exterieurement*.
 Page 228. lig. 31. pyrite comme , lisez connu.
 Page 241. lig. 10. comme fluides , lisez comme solides. Même page lig. 12. les solides , lisez les fluides.
 Page 249. lig. 15. trois drachmes , lisez trente grains.
 Page 255. lig. 14. la lipoplexie , lisez l'apoplexie.
 Page 259. lig. 29. d'un pied , lisez d'un pois.
 Page 261. lig. 2. le fer , lisez le feu.
 Page 262. lig. 27. une once confectiõ d'hiacinthe , lisez une drachme.
 Page 263. lig. 24. vingt grains , lisez vingt gouttes.
 Page 278. lig. 19. le végétal , lisez le regne végétal.
 Page 282. lig. 20. l'eau , lisez le veau.
 Page 283. lig. 24. purgatifs , lisez apéritifs. Même page , ligne 26. sirop d'hyacinthe : lisez d'absynthe.
 Page 284. lig. 18. évafée , lisez extravasée.
 Page 298. lig. 8. rouges rouges , lisez roses rouges.
 Page 330. lig. 7. rapidité , lisez vapidité. Même page , lig. 18. des stomachiques froids , lisez des stomachiques en chauds & en froids.
 Page 337. lig. 7 six onces , lisez six drachmes. Même pag. lig. 32. de Pic de la Mirandole , lisez d'après Pic de la Mirandole.
 Page 338. lig. 29. semiperus , lisez juniperus.
 Page 343. lig. 31. une eau , lisez une liqueur. Même page , dernière ligne , eau appropriée , lisez sirop approprié.
 Page 368. lig. 2. demi once , lisez demi drachme. Même pag. lig. 27. dans sept , lisez dans six ou sept.
 Page 379. lig. 9. sableuses , lisez sabloneuses.
 Page 386. lig. 22. cinquante-cinq grains , lisez cinq à six grains.
 Page 402. lig. 25. solide , lisez liquide.
 Page 410. lig. 14. les premières voies , lisez les secondes voies.
 Page 413. lig. 4. malavais , lisez mauvais.
 Page 430. lig. 8. deux gros , lisez demi gros.
 Page 456. lig. 7. la graisse , lisez l'huile d'olives.
 Page 457. lig. 23. le nitre , lisez l'esprit de nitre.
 Page 466. lig. 9. sphacele , lisez sphacelée.
 Page 469. lig. 31. on emploie , lisez on n'emploie.
 Page 471. lig. 16. M. Chatte , lisez M. Matte la Faveur.

On attend de l'indulgence du Lecteur , qu'il voudra bien excuser plusieurs fautes de ponctuation , d'orthographe , & quelques autres incorrections qui se trouvent dans cette édition ; l'absence du Rédacteur ne lui ayant pas permis de veiller à l'impression de l'ouvrage.



PHARMACOLOGIE,

O U

MATIERE MÉDICALE.



A Thérapeutique est cette partie de la Médecine qui donne la manière de traiter & de guérir les maladies , ou de changer les dispositions & qualités vicieuses des parties tant solides que fluides de notre corps en des meilleures. Les secours qu'elle emploie à cette fin , sont tirés de la diete , de la Chirurgie & de la Pharmacie qui sont les moyens dont on se sert pour le traitement des maladies.

La diete est le régime de vie qu'on doit observer dans le boire & le manger ; elle a encore plus d'étendue , & peut se prendre pour l'usage convenable de six choses non naturelles , comme on le dit dans les écoles qui sont connues de tout le monde.

La Chirurgie fournit des secours extérieurs & mécaniques , ainsi appelés , parce qu'ils agissent sur les parties de notre corps par des principes évidents & mécaniques.

La Pharmacie offre des secours qui agissent d'une manière toute opposée , c. à. d. qui par des principes physiques , changent les dispositions vicieuses de notre corps , soit qu'ils soient pris intérieurement , soit qu'ils soient appliqués extérieurement. Ces secours sont appelés Médicaments. L'ensemble de ces Médicaments , est ce qu'on nomme *Matiere Médicale* , dont le traité s'appelle Pharmacologie , qui , selon son étimologie , signifie discours sur les Médicaments : en quoi il faut bien distinguer la Pharmacologie de la Pharmacopée , qui est l'art de travailler & de préparer les Médicaments.

Les Médicaments sont tirés de trois regnes , du végétal , du minéral & de l'animal , c'est-à-dire , des plantes & de leurs préparations , des minéraux & de leurs préparations , des animaux & de leurs différentes parties.

On divise les Médicaments en simples & en composés. Les simples sont ceux qu'on emploie sans préparation & tels que la nature nous les offre. Les composés sont ceux qui se font par différents mélanges.

On les divise encore en internes & en externes , & suivant quelques Auteurs en moyens. Les internes sont ceux qui se prennent intérieurement , les externes sont ceux qu'on applique extérieurement , & les moyens enfin , selon quelques-uns , sont ceux qu'on introduit dans quelque cavité , pour les en faire sortir bientôt après , comme les clysters & les gargarismes.

Enfin on divise les Médicaments , en évacuans & en altérans ; la connoissance des Médicaments est ou empirique ou rationnelle. La connoissance empirique se borne à l'histoire des Médicaments , c'est-à-dire , à leurs caractères distinctifs , aux pays d'où on les tire , aux cas où on les a employés , aux effets qu'ils ont produit , à la maniere de les donner , & à la dose à laquelle on les prescrit. Les empiriques se fendoient encore sur l'analogie : ainsi croyant qu'un tel remede avoit opéré de bons effets dans une telle maladie , ils l'employoient dans une autre qui lui étoit analogue. La connoissance rationnelle va plus loin , & après avoir adopté tout ce que les empiriques ont découvert sur les effets de différents Médicaments , elle tâche de découvrir les causes de ces effets , pour pouvoir ensuite par connoissance de ces causes & des vertus , appliquer les mêmes Médicaments dans des cas où ils n'avoient pas été employés & en découvrir des nouveaux.

Or cette connoissance rationnelle des Médicaments ou de Pharmacologie rationnelle est de deux especes , l'ancienne & la nouvelle. L'ancienne est assortie aux principes de l'ancienne Médecine rationnelle , suivant laquelle on reconnoissoit dans le corps humain quatre qualités principales ; savoir , le chaud & le froid , le sec & l'humide. Les plantes & les autres Médicaments qui excitoient ou augmentoient la chaleur , par exemple , avoient selon les anciens Médecins , une vertu chaude & ainsi des autres. Ils reconnoissoient même différents degrés dans ces vertus ; ainsi il y avoit des plantes chaudes au premier , au second , au troisieme & au quatrieme degré. Même raisonnement pour les plantes rafraîchissantes & les autres. Il est aisé de voir qu'une telle méthode n'est pas

pas satisfaisante , puisqu'il reste toujours à expliquer pourquoi telle plante par exemple , a une vertu chaude & en quoi consiste cette vertu ; ce qui n'est point du tout expliqué par les partisans de l'ancienne Médecine rationnelle. De plus les mêmes Auteurs pour parvenir à la connoissance des vertus des Médicaments , se fondoient quelquefois sur la ressemblance qu'ils remarquoient ou qu'ils croyoient appercevoir entre certaines plantes & certaines parties du corps humain. Ainsi ils disoient que l'hépatique étoit spécifique pour les maladies du foie , la Pulmonaire pour celle des poumons , par la même raison , ils jugeoient que les préparations de certaines noyaux de fruits étoient propres pour résoudre les calculs. Une telle explication tombe d'elle-même sans avoir besoin d'être réfutée , il faut cependant remarquer qu'on en a tiré quelques indications utiles.

Les partisans de la nouvelle Médecine rationnelle ont pris une autre route pour connoître la vertu des Médicaments. Voyons s'ils ont été plus heureux. Les moyens qu'ils ont pris pour cet effet , ont été de soumettre à l'analyse chymique , les Médicaments , & d'examiner quels étoient les principes qui se trouvoient dans les plantes & autres Médicaments , & ce qu'on en retiroit par l'action du feu , afin de conclure dans quel cas , telle plante pouvoit convenir par la connoissance des principes que l'analyse y démontroit : mais cette méthode n'est pas plus satisfaisante que celle des anciens. Ces sortes d'analyses sont toujours suspectes , souvent l'action du feu changeant & altérant les qualités des corps qu'on y soumet , & leur en donnant même qu'ils n'avoient pas dans l'état naturel ; ce qui se prouve par les sels *Alkalis* qu'on forme avec certains corps par l'action du feu & qui n'existoient pas auparavant dans ces mêmes corps. De plus par cette méthode on pourroit tout au plus déterminer les parties qui agissent dans les Médicaments , mais on n'explique pas comme elles agissent. Outre cela , comme on retire des corps différents les mêmes principes , il suivroit delà qu'on pourroit employer dans les mêmes cas , différents Médicaments , dont les effets sont cependant très-différents.

Un autre moyen qu'ils ont employé , a été de mêler différentes drogues avec du sang extravasé , ou de les injecter dans les veines des animaux vivants pour observer les effets qu'elles produiroient. Cette méthode est encore défectueuse , 1°. parce qu'il y a une grande différence de mêler un Médicament avec un sang extravasé qui est en repos , ou avec un sang qui est dans le mouvement de la circulation ; 2°. parce qu'un même Médicament mêlé avec un sang artériel ou avec un sang veineux , produit des effets bien différents ; 3°. parce qu'une même drogue portée im-


médiatement dans le sang , agit bien différemment que lorsqu'elle passe par les voies ordinaires , comme cela se voit par le venin de la vipere.

Il faut conclure de tout ce qui vient d'être dit , qu'il faut se contenter d'une Pharmacologie expérimentale , jusqu'à ce qu'on en ait découvert une rationnelle qui soit plus capable de contenter que celles qui ont été en cours jusqu'à présent. Cependant nous nous servirons de la Pharmacologie rationnelle dans les cas où elle pourra avoir lieu.

La Pharmacologie expérimentale pour être sûre , doit avoir certaines conditions , sans quoi elle pourroit jetter dans des erreurs pernicieuses aux malades. Et d'abord il ne suffit pas que l'expérience ait été faite une ou deux fois , il faut qu'elle ait été très-souvent répétée , & qu'on observe soigneusement les circonstances , je veux dire l'âge , le tempérament , le pays & les différents états de la maladie , dans laquelle l'expérience a été faite.

Il évident que l'attention à toutes ces circonstances est nécessaire pour pouvoir déterminer qu'un tel Médicament convient dans tel cas. Il faut encore que le Médicament ait été employé seul , autrement l'on ne sauroit dire que les bons effets qui ont suivi l'exhibition de ce Médicament , fussent dûs à ce Médicament en particulier , puisqu'ils pourroient être une suite du mélange & de la combinaison de ce Médicament avec d'autres.

Notez que pour conclure quelque chose des expériences , qu'un tel Médicament agit en divisant le sang , il faudroit être auparavant assuré de la nature du sang ; d'où il suit qu'il faut être dépouillé de tout préjugé dans les expériences que l'on fait après ces avis généraux ; venons au détail des Médicaments , nous suivrons la division la plus commune des Médicaments en internes , moyens & externes.



PREMIERE PARTIE.

Des Médicaments internes.

LES Médicaments internes sont évacuants ou altérants; les évacuants sont ceux qui changent les dispositions vicieuses de notre corps en des meilleures, par des évacuations sensibles, par les voies ordinaires des felles, des urines, de la sueur, de la salivation; les altérants sont ceux qui opèrent le même changement, sans évacuation du moins sensible.

CHAPITRE PREMIER.

Des Evacuants.

LES Médicaments évacuants produisent leur effet par différentes voies; nous suivrons l'ordre de ces voies dans le détail que nous en allons faire.

SECTION PREMIERE.

Des Purgatifs.

ON appelle Médicaments purgatifs ceux qu'on emploie à dessein d'évacuer les premières voies; par premières voies, nous entendons ici le ventricule & le conduit intestinal. Ces premières voies peuvent s'évacuer, ou par les felles ou par l'œsophage & par la bouche. Les purgatifs qui évacuent par les felles sont appelés proprement Cathartiques; ceux qui évacuent par l'œsophage & par la bouche s'appellent proprement Emétiques. Le même Médicament pouvant être émétique donné à forte dose, & cathartique donné à plus basse. Pour établir une différence entre les Médicaments, il suffira de remarquer que les uns produisent plus communément les évacuations par les felles & les autres par l'œsophage. En voilà assez pour les distinguer les uns des autres, autrement on ne pourroit mettre aucune différence entre les autres Médicaments.

Nous allons commencer par les Emétiques, après avoir observé qu'en général, les purgatifs n'ont pas toujours l'effet qu'on se propose, poussant tantôt par les urines, tantôt par les sueurs ou la transpiration qu'ils augmentent, tantôt enfin par la salivation. Il suffit qu'un Médicament

produise le plus constamment un effet , pour qu'on puisse le lui attribuer avec une certitude morale qui est la seule à laquelle nous puissions prétendre en Médecine , comme dans presque toutes les autres Sciences humaines.

ARTICLE PREMIER.

Des Emétiques.

ON doit distinguer les Emétiques proprement dits , des autres secours dont on se sert pour aider le vomissement , tels que sont l'eau tiède , l'huile , &c. nous parlons ici des émétiques proprement dits , dont voici les principaux effets qui sont sensibles & manifestes , & d'où l'on peut déduire plusieurs effets non moins réels mais moins sensibles.

Effets des Emétiques.

Peu de tems après l'exhibition de l'Emétique , le malade se plaint d'inquiétude & d'une anxiété qu'il rapporte au creux de l'estomac. L'anxiété commençant , il survient des nausées. Les muscles de la respiration se mettent en jeu , le Diaphragme s'abaisse , le malade fait une forte inspiration , & retient son haleine pour faire ses efforts. Le Diaphragme reste abaissé , la face du malade rougit , les larmes coulent abondamment , les muscles de l'abdomen se contractent , le ventricule entre aussi en contraction , & les matieres sont rejetées par la bouche ; voilà les effets sensibles.

Dans cette action le ventricule est fortement comprimé par le Diaphragme qui reste abaissé & par les muscles abdominaux , le pylore paroît plus pressé par le petit lobe du foie qui repose dessus , en sorte que les matieres contenues dans le ventricule qui se trouve pressé latéralement , passent par la bouche , obligées de passer par l'orifice supérieur du ventricule , vers lequel elles trouvent moins de résistance. Il y a lieu de penser qu'il en passe aussi par le pylore , mais en moindre quantité.

Il ne faut pas dissimuler une objection qu'on peut former à cet égard. L'orifice supérieur du ventricule , dit-on , est comprimé par les fibres du Diaphragme qui l'entourent , & ainsi les matieres qui doivent être évacuées , ne trouvent pas moins de résistance vers l'orifice supérieur que vers le pylore. A cela on peut répondre qu'il est à présumer que les fibres du Diaphragme sont dans le relâchement dans le temps que le

reste du Diaphragme est en contraction. Cette solution deviendra probable, si l'on fait attention à ce qui se passe dans plusieurs autres masses charnues de notre corps, comme dans les muscles fléchisseurs des doigts, dans lesquels on voit une partie des fibres en contraction, les autres demeurant dans le relâchement.

Il y a des Auteurs qui croient que le vomissement est produit par la contraction du Diaphragme & des muscles abdominaux, & que le ventricule est passif dans cette contraction. D'autres, comme *Vesper*, prétendent que la seule contraction de l'estomac suffit pour le produire, & qu'il agit par un mouvement vermiculaire rétrogradé, qu'il prétend avoir observé dans des animaux. Les expériences qui ont été faites devant l'Académie des Sciences ne décident de rien. Nous avons nous-mêmes donné du sublimé corrosif à des chiens, mais nous n'avons jamais observé ce mouvement vermiculaire rétrogradé. Les chiens étant morts, & ayant cessé de vomir, avant qu'on eût mis à nud le ventricule. Ce n'est pas cependant que nous nions absolument ce mouvement vermiculaire, mais nous n'avons pu nous en convaincre par nos propres expériences. On peut raisonnablement penser que les muscles abdominaux se contractent aussi bien que le ventricule.

On fait une question, savoir, si le vomissement se fait dans le tems de l'inspiration ou dans l'expiration ? il se fait dans un temps moyen, c'est-à-dire, que dans le tems du vomissement actuel, le malade ne fait ni inspiration, ni expiration, mais retient son haleine, les poumons restants distendus. Ce sentiment paroît d'autant plus probable que si la glotte n'étoit exactement fermée, les matieres rejetées par le haut, enfileroient cette ouverture, & étoufferoit le malade. De ce qui a été dit, on doit conclure que les viscères du bas-ventre sont fortement comprimés, que les mauvaises matieres sont chassées, que les glandes & les conduits tant excrétoires que sécrétoires dont ils sont composés, étant pareillement comprimés, versent en plus grande abondance leurs liqueurs, que le cours de celles-ci est accélérée & devient plus libre. La veine-cave est aussi plus pressée, & par conséquent le sang reflue avec plus de force, non seulement vers le cœur, mais aussi vers la partie supérieure du corps & du cerveau. Delà la rougeur du visage, de plus tous les muscles du corps étant fortement contractés, le sang en est exprimé abondamment, la circulation augmentée, le sang atténué, divisé, enfin le cours du sang & de toutes les autres humeurs devient plus libre.

Cas où les Emétiques conviennent.

ON emploie les Emétiques avec succès, 1°. dans toutes les fièvres, soient simples, soient composées, continues, putrides; 2°. dans les fièvres intermittentes; 3°. dans les fièvres comateuses; 4°. dans les maladies inflammatoires, symptomatiques; 5°. dans les fièvres exanthématiques & dans toutes les fièvres aiguës; 6°. dans les maladies soporeuses, comme dans l'apoplexie, le coma; 7°. dans les maladies convulsives périodiques, 8°. dans l'ictère, 9°. dans la suppression du flux menstruel, lorsqu'elle vient de l'épaississement du sang & qu'il n'y a point de signe d'inflammation, 10°. dans l'inappétence & le vomissement habituel, 11°. dans les diarrhées & les dysenteries, 12°. dans l'hydropisie, 13°. dans les maux de tête périodiques; voilà en général les cas où les émétiques sont employés avec succès. Nous allons les reprendre & les expliquer chacun en particulier.

1°. Nous avons dit que les émétiques conviennent dans les fièvres putrides. La fièvre putride est celle dans laquelle on remarque des signes de putridité dans les premières voies. Ces signes sont les suivants. La langue est chargée, c'est-à-dire, enduite d'une croûte blanche, jaune ou noirâtre; quelquefois les gencives sont enduites d'une pareille croûte; les rapports qui viennent à la bouche, sont tantôt aigres, tantôt amers, quelquefois brûlants, quelquefois tout-à-fait insipides; toute la bouche est comme visqueuse; le malade ressent une douleur gravative qu'il rapporte à l'estomac, il éprouve des nausées, ce qui marque que les couloirs des premières voies sont engorgés; lorsque ces signes de putridité paroissent, les émétiques conviennent, parce qu'ils évacuent les matières contenues dans le ventricule. L'action des émétiques augmente le mouvement du sang, comme on l'a déjà remarqué, atténue, divise le sang, le rend plus fluide, & par conséquent les matières s'évacuent plus aisément.

2°. Dans les fièvres intermittentes. Dans celles-ci la matière s'accumule ordinairement dans quelques viscères du bas-ventre, comme dans le foie, si c'est une fièvre tierce; dans la rate, si c'est une fièvre quarte; dans le ventricule, si c'est une fièvre quotidienne, & dans tous les couloirs des premières voies, si c'est une fièvre putride. Les obstructions formées dans les viscères sont souvent emportées ou du moins diminuées par l'action des émétiques, parce que les viscères étant pour lors comprimés fortement, leurs couloirs se débouchent & donnent issue aux matières accumulées.

3°. Dans les fièvres comateuses pour les raisons ci-dessus.

4°. Dans les fièvres inflammatoires symptomatiques , comme dans la pleurésie , dans la péripneumonie , lorsqu'elles sont symptomes de la fièvre putride. On connoît que la pleurésie est symptome de la fièvre putride , lorsque la fièvre commence sans signe d'inflammation , & qu'après avoir duré ainsi quelque-temps , l'inflammation de la fièvre se manifeste & augmente ou diminue à proportion de la fièvre. Il en est de même de la Péripneumonie ou inflammation des poumons qui est simplement symptomatique , ou symptome de la fièvre putride , lorsque la fièvre ayant précédé & duré quelque temps sans signe d'inflammation. L'inflammation des poumons se manifeste , augmentant & diminuant à proportion que la fièvre augmente ou diminue ; dans ce cas les émétiques conviennent pour les raisons que nous avons dites en parlant des fièvres putrides.

5°. Dans les fièvres exanthématiques , comme la petite vérole , la rougeole , dans la fièvre scarlatine , dans la fièvre érysipélateuse , lorsque la circulation est languissante , alors il faut aider le cours du sang , afin de favoriser les éruptions , lorsqu'elles ne peuvent se faire , ou ne se font que difficilement , sur-tout dans l'érysipelle qui affecte le visage ; ces érysipelles viennent souvent de la bile mêlée avec le sang.

6°. Dans les maladies soporeuses , essentielles comme dans l'apoplexie , on distingue deux sortes d'apoplexie , la sanguine & la pituiteuse. Dans l'apoplexie sanguine , la respiration est forte , le visage rougit , le pouls est fort & augmente bien loin de diminuer. Elle se connoît encore en faisant attention au tempérament du malade & aux causes qui ont précédé. Dans l'apoplexie pituiteuse , la respiration est peu gênée , le visage pâlit , le pouls est foible , les émétiques conviennent dans l'une & dans l'autre espèce , mais sur-tout dans l'apoplexie pituiteuse , parce qu'ils éveillent le mouvement dans toutes les parties. Dans l'apoplexie sanguine , il est prudent de faire précéder la saignée , pour désemplir les vaisseaux , sans quoi il y auroit à craindre d'augmenter le mal , le sang refluant , comme nous avons dit , avec plus d'abondance vers le cerveau par l'action des émétiques , ainsi ce n'est qu'après avoir pris cette précaution qu'il convient d'administrer les émétiques dans cette espèce d'apoplexie.

7°. Dans les maladies convulsives périodiques comme dans l'apoplexie , l'épilepsie essentielle , hydiopatique qui dépend du vice du cerveau , le sang de ces malades , comme on l'observe , est visqueux & coëneux : par l'action de l'émétique , il est rendu fluide ; on le donne ou

dans les paroxysmes , lorsqu'il y a à craindre qu'ils ne dégénèrent en affection soporeuse , ou hors des paroxysmes pour les rendre moins fréquens.

8°. Dans les différens icteres , lorsqu'ils dépendent , comme on dit , à *causa internâ* & qu'il n'y a point de disposition à l'inflammation , & généralement dans les embarras du bas-ventre , lorsqu'il n'y a pas lieu de craindre l'inflammation.

9°. Dans la suppression du flux menstruel, lorsqu'elle est produite par un sang épais qui ne peut couler par les voies ordinaires , & lorsqu'il n'y a point de signe d'inflammation à l'Uterus, en poussant le sang contenu dans ses couloirs.

10°. Dans l'inappétence & le vomissement habituel & généralement dans tous les cas où les fonctions du ventricule sont dérangées , pourvu qu'il n'y ait aucun signe d'inflammation. Dans ces cas les liqueurs paroissent se mouvoir lentement , l'action des émétiques les met en jeu.

11°. Dans les diarrhées , les dysenteries , la cause de ces maladies résidant souvent dans le ventricule , les émétiques agissent pour lors en évacuant les matieres de mauvaise qualité qui séjournent , soit dans le ventricule , soit dans les intestins.

12°. Dans l'hydropisie , pourvu qu'il soit administré à propos , lorsque le malade n'est pas trop affoibli & qu'il peut en supporter l'action ; dans ce cas , ils produisent de bons effets , 1°. parce qu'ils débouchent les viscères dont l'obstruction avoit occasionné l'hydropisie , 2°. parce qu'ils débouchent pareillement les pores du conduit intestinal par lequel les eaux épanchées sont repompées & rejetées ensuite par les selles.

13°. Dans les maux de tête périodiques invétérés , parce qu'ils sont quelquefois produits par les mauvais suc , suite des mauvaises digestions & par les obstructions de différens viscères du bas-ventre. Enfin il n'est presque pas de maladies dans lesquelles les émétiques ne s'emploient même avec succès , pourvu toutefois qu'on observe soigneusement les précautions suivantes.

Précautions.

TOUT ce qu'il y a à dire sur les précautions à prendre dans l'administration des émétiques peut se réduire à trois chefs , savoir , les circonstances où se trouve le malade , le temps de l'administration & les moyens qu'il faut prendre pour se préparer aux fâcheuses suites des émétiques que la prudence du Médecin ne peut prévoir.

Circonstances.

Circonstances.

Les circonstances qu'il faut observer , se prennent de la maladie même & des symptomes , ou de l'état des différentes parties , 1°. les maladies inflammatoires essentielles tant de la poitrine que du bas-ventre , paroissent contre-indiquer les émétiques , sur-tout lorsque l'inflammation attaque quelque viscere. On connoît l'inflammation essentielle à ces signes. Elle se manifeste avant la fièvre , elle ne fuit pas les paroxysmes de la fièvre , mais on observe les symptomes dans tout le temps de la maladie. Au lieu que l'inflammation symptomatique ne commence ou ne se manifeste que quelque-temps après la fièvre putride , comme un ou deux jours après : ces symptomes augmentent ou diminuent à proportion de la fièvre ; dans l'inflammation on a à craindre la suppuration ou la gangrene & le sphacele. Or les émétiques augmentant la circulation , forceroient les ressorts , & accumuleroient le sang en plus grande quantité dans la partie enflammée , & par-là procureroient la suppuration ou la gangrene.

2°. Les émétiques sont contre-indiqués dans les inflammations même symptomatiques du bas-ventre , parce qu'agissant immédiatement sur les viscères de cette cavité , ils pourroient les faire tomber en gangrene ou en sphacele. On connoît l'inflammation des viscères du bas-ventre par la situation de ces viscères , par la douleur fixe plus ou moins vive , constante rapportée à la région du viscere enflammé & par la chaleur que le malade y ressent.

3°. Ils sont contre-indiqués dans l'inflammation du ventricule qui se connoît par la chaleur & l'ardeur rapportée à ce viscere , par le vomissement fréquent , par une grande soif presque inaltérable , le pouls étant dur , petit , serré.

4°. Dans le cas d'inflammation menaçante , ou comme on dit , de météorisme qui se connoît par le gonflement & la tension douloureuse du bas-ventre , qui fait que le malade ne peut souffrir l'attouchement du Médecin. Si cependant le météorisme n'étoit qu'apparent , ce qu'on reconnoitra par le pouls souple & mou , & qu'il y ait d'ailleurs nécessité de vider les premières voies à cause des signes de putridité , on pourroit employer les émétiques , mais après avoir fait précéder plusieurs saignées , donné des huileux , des ptisanes mucilagineuses.

5°. Dans les douleurs fixes du ventricule accompagnées du vomissement , sur-tout de sang , parce que dans ce cas on a lieu de craindre une

inflammation menaçante. Ces vomissements dépendent quelquefois des mauvaises matieres contenues dans ce viscere. Il consiste cependant par une observation rapportée dans les Mémoires de l'Académie que l'émétique a été donné avec succès à une fille attaquée d'un vomissement de sang, mais après avoir fait précéder trois saignées.

6°. Dans l'ulcere du bas-ventre qu'on connoît par les signes d'inflammation, de suppuration, de fièvre lente.

7°. Dans le vomissement de sang périodique qui survient quelquefois aux femmes, après la suppression de leurs regles, ou aux hommes après la suppression du flux hémorroïdal. Dans ce cas, les vaisseaux du ventricule sont extrêmement foibles, l'émétique pourroit occasionner leur rupture, & causer un vomissement plus abondant.

8°. Dans les blessures du ventricule, quoiqu'elles aient été guéries, parce qu'il est à craindre que les vaisseaux de ce viscere ne s'ouvrent par le vomissement, ce qui est confirmé par l'observation d'un soldat, qui ayant été guéri d'une blessure reçue à l'orifice supérieur de l'estomac, & étant devenu malade, quelque temps après périt dans l'action de l'émétique qui lui causa un vomissement de sang, les vaisseaux de la partie cicatrisée s'étant ouverts; il consiste cependant par une autre Observation que l'émétique a été donné avec succès dans le même cas de blessure de l'estomac. C'est celle d'un Officier qui reçut un coup d'épée à l'estomac après avoir resté long-tems à table, en sorte que le vin sortoit par l'ouverture de la blessure. On lui fit prendre l'émétique par l'ordre d'un des deux Chirurgiens consultés, & ensuite on procéda au traitement de la blessure de la maniere accoutumée, ce qui réussit; quoique l'émétique fût indiqué dans ce cas pour vider les premières voies, & empêcher l'épanchement des matieres contenues dans l'estomac qui se feroit fait dans la cavité de l'abdomen, il faut cependant convenir que cette pratique fut hardie.

9°. Dans les hernies, principalement dans le Bubonocèle, sur-tout lorsqu'il est accompagné de l'étranglement du sac herniaire, il y a de la témérité de prescrire les émétiques, parce qu'il est à craindre que les muscles abdominaux se contractant fortement par leur action, ne causent un plus grand étranglement. Il est cependant des cas où on peut & on doit même les ordonner malgré les hernies, c'est le cas d'affection soporeuse, mais pour lors il n'y a pas tant sujet de craindre l'étranglement dont nous avons parlé, tout étant plus relâché dans le corps.

10°. Dans les schirres des viscères du bas-ventre, sur-tout du foie & de la rate, & dans les tempéraments bilieux & mélancoliques, parce que

la pression de ces viscères peut produire l'inflammation & le faire dégénérer en gangrene.

11°. Dans l'ulcère ou l'abcès du foie qui occasionne quelquefois la dysenterie ou le flux hépatique, parce que l'abcès pourroit se crever & le pus s'épancher dans le bas-ventre. Un malade qui avoit un pareil flux hépatique, périt dans l'action même de l'hypécacuanha qu'il avoit pris contre l'avis de *Boerrhaave*.

12°. Dans les maladies des femmes grosses, l'action des Emétiques peut détacher le placenta & procurer l'avortement. Cependant dans le cas de fièvre putride, on les prescrit, mais avec beaucoup de circonspection & en choisissant les moins violents. Cette pratique est fondée sur ce que les Emétiques ne procurent pas toujours l'avortement, comme l'expérience de bien de malheureuses ne le prouve que trop souvent.

13°. Dans le cas d'affection des poumons, comme d'ulcère, d'abcès, de crachement de sang par cause héréditaire, de tubercule, d'asthme, en un mot de foiblesse des poumons, parce qu'il y a à craindre la rupture des vaisseaux pulmonaires qui sont foibles & délicats; par la même raison ils sont contre-indiqués dans ceux qui ont la poitrine gênée, par exemple, les bossus. Cependant on les donne quelquefois dans la vomique, mais ce n'est pas sans danger, le malade pouvant étouffer dans le temps de l'expectoration, si la vomique est considérable.

Tems où on doit administrer les Emétiques.

ON distingue dans la maladie deux sortes de tems; savoir, les tems généraux & les particuliers. Les généraux sont le commencement, l'accroissement, l'état & la déclinacion, lorsque la maladie ne se termine pas par la mort. Les tems particuliers sont ceux de l'exacerbation & de la remission. En général on peut donner les Emétiques dans tous les tems généraux, quoique cependant on peut les administrer au commencement, les forces n'étant pas alors si épuisées; d'ailleurs les symptômes ne sont pas si violents, & alors *turget materia*. En un mot tout dépend des indications & des forces. On doit aussi préférer le tems de la remission à celui de l'exacerbation. Nous ne nous étendrons pas davantage sur l'exhibition des Emétiques, parce que la même question se présentera en parlant des Cathartiques.

Voyons les moyens qu'il faut prendre pour faciliter l'usage des Emétiques & parer aux fâcheuses suites qu'ils pourroient avoir, & que la prudence du Médecin ne peut pas toujours prévoir.

1°. Dans les maladies inflammatoires , on est forcé d'employer les Emétiques ; lorsque le sang est dans une grande fougue & les solides dans une grande irritation , on doit faire précéder les saignées , les ptisanes d'eau de riz , de poulet , les fomentations sur le bas-ventre , les Clysteres émoulliens , les huileux , &c.

2°. On facilite le vomissement en faisant prendre au malade beaucoup d'eau tiède , par-là les matieres qui sont contenues dans le ventricule , sont plus délayées , & d'ailleurs les contractions du ventricule ont plus de prise sur elles , lorsqu'elles sont en petite quantité.

3°. Dans le cas où le vomissement est trop considérable & dure trop long-temps & où il survient de superpurgations , on doit se conduire comme dans le *Cholera-morbus* , en employant les saignées , les bouillons gras , les Clysteres adoucissans , & si cela ne suffit pas , donner les gouttes anodines dans deux cuillerées d'eau de nymphaea.

Détail des principaux Emétiques.

IL est temps de passer au détail des Emétiques. On les prend du regne végétal & du regne minéral. Nous commencerons par les Emétiques tirés du regne végétal.

Emétiques Végétaux.

LES Emétiques végétaux sont en petit nombre. On peut les réduire à l'*Ipecacuanha* , l'*Azarum* ou le *Cabaret* , l'hellebore blanc , la gomme gutte ; de tous ceux-là le plus usité & le seul presque qu'on emploie est l'*Ipecacuanha*.

L'Ipecacuanha.

C'EST une racine de l'épaisseur de trois ou quatre lignes , tortueuse , dure , assez cassante ; l'écorce externe renferme de petits filets ligneux & blancs qu'on rejette , elle est amere & piquante , & toutefois un peu visqueuse. Il y en a de deux especes , l'une qui nous est apportée du Pérou & qui est grise , qu'on nomme *Ipecacuanha* , *perusiana* ou *grisea* ; l'autre qui nous vient du Brésil est brun ou noir , & s'appelle *Ipecacuanha* ou *Radix Brasiliensis* ou *Ipecacuanha fusca*.

L'*Ipecacuanha* gris a ordinairement plus de grosseur que le noir , & le noir plus de rides que le gris. Les deux especes se trouvent pour l'ordinaire mêlées & confondues chez nos Apothicaires : il est cependant important de les distinguer ; le noir est plus violent , le gris agit plus doucement.

L'Ipecacuanha donné depuis six grains jusqu'à quinze ou vingt produit des évacuations par les selles & le vomissement. Il n'est en vogue que depuis 1686 ; il est vrai qu'avant ce temps-là on connoissoit cette racine & sa vertu émétique , mais on l'employoit plus rarement. On a observé que l'Ipecacuanha donné à des gens d'un tempérament chaud & bilieux faisoit plus de mal que de bien , & produisoit des fièvres , des inflammations.

Cas.

ON l'emploie avec succès dans les dysenteries , dans le flux de sang ; dans les devoiements avec douleur , dans le crachement de sang , dans les hémorragies de l'uterus ; on les recommande dans les vieilles obstructions , mais moins ordinairement.

1°. Dans la dysenterie , quelques Auteurs le regardent comme un spécifique , il ne l'est pas davantage , cependant on peut seulement le regarder comme un excellent remède.

On distingue deux especes de dysenteries , l'essentielle & la symptomatique. L'essentielle est celle dans laquelle il se fait des déjections fréquentes , muqueuses & sanguinolantes , ou mêlées de quelques filets de sang , accompagnées de douleur & de tranchées dans les intestins qui sont dues aux mauvais sucs produits par les mauvaises digestions , ou par une autre cause quelconque & qui n'est point précédée de la fièvre.

La symptomatique au contraire est produite par des sucs âcres mêlés avec le sang & précédée du froid , de frissons & ensuite de la chaleur.

M. de Sydenham traitoit la dysenterie essentielle de cette manière. Il faisoit saigner du bras. Le soir de ce même jour , il ordonnoit une potion de son *Laudanum liquidum* ; il purgeoit avec deux onces & demi de manne , deux gros de sené , un gros de Rhubarbe & de Tamarin ; & dès que la purgation avoit fait tout son effet , il faisoit prendre le narcotique ci-dessus. Cette méthode lui réussissoit , mais il faut remarquer qu'il la suivoit à l'égard des gens vieux & d'un tempérament phlegmatique ou pituiteux.

Il faut cependant convenir que le purgatif est trop violent & qu'on doit en retrancher le sené & la rhubarbe qui échauffent & n'employer que des ~~lour purgatives~~ ^{plus} douces , de peur d'agacer davantage les tuniques des intestins qui ne sont déjà que trop irritées. Il est vrai que M. Sydenham , pour remédier à cet inconvénient , donnoit son narcotique immédiatement après l'effet du purgatif , afin d'appaiser les symptômes , mais l'usage du narcotique qui calme d'abord , nuit dans la suite , & souffre bien des inconvénients.

1°. L'Ipecacuanha convient dans les dyssenteries essentielles , ou dans celles qui ne sont pas symptomatiques. Dans les symptomatiques il ne doit avoir lieu que sur la fin. On ne doit pas le donner lorsque la fièvre est allumée , lorsqu'il y a une grande fougue dans le sang ; dans les tempéraments vifs & bilieux , lorsqu'il a précédé des causes qui peuvent échauffer.

2°. Dans le flux de sang pur , accompagné de douleurs dépendantes de matieres âcres , rongentes & piquantes qui ne semblent différer de la dyssenterie que par les matieres évacuées.

3°. Dans les diarrhées légèrement tormineuses.

4°. L'analogie a fait encore employer l'Ipecacuanha dans d'autres cas , & on l'emploie avec succès dans le crachement de sang , dans les hémorrhagies de l'uterus , & autres. Venons actuellement à la maniere d'employer l'Ipecacuanha.

Maniere d'employer l'Ipecacuanha.

L'IPECACUANHA donné depuis un grain jusqu'à quatre , n'excite point le vomissement , il agit comme simple altérant , & produit de très-bons effets. Comme évacuant , la dose est depuis six grains jusqu'à quinze , vingt ou vingt-cinq. Il y a des endroits , comme à Lyon , où on pousse la dose jusqu'à quatre-vingt grains. Cette dose est trop haute , & outre qu'alors il ne produit pas de plus grandes évacuations qu'à la dose de vingt-cinq grains , il doit beaucoup échauffer. On donne l'Ipecacuanha ou seul ou associé à d'autres remèdes , seul on le donne en poudre depuis six grains jusqu'à quinze dans une cuillerée de bouillon ou de vin , & il produit le vomissement & les selles. On facilite son action par l'eau tiède ; on l'associe à la manne & aux tamarins depuis quinze jusqu'à vingt grains lorsqu'on craint d'échauffer le malade ; on le donne comme altérant depuis un grain jusqu'à quatre qu'on incorpore avec les électuaires stomachiques , par exemple , quatre grains d'Ipecacuanha avec vingt ou vingt-cinq grains de Diascordium , & on donne un verre de vin trempé après cette Potion. On peut aussi dans ce cas se servir des pilules spécifiques d'*Helvetius* qui sont un grain d'Ipecacuanha incorporé avec le mucilage de la gomme adragan. On peut encore donner l'Ipecacuanha en infusion dans de l'eau ou du vin depuis dix grains jusqu'à trente , il excite le vomissement & les selles. En décoction , depuis trente grains jusqu'à quarante , il rend l'eau dans laquelle on le fait bouillir , visqueuse , mucilagineuse , mais il n'est gueres usité.

M. Sidobre ayant observé à l'armée que l'Ipecacuanha donné comme altérant, nuisoit dans les dyssenteries épidémiques, imagina de le faire infuser pendant une nuit dans de l'eau-de-vie, il le fit ensuite secher, le pulvérisa de nouveau, & le donna à la dose de dix à vingt grains, il ne produisit alors aucune nausée & n'échauffa point: il l'appella Ipecacuanha adouci.

Pharmacologie rationnelle.

ELLE conduit à la connoissance des parties par lesquelles l'Ipecacuanha agit; pour parvenir à cette connoissance, M. Bouleduc a eu recours à la voie de la distillation & à celle de l'extraction. La distillation fournit peu de lumieres; par ce moyen, il ne retira que du phlegme & un esprit acide & de l'huile, & il remarqua que l'esprit de l'Ipecacuanha brun étoit plus âcre que celui du gris. L'extraction lui a été plus heureuse. Dans l'Ipecacuanha il y a des parties résineuses & des parties gommeuses. Il employa les dissolvants pour faire l'extraction de ces différentes parties. Pour cet effet il fit infuser huit onces d'Ipecacuanha gris dans un bon esprit de vin bien rectifié, (c'est le dissolvant des résines) & il tira dix dragmes de résines ou d'extrait résineux. Il fit ensuite infuser le résidu dans de l'eau de pluie bien claire, c'est-à-dire distillée, & il en tira deux onces d'extrait gommeux; il employa la même méthode sur une même quantité de brun, & celui-ci ne rendit que six dragmes de résine & cinq ou six de gomme. Il observa en même tems que l'extrait gommeux donné à la dose de l'Ipecacuanha même naturel de vingt grains, n'excitoit aucune nausée, mais pouffoit par les urines, & purgeoit moins que l'Ipecacuanha en nature, & qu'enfin il guérissoit des dyssenteries; & qu'au contraire l'extrait résineux à la même dose faisoit vomir & ne guérissoit pas le flux dyssenterique. Ainsi la vertu échauffante & purgative de l'Ipecacuanha réside dans la partie résineuse, & a la propriété d'arrêter le flux dyssenterique & autres. Il suit encore des expériences que l'action vomitive doit être plus bridée dans l'Ipecacuanha gris que dans le noir, puisque le gris contient à proportion beaucoup plus de parties gommeuses que le noir, par où l'on peut expliquer raisonnablement pourquoi il a moins de puissance & de vertu émétique que le noir; delà on peut encore expliquer les effets que l'Ipecacuanha produit.

La résine qui est âcre & piquante agit sur les parois du ventricule & des intestins, & procure les évacuations. La gomme est astringente &

calme les douleurs. Quand nous disons que la gomme ou la partie gommeuse de l'Ipecacuanha est astringente, il ne faut pas que cette dénomination réveille chez nous l'idée d'un Médicament qui a la vertu astringente, de resserrer, de froncer les fibres & de rendre les pores plus petits; ce n'est point là sa manière d'agir, mais les parois de l'estomac se trouvant presque dépouillés du mucus dont elles devroient être enduites, & presque tout-à-fait à nud, à cause des matieres rongeantes qui excitent la douleur, la partie gommeuse de l'Ipecacuanha remédiera à ces désordres en deux manieres, 1^o. en ce qu'elle enduit les parois, les empêche d'être agassées par les mauvaises matieres, & supplée ainsi au défaut du mucus. 2^o. En ce qu'elle est propre en même tems à envelopper ces matieres âcres & à émousser leur action.

Ce qui vient d'être dit fournit des lumieres pour préparer l'Ipecacuanha d'une manière convenable pour certains cas. En diminuant sa partie résineuse, on le rend plus doux, moins échauffant, ainsi dans le cas où l'Ipecacuanha adouci de M. de Sidobre nuirait, on pourroit se servir de l'extrait gommeux de M. Bouleduc qui est plus doux, & ne laisse pas cependant d'arrêter la dysenterie. On peut encore employer cet extrait dans des cas où l'Ipecacuanha donné à haute dose seroit capable de nuire, comme dans les tempéraments chauds & bilieux. Cet extrait qui arrête les dysenteries & le flux de sang, ne purge point du tout ou il le fait très-doucement, & ce dernier effet quand il a lieu doit être attribué à quelques parties résineuses qui n'ont pas été séparées par l'extraction des parties gommeuses, mais qui sont en très-petite quantité.

L'extrait gommeux est encore bon dans les ulceres mêmes des poudrons, du foie & de la rate, dans les ulceres du ventricule & des intestins qui viennent à la suite de la dysenterie invétérée, dans le crachement de sang & autres hémorragies, & généralement dans tous les cas où l'Ipecacuanha adouci convient.

La racine d'Ipecacuanha se conserve assez long-tems sans perdre sa vertu émétique; si cependant on la garde trop long-tems, elle la perd & devient, selon Pison, apéritive & diurétique. Il arrive quelquefois qu'en pulvérisant l'Ipecacuanha, si on n'a pas soin de bien fermer le mortier où se fait la trituration, les parties volatiles de cette racine montent au visage de celui qui le pulvérise, & lui occasionne des crachements de sang & des grands maux de tête; on ne doit pas s'effrayer de ces accidens, ils n'ont pas de suites fâcheuses, & se guérissent par une diete humectante & rafraichissante de deux ou trois jours.

Azarum.

L'AZARUM qu'on appelle *Cabaret*, encore *Rondet*, *Nar sauvage*, a des feuilles rondes, vertes foncées, sa racine est menue, rampante, noueuse, d'un goût amer, un peu aromatique; il étoit assez usité chez les anciens Médecins avant la connoissance de l'*Ipecacuanha* & des préparations minérales. Outre sa vertu cathartique & émétique, il est encore apéritif, diurétique, emmenagogue; la racine & les feuilles sont très-propres à pousser par les selles, à procurer le vomissement, les mois. Il faut se garder de le donner aux femmes grosses. Il est aussi propre à lever les obstructions, il convient dans les fièvres intermittentes croniques, dans des maladies causées par des humeurs visqueuses, tenaces, dans les ictères noirs & jaunes, lorsque les ictères dépendent d'une obstruction des couloirs de la bile, & qu'il n'y a point de chaleur, ni de fièvre. Si l'on veut faire vomir dans les tempéraments pituiteux, on peut employer la Poudre de la racine ou des feuilles. Les feuilles sont plus violentes. Si on veut se servir de la Poudre de la racine, on en prend deux dragmes, qu'on fait infuser pendant une nuit sur des cendres chaudes dans six onces de vin. Si on emploie les feuilles, on en prend cinq ou six qu'on fait macérer dans pareille quantité de vin blanc, pendant une nuit, & on en donne le matin la colature. Si on veut donner la Poudre de la racine en substance, la dose est depuis dix grains jusqu'à vingt-cinq qu'on associe avec la conserve de fleur d'orange, en infusion depuis deux gros jusqu'à trois; si l'on veut atténuer, débarrasser, provoquer les mois, alors on les prépare autrement; on prend deux dragmes ou trois de la racine en poudre, qu'on fait infuser dans douze onces d'eau commune ou orgée pendant la nuit, & on la donne le matin en deux verres, elle est alors dépouillée de sa vertu cathartique & émétique. La poudre des feuilles est un très-bon sternutatoire dans les maux de tête invétérés dépendans principalement des matieres visqueuses, tenaces, retenues dans les couloirs; voici comme on s'en sert: on pulvérise ces feuilles desséchées, & on en prend le soir en se couchant trois ou quatre grains comme du Tabac. Cette poudre n'empêche pas le sommeil, elle agit doucement sans causer beaucoup d'effort, & le malade en s'éveillant trouve quantité de matieres rendues; cependant si on en continuoît trop long-temps l'usage, il produiroit le saignement du nez. M. *Geoffroi* a éprouvé cette vertu sternutatoire; il a usé de la même poudre dans la paralysie de la bouche & de la langue qui peut dépendre des ma-

tieres tenaces qui compriment les nerfs de ces parties , ce qui lui a réussi & lui a fait soupçonner que ce remede pourroit convenir dans les affections soporeuses , pituiteuses. Le Cabaret agit par ces parties résineuses & gommeuses à-peu-près comme l'Ipecacuanha , sa vertu apéritive est dans la gomme & les fels.

Hellebore blanc.

C'EST une racine oblongue de la grosseur d'un pouce , beaucoup plus amere , âcre & désagréable , on l'appelle encore *helleborus albus flore subviridi*. Cette racine pulvérisée étoit fort usitée chez les anciens. Ils la regardoient comme très-propre à faire couler les matieres tenaces & visqueuses des premieres voies : ils ne l'ordonnoient qu'à des personnes pituiteuses , mais robustes , & ils les préparoient auparavant par des remedes adoucissans. Ils l'ordonnoient dans les maux de tête , la manie , la mélancolie ; sa force émétique est si violente , si propre à causer des inflammations , qu'on ne l'emploie gueres à présent que comme sternutatoire dans les maladies soporeuses , son usage intérieur seroit dangereux ; lavée on l'applique sur les petits ulceres de la peau , selon quelques-uns sa vertu dure environ trente ans. Elle est encore bonne pour la phthisie & le mal caduc.

Gomme-Gutte , Gutta , Gamba , Gammanda.

C'EST un suc concret , opaque , jaunâtre , en partie gommeux & en partie résineux qui se dissout dans l'esprit de vin & dans l'eau , & prend feu à-peu-près comme la cire d'Espagne ; elle est d'abord insipide , & paroît ensuite caustique , piquante , jaunit la salive : on l'apporte des Indes orientales & occidentales en petits gâteaux , les uns croient que cette gomme est d'une espece de Thitimale fort élevé ; d'autres croient qu'elle découle d'un arbre oriental nommé *Carcapuli* ou *Gargapuli* : elle n'est connue que depuis 1603. Ses vertus ne sont pas bien constatées ; les Indiens ne s'en servent que très-rarement en médecine , ils l'emploient beaucoup plus pour la Teinture. M. d'Ausbourg l'emploie dans le cas de fièvre quotidienne ou quarte ; dans toutes les obstructions , *Hortius* & *Cartheuser* la croient pernicieuse ; M. *Geoffroi* remarque qu'*Hortius* dans la suite s'est retracté & qu'elle convient dans les hydropisies causées par des obstructions de matieres sereuses. *Hechteller* s'en est beaucoup servi & la regardoit comme un remede *polycreste* , sur-tout dans les obstructions invétérées ; dans la difficulté de respirer , lorsqu'elle est produite par des matieres vis-

queuses. M. *Geoffroi* la croit propre à vider les sérosités dans les hydro-pisies du bas-ventre , & dans le cas de Leucophlegmatic. Elle procure la déjection par les selles , sans tranchées , douleur ni inflammation , ni convulsions. Elle peut produire des superpurgations, donnée à trop haute dose , ou dissoute dans des liqueurs spiritueuses. M. *Wedelius* tient le milieu , il la regarde comme un purgatif fort & émétique en même-temps : il ne l'ordonne que dans le cas de relâchement , & lorsque les humeurs sont tenaces. Lorsqu'on la donne seule , on prétend qu'il en résulte de meilleurs effets. En substance on la donne depuis un grain jusqu'à six délayée dans une grande quantité de véhicule. M. *Geoffroi* prenoit huit grains de gomme-gutte , les faisoit dissoudre , infuser pendant la nuit dans douze onces d'eau commune , & y ajoutoit une once de sirop violat qu'il partageoit en deux doses , quelquefois il l'associoit aux autres Cathartiques. Ce remède est extrêmement douteux , il convient principalement dans le cas d'hydropisie , d'anasarque , de tempérament pituiteux , & en cela presque tous ceux qui ont parlé de sa vertu , s'accordent entr'eux. On peut encore rapporter aux Émétiques végétaux , l'élaterium , l'hellebore noir , le tabac , la coloquinte.

Émétiques minéraux.

DE tous les Émétiques minéraux , les seuls qui soient en usage , se tirent de l'Antimoine , nous ne parlons ici que de ceux-là.

Antimoine.

L'ANTIMOINE est une substance métallique , solide , pesante , fragile , de couleur de plomb , parsemée de petites aiguilles brillantes , qui se fond au feu & qui n'est pas mallable : elle est composée d'une partie demi-métallique & d'un soufre semblable au soufre commun. On en trouve plusieurs mines en France & en d'autres endroits. Celui de France contient partie égale de substance métallique & de soufre. Dans les autres ces parties sont combinées à différente proportion. Les Chymistes lui ont donné différents noms ; les plus usités en Médecine sont ceux d'*Antimorianum* & de *Stibium* ; l'Antimoine cru n'est point émétique , mais seulement ses préparations dont nous allons nous occuper. Voici l'ordre que nous suivrons : 1°. nous expliquerons les différentes préparations Antimoniales & nous donnerons leurs doses ; 2°. nous dirons en quoi consiste ou

en quelle partie réside la vertu émétique des Antimoniaux ; 3°. nous marquerons les cas tant généraux que particuliers où ces émétiques conviennent , & les cas particuliers où on doit donner la préférence aux uns sur les autres.

A R T I C L E P R E M I E R.

Préparations Antimoniales & leurs doses.

NOUS commencerons par les plus simples pour passer delà à celles qui sont plus composées. Suivant ce plan , nous traiterons d'abord des fleurs d'Antimoine , comme de la préparation la plus simple , ensuite du verre d'Antimoine , du foie d'Antimoine , du ~~du~~ régule d'Antimoine , du vin émétique , du Tartre émétique , du Kermès minéral , enfin du Sirop de *Glauber*.

Fleurs d'Antimoine.

POUR faire les Fleurs Antimoniales , on pulvérise la quantité d'Antimoine cru qu'on juge à propos ; on prend un vaisseau de terre non vernissé , qui ait une ouverture latérale , on l'adapte à un fourneau , on couvre ce premier vaisseau de trois autres qui n'ont point de fonds , qu'on appelle aludels. Ceux-ci sont recouverts d'un autre qui a un fond ; on allume le feu & on le pousse jusqu'à ce que ce premier vaisseau soit rougi , alors on jette cuillerée à cuillerée l'Antimoine pulvérisé par l'ouverture latérale qu'on ferme ensuite après avoir remué avec une spatule de fer un peu recourbée la matière pour l'étendre dans le vaisseau. La poussière diversement colorée & parsemée de petites aiguilles , qu'on trouve aux parois des aludels , est ce qu'on appelle Fleurs d'Antimoine qui ne sont autre chose qu'un composé des parties métalliques & des parties sulfureuses , mais autrement combinées qu'elles ne l'étoient avant cette préparation. Elles servent à la composition du sirop de *Glauber*. Seules elles ne sont gueres usitées ; si l'on vouloit cependant les employer , la dose est de deux grains à six.

Verre d'Antimoine.

POUR avoir le Verre d'Antimoine , il faut commencer par faire calciner l'Antimoine ; pour cet effet on prend un vaisseau de terre non vernissé , on y met dedans deux ou trois onces d'Antimoine cru réduit en poudre fine , on place ce vaisseau sur un petit feu de charbon , que l'on

augmente jusqu'à ce qu'on voie que l'Antimoine commence à fumer (on doit se tenir en garde contre cette fumée qui est dangereuse), on entretient le feu à ce degré , & on remue la matiere qui devient terreuse , alors on augmente le feu jusqu'à faire rougir le vaisseau , & on l'entretient à ce degré jusqu'à ce que la matiere cesse de fumer , on a la chaux d'Antimoine qu'on met dans un creuset placé dans un fourneau de fusion ; on couvre le creuset , y laissant une petite ouverture pour pouvoir y introduire une petite verge ; on allume le feu peu-à-peu , puis on le pousse fortement pour faire fondre la chaux. Pour s'assurer si elle est fondue , on introduit dans le creuset , par l'ouverture dont nous venons de parler , une petite verge de fer , au bout de laquelle il s'attachera une petite masse de verre ; si la matiere est bien en fonte , on retire le creuset & on verse promptement la matiere fondue sur un marbre poli & chaud , elle se fige aussi-tôt en un verre jaunâtre , c'est le verre d'Antimoine : il sert à composer le tartre émétique , il s'emploie rarement seul , & est plus violent que les Fleurs d'Antimoine. Si on vouloit cependant s'en servir , on peut le prescrire depuis un grain jusqu'à six. M. Geoffroi remarque qu'on en empêche sa force , si on y brûle trois ou quatre fois de l'esprit de vin , en le pilant bien chaque fois sur le marbre , & qu'alors on peut le donner depuis dix grains jusqu'à 20 & 30 , il purge doucement par le haut & par le bas , & quelquefois il fait suer ; il perd sa vertu émétique & devient un véritable cathartique , si on le fait macérer pendant deux ou trois jours dans l'esprit de vin , dans laquelle on aura dissout demi-once de Mastic.

Foie d'Antimoine.

ON prend parties égales d'Antimoine cru & de nitre réduits en poudre très-fine qu'on met dans un ~~creuset~~ ^{creuset} placé sur les charbons ardens , on mêle exactement ; la détonnation se fait , la matiere s'enflamme tout-à-coup & se change en une masse à demi-vitrifiée que l'on appelle foie d'Antimoine , à cause de sa couleur. On réduit cette masse en une poudre très-fine qu'on lave trois ou quatre fois dans l'eau commune. On seche cette poussiere , & on l'appelle communement safran de métaux & terre sainte de Rulland. La dose de cette poudre en substance est depuis deux grains jusqu'à six.

Régule d'Antimoine.

ON prend seize onces d'Antimoine cru , douze onces de tartre , cinq onces de nitre , on pulvérise bien ces matieres , on les mêle exactement , & on les jette dans un creuset ardent ; après que toute la déflagration est faite , on jette encore dans le même creuset une once de nitre , on excite un plus grand feu , afin que la matiere se fonde bien. Alors on la verse dans un vase d'airain qui a la figure d'un cône renversé , que l'on fait échauffer & que l'on enduit de graisse ; on secoue un peu le vase avec un marteau , afin que la matiere ne s'attache pas aux parois du vaisseau ; on donne un second coup de marteau pour que la régule se sépare des scories. On retire la régule & on la sépare des scories. La régule excite le vomissement , mais elle est moins violente que le verre & que le foie d'Antimoine. On la donne depuis deux grains jusqu'à dix ou douze.

On fait avec la régule d'Antimoine des gobelets qui rendent émétique le vin qu'on y fait infuser pendant la nuit : on en fait encore des boules qui ont la vertu émétique , & qu'on peut avaler plusieurs fois sans qu'elles perdent leur éméticité , on les appelle pilules perpétuelles.

Vin Emétique.

ON fait le Vin Emétique en faisant infuser du safran de métaux trois onces , dans trois onces de vin blanc , pendant deux ou trois jours , en remuant la bouteille de tems en tems. Ensuite on laisse reposer le tout , il devient clair & lymphide , c'est-là le vin émétique : on le donne depuis une once jusqu'à trois ; si avant de le donner on remue le vase , on rend ce Vin Emétique trouble ; on peut se servir de celui-ci , quand le simple n'a pas assez d'action. On l'emploie assez ordinairement en lavement à la dose de deux onces jusqu'à quatre en certains endroits. On appelle ce Vin Emétique , *Aqua Benedicta Rullandi*.

Tartre Emétique.

SA préparation est différente suivant différents Auteurs. Voici celle de M. Geoffroi : il prend deux onces de foie d'Antimoine , avec les scories pulvérisées , huit onces de crème de Tartre & une suffisante quantité d'eau commune : il fait bouillir le tout dans un vaisseau de terre pendant huit ou neuf heures , passe la liqueur & fait évaporer jusqu'à siccité. Ce résidu

salin est ce qu'on appelle Tartre Emétique qu'on donne depuis deux jusqu'à huit grains.

Il y a de Chymistes qui , au lieu du foie , emploient le Verre d'Antimoine , celui-ci étant plus violent que le foie ; le Tartre qui résulte de ce procédé est un plus puissant Emétique , on ne peut l'ordonner qu'à la dose de ~~deux~~ ou ~~trois~~ grains tout au plus. D'autres mêlent partie égale de verre & de foie d'Antimoine avec la Crème de Tartre & l'eau , & font bouillir la matière douze heures. Il y en a qui au lieu de la crème de Tartre , emploient le sel végétal , qu'ils mêlent avec le foie d'Antimoine , & forment ce qu'ils appellent Tartre Emétique *Soluble*. De ces différents mélanges , il résulte une grande variété de force dans le Tartre Emétique. La même variété doit suivre du temps pendant lequel l'ébullition se fait.

M. Hofman remarque que si on laisse trop long-temps bouillir les mélanges dont nous avons parlé ci-dessus , on a un Tartre dépouillé en partie de sa vertu Emétique. Cette remarque est confirmée par M. Macquer qui prétend que , selon un habile Chymiste , on ne doit faire bouillir la matière que 6 ou 7 minutes. Ainsi la différence du temps d'ébullition en doit produire une dans la vertu Emétique du Tartre. Comme on ne peut déterminer la force du Tartre Emétique en général , on doit s'informer de l'Artiste pour savoir quelle est la plus haute dose à laquelle on peut donner son Tartre Emétique.

Kermès minéral , ou Poudre des Chartreux.

LE Kermès minéral se prépare en faisant bouillir pendant deux heures quatre livres d'Antimoine pilé & réduit en petits morceaux avec une livre de nitre fixe & huit livres d'eau de pluie : on passe cette décoction toute bouillante au travers d'un papier gris , & on le met à l'écart pendant vingt-quatre heures , jusqu'à ce qu'une poudre jaune se soit précipitée au fond du vaisseau & que la liqueur soit limpide. On verse peu-à-peu cette liqueur par inclination , & on remet sur du papier gris la poussière qui étoit au fond du vaisseau. On verse plusieurs fois dessus de l'eau tiède : enfin on fait sécher cette poussière & on allume par-dessus deux ou trois fois de l'esprit de vin , jusqu'à quatre onces , après quoi on fait bien sécher cette poudre & on la garde pour l'usage. Cette préparation est émétique & altérante , & peut être regardée comme un remède polycreste. On l'ordonne comme émétique , depuis deux jusqu'à quatre grains. Comme alté-

rant depuis un demi-grain jusqu'à deux, on ne le prescrit gueres ici que comme altérant.

Syrop, ou extrait vomitif de Glauber.

C'EST la préparation Antimoniale la plus composée; on prend fleurs d'Antimoine 1. onc. Crème de Tartre 2. onc. Sucre Candi 6. onc. on pulvérise & mêle ensemble ces trois matieres, on les met dans un matras, on verse dessus de l'eau de pluie une livre: on adapte un vaisseau de rencontre, & on fait bouillir pendant douze heures. On retire une teinture rouge qu'on filtre toute chaude, on la met dans un alambic & on en fait distiller toute l'humidité jusqu'à consistance de miel. On met la matiere dans une cucurbite & on verse dessus une livre d'esprit de vin. On adapte un vaisseau de rencontre & on fait bouillir pendant douze heures. On retire une teinture rouge qu'on filtre toute chaude, on la fait digérer au feu de sable pendant sept ou huit heures ou plus; on a une teinture rouge, on la sépare, on la filtre & on la fait distiller dans un alambic de verre jusqu'à consistance de sirop; c'est le sirop ou l'extrait vomitif de *Glauber*. Cette préparation est un émétique assez doux pour les enfants, comme l'expérience le fait voir; la dose pour les enfants de deux à huit ans est d'une goutte jusqu'à quatre, cinq, six, sept & huit. Pour les enfants de huit ans depuis six gouttes jusqu'à vingt. Pour les adultes depuis dix-huit jusqu'à trente ou même quarante gouttes. On dit ordinairement que quatre gouttes de sirop de *Glauber* équivalant un grain de Tartre. Cela dépend des procédés dont on s'est servi pour faire le Tartre qui est plus ou moins violent, selon les différents mélanges & le tems de l'ébullition.

A R T I C L E II.

Dans quelles parties réside la vertu Emétique des Antimoniaux.

SI on veut s'en tenir à ce que l'expérience nous apprend, touchant les parties dans lesquelles consiste l'Eméticité des préparations antimoniales, on peut avoir à cet égard une satisfaction suffisante, mais si on veut aller plus loin & savoir, par exemple, quelle est la nature particuliere de ces parties, on tombera nécessairement dans des hypoteses. Voici donc ce que les expériences nous apprennent. L'Antimoine, comme nous l'avons dit, est un composé d'une substance demi-métallique & d'un soufre semblable au soufre commun. Ce soufre est combiné à différentes proportions avec

la substance demi-métallique, suivant les différents antimoine; il y en a dans lesquels on ne trouve qu'un quart du poids, & d'autres dans lesquels on trouve la moitié de soufre.

On ne peut pas dire que la vertu émétique des antimoniaux réside, 1^o. dans le soufre, puisque le soufre seul n'excite point le vomissement, 2^o. ni dans la combinaison du soufre avec la substance demi-métallique, puisque l'Antimoine cru, dans lequel ces deux substances sont combinées, n'est point essentiellement émétique, mais seulement par accident lorsque l'estomac se trouve chargé de matières acides: aussi les fleurs d'Antimoine qui ne sont qu'un composé de parties demi-métalliques & de parties sulfureuses, mais différemment combinées, c'est-à-dire, volatilisées, ~~ne sont pas beaucoup usitées.~~

Quant à la substance demi-métallique ou réguline de l'Antimoine, elle est composée de même que les autres substances métalliques d'une terre vitrifiable & d'un phlogistique. Le phlogistique nuit plutôt à l'éméticité qu'il ne l'aide, puisqu'on voit par les expériences que la substance demi-métallique séparée du soufre quoiqu'émétique, l'est cependant beaucoup moins que lorsqu'elle est dépouillée de son phlogistique, & que plus elle est dépouillée de son phlogistique, plus elle est émétique; ainsi la règle est moins énergique que le verre d'Antimoine, qui dans le temps de la calcination, souffre une grande dissipation du phlogistique. La terre vitrifiable est donc la partie dans laquelle réside la vertu émétique des antimoniaux; aussi voit-on que lorsque cette terre métallique a perdu la vertu de se vitrifier, l'Antimoine n'est plus émétique. Voilà ce que les observations nous apprennent touchant les parties dans lesquelles réside la vertu émétique des antimoniaux. De là il suit que si on peut découvrir quelles sont les préparations antimoniales qui contiennent le plus de cette terre vitrifiable, sous une égale masse, on découvrira en même temps quel est des antimoniaux le plus puissant & le plus énergique; c'est ce que M. Geoffroi a heureusement découvert par la méthode de la réduction qu'il a suivi sur différents tartres.

Pour cela il emploie dans ses expériences douze tartres émétiques différemment préparés. Le premier tartre lui a donné trente-deux grains de règle par once qui ne sont qu'un dix-huitième de grain de règle par grain de tartre. Un autre tartre lui a donné une drachme & demie 31 scrup. de règle par once, & ce tartre produisoit de bons effets: une drachme & demie par once, fait trois sixièmes de grain de règle par grain de tartre. Un autre lui a donné trois onzièmes de règle par once, & ce tartre étoit

un puissant émétique qu'on ne pouvoit donner au dessus d'un ou de deux grains , émétique plus énergique encore que le verre d'Antimoine ordinaire qu'on peut donner depuis 1 grain jusqu'à 4 ; or deux drachmes par once font un quart de grain de régule par grain de tartre ; d'où il suit que l'acide de crème de tartre , bien loin de châtrer & de diminuer la vertu émétique de la régule , l'augmente au contraire ; il faut cependant observer que les acides végétaux n'ont guere de prise sur les parties de l'Antimoine cru , c'est-à-dire , lorsque la substance réguline n'est pas dégagée de la partie sulphureuse & du phlogistique.

Par les expériences ci-dessus , on peut rendre raison des différents degrés d'éméticité qu'on remarque dans les différentes préparations d'Antimoine. Ainsi les fleurs d'Antimoine sont moins émétiques qu'aucune autre préparation antimoniale , parce que ce n'est autre chose que les parties demi-métalliques & les parties sulphureuses de l'Antimoine sublimé , & qu'elles approchent beaucoup de l'Antimoine cru qui n'est pas émétique.

Le foie d'antimoine est une préparation dans laquelle on remarque une terre qui n'est qu'à demi vitrifiée , elle est moins émétique que le verre d'Antimoine ; le verre d'Antimoine est de toutes ces préparations simples la plus énergique , parce qu'il contient une terre vitrifiée , dépouillée de soufre & du phlogistique : voilà pour les préparations simples de l'Antimoine. A l'égard des préparations plus composées , le tartre émétique préparé avec la régule est plus foible que celui-ci qui l'est avec le foie , & ce dernier moins énergique que celui qui est préparé avec le verre , parce que , suivant ces différents procédés , la terre vitrifiable de l'Antimoine se trouve plus ou moins pure & dégagée du phlogistique. Le sirop de *Glober* est un émétique beaucoup plus doux que les autres préparations : on en verra aisément la raison , si on fait attention qu'il est préparé avec les fleurs d'Antimoine.

Le Kermès minéral tire sa vertu émétique de la régule qui entre dans sa préparation. On a remarqué qu'un grain de Kermès minéral qui contenoit un trente-sixieme de substance réguline , faisoit vomir doucement.

A R T I C L E T R O I S I E M E .

Cas généraux où les Émétiques antimoniaux conviennent.

LES Émétiques antimoniaux conviennent généralement dans tous les cas où il faut faire vomir , mais ils sont sur-tout indiqués , 1°. dans les fièvres putrides simples , c'est-à-dire , qui ne sont pas accompagnées d'inflammation , principalement lorsqu'il y a des signes d'amas de mauvais sucs dans les vaisseaux sécrétoires de l'estomac. Ces signes sont les nau-

fées , les rapports aigres , amers , brûlants , une douleur gravative à l'estomac ; dans ce cas ils conviennent , & sont propres à déboucher les tuyaux sécrétoires de l'estomac , & à les dégager de ces mauvais suc par les secouffes qu'ils occasionnent. Nous avons dit qu'ils conviennent principalement lorsqu'il se trouvoit des signes d'amas de mauvais suc dans les vaisseaux sécrétoires de l'estomac , parce que quand même ces signes manqueroient , les émetiques antimoniaux ne laisseroient pas d'être toujours utiles dans les fièvres putrides simples , pour les raisons qu'on a donné ci-devant en parlant des généralités des émetiques. 2°. Dans les fièvres putrides inflammatoires , mais il faut avoir soin auparavant de désemplir considérablement les vaisseaux par les saignées fréquentes , d'employer des boissons abondantes & rafraîchissantes , & ce n'est que lorsque les symptômes de l'inflammation ont diminué , qu'on peut donner les antimoniaux , sur-tout si la poitrine est prise. Mais si les symptômes de l'inflammation se portent vers le bas-ventre , on ne doit point administrer les émetiques que ces symptômes non-seulement soient diminués , mais mêmes qu'ils n'aient entièrement cessés : encore même faut-il attendre quelque temps après que les symptômes ont disparu , c'est-à-dire , un ou deux jours , parce qu'il reste toujours dans les parties qui ont été enflammées , une disposition prochaine à l'inflammation , & que les émetiques ne manqueroient pas de renouveler. 3°. Dans les fièvres inflammatoires , exanthématiques , éréthelateuses , celles qui accompagnent la petite vérole , les tâches de la rougeole ; lorsque les éruptions ne se font point du tout , ou ne se font qu'avec peine , que le sang est épaissi & qu'il y a des signes de putridité , ils produisent alors de bons effets , sur-tout étant donnés dans les commencemens , en donnant plus de fluidité au sang & faisant procéder les éruptions. M. Sydenham a observé & on l'observe encore après lui , lorsque les cas se présentent , que dans les petites véroles confluantes , il survient une salivation qui dure depuis le premier ou le second jour de l'éruption jusqu'à l'onzième , & qui est accompagné de l'enflure du visage , enflure qui doit durer quelques jours de plus que la salivation , & qu'alors , c'est-à-dire , le onzième jour , si une enflure considérable des mains ne succède à la suppression de la salivation , le malade éprouve une espece d'affection soporeuse , une suffocation , les glandes salivaires & les glandes muqueuses de la bouche & du gosier étant engorgées de suc épaissi ; & qu'enfin il périt ; pour dégorgier les glandes , M. Sidenham donnoit le vin émetique à la dose d'une once & demi , dose plus haute que celle qu'il donnoit dans d'autres cas

il assure que cette méthode lui a mieux réussi qu'aucune autre , mais il avoue en même temps qu'elle n'est pas infailible , & que ce remede n'a pas guéri tous ceux à qui il l'a fait donner. 4°. Dans les affections soporeuses , dans les apoplexies , soit sanguines , soit sur - tout pituiteuses , il faut remarquer , comme on l'a dit plus haut , que dans les apoplexies sanguines , on doit faire précéder les saignées pour les raisons qu'on a données. Ils conviennent encore , soit que l'apoplexie soit parfaite , soit qu'elle soit imparfaite. On appelle apoplexie parfaite celle où le malade perd tout-à-coup l'usage des sens , le mouvement & que tout le corps est paralysé ; mais l'imparfaite est celle qui ne fait pas perdre l'usage des sens & dans laquelle tout le corps n'est pas paralysé , mais seulement quelques parties , comme la langue ou même tout un côté du corps ; mais il faut que cette paralysie survienne tout-à-coup. 5°. Dans le cours de ventre , les dysenteries où les émétiques sont indiqués , on doit préférer les végétaux , comme l'ipécacuanha , pour les raisons ci-devant données ; cependant au défaut des végétaux on peut employer les antimoniaux. 6°. Dans les fièvres intermittentes , on doit préférer les émétiques antimoniaux. 7°. Dans les hydropisies , M. *Sidenham* donnoit le vin émétique à la dose d'une once & demie pendant trois jours de suite , puis il continuoit de le donner à moindre dose , ayant égard aux forces du malade , & mettant un jour d'intervalle entre deux , jusqu'à ce que le malade en eût pris en tout la valeur de six doses ; il continuoit ensuite le traitement par les purgatifs hydragogues ; mais il faut observer que M. *Sidenham* usoit de cette méthode seulement lorsqu'il y avoit une grande quantité d'eau ramassée dans la cavité du bas-ventre , & que les forces du malade n'étoient pas épuisées & pouvoient supporter l'action de cet émétique. Ces deux conditions sont absolument nécessaires pour que le vin émétique fasse de bons effets. 8°. Dans certains cas où les émétiques paroissent indiqués d'un côté & contre-indiqués de l'autre , comme dans les blessures de l'estomac faites lorsque ce viscere est rempli d'aliments , crainte qu'ils ne se jettent ~~dans~~ dans la cavité du bas-ventre , tel qu'étoit le cas d'un Officier dont nous avons parlé dans les généralités des émétiques , on doit alors se servir d'un émétique dont l'action soit prompte & sûre , le vin émétique peut convenir. Il conviendrait aussi dans un cas semblable à celui d'une fille dont il a été parlé dans les généralités des émétiques , qui avoit une douleur fixe à l'estomac , accompagnée d'un vomissement de sang , à laquelle on donna l'émétique , après avoir fait précéder trois saignées. Cependant

dans ce cas on devroit préférer l'ipecacuanha comme plus propre pour les hémorragies , pour les raisons que nous avons déjà données.

A R T I C L E IV.

Cas particuliers où on doit donner la préférence aux préparations Antimoniales sur d'autres du même métal.

LE Vin Emétique agit plus promptement & excite le vomissement , a moins de reprise que le Tartre Emétique. Le Tartre Emétique au contraire agit plus lentement , cause des nausées quelque-tems avant le vomissement , excite plus de fois les efforts pour vomir , & affoiblit par conséquent davantage le malade ; ainsi on doit préférer le Vin Emétique au Tartre ; 1^o. dans les cas qui exigent un prompt effet de l'Emétique , & où il faut promptement secouer le système nerveux & toute la machine , comme dans les affections soporeuses ou tendance à ces affections , dans l'apoplexie , soit sanguine , soit pituiteuse ; 2^o. dans les cas où on doit craindre d'échauffer , lorsque la constitution tourne vers l'âcre , ce qu'on connoît par la soif presque inextinguible , par une grande ardeur , comme dans les fièvres putrides , éréthelateuses , ou même inflammatoires , surtout lorsque l'inflammation se porte vers la poitrine ; 3^o. dans les cas où l'on craint d'épuiser les forces du malade qu'il faut ménager comme dans l'hydropisie , le Tartre Emétique doit être préféré au Vin Emétique , dans tous les cas où on a besoin d'un émétique dont l'action soit constante ; ainsi il convient parfaitement lorsque le ventricule paroît enduit intérieurement de matieres visqueuses & tenaces , ce qu'on connoît par une douleur gravative rapportée à ce viscere par des rapports aigres ou insipides. Dans ce cas le Tartre Emétique agissant plus constamment & séjournant plus long-temps dans l'estomac , est très-propre à détacher les matieres qui bouchoient les canaux excrétoires de ce viscere , sur-tout si on n'a pas à craindre d'échauffer. Par la même raison il convient & doit être préféré aux autres préparations dans le cas où les émétiques sont indiqués chez des personnes d'un tempérament pituiteux , lorsque les humeurs sont épaissies & visqueuses , pourvu que les forces le permettent.

Le sirop de *Glauber* agit beaucoup plus modérement que les deux précédentes préparations , & cependant assez constamment , il épuise & échauffe moins , & doit être préféré lorsqu'on craint de trop affoiblir ,

ainfi il convient dans les enfans , à caufe de la foibleffe de l'âge & de la grande irritabilité dont ils font fufceptibles , il convient auffi aux vieillards à caufe de leur foibleffe.

A l'égard du Kermès minéral , fon action eft fort incertaine pour deux raifons , parce qu'il peut être ou trop ou trop peu lavé , ce qu'on ne peut connoître , & que d'ailleurs on ne peut être affuré de la quantité d'efprit de vin qu'on y brûle par-deffus , qui comme le remarque M. *Geoffroi* , châtre l'action de l'émétique , c'eft pourquoi on ne s'en fert gueres ; fi cependant les autres émétiques manquoient , on pourroit l'ordonner depuis un grain jufqu'à quatre , on l'emploie plus ordinairement comme altérant dans les fievres putrides , malignes à *Coagulo* , pour lors on le donne à la dofe d'un demi-grain de deux en deux heures , ou d'un grain de quatre en quatre heures. Pour l'ordinaire on l'affocie à une potion cordiale , donnant , par exemple , de deux en deux heures une demi-grain de Kermès minéral dans une cueillerée de potion cordiale , il produit quelquefois des évacuations par les felles , les urines & les fueurs. Dans un grand épailiffement de fang , la dofe eft quelquefois d'un grain de deux en deux heures , ou de deux grains de quatre en quatre heures ; il eft recommandé en certains pays dans les maladies inflammatoires de la poitrine , mais on a foin de faire précéder les faignées fréquentes & les boiffons humectantes : on l'ordonne à petite dofe pour divifer le fang , il facilite fouvent l'expectoration.

A R T I C L E V.

Maniere d'adminiftrer les Emétiques Antimoniaux.

DANS les affections foporeufes , le vin émétique fe donne feul depuis une demi-once jufqu'à deux ou trois onces , la dofe ordinaire eft de demi-once. Après en avoir donné une dofe , fi on voit quelle ne faffe aucun effet , on en donne une feconde peu de tems après , & alors au lieu de demi-once , on en donne une once. Si cette feconde n'opere pas , quelque-tems après on paffe à une troifieme plus haute , c'eft-à-dire , d'une once & demie , ainfi de fuite *gradatim* , jufqu'à ce que le vomiffement furviene , on peut aller jufqu'à trois onces ; fi cela n'étoit pas fuffifant , on pourroit donner le vin émétique trouble à la dofe d'une once , ou d'une once & demie : on peut auffi donner le vin émétique trouble en lavement depuis une once jufqu'à quatre dans les affections foporeufes ou pituiteufes ; lors-

que le poulx est foible , on le joint à des cordiaux actifs , on fait prendre , par exemple , dans une dose de vin émétique dix , douze ou vingt gouttes de *l'ilium de Paracelse*. Cette précaution est nécessaire lorsqu'il faut absolument faire vomir & que cependant les forces sont abattues. On donne même dans ce cas-là une cueillerée de potion cordiale , après chaque vomissement ou après chaque effort que le malade fait pour vomir. On joint encore le vin émétique aux cathartiques dans le maladies de poitrine ; on fait une décoction avec la bourrache , dans la colature on dissout la manne & on ajoute une demi-once de vin émétique.

On peut donner le Tarte émétique seul ou dissout dans l'eau tiède ; si on veut le donner dissout , on prend six ou huit grains de Tarte émétique , qu'on fait dissoudre dans une livre , ou une livre & demi d'eau tiède , & on le donne par verre au malade , c'est la meilleure méthode. On met quelqu'intervalle entre chaque verrée ; si les premières verrées ont produit l'effet qu'on souhaitoit , on cesse d'en donner : ici on joint quelquefois aux purgatifs deux ou trois grains de Tarte émétique pour les aiguïser , comme l'on dit , & rendre leurs effets plus certains. Lorsqu'on a seulement en vue de pousser par les selles , on en dissout trois ou quatre grains dans quantité d'eau & on prend cette potion par verrée. On est quelquefois forcé d'employer ce purgatif , lorsque les malades ont une répugnance insurmontable pour les autres purgations liquides.

Le sirop de *Glauber* se donne délayé dans du vin aux doses que nous avons marquées ci-devant , suivant les différents âges : on peut aussi l'associer aux Purgatifs , comme les préparations ci-dessus.

A R T I C L E V I.

Précautions.

ON doit s'abstenir des émétiques antimoniaux dans les cas où nous avons dit ci-devant que les émétiques en général étoient contre-indiqués ; & prendre à cet égard toutes les précautions que nous avons marquées ; si malgré cette attention , il survient de superpurgations , on devroit le traiter comme le *cholera-morbus* , c'est-à-dire , employer les saignées , les bouillons gras , l'eau de poulet , les clystères adoucissants , & si cela ne suffisoit pas & que le malade se trouve si foible qu'il ait les extrémités froides , dans ce cas seulement on doit donner le *laudanum liquidum*. Quand nous disons que l'on doit employer pour ces superpurgations le-

secours qu'on emploie pour le *cholera-morbus*, nous n'entendons pas y comprendre la limonade qui augmenteroit le mal, quoiqu'en disent des Auteurs d'ailleurs très-respectables, fondés sur ces principes que les acides végétaux châtrent l'action des émétiques antimoniaux. Nous avons prouvé le contraire en faisant voir, d'après les expériences de M. *Geoffroi*, que bien loin de diminuer l'éméticité des Antimoniaux, les acides végétaux l'augmentent. Ce qu'on dit des acides minéraux n'est pas vrai, pris génériquement il est faux que tous les acides minéraux châtrent l'action des préparations antimoniales, puisque l'acide marin l'augmente, bien loin de la diminuer. Cela se voit par le beurre d'Antimoine qui est un composé de régule d'Antimoine & d'acide marin, qui est un puissant scarrotique, & qui seroit un poison mortel pris intérieurement. La poudre d'Algaroth ou mercure de vie qui n'est autre chose que cette même régule, mais chargée d'une ~~grande portion d'acide~~ ^{très grande portion d'acide} marin, est un émétique si violent que personne n'oseroit s'en servir, si ce n'est dans des cas désespérés. Ainsi on ne peut pas dire en général que les acides minéraux émoussent l'action des Antimoniaux, cela n'est que de l'esprit de soufre & de l'acide vitriolique. Dans le cas donc de superpurgation, on peut, si les moyens que nous avons indiqués ci-devant ne suffisent pas, donner au malade l'esprit de vitriol ou l'esprit de soufre dans l'eau jusqu'à agréable acidité. En voilà assez pour les émétiques tirés, soit du regne végétal, soit du regne ~~minéral~~ ^{minéral}. Il est tems que nous passions aux Médicaments qui poussent le plus ordinairement pas les selles, & qu'on appelle pour cette raison cathartiques.

A R T I C L E P R E M I E R.

Les Cathartiques ou Purgatifs.

NOUS tiendrons ici le même ordre que nous avons suivi, en parlant des émétiques. Nous expliquerons d'abord leurs effets, soit sensibles, soit cachés; nous exposerons les sentimens des Médecins tant anciens que modernes, sur la manière dont les purgatifs agissent. Les cas où ils conviennent, ceux où ils sont contre-indiqués, & les précautions que l'on doit prendre, soit avant, soit après les avoir administrés.

Effets des Purgatifs.

DANS les premières voies , telles que nous les avons définies en parlant des émétiques , on remarque les effets suivants. Peu de temps après l'administration du cathartique , le malade éprouve une certaine anxiété & inquiétude , il sent quelques légères nausées , mais qui passent bientôt , quelques légères douleurs qu'il rapporte au conduit intestinal & qui sont plus ou moins vives , selon la disposition du corps & selon la force du cathartique , des borborigmes , c'est-à-dire , un bruit qui se fait entendre & qui court d'une partie des boyaux à l'autre. A ces phénomènes succèdent des déjections plus fréquentes que d'ordinaire dans un temps donné. Dans les secondes voies , c'est-à-dire , dans celles de la circulation , on remarque ces effets , l'habitude du corps s'échauffe , on éprouve une espèce d'ardeur , le pouls devient plus fort , plus fréquent , plus fébrile. Voilà les effets sensibles , d'où l'on en peut déduire immédiatement d'autres qui pour n'être pas si sensibles , n'en sont cependant pas moins certains. 1°. Les purgatifs doivent déterminer une plus grande quantité d'humeurs vers le canal intestinal , cela se prouve par analogie : si l'on irrite une partie vivante par quelque corps piquant , cette partie rougit , elle se gonfle , les humeurs y coulent plus abondamment. Il n'est pas douteux que les purgatifs n'irritent les intestins , les douleurs ou du moins les inquiétudes que le malade y ressent en conséquence du purgatif le démontrent : les humeurs doivent être déterminées vers cette partie en plus grande abondance. Par l'observation le malade rend quelquefois même après plusieurs purgations , une grande quantité de matières liquides , qui n'étoient pas contenues assurément dans les premières voies : elles y ont donc été déterminées par l'action du purgatif. 2°. Les purgatifs doivent faire refluer le sang vers le cerveau avec plus d'abondance de même que les émétiques , quoiqu'avec moins de violence que ceux-ci , parce que par leur action la veine-cave se trouve plus pressée que d'ordinaire. 3°. Les purgatifs affoiblissent , parce que dans le temps des déjections , le diaphragme s'abaisse , les muscles du bas-ventre se contractent , ce qui exige des efforts qui ne peuvent se faire qu'aux dépens des forces , ainsi les purgatifs affoiblissent *per se*. Cependant on observe quelquefois que les malades après un purgatif , se sentent plus dégagés & plus forts qu'auparavant , ce qui ne détruit pas ce que nous avons avancé , parce que les matières qui ont été viduées ,

ont détruit les causes qui diminuoient considérablement les forces en épaississant le sang & empêchant la circulation : or il peut très-bien se faire que l'affoiblissement procuré par ses causes, fût encore plus grand que celui que les purgatifs procurent, il n'est donc pas étonnant que quelquefois ces malades se sentent plus forts après les purgations qu'auparavant, quoique le purgatif les ait réellement affoiblis *per se*. 4°. Les cathartiques, comme nous l'avons déjà remarqué, augmentent la chaleur, la force & la fréquence du pouls, d'où il suit que le mouvement des fluides est augmenté, que les organes de la circulation agissent avec plus d'énergie, que les oscillations augmentent, qu'il se fait une division, une attrition du sang, que les sécrétions se rétablissent, surtout celles de la peau : aussi voit-on assez souvent qu'après les purgations, il survient des sueurs : en sorte que les cathartiques deviennent quelquefois sudorifiques. Ce n'est pas seulement en agissant immédiatement sur le ventricule & sur les intestins que les cathartiques produisent ces effets, mais en passant des premières voies dans les secondes ; l'expérience démontre que les molécules des cathartiques enfilent les voies de la circulation ; cela paroît évidemment quand on purge une nourrice, puisqu'alors l'enfant est purgé en même temps ; ce qui fait même que quand un enfant a besoin d'être purgé & que cependant on ne peut à cause de sa foiblesse lui faire avaler le purgatif, on se contente de purger la nourrice avec des cathartiques légers, & l'enfant est purgé en même temps ; ce qui fait voir que les molécules du purgatif sont amenées aux mamelles de la nourrice par les voies de la circulation. Il est vraisemblable que les molécules des émétiques s'insinuent de même dans les secondes voies, mais il n'y a point d'expérience qui le démontre, comme pour les cathartiques. Il faut remarquer ici que les cathartiques produisent de bons effets & guérissent même certaines maladies ; certains Auteurs en concluent que ces maladies étoient produites par des mauvais sucs qui étoient passés des premières voies dans les secondes, ce qui n'est pas toujours vrai. Pour que cette conclusion fût bonne, il faudroit que les purgatifs ne produisissent d'autres effets que d'évacuer les matières contenues dans les premières voies : or nous avons fait voir le contraire en démontrant plusieurs autres effets des cathartiques ; au surplus ce sentiment des Auteurs peut être très-dangereux dans la pratique, puisque sur ce principe, dans les fièvres intermittentes, à la fin des fièvres putrides & dans la convalescence, toutes les fois qu'on trouveroit le pouls plus fort, on seroit porté à croire qu'il faut purger, jusqu'à ce qu'on ait emporté

entièrement les mauvais fucs qui ont passé dans la voie de la circulation, ce qui seroit très-dangereux , & rendroit les convalescences très-longues & très-fâcheuses. Venons actuellement aux sentiments des Médecins tant anciens que modernes , sur la maniere dont les purgatifs agissent.

Sentiments des Médecins tant anciens que modernes , sur la maniere dont les Purgatifs agissent.

COMME on aime naturellement à généraliser les idées , sur-tout dans les sciences, les Médecins anciens & modernes ont beaucoup travaillé pour trouver une maniere d'agir commune à tous les purgatifs , & ils ont été partagés de sentiments ; avant de les exposer en détail , il ne sera pas inutile de faire remarquer qu'il n'est pas possible de donner des regles générales à cet égard ; si on considere chaque purgatif en particulier , on verra qu'ils agissent par des principes différents ; ainsi la rhubarbe purge par d'autres principes que la manne , & ainsi des autres purgatifs. Après cette reflexion , passons à l'examen des sentiments des auteurs sur cette matiere. Les anciens , *Galien* , par exemple & ses sectateurs croyoient que les purgatifs agissoient par sympathie & par attraction , c'est-à-dire , que les particules dans le corps se subtilisoient , se repandoient dans la masse des humeurs , se mêloient avec elles & séparoient les mauvaises d'avec les bonnes par une espece d'attraction. Cette attraction , selon eux , n'étoit fondée ni sur une ressemblance de substance entre les purgatifs & les mauvaises humeurs , ni sur une ressemblance de qualités accidentelles de ces mêmes purgatifs & de ces humeurs ; car ils voyoient bien , que l'absynthe ne purgeoit pas la bile , quoiqu'elle soit amere , non plus que le safran , quoique celui-ci soit jaune comme la bile : ils attribuoient donc cette attraction à quelques principes cachés ou à des qualités occultes , & ils prétendoient que les mauvaises humeurs ainsi altérées , irritoient avec ceux-ci le principe vital ou la nature , & déterminoient celle-ci à faire ses efforts pour chasser hors du corps les molécules tant des purgatifs que des autres humeurs. Comme ils n'expliquoient pas ce que c'étoit que ces qualités occultes , il est aisé de voir que cette façon d'expliquer la maniere d'agir des purgatifs , n'explique rien. D'autres au contraire ont cru que les purgatifs agissoient par antipathie , & ceux-ci se divisoient en deux classes ; car , 1^o. les uns s'imaginoient que les purgatifs étoient ennemis du principe vital , qu'ainsi étant reçus dans le corps , ils irritoient ce principe qui de son côté faisoit tous ses efforts pour expulser les pur-

gatifs , ce qui occasionnoit des secrétions plus abondantes & la séparation des mauvaises humeurs d'avec les bonnes , & que ces mauvaises humeurs étoient expulsées avec les purgatifs par les efforts de l'esprit vital. Ceux-ci , comme on voit , mettoient l'antipathie entre l'esprit vital & les purgatifs. 2°. Les autres prétendoient que l'antipathie se portoit vers la matière morbifique , en sorte que cette matière & ces purgatifs faisoient des efforts les uns sur les autres , ce qui ne pouvoit se faire sans que le principe vital ne fût irrité , & qu'il ne fit de son côté tous ses efforts pour chasser également les purgatifs & la matière morbifique ; tel est le sentiment de *M. Joubert*, Professeur de l'Université de Montpellier. Cette antipathie , dans quelque sens qu'on l'entende , n'explique rien du tout. C'est une imagination sans fondement qui ramène aux qualités occultes des anciens. Depuis que la Chymie s'est introduite en Médecine , les Médecins Chymistes ont prétendu expliquer l'action des purgatifs par la fermentation : ils ont cru que les molécules des purgatifs passaient des premières voies dans les secondes , & y excitoient une ébullition , un orgasme , c'est-à-dire , une turgescence ou gonflement des suc ou des humeurs , ce qui ne pouvoit se faire sans que le ventricule & les intestins ne fussent irrités. Ce mouvement de fermentation ne suffit pas , puisqu'il reste toujours à expliquer l'expulsion des mauvaises humeurs. Il paroît par tout ce que nous venons de dire que les Médecins de tout temps ont reconnu que les purgatifs excitoient une irritation ; toutes les explications que nous avons rapportées jusqu'à présent la supposent ; il est vrai que les purgatifs excitent les douleurs , ou au moins les inquiétudes que les malades éprouvent dans les boyaux à la suite de l'administration des purgatifs , le prouvent évidemment , comme nous l'avons déjà observé , mais cette idée d'irritation ne suffit pas pour expliquer en général l'action des purgatifs ; car 1°. tout ce qui irrite ne purge pas. Le poivre , par exemple , les aromates irritent , & cependant ne purgent pas ; 2°. il y a quelquefois de grandes irritations sans purgation , comme dans les grandes coliques ; ainsi les purgatifs irritent , mais on ne peut pas dire qu'ils purgent , parce qu'ils irritent. On a senti le vuide de cette explication , & c'est ce qui a porté à expliquer la cause de cette irritation. On a donc prétendu qu'elle étoit due aux particules acides & dures des purgatifs , & que c'étoit par cette roideur & cette dureté des particules que les purgatifs agissoient & irritoient. On a fait le même raisonnement pour les autres médicaments , on a cru que les sudorifiques & les cordiaux agissoient par les particules dures , les unes plus fines que les autres , mais qu'on ne peut déterminer. Telle est l'ex-

plication suivie ordinairement dans les écoles de Montpellier , mais elle n'est pas plus heureuse que les autres ci-devant rapportées. On peut se convaincre du contraire, si on fait attention que les premières molécules de l'eau, de l'huile même & généralement de tous les corps, sont extrêmement dures, & qu'ainsi, selon cette idée, l'eau, l'huile & tous les autres corps devroient irriter & purger ; on voit par-là l'inutilité, & si on ne craignoit pas de le dire, l'absurdité de cette explication. On voit aussi combien peu on est en droit de se moquer des qualités occultes des anciens, puisque lorsque nous voulons approfondir, nous tombons nous-mêmes dans ces qualités occultes.

Cas où les Cathartiques conviennent.

ILS sont à-peu-près les mêmes que ceux où les émétiqes conviennent ; ainsi les cathartiques conviennent, 1°. dans les fièvres, soit continues, soit intermittentes ; 2°. dans les fièvres putrides inflammatoires ; 3°. dans les maladies inflammatoires exanthématiques ; 4°. dans les affections soporeuses, soit sanguines, soit pituiteuses ; 5°. dans les maladies chroniques convulsives ; 6°. dans les maladies cachectiques, comme dans l'ictère jaune ou noir ; 7°. dans les tumeurs œdémateuses ; 8°. dans la Leucophlegmatie ; 9°. dans l'hydropisie du bas-ventre ; 10°. dans le flux de ventre, soit séreux, soit bilieux, soit dysentérique ; 11°. dans l'inappétence ; 12°. dans les obstructions invétérées ; 13°. dans l'Asthme humide ; 14°. dans les maux de tête invétérés ; 15°. dans toutes les maladies chroniques ; 16°. pris dans toute leur étendue, ils conviennent presque dans toutes sortes de maladies.

1°. Dans toutes les fièvres putrides, soit continues, soit intermittentes, soit continues simples, soit continues composées ; la putridité se connoît aux signes que nous avons déjà indiqués en parlant des émétiqes. Les cathartiques conviennent dans ce cas par les mêmes raisons que les émétiqes. Outre cela les cathartiques déterminent une plus grande quantité d'humeurs vers le conduit des intestins, procurent de plus grandes oscillations, des sécrétions plus abondantes, & débouchent les canaux excréteurs du ventricule & des intestins.

2°. Dans les fièvres putrides inflammatoires ou dans les inflammations qui sont symptômes de fièvre putride, ce qu'on connoît par les signes ci-devant donnés. Ils conviennent pareillement pour les mêmes raisons que les émétiqes & suppléent à ceux-ci, qu'on ne peut pas répéter souvent

dans les maladies. 3°. Dans les maladies inflammatoires ; exanthématiques ; comme érysipeles , taches de rougeole , petite vérole , sur-tout confluentes , lorsque l'éruption est retardée ou empêchée par l'épaississement du sang , ce qu'on connoît par la foiblesse & la petitesse du pouls ; mais ce n'est pas seulement dans les commencements de la petite vérole que les cathartiques conviennent , ils conviennent encore dans le temps de l'exsiccation qui est le plus dangereux ; car les pustules ayant percé , le pus sort & il se forme des croûtes sur la peau de la matiere même du pus , & il arrive ordinairement que le pus n'est pas entièrement vidé lorsque ces croûtes se forment ; alors ce qui reste étant divisé & repompé , se mêle dans la masse du sang. Ces mêmes croûtes empêchent l'insensible transpiration qui est pareillement repompée , & se mêle avec la masse du sang. Delà il survient une fièvre putride qu'on appelle la fièvre secondaire qui est très-dangereuse , alors point de meilleurs remèdes que les cathartiques , comme M. *Freind* , auteur Anglois , le prouve par les observations dans les lettres qu'il a données à ce sujet ; la raison en est que le conduit intestinal est pour ainsi dire le vicaire de la peau , & que les humeurs qui ne trouvent point d'issue par celle-ci , sont déterminées par l'action des cathartiques vers les intestins , & s'évacuent par-là. 4°. Dans les affections soporeuses , soit-sanguines [alors il faut faire précéder la saignée & la répéter] soit pituiteuses , pour les mêmes raisons que les émétiques , & pour suppléer à ceux-ci qu'on ne peut pas répéter trop souvent , de peur de trop secouer le système nerveux , & d'épuiser les forces du malade. 5°. Dans les maladies convulsives , comme dans l'épilepsie , sur-tout symptomatique , qui dépend des mauvais suc & souvent dans le bas âge , des matieres vermineuses contenues dans les premières voies. Dans ce cas les cathartiques purgent les intestins , les délivrent de ces mauvais suc , rendent le ton aux fibres musculuses des tuniques du ventricule & des intestins , empêchent le retour des paroxysmes dans les épilepsies essentielles , ils divisent le sang & rétablissent les digestions. 6°. Dans les maladies cachectiques , c'est-à-dire , qui changent l'habitude du corps à cause des suc ralentis & viciés , par exemple , dans l'ictère jaune qui est le plus souvent produit & entretenu par le défaut de liberté des couloirs biliaires , par l'épaississement de la bile qui ne pouvant se séparer dans les vaisseaux sécrétoires du foie , reflue , ou plutôt est retenue dans la masse du sang , ce qui fait qu'elle y abonde , & que les différents suc qui s'en séparent , prennent une couleur jaune & la donnent à toute l'habitude du corps , dans ces cas les cathartiques produisent de bons effets. 1°. En supplant au défaut de la bile pour déterger

les intestins , & la délivrer de la trop grande quantité des matieres muqueuses dont leurs parois sont enduits. 2°. Les particules des purgatifs portées dans la masse du sang abondent au foie , donnent du ton à ce viscere , y atténuent la bile , débouchent les vaisseaux sécrétoires & excrétoires de ce viscere , rétablissent les digestions.

Dans l'ictère noir on observe ordinairement que la rate est embarrassée ; les cathartiques produisent sur la rate les mêmes effets , à-peu-près que sur le foie. 7°. Dans les tumeurs œdémateuses qui sont des tumeurs molles & sans douleurs , causées par une lympe , ou une sérosité arrêtée & infiltrée dans les cellules de la membrane adipeuse ou dans les vaisseaux lymphatiques dilatés , les cathartiques augmentent le ressort des vaisseaux , font rentrer cette lympe ou sérosité dans les voies de la circulation. 8°. Dans la leucophlegmatie qui est une enflure œdémateuse de toute l'habitude du corps , par la raison donnée ci-dessus. 9°. Dans l'hydropisie du bas-ventre nous avons déjà vu que les émétiques conviennent , spécialement le vin émétique , mais il faut que les eaux soient ramassées en grande quantité dans la cavité du bas - ventre , & que les forces ne soient pas abattues , il en est de même des cathartiques , on les donne avec succès dans les cas où les eaux sont ramassées en moindre quantité , & où les émétiques ne réussiroient pas. Les cathartiques déterminent ces eaux vers le conduit intestinal dans lequel elles sont repompées & de-là rejetées par les selles. 10°. Dans le flux de ventre , soit bilieux , soit dyssentérique , soit que les humeurs soient contenues dans les premières voies , soit qu'elles soient dans les secondes. Dans le premier cas les humeurs sont évacuées immédiatement par les cathartiques , dans le second elles sont déterminées vers le couloir des intestins , & ensuite évacuées par les selles. 11°. Dans l'inappétence qui vient des suc putrides contenus dans l'estomac & les intestins , ou épaissis qui émoussent la sensibilité des tuniques nerveuses , les cathartiques emportant ces mauvais suc , rétablissent la sensibilité & l'appétit. 12°. Dans les obstructions invétérées , pourvu qu'il n'y ait pas lieu de craindre l'inflammation , on sent aisément pourquoi les cathartiques conviennent dans ce cas. 13°. Dans l'asthme humide , qui dépend des mauvais suc qui passent des premières voies dans les secondes , pour les raisons ci-devant données. 14°. dans les maux de tête invétérés , dans la migraine qui dépend pareillement des mauvais suc portés des premières dans les secondes voies , par les mêmes raisons. 15°. Dans toutes les maladies chroniques , parce que dans ces maladies les digestions se font mal , & que tous les mauvais suc passent des pre-

mieres voies dans les secondes & *vice versâ*, entretiennent ces maladies; d'ailleurs la plupart de ces maladies dépendent des mauvais suc's ou de l'épaississement des humeurs. 16°. Enfin si l'on prend les cathartiques, selon toute leur étendue, c'est-à-dire, si l'on fait attention aux différentes especes de cathartiques & aux différens degrés de force qu'on trouve dans chacun en particulier, on verra qu'il y a bien peu de maladies dans lesquelles ils ne puissent convenir & produire de bons effets.

Temps où il convient d'administrer les Cathartiques.

ON peut considérer trois sortes de temps pour l'administration des cathartiques, 1°. les temps généraux de la maladie, 2°. les temps particuliers, 3°. les différentes heures de la journée.

Temps généraux.

DANS toutes les maladies & sur-tout dans les aiguës, on remarque quatre temps généraux, qui sont le commencement, l'augmentation ou l'accroissement, l'état ~~de~~ la déclinacion, lorsqu'elles ne sont pas terminées par la mort. Les anciens reconnoissoient trois états qui reviennent aux quatre temps que nous venons d'indiquer : ces trois états étoient celui de crudité, de coction & celui de crise; on appelloit temps de crudité, lorsque la matiere morbifique paroissoit avoir le dessus sur la nature, ce qu'on connoissoit par l'augmentation des symptomes; alors les humeurs paroissoient être très-éloignées de l'état naturel, par conséquent n'être pas encore assemblées & être crues; ce temps répond au commencement, à l'accroissement & en partie à l'état de la maladie. Le temps de coction étoit celui où la matiere morbifique étoit travaillée & atténuée, ce qu'on connoissoit par la diminution des symptomes. La crise étoit accompagnée d'efforts critiques, c'est-à-dire, des efforts que la nature faisoit pour chasser cette matiere morbifique & suivie d'évacuations critiques par les selles ou par les urines, ou par les sueurs ou par les crachats. La crise s'observe sur-tout dans le temps de la déclinacion de la maladie.

Après avoir ainsi distingué les temps généraux des maladies & sur-tout des aiguës, il se présente une question, favoir, en quel temps il convient de purger, il y a eu là-dessus de grandes disputes entre les Médecins; les uns ont prétendu qu'il ne falloit jamais purger au commencement de la maladie, 1°. pour ne pas évacuer les bonnes avec les mauvaises humeurs;

2°. pour ne pas troubler l'ouvrage de la nature. Les autres au contraire ont dit qu'on devoit purger dans tous les temps lorsque le cas l'exige, ne niant pas cependant qu'on ne dût laisser mûrir, pour ainsi dire, un peu la matiere. Les uns & les autres avoient pour eux l'autorité d'*Hippocrate* ; les premiers se fendoient sur l'aphorisme où il dit, *concocta medicamento purgante educenda & movenda, non cruda neque per initia*, les seconds sur cet autre aphorisme, *in acutis morbis, in principiiis, medicamentis purgantibus, utendum*. Il est aisé de concilier ces deux passages d'*Hippocrate* qui paroissent contradictoires ; il ne veut pas qu'on purge dans le commencement de la maladie, dans le tems de crudité, à moins que les humeurs ne se portent vers les premieres voies, ce qui arrive rarement & cela dans les maladies aiguës. *Concocta educenda non cruda nisi turgent, ut plurimum ~~vero~~ non turgent*. Sans doute que dans les maladies aiguës de son temps, il avoit vu que les humeurs morbifiques se portoient rarement vers les premieres voies dans le temps de crudité au commencement des maladies aiguës, au lieu que cela est beaucoup plus commun aujourd'hui. Ainsi il faut purger dans tous les temps où il y a indication à purger & qu'il n'y a point de contre-indication. On peut purger au commencement pendant l'accroissement de la maladie, lorsque les humeurs morbifiques paroissent se porter vers les premieres voies. Si les indications ne paroissent qu'après la coction, il faut purger dans ce temps-là, enfin si les évacuations critiques ne paroissent pas suffisantes pour emporter la matiere morbifique, & qu'elles ne soulagent pas le malade, il faut purger durant les évacuations, & même après vers la fin de la maladie.

Nota. A propos de la maladie, il est très-important de remarquer qu'on ne doit pas toujours être déterminé à purger vers la fin de la maladie, par les signes de putridité qui paroissent dans la bouche, qui sont une croûte blanche ou jaune ou noirâtre ; car comme la langue se décharge successivement, & que cette croûte se dissipe d'abord vers la pointe de la langue, ensuite vers le milieu, ensuite vers la base, de même il peut se faire que les couloirs, soit du ventricule, soit des intestins, soient déchargés successivement & même plutôt que la langue ; lors donc qu'après des évacuations abondantes, soit qu'elles soient l'ouvrage de la nature ou celui de l'art ; lors, dis-je, qu'après ces évacuations, ce qu'on donne au malade est pris avec plaisir & que les fonctions se font bien, la raison veut qu'on n'insiste pas davantage sur les purgatifs, quoique la langue soit extrêmement chargée, ils seroient alors inutiles, les premieres voies

ayant été suffisamment vidées. Ce que la raison dicte est confirmé par l'observation ; on voit tous les jours que les malades qui sont dans les circonstances déjà marquées , recouvrent l'appétit , font bien la digestion & toutes leurs fonctions , la langue se nettoie sans le secours des nouveaux purgatifs , il suffit alors de leur prescrire un régime convenable.

Temps particuliers.

OUTRE les temps généraux dont nous venons de parler , on remarque dans toutes les maladies aiguës , qu'il y a des temps particuliers , comme dans les fièvres continues composées , le temps de l'exacerbation ou du redoublement & celui de la remission. Dans les fièvres intermittentes le temps de l'accès & celui de l'intermission , il est certain qu'on ne doit purger que vers la fin du redoublement , & même s'il est possible attendre que le redoublement ait fini entièrement , 1°. parce qu'on troubleroit l'ouvrage de la nature qui fait pour lors ses plus grands efforts pour chasser la matiere morbifique ; 2°. parce que les humeurs étant pour lors dans une grande fougue , on l'augmenteroit en administrant les purgatifs qui échauffent , & par-là on nuiroit au malade ; par la même raison dans les fièvres intermittentes , on ne doit purger que dans les intervalles entre les accès , c'est-à-dire , dans le temps de l'intermission , en faisant attention aux loix générales , qui sont d'avoir égard aux indications & aux signes de putridité ; car il arrive quelquefois que jusqu'au dixieme accès , il ne se présente aucun signe qui indique les purgatifs , l'appétit se soutient , les digestions se font bien ; dans ce cas il faut attendre , & alors un émétique ou un cathartique administré à propos prévient souvent le septieme accès , ou celui qui doit suivre.

Heures de la journée.

IL y a un temps d'élection & un temps de nécessité , lorsqu'on est libre & que rien n'empêche de purger le matin , il est clair qu'on doit préférer le matin au soir , parce que le matin les forces du malade ont été réparées par le sommeil , & sont mieux en état de supporter l'action des cathartiques , qui , comme nous avons vu , affoiblissent par eux-mêmes ; mais comme on ne peut pas purger dans le redoublement , & qu'il peut arriver qu'il ne finisse que sur le soir ou dans la nuit , alors on purge à la fin du redoublement à quelle heure que ce soit , c'est le tems de nécessité.

Précautions.

ELLES peuvent se réduire à trois chefs , 1°. aux contre-indications , 2°. aux moyens de préparer aux cathartiques & d'aider leur action , 3°. aux moyens de remédier aux superpurgations qui peuvent survenir.

Contre - Indications.

ELLES se tirent de la nature de la maladie , de l'état des parties & de celui des forces : il y a deux états généraux de maladie , où les cathartiques proprement dits , sont contre-indiqués ; savoir , l'état inflammatoire ou de tendance à l'inflammation & l'état de secheresse : 1°. Ils sont contre-indiqués dans l'état inflammatoire ou tendance à l'inflammation , parce qu'ils échauffent & qu'ils augmenteroient ou exciteroient l'inflammation ; 2°. dans les maladies où il y a une grande tension des solides , produite & entretenue par la secheresse qu'on appelle dans les femmes , *passion* ou *affection hystérique* , & dans les hommes *passion hypocondriaque* , on observe que dans ces maladies le système nerveux est fort irritable , les cathartiques n'agissant pas seulement sur les premières voies , mais passant encore dans les secondes , nuisent dans ce cas : il est vrai qu'ils paroissent souvent soulager , mais ce n'est que pour un temps , & les symptômes redeviennent plus fâcheux ; 3°. ils sont contre-indiqués dans l'inflammation de l'estomac & des intestins , parce qu'ils agissent immédiatement sur ces viscères , les irritent , les échauffent , & déterminent une plus grande quantité d'humeurs vers ces parties , & occasionnent d'ailleurs une plus forte contraction du diaphragme ; 4°. on ne les donne pas non plus dans les inflammations de la rate , du foie , des reins & autres viscères contenus dans la cavité du bas-ventre , parce que les contractions du diaphragme & des muscles abdominaux , pressant davantage les viscères , pourroient occasionner la suppuration ou la gangrene ; 5°. ils sont contre-indiqués en général dans le météorisme , c'est-à-dire , dans la tension douloureuse du bas-ventre , lorsque cette tension est accompagnée de tendance à l'inflammation. Or il faut remarquer que toute tension douloureuse du bas-ventre , n'indique pas toujours l'inflammation ; voici les principaux signes auxquels on reconnoît que cette tension est jointe à l'état inflammatoire , 1°. la douleur est très-considérable & fixe ; 2°. le poulx , (c'est ici le signe le plus sûr) est petit , dur , dans ce cas les cathartiques ne sauroient avoir lieu ; mais si la tension douloureuse du bas-ventre n'est pas jointe à l'état

inflammatoire , ce qu'on reconnoît , parce que , 1°. la douleur est vague ; 2°. le pouls est mou , grand , fort , alors s'il y a des signes de putridité dans les premières voies , après avoir pris la précaution d'employer les adoucissans , les émolliens , on peut & on doit même avoir recours aux cathartiques , parce que pour lors cette tension dépend des matières putrides ou vermineuses ; 6°. l'état ulcéré , soit du ventricule , soit des intestins , contre-indique les purgatifs proprement dits , on en voit aisément la raison ; 7°. ils sont aussi contre-indiqués très-souvent dans les hernies sur-tout dans le bubonocèle , & dans les cas où on veut les employer , on ne doit le faire qu'avec beaucoup de prudence & de précaution , & se servir des minoratifs ; 8°. quant aux forces du malade , il est évident qu'on doit faire attention qu'elles ne soient pas si abattues , qu'elles ne puissent supporter l'action des cathartiques , nous avons déjà observé qu'ils affoiblissent par eux-mêmes. Nous avons dit que les cathartiques étoient contre-indiqués dans l'état inflammatoire ou dans la tendance à l'inflammation , cela se doit entendre des maladies inflammatoires essentielles ; car dans les maladies inflammatoires symptomatiques , c'est-à-dire , qui sont symptômes de la fièvre putride , sur-tout lorsque l'inflammation se porte vers la poitrine , ou vers la tête , il n'y a pas d'autres secours que les purgatifs ; mais on ne doit les administrer alors qu'avec beaucoup de précaution , c'est-à-dire , premièrement ne les pas donner dans le temps que les symptômes sont dans leur plus grande force ; 9°. faire précéder les saignées répétées pour diminuer l'impétuosité du sang , adoucir , humecter les malades avec les ptisanes , comme avec l'eau de poulet , d'orge , employer les fomentations , les clystères émolliens. Après les précautions de cette espèce , on peut , on doit même en venir aux cathartiques ; si les forces sont trop abattues , & qu'il faille cependant purger , on doit joindre aux purgatifs les cordiaux , ayant soin même à chaque évacuation de soutenir le malade avec la potion cordiale , avec un peu de confectiion d'hyacinthe.

Lorsqu'on a donné un cathartique , on peut aider son action par des boissons abondantes , comme avec les ptisanes de capillaire , de thé , &c. par-là on tempère l'acreté des purgatifs , on adoucit les premières voies , on délaie les matières qui doivent être évacuées ; on doit user de cette précaution , lorsqu'on ne craint point de trop émousser l'action des purgatifs , & que d'un autre côté il y a à craindre que leur trop grande activité n'irrite trop , comme dans les tempéramens secs , mélancoliques. Il arrive quelquefois que malgré toutes les précautions possibles , il survient

des superpurgations , on doit les traiter comme le *cholera-morbus* , faire avaler au malade beaucoup d'eau tiède , d'eau de poulet , employer les huileux , les clystères , & n'en venir aux narcotiques qu'à l'extrémité ; lorsqu'on voit que les forces s'abattent , que les extrémités deviennent froides , on peut alors employer ^{ou on se sert} ~~un~~ gros de *thériaque* récente dans le vin blanc ou le *laudanum liquidum*.

Avant que de quitter les généralités des cathartiques , il est à propos de remarquer que peu de temps après l'administration des purgatifs , les malades se sentent si ~~enclin~~ ^{enclin} au sommeil qu'on a bien de la peine de les en détourner. On demande si on doit les laisser dormir ou les tenir éveillés ? les sentiments des Auteurs sont partagés là-dessus , les uns prétendent qu'il faut les tenir éveillés , disant qu'autrement l'action des purgatifs seroit éteinte , parce que le système nerveux est relâché pendant le sommeil ; d'autres disent que si le cathartique est un peu fort , on peut les laisser dormir , mais qu'au contraire si le purgatif est doux , & qu'on veuille que les malades soient purgés par les selles , il faut les tenir éveillés. Nous croyons que lorsque les malades sont portés au sommeil & qu'on ne peut les en détourner qu'en les inquiétant & les fatiguant , il est cruel de les détourner. Nous avons observé que les purgatifs n'en agissent pas moins , quoique les malades dorment , & d'ailleurs le sommeil leur donne des nouvelles forces pour supporter les purgatifs & pour faire leurs déjections.

Il est temps de passer au détail des Cathartiques. Les anciens divisoient les purgatifs en lénitifs & purgatifs proprement dits ; ils faisoient ensuite une subdivision de purgatifs en *cholagogues* , en *menalogogues* & en *hydragogues*. Ils appelloient cholagogues les médicaments qui avoient la vertu spécifique de purger la bile ; menalogogues , ceux qui purgeoient la bile noire , ou la mélancolie ; phlegmagogues , ceux qui purgeoient les eaux & les sérosités ; ils pensoient en même temps que ces médicaments agissoient par préférence sur ces différentes humeurs : par exemple , les *cholagogues* pour la bile , soit par attraction ou autrement. Les modernes emploient ces médicaments dans les mêmes cas que les anciens , mais ils croient qu'ils agissent sur toutes les parties & les humeurs du corps humain. Dans le détail que nous allons faire des cathartiques , nous suivrons la division qui est la plus ordinaire , en cathartiques doux , moyens & forts.

Cathartiques doux.

ON appelle cathartiques doux ou minoratifs , ceux qui agissent doucement , & qu'on peut donner dans certains cas où les moyens & les forts ne feroient avoir lieu. Ils sont assez nombreux ; nous exposerons ceux qui sont en usage.

Polypode.

C'EST la racine d'une plante qu'on range parmi les capillaires : elle croît dans les forêts , sur les vieilles murailles , sur les troncs des vieux arbres. Elle est longue d'un demi-pied , presque de la grosseur d'un petit doigt , garnie de petites fibres qu'on rejette , relevée de petits tubercules qu'on prétend être les vestiges des feuilles tombées , roussâtre en dehors , d'un jaune verdâtre en dedans , d'un goût douceâtre & un peu âcre. On préfère celui de chêne , *polypodium quercinum* ; on le doit choisir récent , bien nourri , gras , se cassant aisément.

Cas où on l'emploie.

LES cas où l'on peut employer avec succès cette racine nous feront connoître ses vertus. L'expérience fait voir que le polypode convient dans les constipations qui accompagnent les affections hypocondriaques , dans les obstructions de la rate , du foie & les maladies qui en dépendent , comme l'ictère jaune , noir , dans les affections de la poitrine , comme la toux sèche , opiniâtre , lorsque les matières qu'on rend par les expectorations sont salées , dans l'asthme sec , dans le scorbut , dans la goutte & différentes affections cutanées qui supposent une grande âcreté dans le sang , comme la gale.

Vertus.

IL paroît par les cas que nous venons de voir qu'elle est purgative non seulement , mais apéritive , adoucissante. Mais l'expérience prouve & démontre qu'elle est légèrement purgative , & que si on ne la fait bouillir long-temps & à haute dose , elle ne purge point.

Doses & façon de le donner.

COMME purgatif , on ne l'ordonne presque jamais seul , mais on en fait la base des potions purgatives. Dans les affections hypocondriaques ,

on fait bouillir pendant demi-heure une once ou trois quarts d'once de *polypode* de chêne dans suffisante quantité d'eau, dans la décoction on dissout les purgatifs appropriés. Comme *apéritif*, on l'ordonne en substance depuis demi-drachme jusqu'à une drachme & demie, mêlé avec la crème de tartre & le *cassia lignea*, il fait un très-bon purgatif dans les embarras de la rate & l'ictère noir. On le fait aussi entrer dans la composition des bouillons apéritifs à la dose d'une once qu'on fait bouillir avec d'autres plantes apéritives. On prend ces bouillons dans les embarras du foie, de la rate, dans les affections hypocondriaques. Comme *adouçissant*, il convient dans la toux sèche, l'asthme sec, la goutte, le scorbut, la gale: on l'ordonne en décoction depuis demi-once jusqu'à une once & demie, qu'on fait bouillir dans une livre d'eau pendant un quart d'heure.

Pharmacologie rationnelle.

LA Pharmacologie rationnelle du Polypode, n'est pas encore bien avancée: cette racine contient des parties gommeuses & résineuses, les gommeuses dominant. M. *Cartheuser* retiroit d'une once de polypode trois drachmes de principes gommeux & deux scrupules seulement du principe résineux. On ne peut pas démontrer que la vertu purgative du polypode réside dans ses parties résineuses, & sa vertu adoucissante dans ses parties gommeuses, parce que jusqu'à présent on n'a point fait d'expérience sur ces parties en particulier; cependant à en juger par l'analogie, c'est-à-dire, par comparaison avec d'autres plantes composées de parties gommeuses & résineuses, il est raisonnable que sa vertu purgative réside dans le principe gommeux. Les anciens regardoient le polypode comme un léger *Menalogue*.

Fleurs de Violette.

LA violette est une plante assez commune & connue de tout le monde; ainsi nous ne nous arrêterons pas à en faire la description. Les fleurs sont soutenues par des pédicules grêles; son calice qui dans sa maturité, s'ouvre en trois quartiers, contient des semences presque rondes, de couleur blanchâtre; les différentes parties de la violette sont en usage en médecine, les fleurs mondées, c'est-à-dire, séparées de leur calice, les calices, les fleurs, les semences, les racines. On les emploie avec succès dans la constipation, accompagnée d'échauffement, dans les tempéraments bilieux, mélancholiques, dans le cours de ventre

bilieux , où il paroît ardeur rapportée aux premières voies , ou même répandue dans tout le corps avec soif. Dans la colique néphrétique qui est ordinairement accompagnée d'ischurie ou de retention d'urine , dans les affections de la poitrine , sur-tout quand elles sont accompagnées d'une toux sèche , opiniâtre avec irritation dans le canal de la trachée artère , ou dans les ramifications des bronches , en un mot lorsqu'il s'agit de rafraîchir , tempérer , purger doucement , pousser par les urines.

Vertus.

PAR tout ce qui vient d'être dit , il paroît que les violettes ont une vertu adoucissante , béchique , légèrement purgative , diurétique , rafraîchissante. On a observé que les fleurs mondées , c'est-à-dire , séparées de leur calice ; n'étoient presque point purgatives , mais adoucissantes & diurétiques. Les calices sont purgatifs aussi bien que les racines , selon *Tournefort* , à la dose d'une once & demie jusqu'à deux onces. La semence est la partie dans laquelle la vertu purgative est plus marquée.

Maniere d'employer les Violettes , & leur Dose.

ON prépare avec les fleurs de violettes ou avec leur suc , trois sortes de sirop , 1^o. le sirop violat simple , 2^o. le sirop violat composé , 3^o. le sirop violat solutif & purgatif. Le simple est composé avec les fleurs mondées ou avec leur suc seulement ; le composé se fait avec les fleurs mondées & autres plantes adoucissantes , béchiques , comme les jujubes ; le sirop violat solutif & purgatif , se fait avec les fleurs , les calices & les semences. Ces sirops sont fort en usage ; le premier se donne pour rafraîchir & humecter la poitrine , pour adoucir les humeurs trop âcres , pour tempérer la bile , pour défaltérer dans les fièvres ardentes & dans le rhume. La dose est depuis demi-once jusqu'à une once ; le second est encore plus adoucissant & il excite les crachats , tempère les ardeurs d'urine , soulage dans les coliques néphrétiques , la dose est la même que du premier ; le troisième convient dans les fièvres ardentes accompagnées d'une soif presque ~~insupportable~~ ^{insupportable} ; *M. Boerhaave* donnoit dans ce cas une décoction de tamarin dans laquelle il avoit fait dissoudre deux ou trois onces de sirop violat solutif. On prépare aussi une conserve laxative avec les fleurs de violette , en donnant à la man-

ne la consistance de conserve , après l'avoir fondue dans leur suc : on l'ordonne dans les constipations depuis demi-once jusqu'à une once. On prépare encore avec les violettes , un ratafia qui convient lorsque le ventre est dur ou paresseux dans une livre de fleurs de violettes non mondées , on delaye sur un feu doux une livre & demie de manne , on passe le tout par un linge & on y ajoute une pinte d'esprit de vin ; la dose est d'une ou de deux cuillerées le matin & le soir. Le miel violat se fait avec les fleurs de violette & le miel cuit en consistance de sirop , la dose en est depuis une once jusqu'à deux ; dans les lavements rafraîchissants & émollients , si on veut lâcher le bas-ventre légèrement , on prend deux ou trois pincées de fleurs de violette non mondées qu'on fait infuser dans ~~une~~^{une} livre d'eau , & on fait prendre de cette infusion au malade pour boisson ordinaire ; cette infusion ne lâche pas seulement le ventre , elle tempere l'âcreté du sang : si on veut que l'infusion soit adoucissante seulement on la fait avec les fleurs mondées. On se sert des feuilles de violette dans les lavements émollients , on en ajoute une poignée ou une poignée & demie aux autres plantes laxatives. On compose aussi avec la décoction des feuilles de violette , un gargarisme excellent pour les fluxions vives occasionnées ^{par} des dents cariées. M. DE LA MURE s'en est servi avec succès : il a observé que ce gargarisme soulageoit assez promptement. Les semences de violette sont purgatives & diurétiques ; on s'en sert dans la colique néphrétique , dans la retention d'urine & dans les autres maladies où il n'est ~~pas~~ permis de purger qu'en adoucissant. On en pile une once & demie dans un mortier , en versant peu-à-peu dessus six onces d'eau de chiendent , on passe ensuite la liqueur & on y ajoute une once de sirop violat simple : on fait une émulsion qui convient dans les cas ci-devant proposés. On ne se sert pas seulement des différentes parties de la violette dans les cas que nous avons indiqués , mais on ajoute encore les fleurs à la dose d'une pincée & demie aux potions purgatives , lorsqu'on veut prévenir la trop grande irritation que les autres remèdes pourroient occasionner.

La Pharmacologie rationnelle ne nous apprend rien de particulier sur les fleurs de violette ; on fait seulement qu'elles sont visqueuses , gommeuses & un peu âcres.

Les Fleurs de Pêchers.

Les fleurs de Pêchers , *flores malipericæ* , ont une certaine amertume aromatique , qui n'est cependant pas désagréable.

Cas.

ON les emploie avec succès dans les constipations qui dépendent du mouvement ralenti des intestins , lorsque les matieres muqueuses des intestins sont trop tenaces , lorsque la bile est épaissie & ne peut couler par les vaisseaux excréteurs , ce qui donne lieu à l'ictère jaune. On s'en sert aussi avec succès dans le cours de ventre féreux , qui n'est pas accompagné d'ardeur d'urine ni de douleur , dans les maladies produites par des matieres vermineuses ou même par des vers contenus dans le ventricule ou les intestins , dans les enflures & bouffissures des enfants , occasionnées par des vers contenus dans l'estomac. On observe que dans ce dernier cas elles procurent des évacuations par les urines. On les prescrit encore dans les obstructions des viscères , sur-tout du foie , dans la leucophlegmatie.

Vertus.

LES fleurs de pêcher sont légèrement purgatives ; données à trop haute dose , elles pourroient procurer la diarrhée & le vomissement : elles ont une vertu tonique , apéritive , une vertu anthelmentique très-marquée , elles sont aussi diurétiques. Comme elles conviennent dans les hydropisies , quelques-uns les ont rangées parmi les hydragogues. Les Anciens les regardoient comme un cholagogue très-doux ; elles peuvent diviser les matieres visqueuses & tenaces dont les intestins sont enduits , & suppléer par-là au défaut de la bile : elles augmentent la chaleur , ainsi on ne doit pas les employer lorsqu'on a à craindre la phlogose ou l'inflammation.

Maniere de les employer , & leurs Doses.

ON se sert des fleurs de pêcher ou du sirop des fleurs , on prescrit les fleurs à la dose d'une ou de deux pincées : on en fait une infusion pour servir de base aux purgatifs , c'est-à-dire , à la rhubarbe ou à la manne , lorsqu'on soupçonne des matieres vermineuses , comme dans les enfants , ou lorsque l'estomac est relâché & qu'il y a des sérosités. Dans les embar-

ras du foie , on les prescrit à la dose d'une demi-poignée , infusées dans un bouillon de veau ou de collet de mouton. Le sirop des fleurs de pêcher est aussi bon pour tuer & chasser les vers. La dose en est depuis une demi-once jusqu'à deux onces. On ajoute aussi ce sirop aux porions purgatives dans la même vue. On peut encore se servir du sirop pour purger les personnes délicates qui ont de la répugnance pour les autres purgatifs , pourvu cependant qu'on ne craigne par d'échauffer : on leur en fait prendre deux ou trois onces délayées dans deux ou trois tasses de thé le matin.

Rose pâle , rosa rubra , pallidior.

LES Roses pâles sont connues de tout le monde , elles ne sont pas d'un aussi grand usage que les plantes dont nous avons déjà parlé , on ne se sert gueres des fleurs seules ; on en fait deux especes de sirop , qu'on appelle sirop de roses pâles solutif , l'un simple & l'autre composé ; celui-ci est plus purgatif que le premier ; le simple se fait avec le suc épuré de roses & partie égale de sucre ; le composé se prépare avec le féné , l'agarie & quelquefois même avec la rhubarbe.

Cas.

ON emploie les roses pâles dans le cours de ventre , soit séreux , soit bilieux , pourvu que le ton des solides ne soit pas trop augmenté & qu'il n'y ait pas trop d'âcreté dans les humeurs. On s'en sert aussi dans les obstructions des viscères , sur-tout du foie. M. Sennert remarque qu'elles excitent les mois , c'est pourquoi on les défend aux femmes grosses.

Vertus.

ELLES ont une vertu purgative , apéritive , un peu tonique.

Maniere de s'en servir.

ON emploie rarement les roses pâles seules ; on se sert du sirop qu'on ajoute aux autres purgatifs à la dose d'une once ou une once & demie. On peut aussi purger les personnes qui sont délicates avec le sirop solutif composé , délayé dans le thé.

Les Mirobolans , mirobalani.

LES Mirobolans sont des fruits différents entr'eux , desséchés , inconnus aux anciens , découverts par les Arabes qu'on nous apporte des Indes orientales ; il y en a cinq especes qui ne sont pas le fruit du même arbre , comme quelques-uns l'ont cru , mais d'arbres entièrement différents , dont nous n'avons pas encore une exacte description. Ces cinq especes sont les mirobolans *citrins* , les *indiens* , les *chebules* , les *bellerics* , les *emblics* ; les mirobolans citrins ou jaunes , *mirobalani citrini* , sont les plus en usage. Ce sont des fruits desséchés , oblongs , arrondis en forme de poire , émouffés par les deux bouts , relevés de cinq grandes canelures ou côtes d'un bout à l'autre , & de cinq autres plus petites qui sont entre les grandes ; l'écorce qui est jaunâtre ou citrine est glutineuse & comme gommeuse , épaisse d'une demi-ligne ou d'une ligne tout au plus , amere , acerbe , quelques-uns ajoutent un peu âcre quelque temps après qu'on l'a mâchée ; elle couvre un grand noyau d'une couleur plus claire , qui renferme une amande blanche , couverte d'une membrane très-fine ; on ne se sert que de l'écorce , on rejette le noyau qui est ligneux ; l'arbre qui porte cette espece , s'appelle mirobolanier à feuilles de forbier , *arbor mirobalanifera forbi foliis*.

Les Mirobolans *chebules* , *mirobalani chebula* , sont des fruits desséchés semblables aux Citrins , plus grands , qui imitent plus la forme de Poire , relevés de cinq côtes seulement , ridés , d'une couleur obscure , ou brunâtre en dehors , d'un roux noirâtre en dedans. Leur pulpe est plus épaisse que celle des *Citrins* ; elle renferme un noyau anguleux , creux , qui contient une amande oblongue : on doit choisir ceux qui sont récents , pesants , grands , pleins , dont l'écorce est visqueuse & difficile à rompre. L'arbre qui porte cette espece , s'appelle mirobolanier à fleurs de pêcher , *Arbor mirobalanifera persica foliis*.

Les mirobolans *indiens* , *mirobalani india seu nigra* , sont des fruits desséchés , plus petits que les Citrins , oblongs , ridés plutôt que cannelés , mouffés aux deux bouts , noirs extérieurement , d'un noir plus luisant intérieurement , creusés d'un sillon en dedans. On en trouve quelques-uns de cette espece , qui contiennent dans ce sillon ; une amande imparfaite ou même un noyau parfait ; ce qui fait croire qu'on nous les apporte avant qu'ils soient mûrs : on doit choisir ceux qui sont récents , noirs , pesants , dont la chair est dure , ferme ; l'arbre qui porte ce fruit , s'appelle

mirobolanier à feuilles de faules , *arbor mirobalanifera salicis foliis*.

Les mirobolans bellerics , *mirobalani bellericæ* , sont des fruits arrondis , un peu anguleux , semblables à la noix muscade , un peu jaunâtres , se terminant en un pédicule un peu gros comme la figue. Leur écorce est amère , austère , de l'épaisseur d'une ligne. Elle contient un noyau d'une couleur plus claire , dans la cavité duquel se trouve une amande semblable à une aveline arrondie & pointue : on doit choisir ceux qui sont récents , dont l'écorce est compacte. L'arbre qui les porte , s'appelle mirobolanier à feuilles de laurier , *arbor mirobalanifera foliis laurinis*.

Les mirobolans emblics , *mirobalani emblicæ* , sont des fruits desséchés , presque sphériques , anguleux , d'un gris noirâtre , ils contiennent dans une pulpe charnue qui s'ouvre en six parties en mûrissant , un noyau léger , blanchâtre , de la grosseur d'une aveline divisée en trois cellules , & qui s'ouvre en trois parties , lorsqu'il est mûr. On nous les apporte en segments desséchés qui sont noirâtres , aigrelets , austères , avec une certaine âcreté mais obscure ; il faut les choisir récents , charnus , épais & pesants ; l'arbre qui les porte s'appelle mirobolanier à feuilles finement découpées , *arbor mirobalanifera foliis minutim incisfis*.

Cas.

LES mirobolans en général s'emploient dans le flux de ventre séreux , bilieux , dysentérique , dans le flux hépatique , c'est-à-dire , dans le cours de ventre séreux , sanguinolent , semblable à de la lavure de chair & qui est sans tranchées , [c'est des Indiens eux-mêmes que nous tenons cet usage] dans le flux involontaire de la semence , tant vraie que fausse , qu'on peut appeller gonorrhée habituelle , soit qu'elle soit produite par un Virus vénérien qui cependant a été déjà détruit , soit qu'elle dépende du relâchement des conduits excréteurs de la vraie & fausse semence.

Vertus.

LES anciens ont cru qu'ils n'avoient pas tous la même vertu , mais que les Citrins avoient une vertu cholalogue , les Indiens une vertu mélanogogue & les trois autres une vertu phlegmagogue. Il est vraisemblable que la couleur des deux premiers les a portés à leur attribuer ces deux différentes vertus , selon le système de ce temps-là , à cause de la ressemblance qu'il y a entre la couleur des Citrins & celle de la bile noire ; on ne sauroit dire cependant la même chose des trois autres especes , sans doute qu'ils croyoient avoir observé qu'elles étoient bonnes

pour évacuer la pituite. Par ce que nous avons dit des cas où on les emploie , il paroît qu'ils ont une vertu purgative , légère , adoucissante , astringente. L'observation a fait voir que M. *Sennert* qui en faisoit grand usage dans les dysenteries , qu'ils augmentoient les obstructions du foie , du pancréas , du mésentère , qu'ils nuisoient dans les constipations qui dépendent des matieres muqueuses , tenaces , épaisses ; les mirobolans purgent sans douleur , sans tranchées ; ajoutés à d'autres purgatifs , ils en diminuent l'activité , temperent leur âcreté.

Maniere de s'en servir & leurs Doses.

ON ne se sert que de la pulpe séparée des noyaux ; on l'emploie en substance , ou en infusion , ou en décoction : en substance , on les prescrit depuis un gros jusqu'à deux , quelquefois on y joint d'autres médicaments appropriés , par exemple , on prend les mirobolans Citrins en poudre une drachme , Rhubarbe en poudre demi-gros qu'on incorpore avec le sirop de chicorée composé , & on en fait un bol pour purger dans le flux de ventre. Si on veut ôter aux mirobolans leur vertu purgative , on les fait torréfier avant de les piler ; on prend de cette poudre depuis un gros jusqu'à trois ; c'est un bon astringent pour le cours de ventre séreux colliquatif ; en infusion depuis deux drachmes jusqu'à six ; après les avoir concassés légèrement , on les fait infuser ou plutôt macérer dans l'eau chaude pendant cinq à six heures , on coule cette infusion & on en fait la base d'une potion purgative. En décoction on prescrit les mirobolans Citrins depuis trois gros jusqu'à six , qu'on fait bouillir pendant un quart d'heure pour servir de base à une potion purgative & astringente. On en prépare aussi une ptisane qui convient dans les hémorragies & dans le flux de ventre. On prend des cinq mirobolans pulvérisés grossièrement de chacun demi-once , roses rouges trois gros ; on macere le tout dans une livre d'eau commune sur la cendre chaude : on ajoute sirop de grenades ou de limon ou de quelques autres aigrelets demi-once : si la poitrine étoit affectée , il faudroit substituer le sirop violat à ceux qui viennent d'être indiqués. On observe que les Mirobolans donnés en substance ne purgent pas , mais resserrent fortement : en infusion ils purgent doucement & resserrent moins : en décoction ils purgent & resserrent en même-temps , & la poudre que l'on en fait , après les avoir rotis , resserre puissamment , mais ne purge point du tout.

Pharmacologie rationnelle des Mirobolans.

LA Pharmacologie rationnelle nous fournit quelques lumieres assez satisfaisante : on observe que l'eau dans laquelle on a macéré les mirobolans, jettée sur un papier bleu , lui donne la couleur rouge , ce qui prouve que les mirobolans contiennent beaucoup d'acide ; de plus par l'analyse chimique , on retire des mirobolans beaucoup d'acide , de principe sulfureux & de terre ; il est vraisemblable que les parties huileuses combinées avec l'acide , forment une espece de matiere savonneuse propre à déterger , l'acide est propre à brider la bile , lorsqu'elle est trop âcre , alkalescente , la terre unie avec l'acide forme une espece de sel alumineux , d'où vient semblablement la vertu astringente. On peut expliquer par-là pourquoi les mirobolans en substance ne purgent pas , mais resserrent ; c'est que la terre dans ce cas-là domine ; pourquoi en infusion il purge doucement & resserre moins , parce que la terre étant indissoluble , ne passe pas dans la colature de l'infusion ; pourquoi en décoction il purge plus & resserre en même-temps ; ses différents principes étant développés , pourquoi ils augmentent les obstructions , parce que la terre portée dans la masse du sang , ne peut manquer d'épaissir les fluides & de ressermer les solides.

Casse solutive , Cassia solutiva , Cassia nigra , siliquosa , ægyptiaca.

C'EST la gouffe d'un arbre appelé *Cassia purgatrix* ; elle est cylindrique , longue d'un pan & demi , grosse environ d'un pouce , couverte d'une écorce ligneuse , dont la couleur est noirâtre en dehors , jaune en dedans ; intérieurement elle est partagée en petites loges par des membranes ligneuses & minces , placées transversalement & paralleles les unes aux autres. Elles contiennent une pulpe ou une moëlle noire , molle , mielleuse , d'un goût douceâtre joint à un peu d'âcreté , qui cache une graine ovulaire , aplatie , jaune & luisante. Il y en a de deux sortes , celle d'Egypte qu'on appelle *Cassia Alexandrina* , & celle qui vient de l'Amérique & sur-tout de la Martinique , qu'on appelle *Cassia occidentalis*. M. Chaumel remarque que , depuis plus de vingt ans , nous n'avons que rarement dans ce pays-ci de la casse d'Alexandrie , mais seulement de celle d'Amérique. Il y en a qui prétendent que cette dernière est in-

férieure à la première , pourvu cependant qu'on ait attention de la bien choisir , récente , pesante , qui ne raisonne pas lorsqu'on la secoue , qui ne soit pas moisie.

Cas.

LES Auteurs ne conviennent pas entr'eux sur tous les cas où l'on peut l'employer , ni par conséquent sur toutes ses vertus : ainsi il faut distinguer trois sortes de cas , 1°. ceux où tous les auteurs conviennent qu'on peut l'employer avec succès ; & dans ceux-ci , on ne doit pas faire difficulté de s'en servir. 2°. Ceux dans lesquels quelques auteurs de mérite prétendent qu'elle est utile , & d'autres qui ne sont pas d'un moindre nom , soutiennent qu'elle est nuisible , & dans ces cas on doit être entièrement réservé. 3°. Dans les cas douteux , c'est-à-dire , dans lesquels quelques auteurs soutiennent qu'elle convient , sans que d'autres auteurs disent le contraire , mais sur lesquels on n'a pas des preuves & des expériences assez certaines , & dans ceux-ci on peut & on doit même s'abstenir de la casse & employer d'autres remèdes plus assurés.

Cas où les Auteurs conviennent qu'on peut donner la Casse avec succès.

DANS la constipation simple , dans les fièvres putrides inflammatoires , lorsque l'inflammation se porte vers la poitrine , comme dans la pleurésie , la péripneumonie , dans la toux opiniâtre dont les enfants sont souvent attaqués , dans la toux qui vient d'un rhume , qui est tombé , comme on dit , sur la poitrine , dans les fièvres putrides inflammatoires , accompagnées de météorisme , c'est-à-dire , d'une tension douloureuse du bas-ventre , lorsque l'inflammation n'est pas encore formée , c'est là le seul purgatif qu'on emploie alors. Dans tous ces cas , les auteurs conviennent qu'on se sert de la casse avec succès.

Cas où les sentiments des Auteurs sont partagés & opposés.

PLUSIEURS Auteurs d'un très-grand nom soutiennent que la casse convient dans les calculs des reins , de la vessie , dans le pissement de sang , dans le diabète & dans toutes les maladies des reins & de la vessie ; d'autres prétendent au contraire qu'elle est nuisible aux calculeux : tel est le sentiment de *Fabricius-Hildanus* & de plusieurs autres. *M. Baillon* prétend

tend avoir observé que la Casse est très-contraire à ceux qui ont été taillés pour la pierre. M. *Geoffroi* assure que les observations qu'on fait tous les jours à Paris, sont contraires à celles que rapporte M. *Baillou*, qu'on peut se servir de la casse dans ces cas, qu'il faut seulement en excepter les ardeurs, qu'elle est à la vérité nuisible, lorsque l'inflammation des reins & de la vessie est très-considérable. Mais comme tous les purgatifs ne font qu'irriter ces maladies, & qu'il est nécessaire de purger dans ces cas-là, la casse a moins de danger & réussit plus heureusement que tout autre purgatif. Cette diversité de sentimens peut venir de la différente façon d'administrer la casse & de la nature même de la casse; par exemple, si elle est aigrie, vieille, moisie; il faut remarquer, en passant, qu'il y a des cas où les symptômes paroissent dépendre des reins, sans qu'ils soient cependant affectés. Par exemple, il arrive quelquefois que les matieres retenues dans le colon pressent les reins, en distendant cet intestin, & empêchent la sécrétion de l'urine. Dans ce cas-là, *Fabricius Hildanus* la casse convient parfaitement; elle convient aussi aux femmes enceintes, aux femmes en couches, aux enfans. ~~Et~~ ^{Il} ~~est~~ ^{est} qui pense qu'on peut la donner dans ce dernier cas, ne veut pas qu'on s'en serve dans le pissement de sang, dans le diabete, dans le calcul des reins, dans la vessie. Il faut observer que ceux qui en soutiennent l'utilité dans les maladies des reins & de la vessie, veulent qu'on s'en abstienne lorsque l'inflammation est considérable, & qu'il y a ardeur d'urine. Pareillement il y a des auteurs qui prétendent que la casse ne convient point aux femmes hystériques, ni aux hommes hypocondriaques, à cause de sa douceur, & parce qu'elle fermentant dans les premières voies, elle cause des gonflemens & des vapeurs, comme l'on dit, à ces fortes de malades, ce qui leur est contraire; d'autres disent qu'avec certaines précautions, qui sont de l'associer avec le tamarin, de la faire bouillir quelque temps, on corrige cette douceur & on obvie aux autres inconvénients. On peut la donner de cette manière, ayant attention, pour plus grande sûreté, de choisir la pulpe récemment extraite.

Cas douteux.

PLUSIEURS Médecins que M. *Geoffroi* prétend être dignes de foi, disent que, si on purge des enfans nouveaux-nés avec la casse, pour leur faire rendre le *meconium* qui est dans les intestins gros, ils ne font pas

sujets à la petite vérole ; ce seroit un grand avantage , si le fait étoit certain , mais il est fort douteux.

Vertus.

ON reconnoît dans la casse une vertu légèrement purgative , béchique ou pectorale : elle est utile , suivant plusieurs Auteurs , dans les maladies des reins , de la vessie , sur-tout lorsqu'il n'y a point d'inflammation : on peut l'ordonner encore dans la passion hystérique & hypocondriaque avec les précautions ci-devant remarquées , elle fait des merveilles dans la tension douloureuse du bas-ventre & dans les superpurgations causées par les émétiques.

Maniere de s'en servir.

ON peut se servir de la pulpe de casse , ou de la casse en bâton. La pulpe s'appelle fleurs de casse , ou casse mondée , lorsqu'elle a été séparée de l'écorce & des pepins & passée par le tamis : on l'ordonne en substance , en infusion & en décoction ; la pulpe en substance s'ordonne depuis deux gros jusqu'à demi-once ou une once , on en fait des bols avec du pain à chanter qu'on avale le matin. Ces bols conviennent aux personnes robustes dans le cas de constipation , on s'en sert fort rarement. La pulpe de casse en infusion s'ordonne depuis demi-once jusqu'à une ou une & demie. On ordonne plus ordinairement la pulpe de casse en décoction depuis une once jusqu'à deux ou trois , on la fait bouillir légèrement pendant un quart d'heure dans une livre d'eau commune ou de petit lait. Lorsqu'il faut adoucir , on coule & on a le *dilutum* de casse : mais comme il est sujet à s'aigrir , il seroit plus sûr d'employer l'eau dans le cas où le météorisme n'est pas si marqué , on peut joindre à ce *dilutum* deux onces de manne ou le sirop violat. Le *dilutum* convient dans les fièvres putrides , lorsqu'il y a tension douloureuse du bas-ventre , il se prend pas verrées. Les bâtons de la casse ne s'ordonnent qu'en décoction depuis quatre onces jusqu'à six après les avoir concassés ; on les fait bouillir avec les tamarins pour servir de base à une potion purgative qui convient dans la passion hystérique & hypocondriaque : prenez six onces de casse concassée , de tamarin une once , deux onces de manne , il est plus sûr de se servir de la casse en bâton que de la pulpe , de peur que celle-ci ne soit aigrie : on s'en sert aussi en bâton pour les lavements ; on peut encore faire succer ces bâtons aux enfants qu'il faut nécessairement purger , comme dans le cas

de fièvre putride, & auxquels on ne peut faire prendre des purgations liquides, ils produisent alors, quoique lentement, des évacuations sensibles, la dose est depuis trois onces jusqu'à quatre; on se sert de la casse extérieurement; on étend la pulpe sur un linge qu'on applique sur les hémorroïdes lorsqu'elles sont douloureuses; on l'enveloppe aussi sous forme de cataplasme qu'on applique sur les hypocondres dans le cas d'inflammation du foie & de la rate, cet usage est rare dans ce pays-ci.

La Pharmacologie rationnelle ne nous donne presque aucun éclaircissement sur la casse; la chimie nous apprend qu'elle fournit dans l'analyse un sel acide volatil & un peu de sel urinaire; on observe que la casse délayée dans une livre d'eau & laissée dans un petit tonneau, dépose au fond une espèce de tartre, mais cela lui est commun avec plusieurs plantes, ainsi on n'en peut rien conclure, la pulpe de casse est presque toute gommeuse & très-peu résineuse.

Les Tamarins, Tamarindi.

LES Tamarins sont la pulpe d'un fruit appelé Tamarin qui vient d'un arbre qu'on appelle tamarinier. Cet arbre croît en Egypte, en Arabie, dans les deux Indes, l'Ethiopie, & cette partie de l'Afrique qu'on appelle *Sénégal*, le fruit est une gousse semblable aux gousses des fèves, distingué par trois ou quatre protubérances, & muni de deux écorces, dont l'extérieure est rousse, cassante, & de l'épaisseur de deux lignes, & l'intérieure est verdâtre & plus mince. L'intervalle qui se trouve entre ces deux écorces, est occupé par une pulpe molle, noirâtre, acide, vineuse. L'écorce intérieure renferme des semences dures, quadrangulaires, rougeâtres, luisantes: on concasse ce fruit & on en extrait la pulpe qu'on nous envoie en masse, & qui se trouve mêlée d'écorce, de filaments, de semences dont on doit la séparer avant que de s'en servir. Il faut choisir cette pulpe récente autant qu'il est possible, il faut aussi autant que faire se peut, qu'elle soit grasse, gluante, d'un roux noirâtre, acide, pleine de suc.

Cas.

ON ordonne le Tamarin avec succès dans les constipations accompagnées d'un sentiment de chaleur, d'ardeur, comme chez les femmes hystériques & chez les hypocondriaques, dans les cours de ventre bilieux, dysentériques qui sont pareillement accompagnés d'ardeur & d'une grande soif, dans la coction lésée, lorsque l'estomac est plein de sucs rances,

brûlants ; ce qu'on connoît par les rapports & par la chaleur ; dans les fievres ardentes où la soif est presque inextinguible & l'ardeur très-considérable , dans les fievres putrides érépisélateuses , dans les fievres malignes à *dissolutione* , comme on dit , dans lesquelles il y a beaucoup d'acreté dans les fluides , beaucoup de chaleur , ce qu'on connoît par une soif extrême , le pissement de sang , en un mot dans tous les cas où il y a beaucoup de chaleur , d'ardeur ; tels sont les cas généraux où on emploie avec succès les tamarins. Il est d'autres cas où l'on regarde les tamarins comme spécifiques , savoir , dans le scorbut , dans la jaunisse , les affections vermineuses , la suppression , ou la diminution de l'excrétion de l'urine , les hémorrhoides , les hydropisies , ces cas sont expliqués en général dans la plupart des *Matières Médicales*. Il est nécessaire de donner ici quelques explications pour ne pas donner lieu aux commençants de tomber dans des erreurs pernicieuses , & d'abord pour ce qui regarde le scorbut qui est une maladie caractérisée par un abattement des forces musculaires , par des taches répandues sur l'habitude du corps , par des ulcères à la bouche , par des gonflements & saignements des gencives à la moindre cause qui les agasse ; il faut en distinguer deux especes avec *Willis* , savoir , un qui est froid & l'autre qui est chaud. Dans le froid le sang circule avec peine & est très-propre à causer des obstructions dans les viscères par lesquels il passe , la respiration se fait avec peine , tout est dans le relâchement ; dans le chaud , le sang est dans un grand mouvement , il y a beaucoup de chaleur , d'ardeur , les urines sont rouges ; celui-ci est commun chez les marins qui font de longs voyages sur mer , à cause des viandes salées dont ils se nourrissent. Les tamarins conviennent dans cette dernière espece de scorbut ; aussi voit-on que les marins après de longs voyages , se trouvent très-bien de manger des limons & des oranges , mais ils ne conviennent du tout point dans le scorbut froid.

La jaunisse ou l'ictère jaune , maladie caractérisée par la couleur jaune répandue sur toute l'habitude du corps , ou du moins sur la plupart des parties , est aussi de deux sortes , l'ictère froid qui est accompagné de symptômes qui montrent que la bile est épaisse & ne coule point aisément dans les vaisseaux du foie , par conséquent en moindre quantité dans les intestins , ce qu'on connoît par les matières fécales qui sont pour lors cendrées , les premières voies sont farcies de matières glaireuses. L'ictère chaud qui est très-souvent joint à l'inflammation du foie à cause de l'acreté de la bile , ou sans inflammation , mais accompagnée d'une grande ardeur , de déjections fréquentes d'urine rouge & briquet-

tée. Les tamarins sont nuisibles dans l'ictère froid, ils sont spécifiques dans l'ictère chaud. La suppression ou la diminution de l'excrétion de l'urine peut venir du mouvement de la circulation ralenti & de l'épaississement des humeurs, c'est aussi dans ce dernier cas seulement que les tamarins sont nuisibles. Les hémorroïdes peuvent dépendre de la foiblesse des vaisseaux hémorroïdaux, sans être accompagnées d'ardeur, & alors les tamarins ne conviennent pas, ou être accompagnées d'un sentiment vif d'ardeur & de chaleur & alors ils conviennent. Enfin les hydropisies sont quelquefois la suite des obstructions qui viennent du relâchement des solides & de l'épaississement des fluides, & dans ce cas les tamarins ne conviennent pas, ou bien elles sont jointes à une fièvre lente, les eaux épanchées tournent vers la putridité, les urines sont rougeâtres, ardentes, diminuées, & alors les tamarins conviennent.

Vertus.

DE ce qui vient d'être dit, il résulte que les tamarins ont une vertu purgative légère, rafraîchissante, antiseptique, diurétique froid, vermifuge, anti-scorbutique, mais ces deux dernières vertus doivent être restreintes aux cas déjà marqués.

Maniere de s'en servir & ses Doses.

ON donne le Tamarin en substance depuis deux gros jusqu'à demi-once sous forme de bol enveloppé dans du pain azime, dans le cas sur-tout de constipation, d'ardeur d'entrailles. On le donne plus ordinairement en décoction depuis demi-once jusqu'à une once ou une & demie. Si on veut purger en deux verrées, on le fait bouillir pendant un quart d'heure pour servir de base aux autres médicaments purgatifs, dans les cas où il y a beaucoup d'ardeur, de chaleur dans les constipations accompagnées d'une grande soif. On se sert de cette même décoction dans les fièvres ardentes, dans le bouillonnement de sang ou de la bile, dans la colature on dissout la manne, on y délaye le sirop violat, on associe aussi très-utilement les Tamarins avec la casse dans les affections hystériques & hypocondriaques, comme nous l'avons dit en parlant de la Casse. On fait encore une ptisane fort utile dans les fièvres malignes à dissolutione : on fait bouillir pendant un quart d'heure deux onces de Tamarin dans deux livres d'eau qu'on coule & on y délaye le sirop violat ; on donne cette ptisane à verrée. M. Boerrhaave s'en servoit avec succès dans le cas indiqué : on donne cette même boisson dans les fièvres ardentes.

Pharmacologie Rationnelle.

ELLE ne nous donne pas de grandes lumieres : on voit seulement par le goût fort , acide des Tamarins qu'ils contiennent une grande quantité d'acide. C'est aussi ce que l'analyse chymique confirme ; on en tire une grande quantité d'acide & beaucoup d'huile. Si on dissout les Tamarins dans l'eau , après un certain temps , il s'attache aux parois du tonneau qui les contient , un sel acide semblable à la crème de tartre.

La Rhubarbe , Rhabarbarum , seu Rheum officinarum.

C'EST la racine d'une plante qui croît dans la Chine , & n'est pas encore bien connue. On nous l'apporte des Indes orientales , de séchée & coupée en morceaux de différente grosseur : elle est extérieurement jaune ou un peu brune , intérieurement de couleur de safran & variée de couleur muscade , d'un goût un peu astringent , d'une odeur aromatique qui n'est pas désagréable , elle ne pèse pas beaucoup ; il la faut choisir récente autant qu'il est possible , qui ne soit point cariée ni pourrie ou noire , qui donne la couleur de safran à l'eau & qui laisse quelque chose de visqueux & de gluant sur la langue.

Cas.

ON l'emploie utilement dans les constipations qui dépendent du relâchement des fibres des intestins , comme il arrive dans l'ictère froid , dans les cours de ventre féreux , mais non dans les bilieux. Dans ceux-ci elle seroit nuisible , dans les fleurs blanches chez les femmes d'un tempérament pituiteux , lorsqu'il ne paroît pas qu'il y ait d'acreté , & que la maladie ne cause pas d'excoriation aux parties voisines , dans les obstructions des viscères du bas-ventre produites par de matieres lentes , visqueuses & tenaces comme celles d'où dépend l'ictère froid. Mais dans celles qui viennent d'un épaisissement sec des fluides & où il y a acreté comme chez les hystériques & les hypocondriaques , la rhubarbe seroit plus de mal que de bien ; dans les vermineuses auxquelles les enfants sont sujets , dans lesquelles il y a ordinairement relâchement des fibres du ventricule & des intestins , les digestions étant viciées & tournant vers l'aigre. Dans les fievres putrides vermineuses , lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'ardeur ni de soif & que les rapports sont aigres , alors on joint avec succès la rhubarbe aux autres purgatifs ; dans les fievres intermittentes opiniâtres qui sont entretenues par des obstructions de quelques viscères , comme

nous l'avons dit. L'observation a aussi démontré que la rhubarbe s'emploie avec succès dans l'hydropisie, mais non dans toutes sortes d'hydropisies ni dans tous les temps : elle a réussi dans les hydropisies qui avoient pour cause quelque obstruction des viscères du bas-ventre dépendante du relâchement des solides & de l'épaississement des fluides ; mais dans les hydropisies invétérées, lorsque les eaux épanchées tournent vers la putridité, que le mouvement du sang est impétueux, la soif presque inextinguible & que les urines viennent en petite quantité, elle est regardée comme nuisible ; dans les maladies des reins, des ureteres, de la vessie, elle est aussi regardée comme dangereuse ; ce qui est dit cependant un peu trop en général, & n'est vrai que dans les cas où les diurétiques chauds ne sauroient avoir lieu ; car si la suppression de l'urine étoit occasionnée par des matieres visqueuses, tenaces, la rhubarbe, bien loin d'être nuisible, feroit au contraire beaucoup de bien.

Vertus.

DE tous les cas où la rhubarbe convient, il suit qu'elle a, 1^o. une vertu purgative légère, 2^o. une vertu tonique. Tout le monde convient de la première vertu, mais on lui a disputé la seconde ; cependant l'observation la démontre dans le cas de relâchement, comme dans le flux de ventre séreux, ainsi que nous l'avons déjà vu. D'ailleurs elle est nuisible dans le cas où les solides sont extrêmement resserrés, comme chez les hystériques & chez les hypocondriaques. De plus elle paroît apéritive, puisqu'elle convient dans les obstructions du foie, comme nous l'avons déjà indiqué ; d'où vient que quelques-uns l'ont appelée, le cœur, la vie du foie, ce qui prouve sa vertu tonique ; elle est aussi légèrement astringente, vermifuge, & enfin elle a une vertu diurétique chaude.

Maniere de s'en servir & les Doses.

ON l'ordonne en substance, en infusion ou en décoction ; en substance on l'ordonne en guise de masticatoire aux personnes dont les digestions sont viciées, à cause du relâchement des fibres & des matieres gluantes attachées aux parois du ventricule & des intestins : la dose en est depuis un gros jusqu'à un gros & demi, demi-heure avant le repas. En poudre on la donne depuis dix grains jusqu'à vingt-cinq ou trente & même on pourroit aller absolument jusqu'à un gros dans la vue d'évacuer, on la joint aux autres purgatifs, on la fait prendre dans une cuillerée de vin ou d'eau de chicorée, le matin à jeun. Si on veut s'en servir comme

d'un altérant, la dose est depuis cinq grains jusqu'à quinze qu'on fait prendre le matin à jeun, faisant boire par-dessus de l'infusion de menthe. On fait prendre aussi la rhubarbe en poudre dans la première cuillerée de soupe, lorsque les digestions sont viciées, à la dose de dix grains jusqu'à quinze ou vingt. 2°. On s'en sert enfin en poudre dans les enfants qui viennent de naître, lorsqu'ils ont de la peine à rendre le *meconium*. Dans ce cas-là M. *Boërrhaave* la donnoit à la dose de trois grains jusqu'à quatre, triturée avec le sucre dans une cuillerée de lait. M. *Sennert* a remarqué qu'il ne faut pas triturer la rhubarbe avec trop de violence, ni la réduire en une poudre trop fine, parce qu'alors on lui fait perdre une partie de sa vertu. En infusion la dose est depuis un ~~gros~~ jusqu'à deux, concassée grossièrement; on la laisse infuser pendant vingt-quatre heures, & on se sert de cette infusion pour base des purgations dans les fièvres putrides vermineuses, accompagnées du relâchement des solides; on se sert de l'infusion seule dans les fièvres intermittentes; on prend deux gros de rhubarbe qu'on fait infuser dans de l'eau pendant huit heures, & on en fait prendre tous les matins à la dose de quatre gros pendant plusieurs jours: on l'ordonne encore à la dose depuis un gros jusqu'à un gros & demi dans un nouet qu'on suspend & qu'on fait infuser dans une livre d'eau de chicorée ou d'eau commune, & qu'on fait prendre pour boisson ordinaire, & le plus souvent qu'il est possible aux enfants dans les affections vermineuses. On a observé que la décoction de rhubarbe a beaucoup moins de vertu que l'infusion, ainsi on ne doit pas s'en servir: si cependant on vouloit l'employer de cette sorte, la dose seroit de trois gros & demi, & même davantage.

Pharmacologie rationnelle.

ELLE ne nous donne pas de grandes lumières. M. *Bouleduc* a traité cette racine par les dissolvants aqueux & par les spiritueux; il coupa deux onces de rhubarbe par tranches, qu'il fit infuser & macérer pendant vingt-quatre heures dans deux livres d'eau de rivière, il coula cette infusion qui étoit jaune, & cette teinture purgeoit assez bien à la dose ordinaire. Il fit de nouveau infuser ce premier résidu, & il en tira une seconde teinture qui fut moins jaune, moins amère & moins purgative, ne purgeant qu'à une dose double de la première teinture; il fit bouillir le résidu de cette seconde teinture, & il eut une teinture qui n'avoit ni la couleur, ni les vertus de la rhubarbe. M. *Bouleduc* traita ensuite la rhubarbe avec l'esprit

l'esprit de vin bien rectifié , il n'en put rien retirer ; la dissolution ne blanchit pas , d'où il conclut qu'elle n'étoit pas résineuse.

Le Rapontic , Rhapunticum.

C'EST une racine qui naît dans la Thrace & la Scythie & qu'on cultive communément dans les jardins de l'Europe. On nous l'apporte en morceaux ; elle est jaune en dehors , rougeâtre à l'intérieur : on y remarque de petits sillons qui sont comme des rayons qui vont de la circonférence vers le centre ; elle a peu d'odeur , un goût amer , un goût âcre , laissant une espece de glutinosité sur la langue après qu'on l'a mâchée , elle teint un peu l'eau en jaune. On substitue quelquefois le rapontic à la rhubarbe dans les boutiques. Ses vertus sont à peu-près les mêmes que celles de la rhubarbe , mais moins marquées ; c'est pourquoi on la donne à double dose de celle-ci. Dans le même cas quelques Médecins prétendent avoir observé que le rapontic est plus astringent que la rhubarbe , & le préfèrent sous ce point de vue. M. de *Chomel* prend une once de rapontic coupé par morceaux , qu'il fait bouillir dans trois chopines d'eau jusqu'à diminution de moitié , il coule & donne cette ptisane dans le cours de ventre fereux comme plus astringent.

La Manne.

C'EST un suc végétal épaissi sous différentes formes , tantôt en grains de millet ou de froment , tantôt en grumeaux , tantôt en petits bâtons , tantôt en masse. Ce suc est assez léger , blanc lorsqu'il est récent ; il devient roussâtre en vieillissant. La manne a une saveur douce , sucrée , mielleuse , mâchée pendant quelque temps , elle laisse un peu d'âcreté sur la langue ; elle étoit connue aux anciens sous le nom de miel *céleste* , miel de *rosée* , *mel roris*. On la recueille en différents endroits , aux Indes orientales , en Perse , en Arabie , en Europe , en Italie , en France. Celle de France s'appelle manne de mélese , manne de Briançon , parce qu'on la recueille sur le mélese , *Larix folio deciduo conifera* , dans le territoire de Briançon en Dauphiné , on ne se sert plus de celle-là. La manne européenne dont on se sert à présent , se cueille dans la Calabre & en Sicile , on préfère celle de Calabre. Elle se recueille sur deux especes de frêne ; c'est pourquoi on l'appelle manne de frêne. Un de ces frênes s'appelle *fraxinus humilior* , sive *fraxinus minõri & tenuiori folio* , le frêne de petite espece. Ce n'est pas tant une espece particuliere de

frêne qu'une différence qui se rencontre dans la figure ; l'autre s'appelle *fraxinus rotundiori folio* , frêne à feuilles rondes , ce n'est là non plus qu'une différence. La manne de Calabre est de deux especes ; celle qui coule d'elle-même des arbres pendant les grandes chaleurs de l'été , s'appelle spontanée ; celle qu'on a en faisant une incision à l'écorce de l'arbre , est appelée par les habitants de la Calabre , *forfata* ou *forfata-tella*. On la divise encore en plusieurs especes , suivant les différentes formes : ainsi on distingue la manne en grain , *manna masichina* , la manne en larmes , *manna stalactica* , & la manne grasse. La manne en grain est celle qu'on voit paroître d'elle-même vers le midi au mois de Juillet & d'Août , comme de petites gouttes de rosée sur les fibres nerveuses des grandes feuilles , & sur les veines des petites , l'on appelle cette espece en Italie , *manna di fronde* , manne de feuilles ; elle est très-rare même dans les boutiques d'Italie. La manne en larmes est de deux sortes , la spontanée & la manne en larmes proprement dite ; la manne en larmes spontanée est celle qui coule d'elle-même des branches & du tronc du frêne en grumeaux qui n'est souillée d'aucune impureté ; la manne en larmes proprement dite se cueille de cette maniere. On fait des incisions au tronc du frêne , & on y insere des pailles ou des petites branches ; elle coule le long de ces corps , s'épaissit & forme des gouttes pendantes ou stalactiques que l'on ôte quand elles sont assez grandes. On retire les pailles ou les petites branches & on les fait secher au soleil. Il s'en forme des larmes très-belles , longues , creuses , légères & comme cannelées en dedans , blanchâtres , dont on fait grand cas avec raison , parce qu'elles ne contiennent aucune ordure. Si , après avoir fait l'incision aux branches & au tronc des frênes , on ne prend pas la précaution d'y insérer des pailles ou des petites branches , comme nous venons de dire , le suc sort par l'incision , & quelquefois il est si abondant qu'il coule jusqu'au pied de l'arbre & y forme de grandes masses. C'est la manne grasse qui n'est pas si blanche que la précédente , mais qui devient rousse & souvent même noire , à cause des ordures de la terre qui y sont mêlées. C'est mal-à propos que quelques-uns préfèrent celle-ci , puisque c'est souvent une manne gâtée par l'humidité de l'air ou bien parce qu'elle a été mouillée par l'eau de la mer dans les vaisseaux , ou par l'eau de la pluie ; souvent même cette manne grasse n'est autre chose qu'un suc épais mêlé avec du miel & un peu de scammonée , c'est ce qui fait que cette manne grasse est meilleure & purge fortement. On donne aussi quelquefois la couleur blanche à la manne en larmes avec de la chaux , mais alors on la rend

plus pesante. On doit préférer la manne en larmes à toutes les autres , excepté cependant la manne en grain qui est extrêmement rare , comme nous l'avons observé. La manne en grumeaux doit être préférée à la grasse. La meilleure manne est celle qui est légère , récente , ce qu'on connoît à la couleur. Plus elle est blanche , plus elle est récente ; elle doit être pure , d'un goût sucré , mielleux , & laisser sur la langue un peu d'âcreté après qu'on l'a mâchée.

Cas.

LA Manne est aujourd'hui d'un usage très-étendu , on l'associe au plus grand nombre des autres purgatifs dans la plupart des maladies ; on l'emploie avec succès dans les constipations , chez les personnes d'un tempérament bilieux , robustes , chez les hystériques , les hypocondriaques , on l'associe alors avec les tamarins ; dans les Cours de ventre essentiels produits par des mauvais suc , des mauvaises digestions , dans les fièvres putrides inflammatoires , lorsque l'inflammation ne se porte point dans le bas-ventre , mais vers la poitrine , comme dans la pleurésie , la péripleurésie symptomatique , dans les catharres , soit secs , soit humides , qui sont accompagnés d'une toux violente & d'une grande difficulté de respirer , qui menace de suffocation. M. Sydenham a observé qu'on pouvoit donner la manne dans le pissement de sang occasionné par le calcul des reins ; il en fit l'essai sur lui-même , à la suite d'un long & puissant paroxysme de goutte , il fut attaqué d'un pissement de sang qui revenoit toutes les fois qu'il alloit à pied ou en carrosse sur le pavé des rues : il avoit des raisons qui ne lui permettoient pas de douter que le pissement de sang étoit occasionné par un calcul dans le bassinet des reins ; après avoir employé inutilement différents remèdes , il jugea que puisque les semences de frêne étoient regardées comme lithontriptiques , la manne qui est le suc du même arbre , devoit avoir à plus forte raison la même vertu : il prit donc deux onces & demie de manne , dissoute dans trois livres de petit lait à verrée qu'il entremêloit d'un peu de suc de limon , & il avoit la précaution de prendre seize gouttes de son *laudanum liquidum* , le soir du jour qu'il s'étoit purgé , ce qui lui ayant réussi , il usa de ce cathartique une fois la semaine pendant quelques mois , & il se trouva soulagé : mais quelque temps après le pissement de sang étant survenu , il prit le matin le même remède deux fois la semaine , & cette seconde fois il ne prit pas les seize gouttes de son *laudanum liquidum* , par

ce moyen il se délivra entièrement de la douleur des reins & du pissement de sang. Enfin la manne peut s'employer utilement dans tous les âges , les sexes , les tempéraments , seule ou associée dans presque toutes les maladies où il est nécessaire de purger.

Vertus.

IL fuit qu'elle a une vertu légèrement purgative , béchique , & lithontriptique sous le point de vue que nous venons de la voir ; les anciens l'ont regardée comme un cholagogue , d'autres comme un phlegmagogue. Il y en a qui prétendent qu'elle est nuisible dans les tempéraments bilieux , dans les inflammations ; l'expérience prouve le contraire : si on la dissout dans la décoction de tamarin , ou qu'on l'associe à quelqu'autre remède acide végétal , elle est un purgatif assuré , & qui ne fermente pas dans l'estomac ; en un mot c'est un purgatif doux , benin , elle purge lentement , les acides végétaux rendent sa vertu purgative plus assurée , elle est amie de la poitrine dans la décoction de bourrache ; dans le cas de pleurésie ou de péricnemonie elle produit de bons effets en évacuant , ce qui n'arrive pas toujours par les selles , mais encore par les urines & en aidant l'expectoration : on peut la donner aux femmes enceintes , à celles qui sont en couche , aux enfants , & dans tous les cas où il y a indication à purger , excepté dans l'inflammation du bas-ventre.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON la donne rarement seule , on la dissout ordinairement dans quelque infusion ou quelque décoction appropriée , par exemple , dans les inflammations de poitrine on fait une décoction de bourrache , on coule , & dans la colature on dissout deux onces & demie de manne ; si on veut rendre le cathartique plus assuré , on y ajoute un ou deux grains de tartre émétique ; dans les affections hystériques & hypocondriaques on prend une once de tamarin , six onces de bâton de casse concassée dont on fait une décoction pour deux verres ; dans le premier on dissout deux onces de manne , dans le second une once & demie. On peut purger les personnes délicates avec deux onces de manne dissoute dans deux tasses de thé ou de café ; on peut aussi se servir de la manne en substance pour les purgations liquides. On fait , comme nous avons déjà dit , une conserve laxative avec la manne & les fleurs de

violette qu'on donne à la dose de demi-once ; on fait aussi avec les mêmes fleurs & la manne un ratafia qu'on donne le matin & le soir à la dose d'une ou deux cuillerées lorsque le ventre est paresseux. La Pharmacologie rationnelle ne nous donne presque aucune lumière sur les principes par lesquels la manne agit ; on fait seulement qu'elle contient beaucoup d'acide & d'huile , qu'elle se résout dans l'eau & non dans le vin.

Le Séné , Sena , sive folia orientalia.

ON trouve trois sortes de séné , le séné d'Alexandrie , le séné d'Italie & le séné des Maures : ce dernier n'est autre chose que les feuilles de Baguenaudier , *colutea vesicaria* , ou faux séné ; il n'est plus en usage , non plus que celui d'Italie dont les feuilles sont grandes , larges , arrondies par leurs extrémités : nous ne ferons ici que la description du séné d'Alexandrie qu'on appelle aussi feuilles orientales ; ce sont de petites feuilles plus ou moins longues , pointues , en forme de lance , fermes , d'un jaune verdâtre , d'une odeur assez suave , lorsqu'elles sont récentes , d'un goût amer , un peu âcre , & qui excitent quelquefois des nausées lorsqu'on les mâche ; lorsqu'elles sont anciennes , elles n'ont presque aucune odeur : on doit les choisir récentes , entières , sans queues & mondées de tous les corps étrangers avec lesquels elles sont mêlées , d'un jaune clair & qui donne à l'eau une couleur assez foncée ; non-seulement les feuilles de séné sont en usage en Médecine , mais aussi les fruits qu'on appelle follicules de séné ; ce sont des gouffes composées de deux membranes arrondies , applaties , lisses , d'une couleur noirâtre qui contiennent des pepins.

Cas.

LE séné convient en général dans tous les cas excepté dans les inflammations & les fièvres accompagnées d'ardeur : on s'en sert avec succès dans les fièvres putrides , soit simples , soit compliquées , principalement lorsque la langue paroît chargée d'une croûte blanche ou même tirant un peu sur le jaune & où il n'y a pas beaucoup d'ardeur ni une grande soif , dans les fièvres putrides où l'on soupçonne des matières vermineuses ou même des vers. Dans les fièvres malignes où les solides paroissent être relâchés & les fluides épaissis , ce qu'on connoît par la lenteur du pouls , par la tendance à l'affection soporeuse , par le peu de chaleur ,

par le défaut de soif , mais dans les fièvres malignes , où le sang paroît dissout , ce qu'on connoît par la fréquence du pouls , l'ardeur , la soif , on doit bien s'abstenir de donner le séné. On l'emploie avec succès dans les fièvres intermittentes accompagnées de signe de putridité , dans les coctions lésées qui se trouvent dans les tempéraments pituiteux , lorsque les solides sont relâchés & que les matieres paroissent tourner vers l'aigre , ce qu'on connoît par les rapports aigres , insipides ; mais lorsque le malade sent des ardeurs à l'estomac , que les rapports sont nidoreux , le séné nuit ; dans les apoplexies après avoir réveillé le ton des solides par les émétiques , on leur substitue les purgations faites avec le séné ou la pûsane de séné pour soutenir leur action , afin de ne pas répéter trop souvent les émétiques qui pourroient trop épuiser les forces : on l'ordonne aussi dans les affections vermineuses des enfants accompagnées de symptomes qui dénotent un relâchement du tissu des fibres de l'estomac , des intestins & en général de tous les solides , & un épaisissement dans les fluides. Les anciens Médecins depuis les Arabes à qui nous devons l'usage du séné , le regardoient comme un spécifique dans les obstructions invétérées , dans les affections cutanées , les éruptions accompagnées plus ou moins de démangeaison , quelques-uns le croient très-utile dans les hydropisies. M. Fernel le regardoit comme un remede excellent dans les fièvres lentes invétérées sur-tout dans les quartes , aujourd'hui on s'en sert encore dans tous les cas de cette espece , mais avec circonspection , lorsque les tempéraments sont pituiteux & que les solides paroissent être dans une espece d'engourdissement. Il y en a qui l'emploient dans les hystériques , dans les hypocondriaques , les mélancholiques ; on doit être aussi extrêmement réservés dans ces cas-là , parce que le séné échauffe , réveille le ton des solides qui sont extrêmement tendus dans ces affections ; cependant lorsqu'il y a des obstructions , on peut employer les follicules.

Contre-Indications.

ON évite avec beaucoup de soin le séné dans les tempéraments bilieux , dans lesquels la bile est exaltée , comme l'on dit , dans les inflammations essentielles , soit du bas-ventre , soit de la poitrine , en général même dans les inflammations symptomatiques du bas-ventre , dans les affections de la poitrine ; mais dans les affections symptomatiques de la poitrine , telles que sont assez souvent la pleurésie ou la péripneumonie , si elles sont sur-tout entretenues par des matieres vermineuses , on peut dans quelques

occasions se servir des follicules de féné, ce qui ne doit cependant pas être pris trop généralement, & doit s'entendre seulement des cas où les symptômes de l'inflammation, de la pleurésie, par exemple, paroissent diminuer ou même cesser totalement dans le temps de la remission de la fièvre, c'est alors seulement que les follicules de féné conviennent & peuvent même être regardées comme un remède spécifique, sur-tout si la pleurésie qui est symptôme de fièvre putride, se trouve entretenue par des matieres vermineuses, mais si les symptômes de l'inflammation ne diminuent point dans le temps de la remission de la fièvre, on doit alors s'abstenir des feuilles & des follicules de féné; enfin on évite le féné dans tous les cas où il y a trop d'ardeur, trop de fougue dans le sang, dans la tension du ventricule & du bas-ventre.

Vertus.

LE détail que nous venons de faire des cas où l'on emploie le féné avec succès, & de ceux où il est contre-indiqué, nous fait assez connoître ses vertus; le féné a une vertu purgative médiocre, mais sûre; donné seul il agit lentement, il est tonique, il aiguillonne & réveille le ton des solides; apéritif, il excite de plus grandes oscillations dans les organes de la circulation, diminue l'épaississement des fluides, augmente leur fluidité, il a une vertu échauffante, on doit s'en abstenir toutes les fois qu'il y a trop d'ardeur, de fougue dans le sang & en général dans les affections de la poitrine, enfin il est un bon anthelmentique: on lui reproche de causer des tranchées & que son effet n'est pas assuré, mais ces reproches ne paroissent pas fondés.

Maniere de s'en servir & ses Doses.

ON peut se servir des feuilles de féné, des follicules ou de l'extrait de féné; ce dernier est préparé de cette maniere, on fait macérer les feuilles de féné dans une suffisante quantité d'eau à une douce chaleur; on fait évaporer l'humidité jusqu'à la consistance d'extrait, il est inflammable & en partie résineux, mais il n'est pas d'usage dans ce pays-ci. Ceux qui s'en sont servis ont remarqué que donné à un gros & demi, il causoit de tranchées & ne purgeoit pas. Quant aux feuilles & aux follicules, il se présente d'abord une question, savoir, si on doit préférer les feuilles ou les follicules. Presque tous les anciens Médecins parmi les Arabes ont cru qu'il falloit préférer les follicules, parce qu'elles n'excitent point de tranchées; d'autres ont prétendu au contraire qu'il falloit préférer les feuilles prétendant que les follicules ne purgent pas;

en général on peut dire qu'il est des cas où il faut préférer les feuilles, & d'autres où les follicules doivent être préférées.

Cas où il faut préférer les feuilles.

1°. LES feuilles conviennent principalement dans les fièvres putrides vermineuses, où il n'y a pas beaucoup de fougue dans le sang, mais au contraire un épaisissement ou une tendance à l'épaisissement des fluides, un relâchement des solides, parce qu'elles sont plus propres à réveiller le ton des fibres du ventricule, des intestins & de tous les solides & à dégager les matières tenaces. 2°. On doit aussi préférer les feuilles dans les affections soporeuses, parce qu'elles sont plus toniques, mais on doit préférer les follicules dans les fièvres simples, dans lesquelles il y a un caractère d'âcreté, quoiqu'il ne paroisse pas y avoir trop d'ardeur ni de mouvement, comme aussi dans la passion hystérique & hypocondriaque, parce qu'elles sont moins échauffantes & moins toniques, & que d'ailleurs elles purgent assez bien quoique lentement, comme l'expérience le prouve. M. *Wedetius* assure avoir employé pendant tout un jour le séné dans le cas de fièvre ardente, sans aucun inconvénient; cette pratique seroit dangereuse dans les pays chauds, on doit l'éviter soigneusement; on peut donner le séné en substance, en infusion, en décoction. Pour s'en servir en substance, on prend du séné mondé qu'on pulvérise & on en fait un bol qu'on peut donner depuis vingt grains jusqu'à un gros; on ne le donne presque plus de cette façon, le plus communément on s'en sert en infusion depuis un gros jusqu'à deux & demi pour une verrée; pour éviter qu'il ne cause de tranchées, on fait bouillir demi-livre de pruneaux dans demi-livre d'eau, on coule & dans la colature on fait infuser deux gros de séné pour purger les femmes enceintes, les personnes délicates, lorsqu'on craint d'exciter des tranchées. Pour un enfant, on ne fait infuser qu'un gros de séné. On fait aussi infuser le séné simplement dans l'eau & cela à froid ou à chaud; à froid pendant la nuit entière, à chaud pendant une demi-heure; lorsqu'on l'infuse théiformement ou pendant toute la nuit on le fait infuser sur les cendres chaudes & on en fait la base des autres purgatifs, tels que de la rhubarbe, de la manne. Suivant les indications qu'on a à remplir, on y ajoute très-souvent quelque sel alkali fixe, comme l'alkali fixe de tartre, le sel d'absynthe, ou bien le sel végétal qui est le plus utile ici en pareil cas à la dose d'un gros, on observe qu'alors

le féné purge mieux & fans douleur ; c'est avec l'infusion de féné qu'on fait la ptisane royale de cette maniere.

Ptisane Royale.

ON prend trois gros ou trois gros & demi de féné mondé pour trois verrées , un gros de sel végétal , une pincée de fleurs de Pêchers , un limon coupé par tranches , on fait infuser le tout à froid pendant la nuit , & dans le premier verre on dissout deux onces de manne , dans le second une once de manne , le troisieme qu'on supprime quand les deux premiers ont suffisamment évacués , se donne avec la seule infusion , sans ajouter la manne ; si on veut aiguïser le purgatif , comme dans les fievres malignes à *coagulo* , on ajoute dans les premiers verres un ou deux grains de tartre émétique. Dans les tempéraments bilieux , lorsqu'on craint de trop échauffer , on fait cette ptisane avec demi-once de follicule , deux gros de sel végétal , & on y ajoute les fleurs de violettes , la manne au premier & second verre , cette ptisane purge abondamment sans échauffer. Dans les fievres malignes à *coagulo* , lorsque le sang est épaissi , que le pouls est foible , on se sert de la ptisane , comme nous avons vu ; mais comme on ne peut pas la répéter tous les jours , & que nécessairement il faut purger , on fait une infusion de follicule de féné dans trois livres d'eau , & on en donne au malade trois ou quatre livres par jour le lendemain de la purgation ; cette ptisane convient aussi dans les coctions lésées : il est vrai qu'on ordonne la décoction de féné , mais on ne doit pas même le faire , parce qu'il perd sa vertu purgative par l'ébullition , & cause des tranchées ; c'est ce qui a fait dire à M. Mesme. que la vertu purgative du féné étoit à la surface. La dose des follicules est depuis un gros jusqu'à un gros & demi pour un verre , deux gros & demi pour deux verres : on corrige le mauvais goût du féné en le faisant infuser avec une égale dose d'*iquetaie* , que M. Marchand croit être les feuilles de la grande scrophuleuse aquatique , mais il y a apparence que ces feuilles en diminuent la vertu , car on ne s'en sert pas aujourd'hui.

Pharmacologie rationnelle.

Elle nous apprend que le féné est composé de trois parties , qu'on peut tirer sans employer la violence du feu , savoir , la partie gommeuse , la partie résineuse & la partie huileuse ; la partie gommeuse domine ;

car d'une once de féné qu'on fait bouillir , on en retire deux drachmes de partie gommeuse , une drachme de résineuse , & une si petite quantité de partie huileuse qu'on ne sauroit la déterminer. M. *Cartheuser* remarque que la partie gommeuse pousse par les urines & ne purge presque point , & que la partie résineuse se colle aux parois des intestins , cause des tranchées : la vertu purgative du féné consiste dans l'alliage des parties gommeuses & résineuses : il y a même apparence qu'elles n'agissent pas comme principe gommo-résineux , mais qu'elles sont animées par un principe particulier , ce qui purge donc dans le féné est ce qu'il y a de plus subtil dans le principe gommo-résineux : on voit par-là pourquoi la décoction de féné de même que l'extrait , ne purge pas , excite beaucoup de tranchées ; pourquoi les sels alkalis fixes , mêlés avec le féné , empêchent les tranchées , en dissolvant les parties résineuses , & les étendant par ce moyen dans l'eau ; les acides , soit minéraux , soit végétaux , brident les âcretés résineuses , comme l'observation le démontre ; ainsi il est bon de mêler quelques acides avec le féné , comme l'on fait dans la ptisane royale.

Le Jalap , Jalapa , sive Jalapium.

Le Jalap est la racine d'une espece de liséron ou de *convolvulus* , qui croît en Amérique dans la nouvelle Espagne , on nous l'envoie coupé en tranches ; cette racine est oblongue , en forme de navet , grosse , compacte , noirâtre en dehors , brune ou grise en dedans , marquée de cercles concentriques , résineuse , d'un goût un peu âcre quand on l'a mâchée ; il faut choisir le Jalap le plus noir , le plus compacte & le plus inflammable.

Cas.

ON exclut le Jalap de toutes les maladies aiguës , sur-tout lorsque l'ardeur paroît dominer ; on ne le donne point non plus dans les tempéramens bilieux , dans les passions hystrériques & hypocondriaques : on l'emploie en général lorsque les solides sont relâchés , dans les tempéraments humides , pituiteux , dans les hydropisies , les leucophlegmaties , sur-tout s'il n'y a point de soif extrême , dans les maladies œdémateuses chroniques ; au défaut de féné & des autres purgatifs , on pourroit l'employer dans les fievres putrides accompagnées d'affaiblissement dans les solides & d'épaississement des fluides , comme aussi dans les fievres malignes à *coagulo*. Comme c'est un remede qui n'est pas désagréable &

qu'une petite dose suffit pour bien purger , les gens de la campagne & les pauvres s'en servent souvent. Le Jalap convient aussi dans les vieilles obstructions qui dépendent du relâchement des solides & des matieres tenaces , visqueuses , dans les tempéraments humides , pituiteux , sur quoi il est très-important de bien distinguer le tempérament , parce qu'il arrive assez souvent qu'on trouve des gens qui se plaignent de la pituite , qui ne sont cependant pas d'un tempérament pituiteux. Toutes les fois que l'on voit des excrétiions abondantes de sérosité , soit par les urines , soit par l'expectoration , on ne doit pas conclure que les personnes qui éprouvent ces excrétiions soient d'un tempérament humide , pituiteux , puisqu'on voit assez souvent que les hystériques ou les hypocondriaques , sur-tout dans les pays chauds , en éprouvent de semblables sans être cependant d'un tempérament pituiteux : les abondantes secrétiions de sérosité dans ces sortes de personnes , viennent de ce que la sérosité ne pouvant se mêler exactement avec le sang qui est extrêmement desséché , est rejetée par les voies des urines , des crachats. Ceux qui dans de pareils cas se plaignent de la pituite , n'étant pas d'un tempérament pituiteux , feroient très-mal de se servir du Jalap qui chauffe & dessèche beaucoup ; on ne peut le donner que lorsque la pituite est bien formée , ce qu'on connoît par l'épaississement du sang & la fluidité aqueuse & par les autres signes d'un tempérament pituiteux , parce que les personnes de ce tempérament crachent quelquefois du pus.

Vertus.

LE Jalap a une vertu purgative assez forte , assez active , propre à irriter considérablement l'estomac & les intestins , à augmenter les mouvements vitaux & la chaleur : il cause assez souvent des coliques , quoiqu'en disent la plupart des Auteurs , qui disent qu'il purge lentement sans causer des tranchées.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON peut s'en servir en substance ou en infusion ; il y a des Auteurs qui pensent qu'on peut le donner en substance jusqu'à quarante grains , d'autres seulement jusqu'à trente ; il y a des observations qui prouvent que donn à la dose de quarante grains , il cause des superpurgations. M. *Wedetius* dit que la dose pour les adultes doit être depuis dix grains jusqu'à vingt-quatre au plus. Lorsque la sérosité abonde , comme dans la leucophleg-

matie , M. *Wedetius* dit l'avoir donné à la dose de trois grains jusqu'à quatre à des enfants , & qu'il opéroit très-bien : il faut cependant que les solides soient fort relâchés dans les enfants pour employer le Jalap. On s'en sert ordinairement très-bien en bol , la dose doit être de dix à vingt grains pour les adultes ; M. *Wedetius* se trouvoit très-bien d'allier , par exemple , un scrupule de Tartre ou de Cryстал de Tartre avec un scrupule de Jalap , dont il faisoit un bol en y joignant les fleurs de pêcher. Si on veut donner le Jalap en infusion , il faut faire attention qu'il est composé de parties résineuses , ainsi il convient de faire l'infusion dans du vin blanc : on fait infuser vingt grains dans six onces de vin blanc , on remue le vase dans lequel on a fait l'infusion pour troubler la liqueur & on la fait boire ainsi trouble le matin , cette infusion convient mieux aux hydropiques. Le Jalap entre dans la composition de l'eau-de-vie allemande ; on prend égale quantité de Jalap & d'Iris de Florence pulvérisés qu'on fait infuser ou macérer avec de l'eau-de-vie au soleil , ou à une médiocre chaleur ; on remue de temps en temps , & la dose est depuis une once jusqu'à trois , on ajoute souvent le Jalap aux autres purgatifs dans les hydro-piques ; par exemple , dans une infusion de séné on dissout la manne , & on y ajoute dix ou quinze grains de Jalap.

Pharmacologie rationnelle.

ELLE nous apprend que le Jalap est composé d'une partie résineuse & gommeuse , enforte que la partie gommeuse domine , car de douze onces de Jalap on en retire quatre & demie de gomme & deux de résine tout au plus. M. *Boërrhaave* a séparé ces parties , & il a observé que la partie gommeuse purgeoit peu & pouffoit par les urines , & que la partie résineuse purgeoit un peu plus , mais causoit des tranchées ; d'où il suit que la vertu purgative du Jalap réside dans un principe particulier volatil , qui se dissipe lorsqu'on sépare les parties gommeuses d'avec les résineuses. On voit par-là qu'on ne peut gueres donner le jalap qu'en substance ou en infusion , mais en infusion faite dans quelque liqueur appropriée , tel qu'est le vin blanc ou l'eau-de-vie.

Le Méchoacan , Mechoacana.

CETTE racine qu'on appelle aussi *Rhabarbarum album* , *convolvulus Americanus Mechoacana dictus* , croît en Amérique dans une province de la nouvelle Espagne appelée *Méchoacan* , d'où lui est venu son nom ; on

l'apporte coupée en tranches : elle est brune en dehors , blanche en dedans , couverte d'une écorce ridée , d'une substance mollassé , dans laquelle on voit à peine quelques fibres & les vestiges de quelques lignes circulaires , mais moins marqués que dans le Jalap , d'un goût douceâtre avec une certaine âcreté qui ne se fait pas d'abord sentir , sans odeur : on doit choisir le *Méchoacan* le plus récent , car on dit que sa vertu ne se conserve que deux ou trois ans , blanchâtre , compacte , pesant , on jette celui qui est noirâtre & carié , cette racine est connue depuis 1524.

Cas.

Dès qu'on eut découvert sa vertu , on lui donna de grands éloges peut-être outrés , on l'employoit à peu-près dans les mêmes cas que le Jalap ; mais depuis la découverte de cette dernière racine , l'usage du *Méchoacan* est devenu plus rare à cause de l'inconvénient qu'il a , comme nous avons dit , de ne conserver sa vertu que deux ou trois ans , c'est ce qui fait même qu'on le trouve rarement dans les boutiques : on s'en servoit principalement dans les hydropisies , dans les leucophlegmaties , dans les coctions lésées qui d'pendoient du relâchement des solides , & qui n'étoient pas accompagnées d'ardeur ; dans toutes les douleurs vives qui n'étoient pas accompagnées de chaleur , comme dans le rhumatisme froid qui a son siege principalement dans les membranes propres des muscles , dans les rhumatismes gouteux , ou même dans la goutte , dans les tempéraments pituiteux & froids , lorsque les fluides paroissoient épaissis , dans les affections vermineuses qui dépendent ordinairement du relâchement des fibres du ventricule & des intestins , lorsqu'elles n'étoient pas accompagnées d'ardeur , de fièvre , ni d'inflammation , dans les vieilles obstructions qui dépendoient du relâchement des solides & de l'épaississement des fluides , dans les fièvres intermittentes invétérées , dans l'asthme humide.

Vertus.

D'OÙ il suit que le *Méchoacan* a une vertu purgative assez marquée , quoique quelques-uns disent qu'il purge lentement. M. *Bouléduc* remarque que lorsqu'il est bien choisi , il purge assez promptement , sa vertu est en même-temps hydragogue , atténuante principalement de la lymphe épaissie , apéritive , béchique , vermifuge.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON n'ordonne le méchoacan qu'en substance ou en infusion , parce qu'il perd sa vertu par l'ébullition. Charles Pison l'ordonnoit en poudre depuis demi-once jusqu'à une once ; la dose ordinaire est depuis dix grains jusqu'à vingt ~~et en gros & demi~~ qu'on peut donner ou dans une cuillerée de vin ou en forme de bol , auquel on peut associer quelque sirop , comme le sirop d'absynthe ou le sirop de fleurs de pêcher ; en infusion la dose est depuis un gros jusqu'à deux concaffé , on le met infuser dans six onces de vin blanc pendant la nuit ; en poudre & en infusion il est insipide , & n'a rien de désagréable ; on peut s'en servir pour les délicats dans les cas marqués ci-devant.

Pharmacologie Rationnelle.

ELLE nous apprend que le méchoacan contient beaucoup plus de parties gommeuses que de résineuses. M. Bouleduc a retiré de quatre onces de méchoacan , une once de parties gommeuses & demi-gros de parties résineuses seulement : il a observé en même temps que l'extrait de ces quatre onces ne purgeoit presque pas , aussi il conseille de le donner en substance.

La Scammonée , Scammonium , Scamonia vel Scammonæa.

LA Scammonée est un suc concret , gomme-résineux , purgatif , assez violent , on le retire d'une plante appelée *scammonia Syriaca* , ou *convolvulus syriacus* : il y a deux sortes de scammonée , savoir , celle d'Alep & celle de Smyrne ; la scammonée d'Alep est un suc concret , léger , fongueux , friable , lorsqu'on la brise , les morceaux paroissent d'un noir brillant ; lorsqu'on la manie long-temps , elle prend un gris sale , mâchée pendant quelque temps , elle imprime un goût d'amertume ; mêlée avec la salive ou avec quelque liqueur aqueuse , elle lui donne un couleur laiteuse. La scammonée de Smyrne est noire , plus compacte , & plus pesante que celle d'Alep : elle est d'une saveur plus amere que celle d'Alep , elle est brûlante , d'où l'on conclut qu'elle est altérée avec le suc de thitimale ; on choisit pour l'usage la scammonée brillante , légère , facile à rompre qui ne brûle pas fortement la langue , qui étant mêlée avec la salive ou avec quelqu'autre liqueur aqueuse devient blanche & laiteuse : on rejette celle qui est brûlée , noire , pesante & souillée de corps hétérogènes ; on re-

tire le suc de deux façons, 1^o. on découvre la racine de la plante, on y fait une incision, & on y infere une coquille pour recevoir le suc laiteux que l'on fait secher & que l'on garde : on ne nous porte point celle-ci, on la réserve pour les habitans du pays; 2^o. on arrache toute la racine, & après l'avoir coupée par tranches, on exprime le suc que l'on fait secher au soleil, ou à un feu doux, on en fait de petites masses que l'on nous envoie.

Cas.

LA scammonée passe presque chez tous les Médecins pour un purgatif très-violent, mais par les différentes préparations qu'on en fait, on s'en sert dans les hydropisies commençantes dans lesquelles il n'y a point de fièvre, de soif, d'âcreté, & lorsqu'on ne craint point d'échauffer, dans les bouffissures de toute l'habitude du corps, la leucophlegmatie, les fièvres quartes invétérées qui dépendent des fluides épaissis par viscosité. M. *Wedetius* a employé la racine de scammonée avec succès dans les constipations opiniâtres qui sembloient préluder à la passion iliaque; il prétend même s'en être servi avec succès dans le flux de ventre & la passion iliaque : elle convient aussi dans les affections vermineuses, & en général dans tous les cas où le méchoacan convient.

Vertus.

C'EST un purgatif violent que les Anciens regardoient comme un fort cholagogue, dangereux dans les femmes grosses & dans les tempéraments foibles, on peut ranger la scammonée parini les hydragogues : c'est un bon remede tonique, très-propre à donner du ton aux solides, à diviser & atténuer les fluides tenaces, visqueux, à vuidier les eaux; donnée à trop haute dose ou mal-à-propos, elle procure la dysenterie ou le flux de sang.

Maniere de s'en servir, & Doses.

ON la donne rarement telle qu'on nous l'apporte; depuis *Galien* jusqu'à présent on a tâché d'en adoucir l'âcreté par différentes préparations dont nous allons rapporter les principales, après avoir remarqué de quelle façon se font ces préparations; la scammonée ainsi préparée ou adoucie s'appelle diagrede.

LA premiere maniere de corriger la scammonée étoit celle-ci, on

ôtoit la pulpe & les grains du coin , ensuite on en remplissoit la cavité de scammonée réduite en poudre , on le couvroit tout au tour de pâte de farine , & on le faisoit cuire ; cette préparation s'appelle diagrede de coing , *diagredium cydoniatum* , secondement , on la prépare avec le soufre de cette maniere : on étend sur du papier brouillard la scammonée en poudre , on l'expose à la fumée du soufre qu'on jette sur des charbons ardents , on remue continuellement jusqu'à ce que la scammonée blanchisse & paroisse se liquéfier. Plus la scammonée est imbibée de soufre , plus elle est douce dans son action : on appelle cette préparation *diagredium sulphuratum*. On se sert du diagrede de soufre pour la composition d'une poudre fameuse connue sous le nom de *Poudre du Comte de Warvic* , *Poudre Cornachine* , *pulvis de tribus* : on l'appelle poudre du Comte de Warvic du nom de son inventeur , *Poudre Cornachine* , parce que M. *Cornachini* , célèbre Professeur de Médecine , en faisoit grand cas & grand usage ; *pulvis de tribus* , à cause de trois drogues dont elle est composée , savoir , la Scammonée soufrée , l'Antimoine & le Crème de Tartre. M. *Cornachini* composoit cette poudre avec parties égales des trois ingrédients dont nous venons de parler : à présent on la trouve dans les boutiques , composée de parties égales de diagrede , d'Antimoine diaphorétique & de Crème de Tartre , & de cette maniere on en proportionne plus sûrement & plus aisément la dose aux différents âges & aux différents tempéraments , en connoissant combien il y a de scammonée dans chaque dose de la poudre qu'on prescrit ; on l'ordonne depuis douze grains jusqu'à vingt pour les adultes ; 3°. on prépare encore la scammonée avec la réglisse ; on prend , par exemple , huit onces de réglisse sèche , on la fait bouillir dans suffisante quantité d'eau pour s'imprégner du mucilage de réglisse , & ce qui reste pèse trois livres , alors on triture & on mêle dans un mortier quatre onces de scammonée avec cette décoction , après l'avoir tirée au clair jusqu'à ce qu'elle ait pris une couleur laiteuse : on fait ensuite évaporer jusqu'à consistance d'extrait : cette préparation de la scammonée s'appelle diagrede de réglisse , *diagredium clycyrrhisatum* ; la dose en est depuis vingt grains jusqu'à trente ; 4°. M. *Bouleduc* faisoit une autre préparation de la scammonée qui est encore plus douce que les précédentes : il faisoit dissoudre deux onces de sel alkali fixe de Tartre dans suffisante quantité d'eau & y ajoutoit quatre onces de scammonée ; quand la dissolution étoit faite , il faisoit évaporer peu-à-peu & il restoit environ seize onces d'extrait , c'est ce qu'il appelloit diagrede tartarisé , *diagredium tartarifatum*.

M. Bouleduc dit que cet extrait purge assez bien ; on peut l'ordonner depuis vingt-quatre grains jusqu'à quarante-huit sans inconvénient : on se sert aussi de la résine de scammonée , on fait dissoudre quatre onces de scammonée dans suffisante quantité d'esprit de vin , on décante la liqueur , on la verse dans l'eau qui prend une couleur laiteuse , la résine descend au fond du vase ; la dose de cette résine est depuis deux grains jusqu'à six ; elle purge très-lentement & cause de tranchées. On ne se sert gueres des préparations que nous venons de rapporter , on se contente de pulvériser la scammonée , & on la donne ainsi depuis trois grains jusqu'à dix ou douze , selon le nom de diagrede , dans une cuillerée de vin ou dans une demi-cuillerée d'eau de fleurs d'orange : on prescrit aussi la scammonée sous forme d'émulsion purgative , on prend quinze grains de scammonée pulvérisée , demi-once d'amandes douces , on les distribue & on les mêle ensemble , on y verse peu-à-peu douze onces de décoction d'orge , on coule & on y ajoute une once ou une once & demie de sirop violat , on fait prendre cette émulsion en deux verres ; c'est la meilleure façon de prescrire la scammonée dans le cas d'enflure oedémateuse , d'hydropisie , d'anasarque ; quand on ajoute la scammonée aux autres purgatifs , la dose est de sept à huit grains. On ne doit pas donner pour dissolvant de la scammonée les aqueux , parce qu'elle ne contient presque que de la résine. M. Wedetius observe que la Poudre Cornachine préparée avec le diagrede sulfuré , cause de tranchées : voici comment il guérit une Princesse d'une constipation opiniâtre , qui n'avoit pas cédé aux remèdes ordinaires : il ordonna seize grains de scammonée & seize grains de jalap dont il fit faire un sirop de roses pâles solutif pour prévenir la passion iliaque , ce remède lui réussit parfaitement bien.

Pharmacologie rationnelle.

ELLE nous apprend que la vertu de la scammonée réside dans la partie résineuse qui est très-abondante ; de quatre onces de scammonée on retire par le moyen de l'esprit de vin trois onces de résine.

Hermodacte.

L'HERMODACTE est la racine tubéreuse d'un certain colchique oriental qu'on appelle *Colchicum radice siccatâ albâ* : cette racine a à-peu-près la figure d'une chataigne , ou plutôt de la glande prostate de l'hom-

me , aplatie d'un côté , relevée en bosse de l'autre , & se terminant en une espece de pointe mouffe avec un sillon creusé de la pointe à la base sur le dos. On nous l'envoie dépouillée de ses enveloppes ou de ses tuniques : elle est blanche en dedans & en dehors lorsqu'elle est récente : elle est blanche en dedans , & jaunâtre en dehors quand elle est vieille ; étant pilée elle se réduit facilement en une substance farineuse , d'un goût douceâtre & bientôt après un peu âcre : on choisit les hermodaëtes récentes , pesantes , blanches intérieurement & extérieurement , & qui ne soient pas cariées.

Cas.

LES Arabes en ont introduit l'usage en médecine , ils les employoient dans les hydropisies commençantes , dans la leucophlegmatie , dans le rhumatisme froid , dans la goutte qu'on pourroit appeller froide , qui survient à des tempéramments pituiteux , en un mot dans tous les cas où il y avoit relâchement des solides , épaisissement visqueux des fluides , ou bien amas de sérosité , & où le Méchoacan convenoit.

Vertus.

D'OU il suit qu'on a reconnu dans les hermodaëtes une vertu purgative hydragogue , assez marquée , capable de vider les sérosités , atténuante , propre à atténuer la lymphe épaissie , visqueuse , tenace ; on leur reproche d'irriter trop fortement l'estomac & les intestins , de causer des tranchées & des ventosités ; on corrige ce défaut en les associant à quelque stomachique.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON les ordonne rarement seules , on les prescrit en substance , en infusion ; en substance la dose est depuis demi-gros jusqu'à deux , on prend , par exemple , un gros d'hermodaëte réduite en poudre , dix grains d'*Aquila alba* , dix grains de cannelle en poudre qu'on incorpore avec suffisante quantité de quelque sirop approprié pour en faire un bol , comme avec le sirop de fleurs de pêcher pour donner du ton aux fibres de l'estomac ; en infusion depuis deux gros jusqu'à demi-once , on prend trois gros d'hermodaëte pilée , un gros & demi de feuilles de séné , quinze ^{grains} de cannelle qu'on fait infuser dans six onces de vin blanc pendant la nuit , le malade en prendra la colature le matin à jeun ; l'hermodaëte n'est presque plus en usage.

Le Turbith , Turpethum , sive Turbithum.

C'EST la racine d'une plante orientale qu'on appelle *convolvulus indicus*, *alatus maximus*, *foliis ibisco non nihil similibus*, ou *turpethum repens foliis althææ*. On nous apporte cette racine coupée à morceaux oblongs plus ou moins gros, bruns ou gris en dehors, blanchâtres en dedans, marqués intérieurement dans leur longueur d'un fillon où étoit logé un filet ligneux qu'on en a séparé. On y voit quelquefois en dedans & en dehors une gomme résineuse, qui n'est autre chose que le suc laiteux de cette racine desséchée; le goût de cette racine est visqueux, & n'est pas d'abord accompagnée d'une âcreté sensible, mais si on la mâche quelque temps, on sent une légère âcreté ou ardeur dans la bouche: on doit choisir celle qui est récente, un peu résineuse, grise en dehors, blanche en dedans non cariée, & qui n'est pas trop couverte en dehors de gomme & de résine, parce que les Marchands frottent quelquefois à l'extérieur, avec de la gomme ou de la résine les morceaux de cette racine, afin qu'elle paroisse plus gommeuse.

Cas.

ON emploie le Turbith dans les mêmes cas & avec les mêmes précautions que l'hermodaëte; dans les hydropisies commençantes on ne l'emploie guères, si ce n'est dans les tempéraments robustes & pituiteux; on le défend aux enfants, aux femmes enceintes, aux personnes attaquées de la passion hystérique ou hypocondriaque, dans les maladies aiguës où il y a beaucoup d'ardeur, il convient seulement dans les maladies chroniques. M. *Didier*, fameux Praticien de cette ville, s'en servoit dans la dyssenterie à la place de l'ipecacuanha, & il en voyoit de bons effets: on peut s'en servir dans le même cas au défaut de l'ipecacuanha, mais avec beaucoup de circonspection.

Vertus.

C'EST un purgatif plus actif que l'hermodaëte, il agit cependant assez lentement, parce que les résines sont long-temps à se dissoudre dans l'estomac & les intestins; il arrive qu'on le donne souvent le matin, & qu'on n'en voit l'effet que le soir: on lui reproche d'exciter beaucoup de flatuosités & de tranchées.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON l'ordonne rarement seul , on l'associe ordinairement aux stomachiques chauds , on le donne en substance ou en infusion ; en substance , la dose est depuis quinze grains jusqu'à demi-gros ou un gros tout au plus : on prend quinze grains de turbith pulvérisé , dix grains de mercure doux qu'on incorpore avec le syrop de fleurs de pêcher , ou avec quelqu'autre syrop approprié pour en faire un bol. En infusion , on le donne depuis un gros jusqu'à trois ; on fait infuser dans six onces de vin blanc un gros de turbith avec un gros & demi de séné , on peut l'aromatiser avec l'eau de cannelle , de cette façon il ne produit pas tant de flatuosités & de coliques ; le turbith entre avec l'hermodacte dans la composition de l'électuaire purgatif , nommé *diarchatame* ; par le moyen de l'eau on retire beaucoup d'extrait gommeux , & par l'esprit de vin , une certaine portion d'extrait résineux.

Les Semences de Carthame.

LE Carthame ou Safran bâtard , *Carthamus officinarum flore croceo* ; a de semences petites , d'une figure pyramidale , plus pointues à l'extrémité inférieure , marquées de quatre angles ou de quatre côtes , blanches , luisantes & fort lisses ; elles contiennent sous une écorce un peu dure , une pulpe ou une espece d'amande blanchâtre , d'une saveur d'abord douceâtre , ensuite âcre. On cultive cette plante en France , en Italie , en Espagne ; en médecine on se sert de l'amande , des graines dépouillées de l'écorce. On doit choisir ces graines récentes , luisantes , blanches , dont la moëlle est blanche , grasse , qui ne soient ni cariées ni moïsies.

Cas.

ON s'en sert dans la leucophlegmatie , l'hydropisie commençante , le rhumatisme froid , & autres cas où nous avons vu que l'hermodacte convenoit. Plusieurs grands Médecins les regardoient comme un remède spécifique dans les maladies de la poitrine , comme les toux invétérées , l'asthme humide qui dépend d'une lymphe tenace , épaissie dans les glandes bronchiques , dans les affections chroniques des poumons qui dépendent du relâchement des fibres des poumons , lorsqu'il n'y a pas à craindre d'irriter , d'échauffer. *M. Fernel* dit qu'elles sont propres à

éclaircir la voix , sans doute en incisant , en atténuant la lymphe tenace & épaissie qui peut recouvrir les cordes vocales.

Vertus.

ELLES ont une vertu purgative , hydragogue ; elles purgent lentement , on leur reproche d'être nuisibles à l'estomac , aux intestins , de causer de flatuosités & des coliques.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON les donne en substance , mais rarement en infusion & en décoction ; en substance on les donne depuis demi-gros jusqu'à un , & alors on les associe souvent avec le mercure doux , on les incorpore avec quelque sirop approprié , on en fait un bol ; en infusion la dose est de deux jusqu'à quatre gros ou six au plus , on les donne alors sous forme d'émulsion qu'on prépare de cette façon ; on prend quatre gros de semences de Carthame qu'on triture dans un mortier en y versant peu-à-peu six ou sept onces d'eau commune , on coule , & dans la colature on mêle une once de sirop de fleurs de pêcher , & on aromatise avec de l'eau de cannelle , ou bien on fait infuser simplement les semences écrasées avec le séné & la poudre de cannelle dans le vin blanc. M. Ray ordonnoit les semences de Carthame bouillies , & il remarquoit qu'elles produisoient de grandes évacuations sans tranchées : il faisoit une décoction de pois-chiches , jettoit dans cette décoction demi-once de graines de Carthame , & faisoit un bouillon de mouton ou de viande.

Iris.

ON connoît deux plantes sous le nom d'Iris , savoir , l'Iris de Florence , *Iris Florentina flore albo* , & l'Iris de notre pays , *Iris nostras* , *iris vulgaris Germanica seu sylvestris* , qu'on appelle en françois flambe ou glaïeul : il n'y a gueres que les racines de ces plantes qui soient en usage en médecine : on en prescrit la poudre ou le suc , cela doit s'entendre de celle qu'on tire de notre pays ou de l'iris ordinaire ; mais si on fait attention à la poudre d'iris , il faut entendre cela de la racine de l'iris de Florence.

Nous ne décrivons ici que la racine de cette dernière iris ; on nous l'apporte en morceaux oblongs , tortueux , un peu applatis , de l'épaisseur d'un ou deux pouces , blanche , dépouillée de son écorce extérieure & de ses fibres , ayant une odeur de violette pénétrante , d'un goût amer

& âcre : on doit choisir celle qui est bien conservée , blanche , très-odorante , & rejeter celle qui est ridée & cariée.

Vertus.

D'où il suit que cette racine a une vertu purgative , hydragogue , surtout le suc , incisive , atténuante , béchique , tonique , on peut dire aussi qu'elle est vermifuge.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON donne le suc ou la poudre de cette racine comme nous avons dit ; la dose de la poudre en substance est depuis un scrupule jusqu'à un gros ; en infusion ou en décoction depuis deux gros jusqu'à trois , mais sous ces deux formes elle ne purge guere , & n'est presque point en usage. La poudre en substance s'associe avec d'autres médicaments appropriés suivant les différentes indications qu'on a à remplir , par exemple , dans l'asthme , quand il faut faciliter les crachats , atténuer les humeurs visqueuses , tenaces , on l'associe aux autres béchiques , on en forme la poudre de *Diaireos* qui est composée de parties égales de poudre d'*Iris* , de poudre *Diatraga anti-frigidi* & de sucre candi ; la dose de la poudre diaireos est depuis un scrupule jusqu'à deux ; dans les affections vermineuses , on l'associe avec quelques plantes antispasmodiques , comme avec la pivoine , le fenouil , & on y ajoute alors le sirop de fleurs de pêcher. Lorsqu'on veut donner l'iris comme purgatif hydragogue dans les hydropisies , on exprime le suc de la racine , on le laisse dépurer par résidence , & on le donne à la dose d'une once jusqu'à trois ou quatre. On réitere plusieurs fois ce remède en mettant un jour d'intervalle , on y ajoute ordinairement demi-gros de crème de Tartre , & on a vu de très-bons effets. M. Ray dit cependant avoir guéri plusieurs hydropisies par le seul suc d'iris de Florence ; on accuse le suc de notre iris d'irriter beaucoup , de causer des tranchées , des coliques ; cependant ceux qui s'en sont servis ne lui ont pas fait ce reproche : d'ailleurs on ne doit pas toujours conclure de l'effet d'un Médicament , par ce qu'il a fait dans quelques sujets , il faut avoir égard aux circonstances ; lorsque les solides sont entièrement relâchés , le suc d'iris irrite à la vérité , mais il ne cause alors que les irritations requises pour vider les eaux épanchées & pour soulager le malade : si au contraire on donnoit le même suc dans les mêmes cas où il n'y a pas un relâchement bien marqué & où les solides sont susceptibles d'une assez grande irrita-

tion , comme on le remarque vers la fin des hydropisies , il faut convenir qu'alors les irritations produites par le suc d'iris , seroient trop fortes , aussi dans ce cas-là on doit s'en abstenir.

Agaric, fungus laricis.

C'EST une substance fongueuse , blanche en dedans & en dehors , qui se réduit aisément en poudre , entrecoupée de quelques fibres , d'un goût assez amer. L'agaric croît sur le mélèze , d'où lui est venu le nom de *fungus laricis* ; on le trouve dans le Dauphiné , sur les Alpes & autres montagnes : il est recouvert d'une écorce dure & calleuse qu'on rejette ; on le voit en boutique dépouillé de cette écorce , en morceaux , tantôt plus grands , tantôt plus petits , de la grosseur du poing , quelquefois de la tête d'un homme : on choisit l'agaric qui est blanc , léger , friable , on rejette celui qui est pesant , noirâtre , moins friable. Les anciens reconnoissoient deux sortes d'agaric , le mâle & la femelle ; le mâle croît sur les troncs pourris des chênes , des noyers & autres arbres ; il est d'une substance ligneuse , d'une couleur grise en dehors , obscure en dedans , tirant sur le brun ; celui-ci n'est pas d'usage en médecine , il sert à faire l'amadou , d'où vient qu'on l'appelle *fungus igniarius* : on l'appelle aussi *agaricus pedis equini facie* : on ne trouve à présent que la femelle.

Cas.

LES anciens & parmi eux *Galien* , s'en servoient dans bien des cas , dans la vue d'ouvrir les vaisseaux obstrués , d'atténuer , de diviser les humeurs épaissies , dans la jaunisse produite par l'obstruction du foie , dans l'asthme humide , dans l'épilepsie qui dépend des matieres visqueuses , tenaces ; dans les douleurs froides qui se trouvent dans les tempéraments froids , comme dans le rhumatisme froid , dans la goutte qui se trouve dans les mêmes tempéraments , dans les obstructions tant du foie que de la rate.

Vertus.

D'OU il suit que les anciens ne regardoient l'agaric que comme un remède altérant , qui avoit une vertu atténuante , incisive , apéritive. Les modernes qui reconnoissent toutes ces vertus dans l'agaric y découvrent une autre vertu inconnue des anciens , & d'après l'expérience , ils regardent l'agaric comme un remède évacuant qui a une vertu purgative bien mar-

marquée, hydragogue ; ils s'en servent dans les hydropisies, les enflures, les fievres intermittentes, lorsque les tempéraments sont pituiteux. *M. Fernel* prétend qu'on peut le donner, non-seulement à ceux qui sont robustes, mais encore à ceux qui sont foibles, aux jeunes gens, aux femmes enceintes, sans aucun danger, pourvu que la nature de la maladie le demande.

Maniere de s'en servir, & ses Doses.

ON ordonne l'Agaric ordinairement en substance, quelquefois en infusion, on ne le donne gueres en décoction ; en substance on le donne depuis demi-gros jusqu'à un gros ou un gros & demi, en infusion depuis un gros jusqu'à deux & demi ; on emploie rarement l'Agaric seul, on l'associe ordinairement avec quelque sirop ou avec quelqu'autre médicament ; on en fait des trochisques avec le gingembre & le vin blanc : on l'associe avec quelques syrops, par exemple, on prend demi-gros d'Agaric pulvérisé, on lui donne une consistance un peu liée avec le syrop de capillaire ou de fleurs de pêcher, on en fait un bol, on l'associe aussi à d'autres médicaments ; sous l'administration de *M. Serane* à l'hôpital de cette ville, on donnoit demi-gros de Kina & un gros d'Agaric pulvérisé, qu'on incorporoit avec le sirop d'absinthe dans les fievres intermittentes, & on en voyoit de bons effets, les accès cédoient quelquefois plutôt, quelquefois plus tard, quelquefois à la premiere dose ; mais il faut observer de ne pas employer ce remede indifféremment dans toute sorte de fievres intermittentes : il seroit dangereux dans les fievres entretenues par des matieres âcres, dans les tempéraments bilieux où il y a beaucoup d'ardeur & de soif, comme dans les fievres tierces bilieuses ; on peut s'en servir dans les fievres quartes invétérées, dans les fievres quotidiennes pituiteuses & autres semblables. On se sert plus ordinairement de l'Agaric en trochisques qu'on fait de cette maniere ; on prend deux gros de gingembre blanc pilé qu'on fait macérer à froid pendant vingt-quatre heures dans quatre onces de vin blanc : on passe & avec le vin on humecte demi-livre d'Agaric pulvérisé dont on fait une masse solide qu'on coupe ensuite en petits morceaux sous forme de trochisques, & que l'on fait secher à l'ombre, ce sont les trochisques d'Agaric : on peut prescrire ces trochisques dans les fievres intermittentes, on les fait entrer dans les potions purgatives dans le cas d'hydropisie ; par exemple, on prend du séné mondé, du trochisque d'Agaric & de Turbith gommeux de chacun un gros, de poudre de cannelle douze grains, de poudre de Tarte quinze grains qu'on

qu'on fait infuser pendant la nuit dans six onces d'eau commune , le matin on coule , & dans la colature on dissout une once de sirop de nerprun.

Pharmacologie rationnelle.

ELLE nous apprend que la vertu purgative de l'Agaric réside dans sa partie résineuse ; M. *Bouleduc* a retiré de deux onces d'Agaric par le moyen de l'esprit de vin , six gros d'un extrait résineux d'un goût extrêmement désagréable , & qui caufoit de nausées pendant tout un jour : cet extrait mêlé avec l'eau aiguillée du sel alkali fixe de Tartre , purgeoit sans causer de tranchées : on peut donner cet extrait depuis demi-gros jusqu'à un ou un & demi. M. *Bouleduc* a essayé de dissoudre l'Agaric dans l'eau , mais il en a retiré peu de chose , l'eau est devenue mucilagineuse , d'où il suit que la macération ou la décoction de l'Agaric dans l'eau est peu utile. M. *Bouleduc* remarque que la vertu de l'Agaric réside dans la surface extérieure , parce qu'ayant séparé la partie fibreuse , il n'a retiré qu'une substance laiteuse , boueuse.

Sureau , Sambucus , sive Sambucus fructu in umbellâ nigro.

C'EST une plante qui est quelquefois arbrisseau , quelquefois arbre , d'une grandeur moyenne , & croît dans les forêts , dans les vallées , dans les endroits ombrageux & humides. Nous ne nous arrêterons pas à en faire la description , cela appartient à la Botanique , nous nous contenterons de remarquer que les feuilles sont attachées cinq ou six le long d'une côte , qu'elles sont dentelées en leurs bords , & que chaque côté est terminé par une seule feuille plus large que les autres. Sa racine , sa tige , ses feuilles , ses fleurs , ses bayes , en un mot , toutes ses parties sont d'usage en médecine : on peut s'en servir extérieurement & intérieurement ; nous ne le considérons ici que sous le second point de vue , nous réservant de parler ailleurs de son usage extérieur.

Cas.

ON emploie le sureau dans l'hydropisie , dans les bouffissures , les enflures , tant générales que particulières , dans la chlorose , c'est-à-dire , dans les pâles couleurs des filles.

Vertus.

LE fureau a une vertu purgative bien marquée & assez prompte : c'est un hydragogue , il est en même temps tonique , diurétique.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

LA racine & la tige fournissent une écorce verte qui est recouverte d'une écorce extérieure de couleur cendrée : on rejette l'extérieure & on se sert de l'écorce moyenne qu'on donne en infusion depuis demi-once jusqu'à une ou une & demie ; par exemple , on prend une once d'écorce de fureau , on la fait infuser pendant la nuit sur les cendres chaudes dans six onces d'eau bouillante avec quinze grains de sel d'absynthe & un scrupule de cannelle ; le lendemain on passe la liqueur par un linge avec une forte expression , & on donne cette dose le matin à jeun. M. Chomel prétend que ce remède est très-bon pour évacuer les sérosités , quelquefois on exprime le suc de cette même écorce , & après l'avoir laissée dépurée par résidence , on le fait boire au malade à la dose de demi-once ou d'une once : on donne ce suc seul ou avec une décoction de pariétaire ou d'orge. On peut aussi piler l'écorce moyenne & la faire infuser dans du lait , de l'eau ou du vin pour évacuer les sérosités. M. Geoffroi assure que c'est un fort bon remède qui purge par haut & par bas sans aucune mauvaise suite , & qu'il l'a souvent éprouvé avec succès sur des gens bouffis & menacés d'hydropisie : on donne ce remède le matin à jeun , on le répète plusieurs fois , mettant un jour d'intervalle. Les feuilles de fureau s'ordonnent depuis demi-once jusqu'à une once & demie en infusion ; les fleurs de fureau sont diurétiques & quelquefois même sudorifiques , mais elles purgent moins que les autres parties du fureau : on peut les donner en infusion , ou légèrement broyées dans le petit lait de cette manière : on fait le petit lait avec la pressure ordinaire , on le clarifie avec un blanc d'œuf , & pendant la clarification , on y jette deux pincées de fleurs de fureau , y ajoutant le suc du cerfeuil. On fait prendre ce remède pendant quinze jours dans l'hydropisie de poitrine commençante. M. de la Mure s'en est servi avec succès dans pareil cas. On se sert enfin des bayes & sur-tout des semences qu'elles contiennent : on les donne en substance ou en infusion ; en substance , la dose est depuis demi-gros jusqu'à un gros ; on prend un gros de semence de fureau , un scrupule de sel de tartre , quinze grains

de mercure doux , on fait du tout un bol avec le syrop de chicorée ou quelqu'autre syrop approprié. M. *Chomel* dit que ce remède évacue très-bien les sérosités. On peut aussi donner les semences de fureau en infusion ; par exemple , on prend deux gros de semence de fureau légèrement concassée , deux gros de semence de fenouil qu'on fait infuser dans six onces de vin blanc , on donne cette infusion le matin à jeun ; la dose ordinaire des semences en infusion est depuis un gros jusqu'à deux. Toutes les parties de fureau , excepté les fleurs , purgent violemment ; c'est pourquoi on ne doit les employer qu'avec beaucoup de circonspection ; il faut s'en abstenir dans les hydropisies , lorsqu'il y a beaucoup de chaleur & de soif , que les humeurs épanchées tournent vers l'âcreté ou la putridité alkaline. On doit aussi s'en abstenir dans les femmes enceintes , & ne les donner qu'avec beaucoup de précaution aux personnes délicates. Les semences de fureau rougissent le papier bleu ; par l'analyse chymique , les feuilles donnent des liqueurs acides & alkales , du sel volatil & beaucoup d'huile , mais cela ne nous donne aucune lumière sur les principes dans lesquels réside la vertu purgative de cette plante.

Hieble , sambucus humilis , seu Ebulus.

CETTE plante ressemble au fureau , on la distingue parce que sa racine n'est pas ligneuse comme celle du fureau , mais charnue ; ses tiges comme celles du fureau sont cannelées , ses feuilles sont placées avec symétrie & composées de quatre paires de petites feuilles plus aiguës & plus dentelées que celles du fureau. On se sert des mêmes parties dans les mêmes cas , de la même manière & à la même dose que nous avons vu en parlant du fureau.

Il faut cependant remarquer que l'hieble possède la vertu purgative dans un degré plus éminent que le fureau ; ainsi on pourroit s'en servir dans les cas où on a besoin d'un purgatif plus violent que le fureau. M. *Chomel* observe que deux gros de semence d'hieble infusés dans six onces de vin blanc produisent une plus grande évacuation par les selles.

Nerprun ou Bourg-Epine , Rhamnus catharticus , Rhamnus solutivus off. spina cervina.

C'EST un arbrisseau qui croît quelquefois à la hauteur d'un arbre : ses branches sont garnies de petites épines , ses feuilles sont assez larges , un

peu rondes , finement dentelées à leur bord ; les bayes en mûrissant deviennent noires & luisantes , & sont remplies d'un suc noir tirant sur le verd , un peu amer. On ne se sert en médecine que des bayes ; il faut les choisir grosses , bien nourries , noires , luisantes , glutineuses , récentes.

Cas.

LES bayes de même que le fyrop qu'on en fait & dont nous parlerons plus bas , conviennent dans l'hydropisie , la leucophlegmatie , & autres cas que nous avons déjà détaillés en parlant des autres hydragogues.

Vertus.

POUR ce qui regarde sa vertu , elle est assez purgative , assez forte ; hydragogue , comme nous l'avons déjà dit.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON se sert des bayes en décoction , ou du fyrop de ces bayes ; les bayes peuvent se donner de cette maniere : on prend vingt bayes de nerprun , autant de pruneaux bien choisis , on les fait bouillir dans huit onces , moitié vin blanc , moitié eau , jusqu'à réduction de la moitié à un feu modéré ; sur la fin de la décoction , on y ajoute douze grains de cannelle ou douze grains de gingembre & deux gros de sucre fin ; on passe le tout par un linge avec expression , & on fait prendre la colature au malade le matin à jeun , & demi-heure après un potage ; on répète le remede deux ou trois fois la semaine dans l'hydropisie.

Sirop de Nerprun.

LE sirop de Nerprun se fait fort simplement ; on prend , par exemple , trois livres de suc exprimé des bayes de Nerprun , qu'on laisse dépurer par résidence , on y ajoute trois livres de sucre blanc , & on fait cuire le tout en consistance de sirop ; la dose de ce sirop est depuis demi-once jusqu'à une ou une & demie. M. *Sidenham* raconte que dans les premières années de sa pratique , ayant été appelé pour une Dame attaquée d'une hydropisie considérable , il lui fit prendre une once de ce sirop qui procura une grande évacuation des eaux sans affoiblir la malade ; ce qui l'engagea à répéter le même remede , en mettant un ou deux jours d'inter-

valle , fuivant qu'il voyoit que la malade étoit affoiblie , par cette méthode il guérit parfaitement cette dame : il avoue en même temps avec fa candeur ordinaire , qu'encouragé par cet heureux succès , il voulut employer le même remede pour une autre femme attaquée d'un hydropisie qui étoit furvenue à la fin d'une fièvre quarte , mais qu'au lieu de diminuer le mal , il ne fit que l'augmenter & fut congédié , & qu'un autre Médecin guérit cette maladie par des remedes fans doute plus efficaces. Dans la fuite M. Sydenham ne donnoit le sirop de nerprun seul qu'aux personnes faciles à purger , & il l'associoit avec d'autres cathartiques pour les personnes qui étoient purgées plus difficilement ; dans ce cas - là il prenoit quatre gros de tamarin & deux gros de feuilles de séné dont il faisoit une décoction dans suffisante quantité d'eau ; dans la colature il faisoit dissoudre une once de manne & demi-once de sirop de nerprun avec deux gros d'électuaire du suc de raves ; ainsi il ne faut employer le sirop de nerprun seul que dans le cas où les personnes sont purgées facilement , autrement il faut l'associer à quelqu'autre cathartique. M. Chomel faisoit une infusion ou une décoction de six ou sept onces de pariétaire ; & dans la colature il dissolvoit une once de manne & une once de sirop de nerprun : il faisoit prendre ce remede plusieurs jours de suite ; il assure avoir guéri , par ce moyen , quantité de malades enflés considérablement , deux desquels avoient des eaux épanchées dans la cavité du bas-ventre ; ils prirent quatre fois ce remede de deux jours l'un. M. Sydenham remarque que le sirop de nerprun cause une soif considérable au malade , sur-tout quand on le donne seul , & que pour éviter cet inconvénient , on donne un potage léger demi-heure après.

Cathartiques forts ou Draстiques.

DANS l'exposition que nous venons de faire des cathartiques moyens ; nous avons observé qu'on ne devoit les employer que dans le cas où les solides étoient relâchés , & qu'on devoit s'en abstenir toutes les fois qu'ils étoient susceptibles d'une trop grande irritabilité. Cette précaution doit avoir lieu à plus forte raison lorsqu'il est question des cathartiques draстiques , ils sont fort peu d'usage ; nous n'expliquerons que les plus utiles ; on range ordinairement dans cette classe l'aloës , mais comme on ne l'emploie gueres simplement comme purgatif , nous nous réservons d'en parler dans la classe des stomachiques chauds.

Bryone ou Couleuvrée , Bryonia alba , sive baccis rubris.

LA Racine est grosse comme la cuisse , quand elle est vieille , desséchée , elle est blanche , fongueuse , on y voit intérieurement de cercles concentriques & des rayons qui vont de la circonférence vers le centre : elle a une saveur amère , il ne faut pas même la mâcher longtemps pour sentir cette amertume : on se sert principalement de la racine , soit fraîche , soit sèche , tant intérieurement qu'extérieurement ; nous ne parlerons ici que de l'usage qu'on en fait intérieurement , nous parlerons ailleurs de son usage extérieur.

Cas.

LES Anciens l'employoient , & on peut l'employer encore aujourd'hui avec succès ; la racine de Bryone dans les maladies chroniques où il y a épaisissement des fluides , où les solides sont relâchés & ne sont pas susceptibles d'irritabilité , & où il y a abondance de sérosité , dans les hydropities , les enflures , les bouffissures , la leucophlegmatie , l'anasarque , dans l'asthme humide ou humoral , c'est-à-dire , qui dépend du relâchement des fibres du poulmon & de l'épaississement des humeurs dans les tuyaux bronchiques ou de l'abondance de sérosité. *Arnaud de Villeneuve* , célèbre Professeur de cette Université , rapporte qu'un épileptique a été guéri dans l'espace de trois semaines , en se purgeant avec le suc de bryone dépuré auquel il ajoutoit une peu de sucre. *M. Sydenham* assure que la curation de la manie se fait par ce remède , si après avoir saigné , comme il convient , du bras & de la jugulaire , le malade prend un gros de cette racine en poudre dans du lait ou demi-once infusée dans du vin une fois la semaine , jusqu'à ce qu'il soit entièrement guéri. *M. Matthioli* , fameux Botaniste , estime le suc de cette plante ou la décoction dans le vin , deux ou trois fois par semaine pour guérir la passion hystérique. Ces trois derniers cas demandent quelqu'explication , parce qu'il est certain qu'on ne sauroit donner la bryone dans tous les cas d'épilepsie , de manie & de passion hystérique sans exposer les malades aux plus grands dangers. Pour ce qui regarde l'épilepsie , il faut en distinguer plusieurs especes , l'épilepsie essentielle héréditaire , l'épilepsie symptotatique qui dépend de quelqu'ulcère , ou de quelqu'autre vice des différentes parties du corps ; l'épilepsie puérile qui survient quelquefois aux enfants dans les affections vermineuses ; dans ces deux dernières especes d'épilepsie , la bryone ne convient

point , mais seulement dans la premiere , dans laquelle le sang est visqueux , épais , & où l'irritabilité des nerfs est moindre : il faut cependant remarquer que si l'épilepsie héréditaire étoit entretenue par un vice local , par exemple , par des exostoses dans l'intérieur du crâne & par des distentions anevrismatiques ou variqueuses , la bryone ne pourroit la guérir parfaitement , mais elle pourroit rendre les attaques moins fortes & moins fréquentes , en divisant & atténuant le sang. La manie qui est un délire universel sans fièvre , est aussi de plusieurs especes ; il y en a qui surviennent après des maladies longues , après des fièvres quartes , il y en a qui se trouvent dans les sujets foibles où les solides sont relâchés & les sérosités abondantes ; il y en a avec fureur & témérité , qui arrivent quelquefois après la phrénésie , & se trouvent dans de jeunes gens robustes , sanguins , pléthoriques , dans lesquels le sang est épais , visqueux , & le genre nerveux difficile à irriter , ce qui se prouve parce qu'ils supportent la glace en hiver sans en sentir l'impression ; il faut faire attention au degré d'irritabilité des solides & à l'épaississement des fluides , & n'employer la bryone que lorsque les solides sont épaissis , ainsi la bryone ne convient point dans les deux premieres especes de manie , elle causeroit de trop grandes irritations. M. Sydenham a observé qu'un lavement avec le lait & le suc de cette racine avoit causé des redoublements à un maniaque presque guéri , c'est dans le dernier cas seulement qu'il prescrit la bryone ; il la faisoit prendre une fois la semaine , mettant l'intervalle d'une ou de deux semaines , lorsque le malade avoit été purgé dix ou douze fois. Enfin la passion hystérique se trouve chez les femmes ordinairement , dans lesquelles les fluides sont épaissis par défaut de *serum* , & les solides sont trop susceptibles d'irritabilité. Quelquefois au contraire cette maladie attaque des femmes d'un tempérament pituiteux , dans lesquelles les solides sont relâchés , la sérosité surabonde , dans le cas d'obstructions ou de suppression de regles. Dans le dernier cas , la bryone convient ; elle seroit nuisible dans le premier dans lequel les évacuants & les saignées nuisent extrêmement ; en un mot la racine de bryone est contre-indiquée en général dans tous les cas où le genre nerveux est fort susceptible d'irritabilité , & dans ceux où il y a beaucoup de chaleur , d'ardeur , de fièvre & de soif.

Vertus.

DE tout ce qui vient d'être dit , il suit que la bryone est un purgatif hydragogue , très-actif , qu'on ne doit employer qu'avec beaucoup de circonspection , apéritif , tonique , diurétique.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON peut s'en servir extérieurement ou intérieurement , extérieurement on s'en sert comme bon résolutif anodin , nous en parlerons ailleurs ; nous nous contenterons de dire ici que cette racine fraîche , pilée & appliquée seule ou avec la bouse de vache sur la région des reins , excite les urines & soulage les enflés , les bouffis. Intérieurement on peut se servir du suc de la racine dépurée , de la racine fraîche , ou de la racine sèche ; le suc exprimé de la racine & dépuré par résidence , s'ordonne depuis deux gros jusqu'à demi-once ou une once ; la racine fraîche s'ordonne en infusion dans quatre onces de vin blanc depuis deux gros jusqu'à demi-once , on peut ajouter une once de sirop de Nerprun , & c'est un purgatif hydragogue , ou une once de sirop violat. Dans le cas de manie la racine sèche & en poudre s'ordonne depuis un scrupule jusqu'à un gros. M. Sydenham substituoit quelquefois la racine sèche à la fraîche , la faisoit infuser & la délayoit dans le lait de vache qu'il faisoit prendre aux maniaques , &c.

Pharmacologie rationnelle.

ELLE nous apprend que cette racine ne contient point de parties résineuses ; sa vertu purgative réside dans des parties salines , gommeuses , en quoi cette racine diffère de la plupart des autres cathartiques , dont la vertu purgative réside dans les parties résineuses : c'est un purgatif violent , on le corrige par la crème de tartre , par les sels fixes : il vaut mieux s'en servir en poudre ; si on veut s'en servir en infusion , il est plus à propos de la faire infuser dans le vin blanc que dans toute autre liqueur. M. Bouleduc observe que si on veut s'en servir seulement pour évacuer les eaux , on doit préférer l'extrait de la manière suivante.

Extrait de Bryone.

ON fait bouillir la racine fraîche , coupée par morceaux dans du vin jusqu'à la diminution de la moitié , on exprime la décoction & on fait épaisir la colature jusqu'à consistance d'extrait , on le donne depuis demi-gros jusqu'à un gros.

Elaterium, Concombre sauvage, Cucumis sylvestris, Cucumis asinium.

C'EST la plante qui fournit le médicament qu'on connoît sous le nom d'*Elaterium* qui n'est autre chose que le suc de cette plante, & principalement du fruit épaissi, noirâtre & d'un goût piquant. On distinguoit autrefois deux sortes d'*elaterium*, le verd & le blanc; l'*elaterium* verd se préparoit en exprimant le suc des fruits un peu avant leur maturité. L'*elaterium* blanc se préparoit sans expression, & seulement en coupant le fruit mûr par morceaux & laissant écouler d'elle-même la liqueur blanche & sereuse : on peut préparer l'*elaterium* en exprimant le suc des feuilles de concombre sauvage, mais celui-ci est moins fort que celui qu'on fait avec le suc des fruits. M. Bouleduc prépare encore un autre *elaterium* avec la racine, en la faisant bouillir & évaporer en consistance d'extrait; enfin il y en a qui se servent des fruits desséchés & pulvérisés comme d'un hydragogue, mais cette façon d'employer les fruits n'est guere usitée, comme on le fait, en aucun pays, quoique M. Bouleduc ait remarqué que c'étoit un bon purgatif. Les anciens donnoient le nom d'*elaterium* en général aux Médicaments les plus violents, & en particulier au suc épaissi du concombre sauvage, parce que c'est un des plus puissants purgatifs qu'ils emploient dans les cas suivans.

Cas.

CE remede qui étoit connu d'*Hippocrate*, étoit fort usité parmi les anciens Médecins, ils l'employoient dans les obstructions du foie, de la rate, dans l'asthme humide, dans la leucophlegmatie ou l'anasarque, dans l'hydropisie ascite; aujourd'hui on ne s'en sert que dans les deux derniers cas, c'est-à-dire, dans la leucophlegmatie & l'ascite, & cela même rarement; les uns croient qu'on ne doit l'employer que dans l'anasarque & lorsque les eaux ne sont pas encore ramassées dans la cavité du bas-ventre; les autres prétendent au contraire, que c'est un remede spécifique dans le cas d'épanchement d'eau dans la cavité du bas-ventre; on peut s'en servir dans l'un & dans l'autre cas, mais avec beaucoup de circonspection, faisant attention que les forces du malade se soutiennent assez, qu'elles ne soient pas trop abattues, qu'il n'y ait point de fièvre. Il y en a même qui veulent qu'il y ait une grande quantité d'eau ramassée dans la cavité du bas-ventre, condition que nous avons vu ci-devant que M. Sydenham

exigeoit pour l'adminiftration du vin émétique dans le cas d'hydropifie ; enfin les meilleurs Praticiens confeillent aux jeunes Médecins de s'abftenir de l'*Elaterium* , & veulent qu'on n'ait recours à ce remede qu'après qu'on a eu recours inutilement aux autres purgatifs moins violents , prétendant que ce n'eft que par une longue pratique qu'on peut difcerner les cas où on peut l'employer utilement. Il y a de grands Praticiens qui affurent avoir employé avec beaucoup de fuccès l'*elaterium* à la dose ordinaire que nous marquerons ci-après dans le cas des eaux ~~pituiteuses~~ *épanchées*

Vertus.

C'EST un purgatif hydragogue des plus violents.

Maniere de s'en servir , Doses.

LES anciens donnoient l'*Elaterium* depuis dix jusqu'à trente grains , fur quoi il faut remarquer pour justifier qu'ils étoient plus timides qu'on ne l'est à présent , pour purger ou pour se déterminer à purger , mais lorsqu'ils y étoient déterminés ils purgeoient violemment ; ils employoient même des purgatifs extrêmement violents au défaut des purgatifs plus doux qu'ils ne connoissoient pas , & qui ont été découverts depuis par les Arabes , aujourd'hui on ne passe pas cinq ou six grains , cette dose même paroît un trop forte. M. Sydenham assure que deux grains purgent assez fortement ; ainsi il convient de commencer par demi-grain & augmenter *gradatim* jusqu'à deux ou trois , tâtonnant pour ainsi dire les forces du malade pour ne pas causer des superpurgations , ou même des flux de ventre dyssenteriques , comme cela arrive quelquefois après l'adminiftration de l'*elaterium*. On associe ordinairement l'*elaterium* à d'autres remedes purgatifs , comme aux pulpes de casse & de tamarin. M. Sydenham l'ajoutoit aussi aux pilules qu'on appelle pilules de duobus , à cause des deux puissants remedes qui entrent dans leur composition , savoir , les trochisques d'albandal & de scammonée pulvérisée , & il incorporoit le tout avec le sirop de nerprun : la dose de ces pilules est depuis dix jusqu'à vingt grains , à quoi on ajoute deux grains d'*elaterium* avec suffisante quantité de sirop de nerprun. Un grand Médecin Italien donnoit la racine de concombre sauvage macérée dans du vin , aux hydropiques qui ne pouvoient prendre l'*elaterium* ; la dose de cette racine en poudre est depuis quinze grains jusqu'à demi-gros : il prenoit , par exemple , demi-gros de racine de concombre sauvage séchée & pulvérisée , la faisoit macérer

pendant trois jours dans une livre de bon vin d'Espagne, & faisoit boire le vin avec la poudre pendant trois jours de suite le matin à jeun, ensuite il recommençoit : il assure avoir guéri plusieurs hydropiques par ces remèdes ; mais il faut remarquer que si l'hydropisie dépend des obstructions des viscères du bas-ventre, il est rare qu'on puisse la guérir par les seuls purgatifs hydragogues.

Pharmacologie rationnelle.

ELLE ne nous donne pas beaucoup de lumières ; M. Bouleduc remarque que l'*Elaterium* contient peu de parties résineuses & beaucoup de parties gommeuses, chargées de parties salines piquantes, extrêmement âcres, d'où vient qu'il occasionne quelquefois la dysenterie.

Coloquinte.

C'EST le fruit d'une plante qu'on appelle *Colochyntis fructu rotundo minor* : les Arabes l'appelloient *handal*, d'où est venu le nom de trochisques d'alhandal qu'on fait avec la pulpe de ce fruit dont nous parlerons ci-après : ce fruit est sphérique, de la grosseur d'un coing ou d'une orange ; c'est une espèce de courge recouverte d'une écorce verdâtre d'abord, & jaunâtre ou citrine lorsqu'elle est mûre ; sous cette écorce est renfermée une pulpe qui étant desséchée est fongueuse, blanchâtre, composée de petites membranes ou lames divisées en trois parties, dont chacune contient deux loges, dans lesquelles se trouvent de graines, on nous l'apporte dépouillée de son écorce. Cette pulpe est trop amère, âcre ; on jette les graines ou semences, cependant elles ont une vertu purgative, quoique moins amère que la pulpe : on ne se sert que de la pulpe qu'on doit choisir blanche, sèche, spongieuse, légère & fort amère.

Cas.

LA Coloquinte est un des plus violents remèdes qu'on puisse donner ; administrée sans préparation, elle cause des coliques affreuses & des superpurgations. Ces mauvais effets peuvent venir également de la façon dont on la donne & de ce que l'on ne s'en sert pas à propos. Les anciens l'employoient avec succès dans les maladies invétérées dépendantes des obstructions des viscères ; dans l'épilepsie, dans l'hydropisie & les autres maladies soporeuses, dans la manie, dans la paralysie, soit hémiplegie, soit paraplegie, dans la lèpre, la gale invétérée, dans l'anasarque,

l'hydropisie , dans l'asthme humide , lorsqu'il étoit produit par une abondance de sérosité , ou par un épuisement des fluides , dans les tempéraments robustes , pituiteux ou phlegmatiques & que le malade avoit encore assez de force ; dans la goutte & le rhumatisme , dans les douleurs de la sciatique , & en général dans tous les cas où il falloit atténuer , évacuer les humeurs épaissies & visqueuses. Aujourd'hui on peut dire que les Médecins sont un peu trop timides , aussi guérissent-ils rarement les grandes maladies , lorsqu'elles sont sur-tout invétérées : on n'emploie gueres la coloquinte que dans l'apoplexie , après avoir employé inutilement les autres remèdes appropriés , dans la paralysie lorsqu'elle succède aux affections soporeuses.

Vertus.

DES bons effets que la coloquinte produisoit dans les différents cas où les Médecins l'employoient anciennement , & qu'elle produiroit encore , si elle étoit administrée à propos , il suit qu'elle a une vertu purgative , hydragogue , extrêmement active & violente , incisive , atténuante , tonique , stimulante.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON donne la coloquinte en substance & en décoction , rarement en infusion ; la dose de la coloquinte pulvérisée en substance est depuis quatre grains jusqu'à dix , ou douze au plus ; en la triturant on doit avoir soin d'y verser un peu d'huile d'amandes douces , de peur que les parties volatiles de cette pulpe ne s'exhalent : on la réduit en une poudre très-fine , parce qu'autrement les molécules un peu trop grandes pourroient s'attacher aux parois des intestins & y causer des douleurs violentes : on peut l'associer avec la pulpe de casse ou de tamarin , avec la scammonée , le jalap ou quelqu'autre purgatif , par exemple , dans l'hydropisie avec le sirop de nerprun ; on la donne rarement en infusion , comme nous avons dit , à cause de son amertume ; si on avoit occasion de la donner de cette façon , la dose seroit alors de quinze à vingt ou trente grains tout au plus dans six onces de vin blanc. En décoction elle ne s'emploie que pour les lavements depuis demi-gros jusqu'à un gros dans l'apoplexie. On doit prendre garde en coulant la décoction qu'il ne passe point des parties de coloquinte moins broyées & pulvérisées qui seroient nuisibles aux intestins. M. *Ethmuler* a observé que pour lors il

survenoit des superpurgations ; pour éviter cet inconvénient , il vaut mieux l'ordonner dans un nouet qu'on met dans l'eau bouillante ; si malgré toutes ces précautions la coloquinte caufoit des superpurgations , l'observation réitérée fait voir que le plus prompt remède est l'huile donnée abondamment , ou injectée par le fondement. On se sert plus communement des trochisques qu'on appelle trochisques d'alhandal , ils se préparent de la maniere suivante : on prend la quantité de pulpe de coloquinte séparée des graines que l'on veut , on la coupe en petits morceaux , ensuite on l'arrose avec semblable quantité d'huile d'amandes douces ; on la pile dans un mortier jusqu'à ce qu'elle soit réduite en une poudre très-fine que l'on mêle avec suffisante quantité de mucilage de gomme adragant extrait avec de l'eau de rose , on fait de petits trochisques que l'on fait sécher à l'ombre & que l'on réduit de nouveau en une poudre très-fine , dont on fait encore de trochisques avec le même mucilage , ce que l'on répète jusqu'à trois fois , & l'on fait des trochisques que l'on conserve pour l'usage , la dose en est depuis six jusqu'à dix grains.

Pharmacologie Rationnelle.

ELLE nous apprend que la coloquinte contient des parties gommeuses , salines , résineuses : on observe que l'extrait résineux purge très-peu & cause de très-grandes douleurs , & que l'extrait gommeux purge plus & cause également beaucoup de tranchées. M. Bouleduc préparoit un extrait de coloquinte de cette maniere : il prenoit seize onces de coloquinte qu'il faisoit infuser dans six onces de moût & fermenter pendant douze jours , il distilloit jusqu'à insipidité , il prenoit ensuite la liqueur qui étoit restée dans l'alambic , & après l'avoir passée , il la faisoit évaporer jusqu'à consistance d'extrait solide ; cet extrait étoit gommeux , & M. Bouleduc a observé que donnés depuis dix grains jusqu'à quinze il purge doucement & calme la douleur.

Le Tabac.

LE Tabac a différens noms , on l'appelle l'herbe de la Reine , l'herbe de l'Ambassadeur , l'herbe du grand Prieur , *Nicotiana* ; les plus communs de ces noms sont celui de Tabac en françois , & celui de *Nicotiana* en latin : il y en a de deux especes , le mâle & la femelle , le mâle s'appelle *Nicotiana major* , & est encore de deux especes , dont l'une s'appelle *Nicotiana major latifolia* , l'autre *Nicotiana major angustifolia*. Le Tabac femelle s'appelle *Nicotiana minor* ou *Priapeia petum minus folio rotun-*

diore ; on se sert ordinairement du Tabac mâle pris par le nez , il excite l'éternuement & procure l'évacuation des sérosités. Nous en parlerons sous ce point de vue à la classe des sternutatoires : on s'en sert encore comme d'un salivant ou masticatoire , en mâchant ou fumant les feuilles seches de cette plante , nous aurons lieu d'en parler à la classe des salivants : on le prend aussi intérieurement , & c'est sous ce dernier point de vue que nous allons le considérer ici.

Cas.

ON l'emploie avec succès dans l'apoplexie sur-tout pituiteuse , dans l'apoplexie sanguine ; mais après avoir fait précéder les saignées & les autres remedes convenables , dans la léthargie & les autres affections soporeuses , dans la paralysie , dans l'épilepsie , dans l'asthme humide , dans la vomique du poulmon & l'empyeme ; quoiqu'on ait vu de bons effets du Tabac dans tous les cas que nous venons d'indiquer , cependant on ne s'en sert gueres aujourd'hui que dans les affections soporeuses & les paralysies , encore faut-il user de prudence & de circonspection même dans ces cas , parce qu'il arrive quelquefois que les malades , après avoir usé de ce remede , tombent dans des convulsions accompagnées de vomissement , de sueurs froides , d'un poulx foible & autres accidens funestes : on ne doit l'employer que dans le cas d'un très-grand relâchement des solides & d'épaississement des fluides.

Vertus.

L'EXPÉRIENCE prouve que le Tabac a une vertu purgative extrêmement violente & presque caustique , que c'est un béchique chaud très-propre à atténuer les humeurs visqueuses & tenaces , mais il faut auparavant l'avoir préparé & dépouillé de sa vertu caustique de la façon que nous dirons plus bas.

Maniere de s'en servir, Doses.

ON ordonne le Tabac intérieurement en décoction & on l'associe à des remedes adoucissans ; par exemple , on prend une once de feuilles seches de Tabac , on les fait bouillir dans trois pintes d'eau commune jusqu'à la diminution d'un tiers , on y ajoute sur la fin des feuilles de mauve , de branche-urfine & de violette , de chacune une poignée , on coule le tout & on y ajoute trois onces de sucre blanc ; la dose de cette décoc-

tion est de trois verres tiedes par jour , deux le matin à jeun , à deux heures de distance l'un de l'autre , & le troisieme dans l'après-dinée. Cette décoction est bonne dans l'asthme humide , la vomique du poumon , l'empyeme : on l'ordonne aussi en décoction pour les lavements dans les cas d'affections soporeuses , on fait bouillir une once de feuilles seches de Tabac dans une ~~livre~~ ^{livre} d'eau , on passe cette décoction pour un lavement. *Zacutus-Lusitanus* employoit avec succès dans l'épilepsie un sirop composé de miel & de suc de feuilles de Tabac dont il faisoit prendre quelques cuillerées par jour au malade. *M. Riviere* recommande extrêmement dans le même cas le sirop de nicotiane de *Quercetan* ; il y en a de deux fortes , le simple & le composé , le simple se prépare de cette maniere : on prend trois onces de suc de Tabac , quatre d'oxymel & d'hydromel une once qu'on fait infuser pendant quatre jours , on passe cette infusion , & dans la colature on y ajoute deux onces de sucre & on fait cuire à consistance de sirop , c'est le sirop simple de *Quercetan* qui convient dans le cas d'épilepsie : on pourroit aussi s'en servir dans l'asthme humide , la vomique du poumon & l'empyeme ; la dose de ce sirop est depuis demi-cuillerée jusqu'à une cuillerée , on peut en donner trois par jour. Le Tabac par l'analyse chymique donne un esprit , beaucoup d'huile & de sel fort âcre.

Hellebore noir , Helleborus niger.

LA racine de cette plante dont on se sert en Médecine , est tubereuse , noueuse , du sommet de laquelle sort un grand nombre de fibres ferrées , noire en dehors , blanche en dedans , d'un goût âcre , mêlée de quelque amertume : il y a plusieurs especes d'Hellebore noir : 1°. *Helleborus niger angustioribus foliis , flore roseo , seu legitimus* , 2°. *Helleborus niger amplissimo folio caute præalto flore purpurascens* , 3°. *Helleborus niger tenuifoliis buphtalmi flore* , 4°. *Helleborus niger fætidus*. Pour savoir si les racines qu'on vend sous le nom d'Hellebore noir , sont les vraies racines d'Hellebore noir utiles en Médecine , *M. Tournefort* propose ce moyen ; il faut en faire infuser dans une suffisante quantité d'eau de fontaine & distiller ensuite dans un alambic. Si la premiere liqueur qu'on sort de l'alambic n'a point de goût , il faut rejeter ces racines comme inutiles ; si au contraire ces racines sont âcres , il faut les employer.

L'action de l'Hellebore noir n'est pas aussi féroce que celle de l'Hellebore blanc , il purge principalement par les selles , on ne s'en sert gueres aujourd'hui.

Cas.

LES anciens l'employoient dans la manie , la folie ou morosis , & dans ce dernier cas , ils se servoient de l'hellebore d'Antyerie , où ils envoyoient les ~~foies~~ pour prendre ce remede ; d'où vient ce proverbe *Naviget Anty~~et~~am* ; ils l'employoient aussi dans l'apoplexie & les autres affections soporeuses , dans la passion hystérique ou hypocondriaque lorsqu'elle se trouvoit dans les tempéraments pituiteux , & en général toutes les fois qu'ils croyoient les solides extrêmement relâchés & les fluides épais , visqueux & tenaces , pourvu que les tempéraments ne fussent pas foibles : ils ne faisoient usage de ce remede qu'après avoir préparé le malade par d'autres remedes plus doux.

Vertus.

C'EST un purgatif très-violent qu'on ne doit ordonner qu'avec beaucoup de prudence , parce qu'il cause quelquefois d'horribles symptomes , savoir , des flux de ventre insupportables , des suffocations , des convulsions , des défaillances , l'inflammation des viscères ; on ne s'en fert gueres aujourd'hui que dans les affections soporeuses & dans certains cas de Manie.

Maniere de s'en servir , & Doses.

AUJOURD'HUI on donne rarement l'hellebore noir en substance , & seulement depuis quinze grains jusqu'à quarante. En décoction depuis demi-gros jusqu'à un & demi ; par exemple , on prend des filets ou fibres de la racine coupés menus , qu'on jette dans six onces de lait , qu'on laisse bouillir légèrement , ensuite on fait infuser pendant la nuit & on en fait prendre le matin la colature au malade. On en prescrit plus souvent l'extrait qui se prépare de cette maniere : on prend la quantité que l'on veut de petits filets de la racine , on les fait couper par petits morceaux & on les fait bouillir dans suffisante quantité d'eau de pluie jusqu'à la réduction d'un tiers que l'on passe & que l'on évapore ensuite jusqu'à la consistance d'extrait ; la dose de cet extrait est depuis quinze grains jusqu'à demi gros. On pourroit se servir de cet extrait dans la manie , lorsque les solides sont extrêmement relâchés & les fluides visqueux & tenaces , en donner par exemple douze grains y ajoutant de la cannelle & de la crème de Tartre , & incorporant le tout dans quelque sirop approprié , la crème de Tartre châtre la férocité de l'hellebore.

Euphorbe ,

Euphorbe , Euphorbium.

C'EST une gomme résineuse ou un suc concret gomme-résineux qu'on nous apporte en gouttes ou en larmes, d'un jaune pâle, tantôt ronde, tantôt oblongue, blanche & caverneuse, d'un goût très-âcre, brûlant, sans odeur; le suc découle d'un arbrisseau appelé le vrai Euphorbe des anciens, *Euphorbium antiquorum verum*, qui croît dans l'Afrique, le Malabar & aux Indes orientales. On choisit celui qui est pur ou séparé des corps étrangers, pâle ou jaunâtre, âcre, & qui étant légèrement touché de la langue, allume le feu dans toute la bouche. On s'en sert extérieurement dans la carie des os & la piquure des nerfs, dans leur convulsion, leur engourdissement; l'usage intérieur est presque tout-à-fait banni de la Médecine, parce que c'est le plus ardent des hydragogues; cependant quelques-uns, comme *Fernel*, disent qu'on corrige les dangers de l'Euphorbe en le faisant macérer pendant vingt-quatre heures dans l'huile d'amandes douces, & le mettant ensuite dans un limon creusé, qu'on recouvre de pâte de farine, & qu'on fait cuire à-peu-près comme nous avons vu qu'on préparoit le diagrede de coing. On pourroit se servir absolument de l'Euphorbe ainsi corrigé, dans le cas d'apoplexie, après avoir employé inutilement les autres remèdes à la dose de deux grains jusqu'à six, mais on doit, tant qu'on le peut, s'en abstenir. Avant que de quitter la classe des purgatifs, nous parlerons de quelques sels purgatifs dont on se sert assez souvent dans les autres Provinces du Royaume, plus rarement ici.

Des Sels.

IL y a plusieurs sortes de sels; on les divise en général, en acides, en alkalis & en neutres ou moyens. Le sel acide est ainsi appelé à cause de la saveur qu'il a, qui est semblable à celle du verjus, de l'oseille, du vinaigre, & d'autres matières aigres qu'on appelle aussi acides, c'est à cette saveur qu'on les connoît particulièrement: il a encore la propriété de changer en rouge la couleur de tournesol; mêlé avec un sel alkali, il entre en effervescence. Le sel alkali est celui dont la saveur est âcre & brûlante & qui a la propriété de changer en verd certaine couleur bleue & violette, sur-tout le sirop violat, & qui bouillonne quand on le mêle avec un sel acide. Si on présente un sel alkali pur à un acide pur, ils s'unissent ensemble, & de cette réunion résulte un sel qui n'a ni les propriétés de l'alkali, ni celles de l'acide; qu'on appelle par

cette raison sel neutre ; on l'appelle aussi sel moyen , sel salé ; les sels dont nous avons à parler , sont de cette dernière espece , c'est-à-dire , des sels neutres ou moyens.

Sel végétal ou Tartre tartarisé , Tartre soluble.

LE sel végétal n'est autre chose que la crème de tartre unie avec le sel alkali fixe de tartre , on le dissout dans huit fois autant d'eau ; on fait chauffer cette lessive sur un bain de sable , dans une terrine de craie ; on y jette par cuillerée de la crème de tartre réduite en poudre. A chaque projection il s'excite une grande effervescence ; on remue la liqueur quand l'effervescence est apaisée & on la voit se renouveler ; quand il ne se fait plus d'effervescence nonobstant l'agitation , on jette dedans une nouvelle portion de crème de tartre , les mêmes phénomènes reparoissent : on continue ainsi jusqu'à ce qu'on ait atteint le point de la saturation parfaite ; on filtre ensuite la liqueur & on la fait évaporer lentement jusqu'à la consistance de sirop qu'on expose dans un lieu frais , il s'y forme des cristaux , c'est le sel végétal qui est un sel salé , piquant & qui ne laisse aucune fraîcheur sur la langue.

Cas.

ON se sert du sel végétal dans les hydropisies commençantes , dans les obstructions des viscères pourvu qu'on ne craigne pas d'échauffer , dans la jaunisse , dans les cas où les premières voies paroissent enduites d'une matière visqueuse , tenacé , & où les autres purgatifs ne peuvent guères secourir.

Vertus.

C'EST un très-bon apéritif , atténuant , purgatif , diurétique.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

SI on l'ordonne comme apéritif , la dose en est depuis 15 grains jusqu'à 40 , qu'on fait prendre dans les premières cuillerées des bouillons apéritifs , comme diurétique la dose est la même ; comme purgatif , on l'ordonne seul ou associé avec d'autres remèdes purgatifs ; si on le donne seul , la dose est depuis deux gros jusqu'à demi-once ou même une once , dissout dans chopine d'eau échauffée au bain-marie : on passe & on donne la colature par verrées dans les cas où les premières voies sont char-

gées de matieres tenaces & visqueuses; ici on l'emploie rarement de cette façon, on s'en sert plus souvent en l'associant au séné ou aux follicules de séné, par ce moyen le purgatif devient plus actif pour deux raisons, la premiere, c'est que l'eau armée, pour ainsi dire, des particules du sel végétal, dissout une plus grande quantité de séné ou de follicules; la seconde, parce que l'infusion se trouve chargée des particules actives du séné & de celles du sel végétal qui sont aussi purgatives. De plus les particules du séné étant mieux dissoutes par le moyen du sel végétal, doivent moins s'attacher aux parois des intestins & y causer moins de tranchées; ce que la raison fait voir sur ce point est confirmé par l'expérience journaliere qu'on en fait ici, les malades étant purgés par ce moyen doucement & copieusement. La dose du sel végétal ainsi associé au séné est depuis un gros jusqu'à un & demi pour deux ou trois gros de séné.

Sel de Seignette.

C'EST aussi un tartre soluble; il ne differe du sel végétal que par l'alkali qu'on emploie pour faire ce sel; on se sert du sel alkali de la soude qui vient d'Alicante, & on procede de la même maniere que pour faire le sel végétal: on observe seulement de faire évaporer plus promptement jusqu'à pellicule, & on a des crysiaux oblongs à neuf faces. Le sel de Seignette laisse sur la langue à peu-près la même fraîcheur que le nitre.

Cas.

ON l'emploie dans les mêmes cas que le sel végétal, dans l'hydropisie commençante, dans les œdemes, dans la jaunisse qui dépend d'une matiere épaisse, glaireuse, on en voit souvent de bons effets. M. Sydobré, célèbre Professeur de cette Université, le regardoit comme plus approprié dans ce cas que tous les autres purgatifs, comme très-propre à débarrasser, pourvu cependant que cette jaunisse soit du caractère de l'ictère froid où la bile est épaisse, visqueuse; car dans l'ictère chaud qui est accompagné de soif, il seroit nuisible.

Vertus.

LE sel de seignette est un purgatif assez actif, diurétique, fondant, apéritif.

Maniere de s'en servir, & ses Doses.

COMME purgatif on l'ordonne depuis demi-once jusqu'à une & demie, & on le fait dissoudre dans une chopine d'eau au bain-marie ; comme apéritif on l'associe aux bouillons apéritifs depuis vingt jusqu'à quarante grains ou jusqu'à un gros & même jusqu'à deux ; si on veut rendre ces bouillons purgatifs , on y en met une once , comme diurétique la dose est la même. Dans les fièvres intermittentes , M. *Sydobre* ordonnoit demi-once de bon kinkina concassé , le faisoit bouillir dans deux livres d'eau & y ajoutoit une once de sel de seignette qu'il faisoit prendre par verrees. On ordonne aussi le sel de seignette dans l'usage des eaux minérales , soit chaudes , soit thermales froides ou acidules ; on en fait prendre demi-once ou une once le premier jour dans le premier verre , & le dernier jour dans le dernier verre. Ici on substitue la manne à ce même sel dans le même cas comme un remède qui convient plus généralement aux différents tempéraments , & cela à la dose d'une once jusqu'à deux & demi pour le premier jour dans le premier verre & pour le dernier du dernier jour ; en cela on doit avoir égard au tempérament & au climat.

Sel d'Epsom.

CE sel ainsi appelé Sel Cathartique amer , ou Sel d'Angleterre , fut d'abord retiré d'une fontaine saline d'Angleterre qui se trouve près de Londres dans un lieu appelé Epsom , d'où lui sont venus les noms de sel d'Epsom & de sel d'Angleterre. A présent on se sert d'un sel factice du même nom & qui a les mêmes propriétés , c'est encore un sel neutre ; on le retire des eaux ameres qui restent dans les marais salants après l'évaporation du sel marin. Pour cela on ne fait que continuer l'évaporation , lorsque la liqueur ne donne plus des cristaux de sel marin ; on en retire encore d'autres cristaux de figure oblongue , quarrée , d'une saveur amere , c'est ce qu'on appelle sel d'Epsom. M. *Bouleduc* a démontré que ce sel n'est autre chose que la combinaison de deux sels neutres , savoir , du sel admirable de *Glauber* & du sel marin qui ont retenu dans leur coagulation une partie de l'eau des salants.

Cas.

LE sel d'Epsom a des propriétés qui sont les mêmes que celles du sel

végétal & du sel de seignette dont nous venons de parler : on l'emploie dans les mêmes cas , à la même dose , de la même manière & avec les mêmes précautions ; on s'en sert plus rarement ici , il est plus usité dans les autres provinces du Royaume , comme à Paris. Après le détail que nous venons de faire des médicaments purgatifs , soit émétiques , soit cathartiques propres à évacuer par les premières voies les matières excrémenticielles viciées & nuisibles ; l'ordre que nous nous sommes proposé nous amène naturellement , en continuant les évacuans , à passer à ceux qui sont propres à évacuer par les secondes voies ; de ce nombre sont les diurétiques par lesquels nous allons commencer.

Diurétiques.

AVANT que d'entrer dans le détail des Diurétiques , nous les allons considérer en général : ce que nous devons en dire sous ce point de vue , peut se réduire aux chefs suivans : 1°. nous examinerons ce qu'on entend en général par diurétiques ; 2°. nous exposerons les effets sensibles , soit généraux , soit particuliers , qu'ils produisent dans le corps humain ; 3°. nous verrons la division qu'on doit en faire ; 4°. nous donnerons les indications , ou ce qui est le même , nous exposerons les cas généraux où les diurétiques sont employés avec succès ; 5°. nous parlerons du choix qu'on doit faire des diurétiques , soit chauds , soit froids , selon les circonstances ; 6°. nous exposerons les contre-indications ou les cas dans lesquels on doit s'abstenir de certains diurétiques ; 7°. nous indiquerons les précautions qu'on doit prendre en administrant les diurétiques.

Ce qu'on entend par Diurétique.

LE sang dans l'état même de santé est agité d'un mouvement intestin qui tend à la putréfaction ; c'est une vérité constante. Pour s'en convaincre on n'a qu'à considérer le lait en premier lieu , & passer ensuite à l'examen du sang. Le lait qui n'est qu'un chyle un peu plus travaillé du suc récemment exprimé des aliments dont il retient encore en partie la nature , le lait , dis-je , étant laissé dans un lieu médiocrement chaud , tourne de lui-même vers l'aigre ; il est par conséquent susceptible de fermentation acide ou acéteuse. Si on le soumet à la distillation , il donne beaucoup de sel acide , & le résidu ou le *caput mortuum* calciné & lessivé donne un sel alkali fixe. Le sang bien formé , laissé pareillement à lui-même dans un lieu médiocrement chaud , ne tournera jamais vers

l'aigre , mais vers la putréfaction : si on le distille , il donnera d'abord du phlegme ou de l'eau , & en poussant le feu , des sels alkalis volatils , des huiles fétides : le résidu ou le *caput mortuum* ne donne presque point d'alkali fixe : d'où il suit que le chyle qui est une espece de lait , en se changeant en sang , perd son penchant vers l'acidité , & qu'il se fait aussi dans ce changement une nouvelle combinaison des sels ; cette nouvelle combinaison ne sauroit être attribuée à un mouvement mécanique qui ne peut tout au plus que triturer , broyer , diviser & atténuer les parties de l'aliment , & on ne sauroit jamais comprendre qu'un tel mouvement produisît un nouveau mixte d'une nature différente. Il faut donc convenir qu'il y a dans le sang un mouvement qu'on ne peut rapporter au mécanique , & qu'ainsi il est agité dans l'état de santé même d'un mouvement intestin. De plus ce mouvement doit être rapporté au mouvement de putréfaction ; une comparaison le fera sentir : qu'on prenne une plante récente , qu'on l'analyse , elle donnera beaucoup de sel acide , le résidu calciné & lessivé fournira des alkalis fixes ; qu'on laisse pourrir cette plante , & qu'on l'analyse , elle fournira des sels alkalis fixes : il est aisé d'appercevoir l'analogie qu'il y a entre cette plante récente & le chyle , on le fait par le produit de l'un & de l'autre , & de même entre cette plante pourrie & le sang pareillement par les produits ; d'où il résulte que le mouvement intestin du sang , que nous avons démontré plus haut , est un mouvement qui tend à la putréfaction , ou du moins est analogue au mouvement de putréfaction. Cette vérité supposée que produit le mouvement de putréfaction , tend continuellement à développer les parties alkalescentes fétides , toutes propres à produire la putréfaction des fluides & même des solides. Les matieres fécales qui sont le résidu des digestions , devenues âcres , fétides , voisines de l'alkalinité dans les premieres voies , sont chassées par les selles ; de même que les matieres salines , huileuses mêlées avec le sang , lorsqu'elles sont extrêmement âcres & voisines de l'alkalinité volatile , sont chassées par des couloirs qui leur sont propres , tels que ceux de l'insensible transpiration & les voies des reins. L'urine doit donc être regardée comme une humeur excrémenticielle , chargée de parties salines très-âcres , tendant à l'alkalinité qui , si elles y étoient retenues , corromproient la masse du sang & endommageroient les solides & produiroient bien des maladies ; il est donc très-important que le sang en soit dépouillé. *Boerrhaave* a examiné de près l'urine , & il a assuré qu'il n'a point apperçu absolument de parties lymphatiques nourricieres ; de plus l'expérience fait voir que l'urine

est chargée de parties salines & d'une huile fétide très-voisine de la putréfaction. L'odeur désagréable de l'urine prouve le degré de la putréfaction de cette huile ; mais cette huile est extrêmement unie à l'eau , ce qui prouve son extrême division , puisqu'on voit que pour peu que les huiles soient grossières , elles se séparent aisément de l'eau , au lieu que l'huile dont nous parlons est tellement unie à l'eau que plusieurs distillations ne peuvent l'en séparer ; ainsi cette huile retenue dans la masse du sang ne pourroit qu'irriter les solides & causer beaucoup de ravages. On voit par-là qu'on a raison de regarder l'urine comme la lessive du sang : l'observation fait voir que , si l'urine n'est pas bien séparée , il survient des maladies très-dangereuses. Ceux en qui elle est retenue , éprouvent des anxiétés , ils sont sujets aux fièvres ardentes inflammatoires , à l'apoplexie , à l'hydropisie , à la leucophlegmatie : il est donc très-important dans l'état de santé , comme dans celui de maladie , d'entretenir cette excrétion. Il y a des médicaments pour cela , ce sont les diurétiques. Nous entendons ici par diurétiques des médicaments qui procurent une plus abondante sécrétion de l'urine ou des humeurs par les couloirs des reins. Or l'urine peut être supprimée , quoique séparée dans les reins ; le calcul & l'inflammation des voies urinaires peuvent occasionner cet effet.

Effets des Diurétiques.

LES diurétiques pris selon toute leur étendue , produisent des effets sensibles bien opposés : il y en a qui augmentent la sécrétion de l'urine en échauffant , ce qu'on connoît , parce qu'après les avoir administrés , on observe plus de force , plus de fréquence dans le pouls , plus de chaleur dans toute l'habitude du corps : il y en a au contraire qui produisent cette sécrétion en diminuant la fougue & l'impétuosité du sang , ce qui se connoît parce que la chaleur diminue , le pouls devient moins fort & moins fréquent , le sentiment d'âcreté à la peau diminue , les malades deviennent plus tempérés.

Division des Diurétiques.

DE LA vient qu'on fait des diurétiques froids & chauds ; les diurétiques chauds , sont ceux qui produisent une plus grande sécrétion de l'urine en augmentant la chaleur ; les froids sont ceux qui procurent cette plus grande sécrétion en diminuant la chaleur & l'énergie de la circulation : on doit être extrêmement attentif à cette division , en prescrivant

les diurétiques , parce qu'il est visible que les chauds seroient nuisibles dans les cas où les froids seroient utiles & *vice versâ*.

Indications ou cas généraux dans lesquels les Diurétiques pris selon leur étendue , conviennent.

IL n'est presque point de maladies où les diurétiques chauds ou froids ne conviennent : on les emploie avec succès dans les maladies , soit aiguës , soit chroniques , dans les maladies fébriles ou dans les fièvres aiguës continues , soit continues simples , soit continues avec redoublement , dans les maladies inflammatoires de la poitrine , dans celles qui attaquent les reins , les ureteres & la vessie , dans les coliques néphrétiques , dans la dysurie qui est une difficulté d'uriner accompagnée de douleurs , de chaleur & de cuisson ; dans la strangurie qui ne diffère de la dysurie qu'en ce qu'on rend l'urine goutte à goutte , au lieu que dans la dysurie , elle coule sans interruption , lorsqu'on a commencé à la rendre ; dans l'ischurie qui est une entière suppression ou retention de l'urine , soit qu'elle ait été séparée dans les reins & qu'elle soit retenue dans la vessie , ce qu'on connoît par une tumeur qui paroît à la région hypogastrique , soit qu'elle n'ait pas été séparée dans les reins ; dans les maladies chroniques cachétiques qui sont accompagnées d'enflure de tout le corps ; dans la chlorose , dans la leucophlegmatie , dans toutes les tumeurs œdémateuses , dans l'extravasation des humeurs répandues dans quelque cavité ; dans l'hydropisie ascite , dans l'hydropisie de poitrine , dans les autres maladies chroniques de la poitrine , comme dans l'asthme , soit humide , soit sec ou convulsif , soit tuberculeuse , dans l'empyeme , dans le scorbut , dans la goutte , dans la sciatique , dans le rhumatisme goutteux : on observe même que les diurétiques sont les remèdes qui conviennent le mieux dans ces maladies , dans les fleurs blanches , dans les gonorrhées virulentes , sur-tout au commencement. On les a aussi employés avec succès dans le cas d'obésité ou d'embonpoint qui est joint avec la difficulté de respirer , l'engourdissement de tout le corps , en un mot avec lésion des fonctions. M. *Wanhelmont* rapporte qu'un homme fort gras fut guéri par l'usage d'un diurétique qu'il substitua à la biere. M. *Wedetius* dit aussi qu'un Marquis allemand qui étoit extrêmement gras , diminua de quatre-vingt sept livres en substituant le vinaigre au vin dont il avoit fait auparavant grand usage.

Du choix qu'on doit faire des Diurétiques , soit froids , soit chauds , suivant les circonstances.

IL est des cas où les diurétiques chauds sont indiqués , & où les diurétiques froids ne conviendroient point , & il en est au contraire d'autres où les diurétiques froids conviennent & où les chauds sont contre-indiqués ; en général l'expérience fait voir que plus le sang est agité , plus il y a de chaleur & plus les humeurs tendent à la putréfaction : c'est ce qu'on peut remarquer dans les personnes robustes , & qui s'exercent beaucoup à des travaux pénibles , par exemple , les payfans chez lesquels les humeurs tendent ordinairement plus vite à la putréfaction , ce qu'on connoît même à l'odeur extrêmement forte & fétide des sueurs : au contraire les personnes délicates , celles qui s'exercent moins , n'ont pas les humeurs si tournées vers la putréfaction , ce qui prouve que la chaleur développe les parties salines , les huiles volatiles , & pourrit ainsi les humeurs ; d'où l'on peut conclure que dans les maladies où le sang est dans une grande fougue , les parties salines & huileuses du sang sont beaucoup exaltées & développées , & tendent prochainement à leur putréfaction ; pour lors les diurétiques conviennent afin de chasser par les voies urinaires , ces parties salines & huileuses & d'arrêter les progrès de la putréfaction ; mais il faut avoir une attention singulière à cette énergie de la circulation , à cette fougue du sang pour se déterminer sur le choix qu'on doit faire des diurétiques. Ainsi nous avons dit en général que les diurétiques conviennent dans les maladies aiguës dans les fièvres aiguës par exemple ; mais il faut remarquer que ces fièvres peuvent se trouver jointes à deux constitutions du sang bien opposées ; car où le sang paroît tourner vers l'épaississement visqueux , comme dans les fièvres malignes à *coagulo* , où il paroît tendre à la dissolution putride ; on connoît que le sang tourne vers l'épaississement visqueux , en ce que les mouvements vitaux ne semblent pas augmenter sensiblement , le pouls est mol , les malades se plaignent de lassitude , & paroissent portés vers les affections soporeuses ; pour lors il faut se servir des diurétiques chauds qui peuvent irriter les vaisseaux , augmenter leur oscillation , non pas cependant indifféremment , mais de ceux qui ont moins d'activité : on connoît au contraire que le sang tourne vers la dissolution putride par une chaleur âcre , mordicante , qu'on remarque en tenant quelque temps la main sur quelque partie du corps du malade , par la soif presque inextinguible , le malade est extrê-

mement inquiet & éloigné du sommeil ; dans ce cas les diurétiques froids sont indiqués , les chauds nuiroient extrêmement ; en un mot on peut dire en général que toutes les fois qu'il y a beaucoup de chaleur , d'ardeur , les diurétiques chauds sont contre-indiqués , & que lorsqu'il y a relâchement des solides & épaisissement des fluides , ils sont indiqués ; il en est de même des maladies chroniques , nous avons dit que les diurétiques convenoient dans les maladies cachectiques qui sont accompagnées d'enflure , dans la leucophlematie , l'hydropisie ; dans ce cas il faut faire attention aux symptômes de la maladie & au tempérament du malade ; si le malade est d'un tempérament chaud , sec , ardent , si les solides sont susceptibles d'une grande irritation , s'il y a beaucoup de soif , de chaleur , les diurétiques chauds ne conviendroient pas , ils augmenteroient la chaleur , la soif ; si au contraire le malade est d'un tempérament pituiteux , phlegmatique , si les solides sont relâchés & qu'il n'y ait pas beaucoup de chaleur ni de soif , les diurétiques chauds sont alors indiqués.

Même attention dans les maladies de la poitrine , si l'asthme dépend d'une matière âcre , saline , qui se porte vers les tuyaux aériens & qui excite des mouvements convulsifs , les diurétiques froids conviennent , les chauds seroient nuisibles : si au contraire il est produit par des tubercules formés , par une lymphe épaissie , visqueuse , glutineuse , comme dans les tempéraments pituiteux , les diurétiques chauds conviennent ; mais si la lymphe est épaissie par la sécheresse , comme chez les hypochondriaques , les hystériques , alors les diurétiques chauds seroient contre-indiqués. On se sert des diurétiques dans l'empyeme , parce que l'observation a appris que le pus s'est quelquefois évacué par les voies urinaires ; mais dans ce cas il faut aussi avoir égard au tempérament du malade & à la constitution du sang , & ne donner les diurétiques chauds que lorsqu'il n'y a pas à craindre d'échauffer , de dessécher le sang. Dans le scorbut , les diurétiques sont regardés comme spécifiques , mais il faut prendre garde qu'il y en a de deux sortes , le chaud & le froid. Le scorbut chaud est entretenu par une matière âcre , saline , développée , & alors les diurétiques froids conviennent , les chauds seroient nuisibles. Le scorbut froid est entretenu par une matière âcre à la vérité , mais enveloppé d'une lymphe visqueuse , glutineuse , & alors les diurétiques chauds conviennent. On ordonne aussi les diurétiques dans la goutte , parce qu'on observe que les urines des gouteux sont ordinairement chargées de gravier , & qu'ils sont sujets au calcul : on les emploie dans ce cas-là pour diminuer la violence des attaques , & pour prévenir la con-

crétion des matieres fablonneuses dans les conduits urinaires ; mais il faut faire aussi attention à la constitution du sang. Il y a des personnes gouteuses dont le sang est fort agité & qui sont d'un tempérament ardent , âcre , dans ce cas les diurétiques froids conviennent ; si , au contraire , ils sont d'un tempérament pituiteux , & qu'il n'y ait point de fougue dans le sang , les diurétiques chauds conviennent : on les ordonne encore dans les douleurs néphrétiques occasionnées par un calcul dans les reins , mais il faut toujours faire attention si les solides sont relâchés , s'il n'y a pas beaucoup de chaleur , d'ardeur ; dans ce cas , les diurétiques chauds conviennent du moins dans les intervalles des paroxysmes ; mais si les solides étoient susceptibles d'une grande irritation , s'il y avoit beaucoup de chaleur , d'ardeur , les diurétiques froids seroient les seuls qui pussent convenir. Les diurétiques conviennent encore dans les fleurs blanches , mais il faut remarquer qu'elles peuvent dépendre du relâchement des glandes du vagin & de l'épaississement des humeurs , ce qui arrive assez souvent , lorsque les femmes ont beaucoup souffert dans leur accouchement , & alors les diurétiques chauds conviennent où il peut arriver que les humeurs soient âcres , qu'elles causent de petits ulcères & des excoariations aux parties voisines , comme dans les femmes d'un tempérament bilieux , & alors les diurétiques froids conviennent. Dans la gonorrhée virulente on doit toujours donner les diurétiques froids au commencement , à cause de la grande ardeur dont elle est accompagnée , il n'est pas même prudent d'employer les diurétiques chauds même sur la fin. Enfin nous avons dit qu'on employoit avec succès les diurétiques dans le cas d'obésité ou de trop d'embonpoint , sur quoi il faut remarquer que l'obésité dépend principalement de ce que le tissu graisseux & même tous les solides sont relâchés. La graisse fournit beaucoup d'acide & peu d'alkali : on doit la regarder comme une humeur d'une nature différente des autres humeurs vitales , qui leur est cependant un peu plus analogue que le chyle & le lait , mais qui n'est pas encore assez animalisée , pour ainsi dire. Ainsi les tempéraments gras , en général , supposent un relâchement des solides , un certain degré d'inertie dans les instruments de la circulation , & pour lors on voit aisément que les diurétiques chauds conviennent ; mais il arrive quelquefois plus rarement que les personnes d'un tempérament vif sont grasses & que leurs solides ne sont point relâchés , ce qui vient de ce que les tuyaux sécrétoires de la graisse ont l'aptitude convenable , & que ceux qui la doivent rapporter dans les vaisseaux sanguins , sont dans une espèce d'inaptitude , & dans ce cas les diurétiques froids sont les seuls à employer.

Contre-indication.

LES diurétiques, comme nous avons dit, sont ou chauds ou froids; les diurétiques chauds produisent une plus grande sécrétion de l'urine ou des humeurs par le couloir des reins, en augmentant la chaleur, en échauffant, par conséquent ils sont contre-indiqués, 1°. dans les fièvres aiguës, soit intermittentes, soit continues, caractérisées par une grande soif, par la chaleur, l'ardeur; 2°. par la même raison ils sont contre-indiqués dans les maladies inflammatoires: il faut cependant en distinguer de deux fortes; l'une où le sang est dissout, la soif est grande, & presque inextinguible, avec une ardeur & une disposition érépélateuse, & c'est principalement dans ce cas que les diurétiques chauds sont contre-indiqués; l'autre dépend de l'épaississement des fluides, la chaleur, la soif ne sont pas si considérables, & dans ce cas les diurétiques chauds pourroient avoir lieu, en choisissant cependant les moins actifs. 3°. Ils sont contre-indiqués à plus forte raison dans l'inflammation des reins appelée en latin *Nephritis*, dans les maladies inflammatoires des ureteres, de la vessie, dans les inflammations de l'uretre parce qu'ils augmentent la chaleur, le mouvement du sang & procurent un plus grand abord d'humeurs vers ces parties; dans ces cas les saignées fréquentes, les demi-bains, les fomentations sur les parties affectées sont les meilleurs remèdes qu'on puisse employer. 4°. Dans les maladies des reins même où il n'y a pas inflammation, comme dans la colique néphrétique, *Nephretica*, marquée par une douleur vive qu'on rapporte à la région lombaire, quoique les urines soient supprimées ou diminuées, parce que les particules de ces Médicaments passant par les voies de la circulation, ne pourroient qu'irriter ces parties, causer une plus grande contraction des vaisseaux, on doit sur-tout s'en abstenir pendant les paroxysmes. 5°. Dans l'ischurie vraie qui dépend d'un vice local du col de la vessie ou du canal de l'uretre, par exemple, de quelque excroissance qui empêche que l'urine soit évacuée avec la même proportion qu'elle aborde dans la vessie, parce que l'acrimonie de l'urine irriteroit les parties & causeroit même l'inflammation; alors les diurétiques froids sont les seuls qui conviennent, & même on ne les prescrit pas dans ce cas comme diurétiques, mais comme propres à adoucir l'âcreté de l'urine & à diminuer la violence des symptomes qu'elle cause, encore même faut-il avoir employé auparavant les secours chirurgicaux, comme la sonde, la ponc-

tion au periné pour donner une libre issue aux urines , parce qu'autrement on nuirait beaucoup en déterminant une plus grande quantité d'humeurs vers la vessie qui est déjà distendue. 6°. Dans plusieurs maladies chroniques comme dans les obstructions qui dépendent d'une lympe âcre , sèche , laquelle se trouve dans les tempéraments chauds , bilieux , dans les hystériques , les hypocondriaques , les diurétiques chauds nuiraient alors pour deux raisons , 1°. parce qu'ils augmentent la chaleur & qu'ils pourroient faire dégénérer des tumeurs schirreuses en cancers qui sont très-dangereux ou même incurables ; 2°. parce que déterminant une plus grande quantité d'humeurs vers les parties urinaires , ils dépouillent de sérosité un sang qui n'est déjà que trop sec , & le rendent par-là plus propre à former des obstructions ; 7°. dans la fièvre lente essentielle , qu'on appelle communément fièvre hectique , qui dépend des obstructions du méfentère , du foie , de la rate , telles que nous venons d'indiquer , on pourroit au contraire les indiquer si cette fièvre étoit entretenue par une matiere épaisse & visqueuse ; 8°. dans les fièvres lentes symptomatiques qui dépendent de quelque ulcere interne , soit des poulmons , soit du foie , de la rate , des reins , dans ce cas le sang se trouve dissout & âcre , & perd une grande partie de sa sérosité par les sueurs , en sorte qu'un remède qui augmente le mouvement du sang & atténue les humeurs , ne peut être que nuisible ; 9°. à propos de l'ulcere des reins & des voies urinaires , il faut remarquer qu'on est assez dans l'usage d'employer dans ce cas la Térébenthine , le Baume de Copahu , du Pérou , de l'Amérique , du Canada , quoiqu'on les range parmi les diurétiques chauds ; mais on ne doit le faire qu'avec beaucoup de précaution : il faut même faire attention qu'on ne les emploie pas alors comme diurétiques , mais comme détersifs , & que pour peu qu'il y ait de fièvre , on les noie dans les diurétiques froids. Cependant malgré ces précautions , on ne peut pas les employer dans tous les cas d'ulcere des voies urinaires , mais seulement lorsque l'ulcere est fardide , baveux ; ce qu'on connoît par la quantité de pus mêlé avec les urines , lorsque cette matiere est fétide , jaunâtre , séreuse , & que le malade ne ressent pas une douleur vive à la partie à laquelle on rapporte l'ulcere ; on peut croire que l'ulcere est fardide par le relâchement de ses parois & par l'accumulation du pus sur les bords , alors on n'a rien à craindre d'un remède un peu stimulant ; mais lorsque le pus est de bonne qualité , qu'il est blanc , qu'il n'a point de mauvaise odeur & qu'il y a une douleur vive rapportée à la partie qu'on croit être affectée d'ulcere , alors l'usage de ces baumes ne peut être que

pernicieux , & c'est ce qu'on voit dans la phthisie tuberculeuse lorsque le pus chassé par l'expectoration est blanc , assez épais , sans odeur & qu'il y a fièvre. L'observation apprend que les baumes même les plus doux sont extrêmement nuisibles , parce qu'ils augmentent la chaleur & irritent les parties ulcérées ; 10°. dans les hydropisies qui surviennent ou qui succèdent aux obstructions lorsqu'elles sont accompagnées de fièvre lente , d'ardeur & d'une soif presque inaltérable ; 11°. on doit aussi éviter les diurétiques chauds dans les maladies des reins dépendantes d'un calcul qui occasionne la néphrétique sur-tout pendant le paroxysme : ils peuvent même être dangereux dans les dispositions calculeuses , c'est ce que nous aurons lieu d'observer en parlant des lithontriptiques. En général on peut dire que les diurétiques chauds sont contre-indiqués dans les tempéraments vifs , ardents , bilieux , où les solides sont tendus & les fluides desséchés , & toutes les fois que la soif est considérable , selon la remarque de *Wedetius* , parce que la soif est l'appetit des fluides. En faisant attention aux cas où les diurétiques froids sont contre-indiqués qui sont les mêmes & réciproquement , ces cas où les diurétiques chauds sont contre-indiqués , sont ceux où les diurétiques froids conviennent.

Précautions.

D'ABORD pour ce qui regarde les diurétiques chauds , il ne faut pas trop insister dans leur usage , parce qu'ils échauffent , irritent les solides , appauvrissent le sang de sérosité , en déterminant une grande abondance d'humeurs vers les couloirs des reins ; des Auteurs ont remarqué que le trop grand usage des diurétiques chauds avoit procuré des calculs , la goutte , la sciatique ; ainsi si on s'apperçoit qu'ils échauffent trop , qu'ils excitent une grande soif , il ne faut pas insister davantage , ni attendre que le ton des solides soit devenu grand , ni les humeurs trop épaisses par sécheresse. A l'égard des diurétiques froids , ils ne réussissent pas toujours , voici un moyen que prescrivait *M. Sydenham* pour les rendre efficaces. Dans les petites véroles confluentes lorsque les urines ne couloient pas , ce qui est un très-mauvais symptôme , il prescrivait les diurétiques froids , mais il avoit attention de faire lever le malade & de lui faire faire deux ou trois tours de chambre , soutenu par deux personnes , afin de l'exposer à un air plus frais que dans le lit , par ce moyen le malade urinoit ensuite avec plus de facilité , ce qui est confirmé par des Médecins amis de *M. Sydenham*. Il faut remarquer que les diurétiques froids sont

presque tous adoucissants , mucilagineux , relâchans : il faut prendre garde que leur trop grand usage ne relâche pas trop le ventricule & les intestins ; c'est pourquoi il est bon d'y joindre les stomachiques chauds , surtout si on veut en continuer l'usage un certain temps. Après avoir parlé en général de ce qui regarde les diurétiques , il est temps d'entrer dans le détail ; nous nous en tiendrons pour cela à la division que nous avons donnée déjà des Diurétiques en chauds & en froids : nous allons commencer par les chauds.

Diurétiques chauds.

LES Diurétiques chauds sont pris de trois regnes , du regne végétal , du regne animal & du regne minéral ; & sous cette dernière classe , on peut placer certaines préparations chimiques qui nous fournissent quelques remèdes diurétiques chauds : nous suivrons l'ordre de ces trois regnes en commençant par le végétal.

Diurétiques chauds tirés du regne végétal.

NOUS parlerons d'abord des cinq racines apéritives majeures dont on se sert principalement pour provoquer les urines , quoiqu'elles soient en même temps apéritives ; sur quoi il faut remarquer que plusieurs Médecins confondent assez les diurétiques avec les apéritifs , & traitent des apéritifs en parlant des diurétiques ; cela vient de ce que le même Médicament est en même temps diurétique & apéritif ; & la dénomination qu'on lui donne dépend de la vue que les Médecins se proposent ; car s'ils donnent le Médicament simplement dans la vue d'ouvrir , de débarrasser , ils le considèrent simplement comme apéritif & lui donnent ce nom : si au contraire en le prescrivant , ils se proposent de provoquer les urines , alors ils s'en servent comme d'un diurétique.

Les cinq Racines majeures apéritives.

LES cinq racines apéritives majeures dont nous avons à parler , sont celles d'Ache , de Persil , de Fenouil , d'Asperge & du petit Houx.

Ache , Apium , vulgare , palustre , Apium officinarum.

SA racine est de différente grosseur suivant l'âge des plantes ; elle est droite , d'un gris noirâtre en dehors , blanche en dedans , chargée quelquefois de plusieurs têtes : elle jette plusieurs petites fibres , son goût est

un peu piquant , mais cependant assez agréable , l'odeur assez forte , un peu aromatique : on se sert de cette racine en substance & du suc exprimé : on peut aussi se servir de ses feuilles ; ses semences sont mises parmi les quatre petites semences chaudes , nous en parlerons à la classe des carminatifs.

Cas.

ON emploie l'ache avec succès dans tous les cas où nous avons dit que les diurétiques chauds conviennent , dans la leucophlegmatie , dans l'hydropisie lorsqu'il n'y a rien à craindre d'un Médicament actif & irritant , dans les obstructions du foie , de la rate , du méfentere , des reins lorsqu'elles sont produites par des humeurs lentes , visqueuses , dans les maladies qui dépendent de ces sortes d'obstructions , comme dans la chlorose , dans l'ictère froid lorsqu'il y a relâchement des solides , dans les fièvres légitimes quotidiennes , dans les fièvres quartes invétérées. *M. Chomel* assure avoir guéri une extinction de voix qui duroit depuis assez longtemps , en faisant manger au malade les feuilles d'ache en salade. Les anciens Médecins ont observé que l'ache étoit contraire aux maladies convulsives & sur-tout à l'épilepsie : cette observation a été confirmée par plusieurs modernes ; ainsi dans le cas de ces sortes de maladies où l'on seroit obligé d'employer les diurétiques chauds , il faudroit pour plus grande sûreté se servir d'autres diurétiques dont on n'auroit pas à craindre les mauvais effets.

Vertus.

PAR ce que nous venons de dire , il est évident que l'ache est propre à diviser , atténuer le sang & les humeurs épaissies par viscosité dans leur couloir , à donner du ton aux solides , ce qui est encore prouvé par l'usage que l'on fait de son suc pour déterger les ulcères baveux , ce qui ne peut se faire que par des remèdes actifs , irritants ; c'est un bon apéritif qui pousse par les urines : on doit faire attention que ce Médicament n'échauffe pas trop , que les humeurs qu'il évacue n'appauvrissent pas trop le sang de sérosité , ce qui se connoît par la soif , comme nous l'avons dit des diurétiques chauds en général , c'est une précaution qu'il faut avoir dans l'usage qu'on fait des tous les diurétiques chauds , ainsi nous nous dispenserons de la rapporter davantage.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON ordonne les racines d'ache en substance dans les ptisanes apéritives & diurétiques , dans les bouillons apéritifs , dans les apozemes depuis demi-once jusqu'à une & demie , on en met une once dans une livre d'eau & ainsi à proportion. Le suc exprimé de cette racine & dépuré par résidence , s'ordonne dans les mêmes cas que la racine , & se joint pareillement aux ptisanes apéritives , aux bouillons , aux apozemes ; la dose est depuis une once jusqu'à deux ou trois , & même quatre si on ne doit pas continuer long-temps son usage ; ce suc s'emploie avec succès dans les fièvres quartes , pourvu que l'état du malade le permette ; on le donne à la dose de six onces dans le frisson , & on couvre exactement le malade ; ceux qui s'en sont servis en pareil cas , disent que le malade , après avoir pris ce remède , sue extrêmement , & qu'il est rare que les accès reviennent après en avoir usé deux ou trois fois ; on emploie encore le suc extérieurement pour déterger les ulcères ; les feuilles d'ache s'ordonnent en décoction , on les ajoute aux ptisanes , aux bouillons , aux apozemes ~~aux~~ apéritifs , à la dose d'une demie ou d'une poignée.

Pharmacologie rationnelle.

M. Cartheuser dit que cette racine contient des parties gommeuses & des parties résineuses ; d'une once de cette racine il en a tiré plus de trois gros de gomme un gros & quelques grains seulement de résine : il avoue cependant que sa vertu ne consiste ni dans la partie gommeuse , ni dans la partie résineuse en particulier , mais dans quelque principe volatil qu'on ne peut recueillir , & qui se dissipe par l'évaporation. Le même Auteur ajoute & prétend que cette racine est contraire aux maladies de la tête seulement quand elle est fraîche , & qu'elle n'a point de mauvais effets quand elle est desséchée ; il est cependant plus prudent de s'en abstenir absolument dans ce cas , & d'y substituer quelque autre diurétique.

Persil , Apium hortense , Petroselinum , vulgare officinale.

SA racine est simple , plus ou moins grosse , suivant l'âge de la plante , blanchâtre en dedans , longue , garnie de quelques fibres , d'un goût âcre & piquant.

Cas.

ON s'en fert dans le cas de la leucophlegmatie , d'hydropisie , & tous les autres où nous avons vu que l'ache convenoit : on emploie également la racine , les feuilles , le suc à la même dose & avec les mêmes précautions , mais il faut remarquer que le persil échauffe plus que l'ache.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON a observé que c'est un très-bon remede dans les fievres malignes à *coagulo* , dans les rougeoles , les petites véroles lorsque l'éruption se fait avec difficulté à cause du relâchement des solides & de l'épaississement des fluides : on prend , par exemple , une once & demie de racine de persil bien lavée qu'on fait bouillir dans deux livres d'eau ou de lait , l'eau convient mieux , jusqu'à réduction de moitié : on passe le tout par un linge , & on le partage en deux doses qu'on donne chaudement à trois heures de distance l'une de l'autre. M. *Geoffroi* assure s'en être servi de la sorte avec beaucoup de succès dans le cas que nous venons d'indiquer.

Fenouil , fœniculum.

SA racine est assez grosse , blanche , droite , d'une saveur aromatique , mêlée de quelque douceur fraîche ; elle a presque la même odeur que tout le reste de la plante.

Cas.

ON ne se fert gueres que de la racine dans les mêmes cas , à la même dose & de la même façon que les deux précédentes , mais elle n'est pas si échauffante que le persil , ni même que l'ache ; on peut s'en servir au défaut de cette dernière. C'est un bon résolutif dans les maladies des yeux , soit pris intérieurement , soit appliqué extérieurement ; la décoction de racine de fenouil faite dans du vin & appliquée sur les yeux , a guéri des cataractes commençantes ; on peut s'en servir dans ce cas , & on recommande pendant qu'on fait le remede extérieur , de prendre le suc exprimé de cette même racine & dépuré par résidence. Les graines sur-tout sont regardées comme spécifiques dans les maladies des yeux qui dépendent de l'épaississement des fluides.

Asperge , Asparagus.

IL y a deux fortes d'asperge , l'une commune , *asparagus sativa* ; l'autre sauvage , *asparagus sylvestris* ; leurs racines se ressemblent assez & ont à peu-près les mêmes vertus : cependant M. *Geoffroi* croit que l'asperge sauvage a plus de vertu que la commune ; M. *Chomel* au contraire prétend qu'elle en a moins. Ses racines sont nombreuses , attachées comme à une tête , cylindriques , charnues , blanchâtres , grosses , longues , elles ont une certaine âcreté , enveloppée d'un peu de viscosité & de glutinosité.

Cas.

ON se sert principalement des racines , on les associe aux autres racines apéritives dont nous avons parlé dans les bouillons , les apozemes , à la même dose & dans les mêmes cas. Ces racines poussent au printemps plusieurs tiges tendres , cylindriques , vertes , sans feuilles , bonnes à manger ; ces tiges provoquent les urines & les rendent assez fétides ; les uns les recommandent comme un préservatif contre les calculs , & comme un remède propre à dissoudre la pierre. M. *Vanhelmont* s'élève contre ce sentiment , & assure qu'un de ses amis avoit un calcul pour en avoir fait un trop grand usage ; ce qui est confirmé par *Ethmuller* : on doit s'en abstenir dans le cas de calcul.

Le petit Houx.

ON l'appelle aussi *myrthe sauvage* ou *épineux* , *Brusc* , *buis piquant* , en latin *Ruscus* ou *Bruscus offic.* sa racine est assez grosse , tortueuse , raboteuse , blanchâtre en dehors , blanche en dedans , d'un goût un peu amer & piquant , d'une odeur assez forte. On se sert des feuilles , mais principalement de la racine dans les mêmes cas , de la même manière & à la même dose que des quatre précédents. On prétend que la racine du petit houx a une vertu plus déterminée dans l'hydropisie , la leucophlegmatie. *Riviere* assure qu'un payfan hydropique fut guéri en prenant tous les jours pendant un mois , par le conseil d'une femme , la décoction de cette racine ; plusieurs assurent qu'elle a une vertu marquée dans les mêmes cas , ainsi on doit la préférer aux autres pour les obstructions : elle n'est pas plus échauffante que les autres. On la regarde aussi comme un bon remède pour pousser le petit gravier des reins. M. *Boerrhaave*

l'ordonnoit dans la gravelle , il la faisoit bouillir dans du vin blanc , dont il faisoit boire un verre tous les matins pendant plusieurs jours. On peut aussi se servir des feuilles dans les douleurs néphrétiques , à la même dose d'une demi-poignée , dans une chopine de vin blanc , qu'on donne par verrées , mais il faut prendre garde que ce remède n'irrite trop la partie affectée. Si on veut donner les cinq racines en poudre toutes ensemble , la dose en est depuis quinze grains jusqu'à vingt , ou même jusqu'à un gros : on a coutume de les prescrire toutes ensemble.

Les cinq Racines apéritives mineures.

LES cinq racines apéritives mineures dont nous allons parler , ont été ainsi appellées , parce qu'elles ouvrent , désobstruent sans échauffer ; elles sont aussi rangées parmi les diurétiques chauds , parce qu'en divisant les humeurs visqueuses & tenaces , elles poussent principalement par les urines ; ces cinq racines sont celles , d'*Eryngium* , Chardon-roland ; d'*Anonis* ou *Ononis* , Arrête-Bœuf ; de *Capparis* , Caprier ; de *rubia tinctorum* , Garance ; de *Granen caninum* , chiendent.

Eryngium , Chardon-roland.

SA racine est longue , de la grosseur du petit doigt , molle & tendre , ayant à son milieu un petit filet ligneux , noirâtre en dehors , blanc en dedans , d'un goût douceâtre.

Cas.

ON l'emploie à-peu-près dans les mêmes cas que les cinq précédentes racines apéritives majeures & de la même manière : on s'en sert avec succès dans les tumeurs froides sans dureté & sans schirre , dans les embarras des reins produits par de petits graviers , auxquels les vieillards sont quelquefois sujets , dans l'ictère jaune , lorsqu'on n'a rien à craindre des remèdes un peu actifs & irritants.

Vertus.

CETTE racine a une vertu apéritive , tonique , diurétique , néphrétique ; les douleurs néphrétiques dépendent souvent des embarras des reins , mais il faut remarquer qu'elle a sa vertu en moindre degré que les cinq dont nous avons déjà parlé.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON n'ordonne gueres cette racine en poudre , parce qu'on a de la peine à la pulvériser , à moins qu'elle ne soit sèche , & alors les Auteurs remarquent qu'elle n'a presque plus de vertu : c'est pourquoi on l'ordonne ordinairement fraîche en infusion ou en décoction depuis demi-once jusqu'à une once pour une livre d'eau ; on a coutume de l'associer , soit aux autres racines apéritives mineures , soit aux cinq racines apéritives majeures , dans les ptisanes , les bouillons , les apozemes apéritifs & diurétiques.

Anonis sive Ononis ; Anonis spinosa flore purpureo , Restabovis , Arrête-bœuf.

SA racine est longue , difficile à rompre , brune en dehors , blanche en dedans , d'un goût fade , & par-là désagréable.

Cas.

ON l'emploie dans les mêmes cas que les précédentes : on la croit très-propre pour détruire les embarras des reins causés par des matieres tenaces , pour détruire aussi les excroissances charnues , qui viennent dans le canal de l'uretre : il y'en a même qui croient qu'elle est propre à résoudre le sarcocèle ou les excroissances charnues des testicules ; mais Alexandre *Pfisterus* , fameux Médecin Suisse , assure qu'elle n'a point la vertu de les détruire ; il dit qu'il l'a employée souvent sur différents sujets attaqués de sarcocèle , qu'aucun n'a été guéri , que de plus elle cause le hoquet à plusieurs & des maux d'estomac. Cet Auteur distingue deux sortes de sarcocèle , le vrai & le faux ; le vrai est une tumeur ou excroissance des testicules totalement charnue & qui exclut toute idée de collection d'eau : le sarcocèle faux qu'il appelle sang-hydrocèle , est une tumeur dure des testicules qui paroît charnue , mais qui contient des eaux renfermées dans des membranes fort dures , ce qui la fait prendre pour un vrai sarcocèle : il prétend que la racine d'*anonis* ne guérit que cette espece de sarcocèle , ou comme il l'appelle hydrosarcocèle , & cela en voidant comme diurétique , les eaux ramassées dans les membranes dont nous avons parlé , qui ensuite s'affaissent & en imposent , & font croire qu'une tumeur charnue a été détruite ; aussi la vertu qu'on attribue à

l'anonis de résoudre le sarcocèle , est tout au moins douteuse , ou même paroît détruite par cette observation.

Vertus.

ELLES sont les mêmes que celles de la racine précédente.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON prescrit la racine d'*Anonis* ou son écorce seulement ; la dose de la racine & de l'écorce desséchée & pulvérisée en substance est depuis demi-gros jusqu'à un gros. En infusion & en décoction depuis demi-once jusqu'à une once ou une & demie , on la fait infuser dans le vin blanc ou l'eau commune ; on a coutume de l'employer dans la ptisane , les bouillons , les apozemes apéritifs & de l'associer aux autres racines apéritives & diurétiques.

Caprier , capparis spinosa fructu minore folio rotundo.

SES racines sont grandes , ligneuses , nombreuses , couvertes d'une écorce assez épaisse : elle jette plusieurs branches longues , garnies d'épines rondes & pointues. L'écorce de la racine & les boutons des fleurs sont en usage , on cueille les boutons des fleurs que nous appellons *Capres* , avant qu'ils s'épanouissent , & on les laisse trois ou quatre heures à l'ombre , ensuite on les laisse dans un vaisseau dans lequel on laisse du vinaigre ; on le couvre & on le laisse couvert pendant huit jours , on les retire de ce vaisseau , on le presse doucement , on verse du nouveau vinaigre , quelques-uns ajoutent du sel ; les capres ainsi préparées sont d'un grand usage dans les Cuisines comme on fait ; on s'en sert aussi quelquefois en Médecine , on emploie sur-tout l'écorce de la racine dans les cas suivants.

Cas.

ON emploie l'écorce de la racine de caprier dans les mêmes cas où nous avons vu qu'on employoit les deux racines précédentes : on a remarqué que les boutons des fleurs ou les capres avoient une vertu spécifique pour fondre les tumeurs de la rate. *Schenkius* rapporte qu'un homme dont la rate étoit obstruée depuis sept ans avoit été guéri par l'usage des capres & l'eau des Forgerons ; mais on ne pourroit absolument rien conclure de cette observation , la guérison de cet homme pouvant également être attribuée à l'eau des Forgerons , dont il avoit usé en même

temps. Il n'en est pas de même d'une autre observation rapportée par *Fo-
reste*, qui dit qu'une vieille femme dont la rate étoit obstruée & très-
grosse depuis vingt ans, fut guérie uniquement par l'usage des capres :
on prétend aussi que le vinaigre dans lequel on a confi les capres, ap-
pliqué extérieurement est très-utile pour résoudre les tumeurs de la rate.
Les anciens avoient remarqué la même vertu dans les capres ; il ne faut
cependant pas les donner dans toutes sortes de tumeurs de la rate. Les
anciens distinguoient ce qu'ils appelloient obstructions, des schirres des vis-
cères du bas-ventre : ils appelloient proprement obstructions une tu-
meur produite par le relâchement des solides & par des matieres tena-
cées, visqueuses, qui ne pouvoient couler dans leurs couloirs, qui n'étoit
pas encore accompagnée de durété : c'est dans les cas d'obstructions que
nous venons d'indiquer, qu'ils croyoient d'après l'observation, que les
capres pouvoient convenir, mais non dans les cas de tumeur schirreuse
de la rate ou de quelqu'autre viscère, & on devroit bien se garder de les
employer dans ce dernier cas, elles seroient pernicieuses, comme aussi
dans les obstructions qui se trouvent dans des tempéraments secs & bilieux.
On recommande encore l'usage de l'écorce, de la racine, des boutons,
des fleurs pour nettoyer les reins des matieres visqueuses qui embourbent
leurs couloirs : cette écorce a une vertu égale aux boutons des fleurs.

Vertus.

DE ce qui vient d'être dit, il suit que l'écorce & les boutons des
fleurs ont une vertu apéritive, tonique ; diurétique & néphrétique.

Maniere de s'en servir, Doses.

LA racine de caprier s'ordonne en substance pulvérisée depuis trente
grains jusqu'à un gros : on en fait un bol en l'ap~~pro~~^{pro}pr~~ifiant~~^{ifiant} à quelque sirop
approprié, par exemple, avec le sirop des cinq racines apéritives majeu-
res ; en infusion depuis trois gros jusqu'à une once dans une livre d'eau
ou de vin, qu'on peut donner par verrées à deux heures de distance de
l'une à l'autre : on se sert aussi de cette racine dans les ptisanes, les
bouillons, les apozemes apéritifs & diurétiques, elle a moins d'activité
que les précédents.

Garance , Rubia tinctorum sativa.

SA racine est menue , longue , rameuse , rouge en dedans & en dehors , succulente , d'un goût piquant assez flatteur , sans odeur.

Cas.

ON l'emploie dans les mêmes cas que les précédents : on s'en sert avec succès dans les obstructions rebelles du foie , de la rate , de la matrice lorsqu'il faut résoudre puissamment des humeurs épaisses & visqueuses. M. Boerrhaave la recommande aussi beaucoup pour faire couler les glaires & le mucilage épais qui séjournent quelquefois dans les reins & dans la vessie & pour chasser les graviers : on s'en sert aussi dans les cas où il faut procurer les regles des femmes enceintes , lorsque les diurétiques sont indiqués , de peur d'occasionner l'avortement en déterminant une trop grande quantité de sang vers l'uterus , il faut alors lui préférer les autres racines apéritives qui n'ont pas la même vertu.

Vertus.

ELLE est comme les précédentes , apéritive , tonique , diurétique , néphrétique , & de plus elle a une vertu emmenagogue. M. du Hamel a découvert dans cette racine la propriété de ramollir les os & de les teindre en rouge , elle teint aussi en rouge les urines , c'est à quoi on doit faire attention pour ne pas être effrayé après s'en être servi , & ne pas croire faussement , comme cela est arrivé à plusieurs Médecins peu entendus , qu'elle ait procuré des déchirures dans les vaisseaux des reins & du conduit urinaire , comme aussi pour calmer les malades qui pourroient être alarmés de ces symptômes.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON l'ordonne de la même façon & à la même dose que les précédentes , c'est-à-dire , depuis demi-gros jusqu'à un gros en substance pulvérisée , & en décoction depuis demi-once jusqu'à une once & demie.

Chiendent , Gramen caninum , Gramen arvense.

C'EST une plante dont les racines sont fort usitées en médecine ; elles
sont

sont un peu jaunâtres , noueuses par intervalle , minces, entrelacées les unes dans les autres , d'un goût douceâtre.

Cas.

ON s'en sert non seulement dans les maladies chroniques où les racines apéritives conviennent , mais encore dans les maladies aiguës , même dans les inflammations phlegmoneuses lorsque le sang est visqueux , coëneux , épais , & on n'en observe point de mauvais effets.

Vertus.

ELLE a la vertu des racines apéritives , mais dans un degré inférieur ; elle échauffe moins , ou plutôt elle n'échauffe point ; elle est moins tonique , moins apéritive , & elle pousse doucement les urines sans irritation.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON s'en sert fréquemment dans les ptisanes , les bouillons , les apozemes apéritifs & diurétiques ; la dose en est depuis demi-once jusqu'à une once ; on les prescrit aussi par poignées & demi-poignées , lavées , coupées par petits morceaux ; dans les maladies inflammatoires on se sert d'une ptisane faite avec demi-poignée de chiendent , qu'on fait bouillir dans une livre d'eau , on peut y joindre la réglisse ou le capillaire. Entre les racines apéritives , soit majeures , soit mineures , le regne végétal fournit plusieurs plantes qui sont diurétiques ; mais comme on les emploie plus communément dans la vue d'ouvrir , de désobstruer que de pousser par les urines , quoique réellement elles poussent par cette voie en désobstruant , il sera plus à propos d'en parler à la classe des apéritifs.

Le regne végétal nous fournit encore des sucres résineux , soit concrets , soit liquides , qu'on peut ranger sous la classe des diurétiques chauds ; nous ne parlerons que des deux les plus en usage , savoir , la térébenthine & le baume de copahu.

Térébenthine.

ON donne le nom de Térébenthine à plusieurs sortes de sucres résineux qui découlent de différents arbres : on en compte quatre especes ; la térébenthine de *Chio* est un sucre résineux , liquide , qui découle d'un arbre

appellé térébinthe , d'où est venu le nom de térébenthine. Ce suc est d'abord blanc , il devient jaunâtre en vieillissant , il est flexible , glutineux , transparent , de consistance , tantôt plus ferme , tantôt plus molle. Cette térébenthine a moins d'amertume , moins d'âcreté que les autres , & elle seroit préférable si on la trouvoit , mais elle est fort rare. Le térébinthe d'où elle découle naît de lui-même dans l'isle de Chio ; on le trouve aussi dans le bois de Valene auprès de Montpellier. Cette térébenthine s'appelle *terebinthina Chia vel Cipria* ; elle a été connue des Anciens , & ils en faisoient usage. La seconde espece est celle qu'on appelle térébenthine de Venise ou de mélese , *terebinthina Veneta* , *terebinthina lorgæa* : elle découle d'un arbre appellé mélese qui donne aussi la manne , comme nous l'avons vu ailleurs. C'est le *larix folio deciduo cornifero* qu'on trouve fréquemment dans le Dauphiné : on l'appelle térébenthine de Venise , parce qu'autrefois on l'apportoît de ce lieu ; cette seconde espece est celle dont on se sert communément pour l'usage intérieur : elle a un goût plus âcre que celle de Chio. La troisieme espece s'appelle térébenthine de Strasbourg , térébenthine de Sabine , *terebinthina argentoratensis* , *abietina* , elle est plus liquide , plus amere , plus âcre que les autres especes ; elle découle du sapin qui s'appelle *abies tax folio fructu sursum spectante* , on la tire de Strasbourg , d'où lui est venu le nom de térébenthine de Strasbourg. La quatrieme espece s'appelle *terebinthina communis* , ou *resina pinea* ; elle découle des pins sauvages : elle est beaucoup plus amere & plus épaisse que toutes les autres , on ne s'en sert pas intérieurement ; la plus usitée , comme nous avons dit , est celle de Venise ou de Mélese , dont l'odeur est assez pénétrante , le goût amer , âcre ; on la choisit autant qu'il est possible , liquide , transparente , la plus blanche ou la moins jaunâtre.

Cas.

ON l'emploie avec succès dans les suppressions d'urine , produites par des matieres glaireuses , ou par des graviers contenus dans les reins , dans les maladies des voies urinaires occasionnées par des exulcérations , pourvu cependant que les ulceres soient fordides , ce qu'on connoît lorsque les urines sont fétides , jaunâtres , séreuses , & que le malade ne ressent pas une douleur vive à la partie que l'on soupçonne être ulcérée ; dans l'asthme piteux , dans les fleurs blanches des femmes , pourvu cependant qu'elles dépendent du relâchement des organes sécrétoires de

l'humeur qui est semblable à l'humeur prostatique , & que cette humeur ne soit pas âcre , & ne cause point d'excoriation aux parties voisines dans les femmes d'un tempérament pituiteux ; dans les gonorrhées , en faisant les mêmes attentions ; dans les dyssenteries purulentes , ou plutôt dans l'ulcère des intestins , lorsqu'après l'inflammation des intestins qui a précédé , les malades rendent les matieres blanchâtres , mêlées avec les excréments , pourvu cependant que la fièvre ne soit pas beaucoup allumée , & que les malades ne soient pas d'un tempérament chaud , on s'en sert alors en lavement. Quelques Auteurs la prescrivent dans la phthisie ou dans l'exulcération des poudrons , mais elle est beaucoup moins sûre que dans celle des voies urinaires ; elle est même souvent pernicieuse , parce que tout ce qui irrite augmente le mal ; cependant si les ulcères étoient fœdés , ce qu'on connoît par les matieres rejetées par l'expectoration , qui sont épaisses & fœdés , si en même tems les malades étoient d'un tempérament lâche & pituiteux , & dans l'absence des symptômes qui dénotent la fougue du sang , on pourroit s'en servir au défaut d'un baume plus doux : on s'en sert aussi dans la goutte , dans les maladies des articulations , à cause de l'affinité qu'il y a entre la matiere de la goutte & celle du calcul ; affinité qui est telle qu'une de celle de ces maladies prend souvent la place d'une autre ; mais pour s'en servir dans ce cas-là il faut qu'on ne craigne pas d'échauffer , qu'il n'y ait pas beaucoup d'ardeur. *Rivieri* la recommançoit pour prévenir les calculs chez ceux qui étoient sujets à la néphrétique causée par des embarras calculeux. Quelques Auteurs de ~~ce genre~~ ^{calculation} ont remarqué qu'elle étoit nuisible à l'estomac lorsqu'il est foible , sur-tout dans les personnes délicates , les femmes hystériques , à cause de la grande irritabilité des fibres de l'estomac ; mais si cette foiblesse dépendoit uniquement du relâchement des solides & de l'épaississement des fluides , elle ne souffriroit pas alors les mêmes inconvénients. On a aussi observé que la térébenthine donnée à trop haute dose produit le diabète , & de plus , qu'employée avec peu de circonspection dans les maladies des voies urinaires , elle cause souvent des inflammations.

Vertus.

C'EST un diurétique chaud , fondant , stimulant , tonique , apéritif , détersif , donné à la dose de demi-once , elle est purgative , mais il est rare qu'on l'emploie à présent pour cette fin.

Maniere de s'en servir , Doses.

LA dose de térébenthine comme diurétique , est depuis demi-drachme jusqu'à un gros , comme purgative depuis un gros jusqu'à trois. On la donne ordinairement dissoute dans un jaune d'œuf ; on peut aussi la joindre avec la réglisse & en former une poudre ou un bol , on peut la faire prendre dans le vin ou dans quelque'eau appropriée. Un Médecin Allemand qui s'en est beaucoup servi , l'employoit de cette façon : il prenoit un gros & demi de térébenthine , la broyoit avec un jaune d'œuf dans un mortier & y versoit peu-à-peu quelque'eau appropriée , comme celle d'ache ou de persil pour chasser les graviers des voies urinaires , ou d'eau d'orge pour déterger les ulcères ; par-là il lui donnoit une couleur blanche , en rendoit le goût moins désagréable & en formoit une espece d'émulsion ; dans les fleurs blanches on prend un gros de térébenthine , quinze ou vingt grains de rhubarbe ou quelque'autre astringent , & on fait des bols avec le sirop de roses ou quelque'autre sirop approprié ; dans la dysenterie purulente on l'ordonne en lavement ; on prend demi-once de térébenthine dissoute dans un jaune d'œuf , une once de miel rosat , huit onces de lait de vache pour un lavement , on le réitere deux fois le jour : on se sert encore en Médecine de l'esprit de térébenthine & de son huile qu'on prépare de cette maniere : on prend la quantité semblable de térébenthine récente de Venise , nette & transparente , on la distille dans une cornue de verre dont on remplit seulement la troisieme partie ; au premier feu qui est très-doux , il s'éleve une huile éthérée & subtile , c'est ce qu'on appelle esprit de térébenthine : en augmentant le feu peu à peu , il sort une huile jaune , ensuite roussâtre & un peu plus épaisse , on l'appelle simplement huile de térébenthine ; la masse solide & rougeâtre qui reste au fond de la cornue , s'appelle colophone ou colophane : on emploie intérieurement l'esprit de térébenthine : il est plus actif que la térébenthine & pousse davantage par les urines : la dose est depuis cinq gouttes jusqu'à quinze ou vingt dans le vin ou quelque'autre liqueur appropriée , ou autre diurétique , on peut l'employer aussi extérieurement. On ne se sert gueres de l'huile de térébenthine intérieurement , on la regarde comme spécifique dans la piquure des tendons , des nerfs ; on la fait couler toute chaude dans les plaies , & elle calme assez promptement les douleurs ; la térébenthine donne l'odeur des violettes aux urines.

Pharmacologie Rationnelle.

ELLE nous apprend que la vertu de la térébenthine réside dans ses parties spiritueuses & volatiles, dans cette huile fine & éthérée qu'on retire la première par la distillation.

Baume de Copahu, Balsamum de Copaïba, Balsamum brasiliense.

C'EST un suc résineux assez liquide, jaunâtre, d'un goût amer & aromatique, d'une odeur pénétrante & agréable, qui découle naturellement par incision d'un arbre qu'on trouve communément dans les forêts du Brésil, qui s'appelle *arbor Balsamifera Brasiliensis fructu monosperure* ou *Copalyva*. On trouve dans les boutiques deux espèces de suc, l'un plus limpide, jaunâtre, d'un odeur agréable, d'un goût amer, c'est la meilleure espèce & celle dont on doit se servir; l'autre est plus grossier, blanchâtre & moins limpide, de la consistance du miel, il est moins odorant, d'un goût désagréable; on rejette cette dernière espèce, comme étant falsifiée ou du moins vieille; on se sert aussi de l'huile éthérée du baume de *Copahu*.

Cas.

LE baume de *Copahu* convient dans les mêmes cas que la Térébenthine, mais il est un peu plus actif: on le regarde comme un excellent remède contre les maladies des reins qui empêchent la libre sécrétion de l'urine; dans les exulcérations des voies urinaires, sur-tout dans la Gonorrhée principalement; dans d'autres affections, comme les dysenteries invétérées entretenues par des ulcères des intestins qu'ont précédé l'inflammation, dans le cas des flux de ventre séreux qui dépendent du relâchement des glandes des intestins, dans des tempéraments cacochymes. M. Fuller assure l'avoir donné avec succès dans l'asthme humide dans des cas de tubercules des poumons, dans des toux opiniâtres & dangereuses qui menaçoient visiblement de la phthisie; on l'emploie aussi dans les fleurs blanches, dans la goutte vraisemblablement, parce que la matière de la goutte est analogue à celle du calcul, & que le baume est propre à fondre les matières épaisses & tenaces en donnant du ton aux vaisseaux; dans le cas de foiblesse d'estomac lorsqu'elle dépend des matières glaireuses dont ses parois sont enduits; dans les affections scorbutiques, lorsque le sang circule avec peine dans ses vaisseaux, sur-tout

lorsqu'il paroît tendre à la pourriture, ce qu'on connoît par la lenteur du pouls, les lassitudes, le sang qui sort quelquefois des gencives & les ulceres puants qui viennent à la bouche : voilà les cas généraux où l'on emploie le baume de *Copahu* avec succès. Mais comme parmi ces cas, il s'en trouve quelques-uns qui sont énoncés d'une manière trop générale dans les Auteurs, il est à propos de faire ici quelques réflexions, & d'indiquer les précautions qu'il faut prendre pour éviter les inconvénients qui pourroient suivre de l'usage inconsidéré de ces remèdes. 1°. Il est certain qu'on peut employer le baume de *Copahu* dans l'asthme humide, pourvu qu'il se trouve dans des tempéraments vraiment pituiteux où les solides sont relâchés & les fluides visqueux ; mais il faut prendre garde que tous ceux qui paroissent avoir une asthme humide, n'en sont pas véritablement atteints, par exemple, on voit bien des hystériques, des hypochondriaques, sur-tout dans les pays chauds, qui crachent beaucoup sans avoir un asthme humide : cela vient de ce que le sang de ces personnes se trouvant extrêmement desséché, soit à cause des grandes chaleurs, soit à cause de leur tempérament, la sérosité ne peut se mêler avec & est rejetée par la voie de l'expectoration, ce qui peut en imposer. Le baume de *Copahu* ne pourroit que nuire à ces personnes qui ont les solides tendus & très-susceptibles d'irritation, & dont le sang n'est déjà que trop appauvri de sérosité. 2°. M. *Fueller* prétend avoir guéri des Tubercules des poulmons par le moyen de ce baume ; pour être assuré de ce fait, il faudroit l'être de l'existence des tubercules, lorsqu'on a administré ce baume, & c'est ce qui n'est pas bien aisé. Le signe qu'on donne de ces tubercules, sont une toux sèche & opiniâtre & une difficulté habituelle de respirer qui augmente à mesure de l'exercice qu'on fait, comme par exemple, en montant quelque escalier : or ces signes peuvent se trouver dans un sujet, sans qu'il y ait pour cela des tubercules aux poulmons. D'ailleurs quand on seroit assuré de l'existence des tubercules, on ne pourroit se servir indifféremment du baume de *Copahu* dans toute sorte de tubercules ; il faut en distinguer deux espèces bien différentes, car ou les tubercules sont des tumeurs schirreuses des glandes bronchiques produites par une lymphe desséchée qui a un caractère d'âcreté, ce qui arrive dans les tempéraments secs, & pour lors le baume de *Copahu* seroit pernicieux ; ou les tubercules sont des tumeurs causées par des humeurs épaisses & visqueuses qui engorgent les glandes bronchiques, ce qui arrive dans des sujets cacochymiques, d'un tempérament pituiteux, & c'est dans ce cas qu'on peut employer utilement

le baume de *Copahu*. 3°. On l'emploie aussi dans les exulcérations des voies urinaires ; mais il faut faire ici les mêmes réflexions que nous avons déjà faites en parlant de la térébenthine , c'est-à-dire , qu'on ne doit se servir de ce baume que lorsque les ulcères sont fongueux , ce qu'on connoît par les urines fétides , jaunâtres , séreuses , & parce que le malade ne ressent pas une douleur vive aux parties ulcérées , en un mot lorsque les malades sont d'un tempérament pituiteux , qu'ils ont les solides relâchés , & qu'on ne craint point d'irriter : on a vu arriver des suppressions d'urine & l'augmentation des symptômes , lorsqu'on a négligé ces précautions. 4°. On ordonne aussi le baume de *Copahu* sur la fin des gonorrhées virulentes qui sont un flux ou un écoulement d'humeur tantôt blanchâtre , tantôt verdâtre , tantôt jaunâtre , par le canal de l'uretre , occasionné par un virus vérolé ; ce qui porte à cette pratique , c'est que d'une part on prend pour fait certain que la gonorrhée dépend toujours d'une inflammation qui s'est changée en ulcère , & que de l'autre on fait que le baume de *Copahu* est un très-bon vulnéraire cicatrisant , détersif ; c'est ce qui fait qu'on l'ordonne à la fin du traitement de la gonorrhée ; les plus sages cependant qui suivent cette pratique , attendent que la matière ait changé de couleur , qu'elle soit blanchâtre & que l'ardeur d'urine ait cessé , mais c'est sans fondement qu'on s'imagine que la gonorrhée dépend toujours d'un ulcère : on peut croire que les fluides qui sont contenus dans les glandes qui sont répandues en quantité dans le canal de l'uretre , que ces fluides , dis-je , sont irrités & viciés par le virus vérolé , sans qu'il y ait aucun ulcère ; cela se pourroit prouver par analogie , par les médicaments errhins , qui en irritant la membrane pituitaire , produisent une plus abondante excrétion de pituite , que par son séjour dans les glandes de cette membrane elle acquiert une couleur jaunâtre ou même verdâtre ; en sorte qu'étant rejetée quelquefois par la bouche , elle pourroit en imposer pour des matières purulentes qui seroient rejetées des poulmons ; cependant dans ce cas , cette excrétion ne suppose aucun ulcère , ni dans les poulmons , ni dans la membrane pituitaire. Or il arrive très-souvent que la gonorrhée vers la fin diminue beaucoup , & cependant on remarque que dans ce cas où l'excrétion est moindre , plus cette excrétion est rare , plus la matière ou les humeurs changent de couleur , devenant plus colorées à proportion qu'il y a plus de temps entre les excréments ; de ce que nous venons de dire , nous pouvons conclure par analogie que la gonorrhée , du moins dans bien des cas , est une espèce de rhume ou de coriza , comme l'on dit vulgairement , &

qu'ainsi il ne faut pas toujours soupçonner un ulcere dans la gonorrhée. *M. de la Mure* a guéri quantité de gonorrhées par l'usage du lait & sans avoir recours à aucune sorte de baume , après avoir fait précéder les saignées , les bains & les frictions mercurielles. On ne prétend pas cependant nier qu'il ne se forme quelquefois des ulceres , ce seroit même en vain qu'on le prétendrait , puisqu'il arrive quelquefois que les matieres sont fanguinolentes , cela peut venir de ce que la gonorrhée a été négligée ou maltraitée ; mais en supposant qu'il y ait des ulceres , l'usage du baume est inutile , du moins dans le temps où les plus sages s'en servent , c'est-à-dire , lorsqu'ils sont déjà détergés & que la matiere de l'écoulement est louable , ces ulceres se guérissent alors d'eux-mêmes : bien plus les baumes dans ce cas-là sont très-nuisibles , parce qu'ils peuvent irriter & occasionner de nouveaux ulceres : ici l'expérience est d'accord avec la raison , si on permet dans ces circonstances l'usage des baumes aux malades , on voit augmenter les symptomes ; c'est de quoi *M. de la Mure* a été témoin. Une personne qui s'impatientoit de voir couler si longtemps prit du baume de *Copahu* avec du lait , dès-lors tous les symptomes augmentèrent , les bourses se gonflèrent & la personne fut obligée de passer par les grands remedes : c'est encore ce qui arrive très-souvent lorsqu'on emploie ce baume dans pareilles circonstances ; aussi *M. Daran* avoue-t-il que ce qui faisoit un de ses meilleurs revenus étoit l'usage de ce baume ; cet usage ne peut être permis que lorsque les ulceres sont sordides , & que la matiere qui coule est puante , fétide , &c.

Vertus.

C'EST un excellent diurétique chaud , apéritif , fondant par rapport à son aiguillon qui se fait sentir sur les solides , un bon détersif , tonique , vulnéraire , non-seulement dans les ulceres externes , mais encore dans ceux des reins , de la vessie , mais encore dans ceux des poumons , par conséquent béchique chaud , antiseptique , propre à prévenir la corruption , comme dans les affections scorbutiques ; il peut même être regardé comme purgatif donné depuis deux gros jusqu'à trois , mais on ne l'emploie pas comme purgatif.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON l'emploie de la même façon que la térébenthine , depuis dix gouttes jusqu'à seize & vingt dans un jaune d'œuf , on l'incorpore avec la pou-
dre

dre de réglisse ; dans les fleurs blanches on l'associe avec la rhubarbe ou quelqu'autre astringent ; dans la dysenterie on le donne à double dose en lavement , & on l'associe au miel rosat , comme nous l'avons dit de la térébenthine ; dans l'asthme humide on prend demi-once de baume de *Copahu* , un jaune d'œuf , sirop de lierre terrestre deux onces , on délaye le tout dans huit onces de bon vin , & on en donne une cuillerée le matin & le soir ; dans le cas d'ulcère de la poitrine , des reins , des intestins , on peut le donner en guise d'émulsion ; par exemple , on prend vingt ou trentes gouttes de baume de *Copahu* qu'on broie dans un mortier avec un jaune d'œuf , y versant peu-à-peu quelque'eau appropriée , à la dose de six ou sept onces ; on se sert encore de l'huile éthérée du baume de *Copahu* , dont la dose est depuis deux jusqu'à sept ou huit gouttes. *M. Hoffman* en parle beaucoup : il prétend qu'en mêlant cette huile avec la graisse humaine , on en fait un liniment très-propre pour les douleurs des articulations , les paralysies ; avec cette huile éthérée dissoute par la teinture du tartre , & une liqueur acide ou le nitre dulcifié , on fait un remède très-estimé dans le cas où la coction est lésée par des glaires contenues dans l'estomac , dans le flux de ventre fereux : on prend une partie de cette huile & vingt-quatre de sucre pour former ce *cleozaccarum* , la dose en est depuis un scrupule jusqu'à deux , on l'ordonne avec un peu de vin vieux ou de vin d'Espagne , la vertu du baume de *Copahu* réside dans l'huile éthérée dont nous venons de parler.

Diurétiques chauds tirés du regne animal.

LE regne animal nous fournit encore des Diurétiques chauds ; nous parlerons ici des Cloportes , des Crapauds , des Vers de terre , des Limaçons & des Ecrevisses de rivière.

Les Cloportes.

LES Cloportes sont de petits animaux terrestres qui ont plusieurs pieds , longs d'un travers de doigt , larges à proportion , un peu plats , ayant la partie supérieure ou le dos un peu cendré , le ventre ou la partie inférieure blanchâtre ; il y en a de deux espèces , les domestiques & les sauvages ; les domestiques se trouvent dans les caves , dans les lieux humides ; les sauvages se trouvent dans les fentes des rochers : on préfère pour l'usage , les cloportes domestiques , parce qu'ils sont plus gros & mieux

nourris ; on dit que quand on les touche , ils se ramassent en pelotons ; cela n'arrive pas toujours ; on les connoît sous le nom de *centipedes* , *multipedes* , *afelli porcelliones* , cloportes.

Cas.

LES Cloportes donnent un remede diurétique chaud , il n'est pas fort actif , mais fort usité : on s'en sert avec succès dans les enflures , soit générales , soit particulieres , c'est-à-dire , dans la leucophlegmatie , l'anasarque , l'hydropisie ascite , l'hydropisie de poitrine , en un mot dans le cas où le sang est surchargé de sérosités & où les vaisseaux sont foibles , dans les obstructions du foie , de la rate , & ce qui est particulier à ce diurétique chaud , non-seulement dans les obstructions produites par des humeurs visqueuses & tenaces , mais même dans celles qui dépendent d'une lymphe épaissie par sécheresse , comme dans les obstructions qui se rencontrent dans les mélancholiques , dans l'ictère froid qui dépend d'une bile épaissie , dans les obstructions des poudons où l'on soupçonne que les glandes pulmonaires ou bronchiques sont engorgées , soit par une lymphe seche , & tournant même vers l'acre dans les embarras des glandes qui dépendent d'un vice scrophuleux : il y en a où la lymphe conserve encore une certaine fluidité , & d'autres au contraire où les tumeurs sont très-dures & schirreuses ; les cloportes conviennent principalement dans le premier cas ; on peut cependant s'en servir aussi dans le second , en les joignant aux délayants , aux adoucissants , dans l'asthme humide , dans l'asthme sec produit par des tubercules. De célèbres Auteurs prétendent qu'il n'y a point de meilleur remede pour diviser la lymphe dans ce dernier cas ; dans les suppressions d'urine qui dépendent des matieres graveleuses , dans le cas de scorbut froid où le sang est épaissi , & son mouvement ralenti , en sorte que la sérosité s'en sépare avec peine , dans la cataracte commençante.

Vertus.

ILS ont une vertu diurétique chaude , apéritive , tonique , mais dans un degré moins éminent que les autres diurétiques dont nous avons parlé jusqu'à présent , ce qui fait qu'on peut les employer plus hardiment.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON ordonne les Cloportes de différentes façons , soit desséchées au four à une douce chaleur ou autrement , soit vivantes ; on en donne

aussi le fuc. Si on les ordonne desséchées , on les réduit en poudre , dont la dose est depuis quinze grains jusqu'à vingt-cinq ou trente dans les cas d'enflures : on peut donner cette poudre dans la première cuillerée d'un bouillon approprié , ou la joindre aux poudres des racines apéritives , & en faire des bols avec le sirop de lierre terrestre ; on ne doit se servir de la terre des cloportes que lorsqu'on ne peut pas en avoir des vivants , parce que leur vertu réside dans un principe salin extrêmement volatil. Les cloportes vivants s'ordonnent par nombre de cette manière : on prend dix ou vingt ou même trente cloportes si on ne craint pas d'échauffer , on les lave dans de l'eau commune , ou ce qui est mieux dans le vin blanc , on les concasse & on les ajoute aux bouillons apéritifs & diurétiques sur la fin de la cuisson , un demi-quart d'heure avant que de retirer le bouillon du feu , parce que si on les laissoit bouillir trop longtemps , ils perdroient leur vertu , & on a soin de mettre un papier autour du pot sous la couverture , pour empêcher que rien ne s'évapore : on ordonne ces bouillons dans les obstructions des viscères. On les associe aussi au petit lait lorsqu'on craint d'échauffer , & que cependant les embarras exigent qu'on divise la lymphe , comme dans les cas des tubercules des poulmons , de passion hypocondriaque : alors on prépare le petit lait à l'ordinaire avec la crème de tartre ou pressure ; pendant la clarification qui se fait avec le blanc d'œuf , on y ajoute dix ou douze cloportes & on passe le tout avec expression : on se sert du fuc des cloportes principalement dans l'hydropisie , dans l'ictère froid , dans l'asthme humide ; on lave les cloportes , on les concasse , & on exprime le fuc qu'on fait prendre au malade : on peut encore en faire une espèce d'émulsion avec le vin blanc ou le fuc d'ache ou de cerfeuil dans les obstructions du foie , dans les embarras des viscères du bas-ventre. M. de la Mure s'en est servi avec succès dans ce cas-là ; en le joignant à une once de cerfeuil qu'il faisoit prendre matin & soir pendant quinze jours , les obstructions se dissipèrent entièrement ; mais comme le malade étoit scrophuleux , la matière se mêla avec la masse du sang & se porta vers les glandes du col. Il y en a qui ordonnent de les avaler en substance , après les avoir lavés & concassés au nombre de huit , dans le cas de schirre qui tourne vers le cancer.

Pharmacologie rationnelle.

LES cloportes contiennent beaucoup de sel volatil , nitreux , ce qui est prouvé par les lieux où on les trouve , savoir , les caves , les en-

droits humides où il se trouve ordinairement beaucoup de nître.

Le Crapaud.

ON se sert de la poudre de crapaud , on fait dessécher les crapauds au four , & même on les fait rotir dans un pot , & on les réduit en poudre dont on se sert dans les mêmes cas où on emploie les cloportes ; mais il faut prendre garde que ce remède est beaucoup plus actif & plus échauffant , ainsi il ne convient pas dans le même cas où la lymphe est épaissie par sécheresse : on les recommande dans l'hydropisie , l'enflure. Un Médecin Romain rapporte un trait bien marqué de son efficacité dans pareil cas ; une femme dont le mari étoit hydropique depuis assez long-temps , s'ennuyant de cet état , & ne pouvant d'ailleurs fournir à la dépense , s'avisa de prendre un crapaud qu'elle savoit être vénimeux , elle le fit torréfier , le réduisit en poudre & le donna à son mari dans la vue de s'en défaire , mais contre son attente , il fut vidué considérablement par les urines , & se trouva soulagé ; elle répéta la dose & l'augmenta , mais le mari fut encore mieux vidué , & se trouva très-bien au grand déplaisir de sa femme ; la dose de la poudre de crapaud est depuis dix grains jusqu'à vingt ou vingt-quatre.

Les Vers de terre , Lumbrici terrestres.

ILS sont connus de tout le monde , ainsi nous n'en ferons pas ici la description.

Cas.

ILS sont recommandés dans la jaunisse , dans les embarras des reins & des autres viscères du bas-ventre , dans l'hydropisie , dans l'asthme humide , en un mot dans les cas où l'on emploie les cloportes.

Vertus.

C'EST un médicament diurétique chaud , apéritif , tonique , mais moins énergique que les cloportes ; on peut s'en servir au défaut de ceux-ci.

Manière de s'en servir , Doses.

ON les donne en poudre ou en substance ; pour les donner en poudre , on les lave , on les fait sécher au four & on les réduit en poudre , dont

la dose est depuis dix grains jusqu'à vingt-cinq dans le vin blanc , ou bien on en fait un bol en l'incorporant avec le sirop des cinq racines apéritives : si on veut les donner en substance , on prend une once pesant de vers de terre vivants , on les lave , on les pile dans un mortier , & en les pilant on y verse peu-à-peu du vin blanc , ou de la décoction d'orge , ou de quelqu'aurre liqueur appropriée , on coule , & on fait prendre ce médicament dans le cas d'hydropisie ; la vertu de ce médicament réside dans un sel extrêmement volatil , de même que celle des cloportes.

Les Ecrevisses , Gammari astaci , Cancri fluviatiles.

ON les emploie avec succès dans les mêmes cas que les cloportes , dans le cas d'enflure avec relâchement , dans la leucophlegmatie , l'hydropisie , dans la phthisie commençante , produite par des tubercules pour diviser le sang , lorsque le sang est épaissi par la sécheresse , comme chez les hystériques , les hypocondriaques , dans le cas de scorbut accompagné d'un caractère de viscosité & d'acrimonie , dans lequel il survient des taches à la peau , dans les maladies de la peau , dans le relâchement de l'estomac pour le fortifier.

Vertus.

LES Ecrevisses donnent un médicament diurétique chaud , apéritif , diaphorétique léger ; l'expérience montre qu'elles sont un peu plus actives & plus échauffantes que les cloportes : ainsi dans le cas des tubercules des poudrons produits par sécheresse , dans les tempéraments ardents & bilieux lorsque les solides sont tendus , en un mot toutes les fois qu'on craint d'échauffer , il vaut mieux se servir des cloportes.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON les ordonne ou en substance , vivantes ou en poudre : on les réduit en poudre après les avoir desséchées au four , renfermées dans un pot bien couvert ; la dose de cette poudre est depuis quinze grains jusqu'à demi-gros : on peut l'associer aux autres médicaments apéritifs & en former des bols , cette poudre est plus diurétique. En substance on les ordonne par nombre depuis deux jusqu'à quatre ou six si elles sont petites & qu'on veuille en faire le principal médicament ; dans le cas de passion hystérique ou hypocondriaque , on ne va pas au delà de deux ou trois ; on les fait étouffer dans le lait bouillant ou dans l'eau bouil-

lante , après quoi on les écrase grossièrement & on les ajoute aux bouillons apéritifs sur la fin de la coction , c'est-à-dire , un quart-d'heure avant de retirer le bouillon du feu , ayant soin de couvrir exactement , comme nous avons remarqué qu'on le pratiquoit à l'égard des cloportes. Dans les cas d'hydropisie ou d'obstructions des viscères du bas-ventre produites par des humeurs visqueuses , on prend des écrevisses vivantes , on les écrase dans un mortier , on ajoute du vin blanc , ou le suc de la décoction d'orge , on coule le tout pour le faire prendre au malade. On se sert aussi des écailles d'écrevisses qu'on appelle tortues desséchées & pulvérisées : on se sert pareillement de petites pierres qui se trouvent sous leur ventre , connues sous le nom d'*oculi cancrorum* ; elles sont absorbantes , nous en parlerons ailleurs.

Diurétiques chauds fournis par le regne minéral , & par quelques préparations chymiques.

ON peut ranger sous cette classe la chaux , le sel ammoniac , les sels neutres , comme le sel marin , le sel gemme , le sel végétal , les ~~quatre~~ sels d'epsom , les sels alkalis fixes , le sel admirable de *Glauber* , le tartre vitriolé , nous avons déjà parlé ailleurs du sel végétal & du sel d'epsom. La chaux est un diurétique chaud très-propre à prévenir la pierre & à fondre les graviers , nous en parlerons à la classe des lithontriptiques ; le sel ammoniac est un diurétique chaud , regardé comme un spécifique dans les fièvres intermittentes , nous en parlerons à la classe des fébrifuges.

les alkalis fixes.
Sel gemme , Sel marin.

EN parlant du sel végétal , du sel d'epsom , nous avons indiqué les propriétés essentielles du sel acide , soit du sel alkali , soit du sel neutre , nous ne les répéterons pas ici ; il nous suffira de remarquer qu'il y a deux especes de sels alkalis , le volatil & le fixe. L'alkali volatil se retire des plantes par une chaleur qui n'excede pas celle de l'eau bouillante , l'alkali fixe réside à la plus grande action du feu & en est ordinairement l'effet : quant à la composition des sels alkalis fixes , les plus habiles chymistes croient qu'ils sont composés d'un acide & d'une terre mêlée avec le phlogistique ; nous n'entrerons pas dans cet examen , il suffit de connoître leurs effets ; les sels alkalis fixes sont regardés comme spécifiques dans le cas de cachexie , lorsque la sérosité abonde & que les solides sont relâchés dans la leucophlegmatie , l'hydropisie ; ils poussent fortement par les urines , & donnent un peu plus de ton aux soli-

des. M. *Sydenham* remarque qu'il y a dans certains sujets attaqués d'hydropisie un abattement de forces qui ne peut soutenir l'action des purgatifs hydragogues ni des émétiques. On ne peut non plus se servir des émétiques ni des purgatifs hydragogues dans les femmes hystériques & les hypocondriatiques, lorsqu'il survient des hydropisies, ce qui est assez ordinaire : dans ces deux cas M. *Sydenham* conseille l'usage des diurétiques chauds, parmi lesquels les sels alkalis fixes sont des plus efficaces. Tous ont les mêmes propriétés, en sorte qu'on pourroit se servir indifféremment d'un sel alkali fixe quelconque ; cependant l'usage paroît en avoir consacré certains dans pareil cas par préférence aux autres ; c'est d'après les préjugés que M. *Sydenham* employoit avec succès dans les deux cas que nous avons déjà indiqués, le sel alkali de genet de cette maniere ; il prenoit une livre de cendre de genet qu'il faisoit infuser pendant la nuit dans quatre livres de vin blanc ou de vin du Rhin ; il couloit cette infusion & en faisoit prendre au malade quatre onces le matin & quatre le soir vers les cinq heures & autant sur les neuf heures, ce qu'il continuoît jusqu'à ce que les eaux fussent entièrement évacuées ; c'est par ce moyen que M. le Maréchal de Saxe fut guéri d'une hydropisie, ce qui a remis ce remède en vogue : il faut cependant remarquer qu'il chauffe ainsi que tous les autres sels alkalis, & qu'il ne réussit pas toujours, ce qui peut venir de la maniere dont on fait l'infusion. Nous avons dit que M. *Sydenham* le faisoit dans du vin blanc, & sur-tout du Rhin qui est chargé de parties tartareuses très-pures, qui s'unissant avec le sel alkali fixe de genet, font qu'il agit commé une espece de sel neutre, c'est vraisemblablement à cette union qu'il faut attribuer ces bons effets que M. *Sydenham* a remarqué, au lieu que ce même sel & les cendres de genet dissoutes dans l'eau, comme on le pratique ordinairement dans ce pays-ci, agissent comme le sel alkali fixe simplement en chauffant & ne produisent pas le même effet : il est donc plus sûr de faire infuser les cendres de genet dans du vin blanc & même dans celui du Rhin lorsqu'on peut en avoir.

Le Sel admirable de Glauber.

Le sel admirable de *Glauber* qui est une espece de sel neutre, n'est autre chose qu'une combinaison de la base du sel marin avec l'acide vi-triolique ; on le prépare de cette maniere : on met trois parties de sel marin décrépité dans un creuset, on verse dessus une partie d'huile de vi-

triol ; on laisse évaporer l'esprit de vitriol , on voit s'élever des parties blanchâtres extrêmement caustiques qu'on doit éviter , alors on trouve au fonds du creuset une masse qui n'est autre chose que l'acide vitriolique uni à la terre alkaline du sel marin : on fait calciner cette masse & on pousse le feu jusqu'à ce que la matiere soit entièrement en fusion ; on fait ensuite dissoudre ce sel dans l'eau bouillante , on filtre , on évapore jusqu'à pellicule , on fait cristalliser , il se forme de beaux cristaux , c'est le sel admirable de *Glauber* ; ce sel convient principalement dans l'hydro-pisie , l'anasarque , la leucophlegmatie , la cachexie où la sérosité abonde , & où les solides sont relâchés , lorsque les purgatifs n'ont pas réussi dans les obstructions du foie , de la rate entretenues par une matiere visqueuse , tenace , dans l'ictère froid , dans les fievres intermittentes qui dépendent d'une bile épaisse & visqueuse.

Vertus.

LE sel de *Glauber* est propre à atténuer les humeurs visqueuses & tenaces , à pousser par les urines & à donner du ton aux solides ; mais il chauffe beaucoup , sur-tout lorsqu'il n'est pas bien préparé.

Maniere de s'en servir, Doses.

GLAUBER l'ordonnoit depuis deux gros jusqu'à une once ; aujourd'hui on ne l'ordonne que depuis un scrupule jusqu'à demi-gros ou deux gros tout au plus. *M. Fixes* ; célèbre Praticien de cette ville , en ayant donné seulement vingt grains mit son malade en feu. Cela dépend de la maniere dont on le prépare différente de celle de *Glauber* ; c'est pourquoi on doit avoir beaucoup de ménagement dans son usage , parce que les uns le calcinent plus , les autres moins , & cela change beaucoup sa force : si on étoit assuré de l'habileté de l'artiste , on pourroit pousser la dose jusqu'à trois gros : on l'ordonne dans les apozemes diurétiques , dans les apozemes fébrifuges à la dose d'un gros & demi. On peut l'ordonner seul dans l'ictère froid à la dose de deux gros dissout dans une chopine d'eau dégoûrdie au bain-marie , qu'on fait prendre par verrées de deux en deux heures ; *M. Sydobre* s'est bien trouvé de le donner de cette maniere en pareil cas.

Le Tartre vitriolé.

C'EST encore un sel neutre qui differe du sel de *Glauber* par sa base & ses propriétés : on se sert de Tartre par défaillance , qu'on
souple

soude d'acide vitriolique , ce sel se dissout difficilement dans l'eau froide ; ainsi on doit l'ordonner dans l'eau chaude : on peut le substituer au sel de *Glauber* , il a les mêmes vertus , il convient dans les mêmes cas ; la dose en est la même.

Diurétiques froids.

LES Diurétiques froids sont ceux qui augmentent la sécrétion de l'urine , ou qui déterminent une plus grande quantité d'humeurs vers les couloirs des reins , sans augmenter sensiblement la chaleur , ou même souvent en la diminuant : ils nous sont fournis par le regne végétal & par le regne minéral ; nous allons commencer par les végétaux.

Les Diurétiques froids pris du regne végétal.

Chicorée sauvage , Chicorium. sylvestre.

LA racine de cette plante est assez longue , épaisse , fibreuse , blanche en dedans : si on y fait une incision lorsqu'elle est récente , il en découle un suc laiteux , un peu styptique & amer : on se sert de la racine & des feuilles de cette plante dans les pîsanes , les apozemes & les bouillons ; on emploie aussi la ^{semence} ~~racine~~ qui est l'une des quatre semences froides mineures dont nous parlerons ailleurs.

Cas.

ON s'en sert avec succès dans l'hydropisie , la leucophlagmatie , l'anasarque , lorsque ces maladies sont accompagnées de chaleur , de fièvre , de toux & d'une grande soif immodérée ; ce qui marque que les eaux épanchées , soit dans le tissu cellulaire , soit dans quelque cavité tendent à la pourriture , dans les fièvres continues où il y a beaucoup d'ardeur , dans les fièvres intermittentes bilieuses , légitimes , comme les anciens les appelloient , qui sont accompagnées d'une grande chaleur & d'une grande soif , dans les obstructions des viscères sur-tout du foie , lorsque les obstructions dépendent du mouvement du sang augmenté , ce qu'on connoît par la chaleur âcre , répandue sur toute l'habitude du corps & par la soif immodérée , dans les maladies qui dépendent de ces obstructions , comme l'ictère chaud , de la suppression d'urine marquée par beaucoup de chaleur & d'ardeur.

Vertus.

DE ce qui vient d'être dit de la chicorée , il suit qu'elle est un diurétique , puisqu'elle détermine une plus grande quantité d'humeurs vers les voies urinaires ; diurétique froid , puisqu'elle produit cet effet sans augmenter sensiblement la chaleur , ou même en ralentissant le mouvement du sang ; apéritive , puisqu'elle emporte les obstructions , mais apéritive froide s'il étoit permis de parler de la sorte , puisqu'elle atténue les matieres sans exciter beaucoup de chaleur , au lieu que les autres apéritifs augmentent beaucoup la chaleur.

Maniere de s'en servir , Doses.

LA Dose de la racine est depuis demi-once jusqu'à une once pour une livre ou une livre & demie d'eau , lorsqu'on l'emploie seule : si on l'associe à quelqu'autre racine ou quelqu'autre plante analogue par la vertu , il faudroit diminuer la dose à proportion ; on emploie les feuilles dans les bouillons qu'on donne dans les fievres continues avec ardeur , dans les fievres intermittentes bilieuses , on ajoute demi-poignée ou une poignée de ces feuilles aux bouillons , qui par ce moyen deviennent tout à la fois alimenteux & médicamenteux ; le suc exprimé , soit de la racine , soit des feuilles de cette plante & dépuré par résidence , s'ordonne depuis deux onces jusqu'à quatre , & on le donne entre les bouillons que le malade prend de quatre en quatre heures ; on se sert du suc dans les mêmes cas où nous avons dit qu'on employoit les feuilles : il y en a qui s'en servent aussi dans les maladies inflammatoires de la poitrine pour faciliter l'expectoration qui est pour lors nécessaire. Il y a beaucoup de personnes qui prennent pour boisson ordinaire une légère décoction ou une infusion de feuilles de chicorée , d'autres en prennent l'infusion le matin seulement en deux verrées , faisant infuser pour cela demi-poignée de feuilles de chicorée dans environ une livre d'eau , l'une & l'autre pratique est utile pour ceux qui sont d'un tempérament bilieux , ardent , sujets à des vomissements qui reviennent tous les matins , pour peu qu'ils se courbent , & qui rendent dans ces occasions des matieres jaunâtres & bilieuses : on peut encore se servir des feuilles de chicorée en salade ; on les hâche assez menues & on les associe à l'ordinaire avec le sel , l'huile & le vinaigre ; cette salade peut être utile dans le cas susdit. M. de la Mure l'a employé avec succès dans une personne à qui une indigestion causée par une grande quantité

d'olives, avoit fait perdre l'appétit : cette personne fut guérie de cette coccidie lésée en mangeant pendant quelques soirs la salade de chicorée.

Pharmacologie Rationnelle.

ELLE ne nous donne pas de grands éclaircissements sur les principes dans lesquels réside la vertu de cette plante ; par l'analyse chimique , on retire de la racine & des feuilles de chicorée d'abord un esprit insipide ou phlegme , qui , en poussant le feu , devient acide ; si on pousse extrêmement le feu , la liqueur devient encore plus acide , mais on ne peut tirer aucune conséquence de cette analyse , parce qu'elle peut être l'ouvrage du feu , & que d'ailleurs elle ne présente pas les principes de cette plante réunis , mais séparés les uns des autres ; il y a lieu de présumer que la vertu de la chicorée réside dans quelques principes volatils qui se dissipent par l'action du feu. On observe que le suc de la racine & des feuilles change la teinture de tournesol en rouge pourpré , ce qui prouve qu'il contient des parties acides.

Oseille , Acetosa.

IL y a deux fortes d'oseille dont on se sert en médecine ; l'oseille ordinaire , *acetosa* ou *oxalis hortensis folio rotundo* , elles ne diffèrent que par la variété de leurs feuilles , ainsi cela ne fait pas deux especes. On emploie la racine & les feuilles dans les mêmes cas que celles de la chicorée , c'est-à-dire , dans l'hydropisie , dans la leucophlegmatie , l'anasarque accompagnée de chaleur , de soif , de la toux , de fièvre , dans les fièvres continues où il y a beaucoup d'ardeur ; voyez le cas où convient la chicorée ci-dessus ; mais il faut remarquer que les feuilles d'oseille sont plus tempérantes & plus adoucissantes que celles de la chicorée , & qu'ainsi il convient de la préférer à ces dernières , dans les cas où il y a beaucoup d'ardeur , comme dans les fièvres ardentes , cependant l'usage veut qu'on les joigne ensemble.

Vertus.

ELLES sont les mêmes que celles de la chicorée sauvage , mais elle a de plus une vertu antiscorbutique , & fournit un bon remède dans le scorbut chaud à *sanguine dissoluto*. La racine de cette plante étant un peu sèche & ayant vieilli pendant quelque temps teint en rouge les bouillons , ce qui fait qu'on appelle bouillons rouges , ceux où elle entre , & les

personnes qui en usent pendant un certain temps , rendent les excréments un peu rouges comme la lavure de chair , tels que dans le flux hépatique , ce qui est bon à remarquer pour ne pas être effrayé par cet accident qu'on voit disparaître en discontinuant l'usage de cette racine. Il faut remarquer aussi que l'acide est beaucoup plus développé dans cette plante que dans la chicorée : on doit s'en abstenir lorsque la poitrine souffre , parce que les acides nuisent à la poitrine , lorsqu'elle est affectée selon l'expérience , on doit alors substituer la chicorée. On ordonne la racine & les feuilles de l'oseille de la même manière & à la même dose que celles de la chicorée. Quelques Auteurs prétendent que le suc d'oseille est très-bon dans les fièvres intermittentes bilieuses , dans les fièvres tierces légitimes & dans les doubles tierces : on en donne cinq ou six onces au commencement de l'accès , après avoir fait les préparations nécessaires. Le suc d'oseille est d'un goût acide manifeste , & donne la couleur de pourpre au papier bleu.

Patience ordinaire sauvage , ou Parelle , Lapathum acutum , sive Oxylapathum.

SA racine est brune en dehors , d'un jaune safrané en dedans : on emploie la racine & les feuilles de cette plante dans les mêmes cas que les précédentes , mais on la préfère aux autres dans les obstructions des femmes hystériques & des hommes hypocondriaques : on s'en sert aussi avec succès dans les éruptions cutanées , comme dans les dartres , les érépèles avec chaleur & démangeaison ; c'est un diurétique froid & apéritif qui agit sans causer beaucoup de chaleur : on donne les racines de cette plante de la même façon & à la même dose que les précédentes ; on les associe même ordinairement , on les fait bouillir une heure & demie , ensuite on y ajoute les feuilles qu'on fait encore bouillir environ un quart d'heure pour les apozemes dans les cas que nous avons ci-devant indiqués.

Althæa , Guimauve , Althæa ibiscus , Bismalva , Malva viscus.

C'EST une plante qui pousse des tiges grêles , cylindriques , velues ou lanugineuses ; les feuilles sont cotonneuses , mollasses & blanches , les racines qui sortent d'une tête sont blanches en dedans , de la grosseur du doigt , fibreuses , divisées en plusieurs branches remplies d'un suc muc-

lagineux & gluant , d'un goût cependant insipide ; en séchant elles se rident : on se sert principalement des racines en médecine.

Cas.

ON emploie la racine de Guimauve avec succès dans les quatre cas suivants : 1°. dans les maladies des reins & de la vessie , telles que la dysurie qui est une difficulté d'uriner , accompagnée de douleur , de chaleur & de cuisson , mais dans laquelle l'urine coule sans interruption , lorsqu'on a commencé à la rendre ; dans la strangurie qui est une envie fréquente & involontaire d'uriner , dans laquelle le malade ne peut rendre l'urine qu'en petite quantité , ou goutte à goutte , avec beaucoup de douleur , de chaleur , de cuisson ; dans l'inflammation des reins , dans les douleurs néphrétiques occasionnées par quelque pierre ou du sable , du gravier , sur-tout dans les tempéraments bilieux , dans les ulcères des reins , de la vessie & des voies urinaires , dans la gonorrhée. 2°. Dans les affections des poumons , comme les catarres ou difficulté de respirer , lorsqu'il y a douleur gravative , que la toux est sèche & que la matière expectorée est en petite quantité , qu'elle est âcre & salée , avec irritation dans les bronches , dans les toux simples , opiniâtres occasionnées par une matière tenace , âcre , & alors on se sert le plus ordinairement du sirop. 3°. Dans le flux de ventre accompagné de chaleur , d'ardeur , d'inflammation , d'érosion des intestins , dans les dysenteries. 4°. Enfin , on s'en sert extérieurement en guise de cataplasme dans le cas où on veut calmer & prévenir l'inflammation , mais nous en parlerons sous ce dernier point de vue , dans la *Matière Médicale* externe.

Vertus.

DE tous les cas où la Guimauve convient , il est aisé de conclure quelles sont ses vertus : c'est un remède adoucissant , pectoral , diurétique froid , béchique , incrassant & émollient.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON se sert de cette racine en substance , en infusion & en décoction , rarement on l'ordonne en substance ; s'il arrive cependant qu'on veuille a prescrire de cette sorte , on la donne en poudre depuis un scrupule usqu'à demi-gros ou un gros associé avec du sucre ; dans les affections

des poulmons & les ulcères des reins , en décoction depuis demi-once jusqu'à une once sur chaque pinte d'eau en infusion , on verse l'eau bouillante sur la racine à la même quantité. Quand on prescrit les racines de guimauve , soit en infusion , soit en décoction , il faut observer de n'en pas trop mettre & de ne pas les faire bouillir trop long-temps , parce que l'infusion ou la décoction seroit trop mucilagineuse & trop visqueuse , elle seroit dégoûtante & chargeroit l'estomac ; c'est pourquoi on ne doit les ajouter que sur la fin de la décoction & les laisser un quart-d'heure seulement. On fait avec la racine de guimauve deux sortes de sirop , l'un simple qui se prépare avec la pulpe passée par le tamis , qu'on fait cuire avec suffisante quantité de sucre ; l'autre composé ou sirop de guimauve de *Fernel* qui se prépare avec les racines d'althæa , de gramin & d'asperge : on se sert de ces sirops principalement dans les affections des poulmons , dans les catarrhes ferreins , & on les ordonne tant l'un que l'autre ou seul par cuillerée de deux en deux heures , ou associés avec des eaux distillées , des décoctions , du petit lait , des émulsions à la dose d'une once.

Pharmacologie rationnelle.

ELLE nous apprend que cette plante contient un mucilage assez épais qui enveloppe un sel acide , qui ne laisse pas cependant de donner des marques de sa présence , par-là on voit assez comment elle agit ; par ses parties mucilagineuses , elle enveloppe les sels de l'urine , en rendant en quelque maniere la mucoité qui a été enlevée des conduits de l'urine & en facilitant la descente & la sortie des graviers ; par son sel acide elle est très-propre à détruire les matieres tendantes à la putridité.

Nymphæa.

LE *Nymphæa* ou Nénuphar est une plante aquatique dont il y a deux especes ; l'une à fleurs blanches qu'on appelle pour cette raison nénuphar blanc d'eau , lys d'étang , *nymphæa alba* ; l'autre à fleurs jaunes appelé nénuphar jaune , jaunet d'eau , plateau à fleurs jaunes , *nymphæa lutea* , *Nenuphar luteum* : on peut se servir indifféremment de ces deux plantes ; mais on emploie le plus communement celles qui sont à fleurs jaunes ; les feuilles en sont larges , soutenues par des grandes queues , rondes , fongueuses ; les fleurs sont grandes , belles , larges quand elles sont épanouies ; la racine est principalement d'usage en médecine , elle est longue , grosse comme le

bras, ayant des nœuds sur son écorce, de couleur brune en dehors, blanche en dedans, charnue, fongueuse, friable; le suc exprimé donne une couleur rouge au papier bleu: on la coupe en long & par tranches assez menues pour la faire sécher.

Cas.

ON emploie la racine de *Nymphaea* dans les mêmes circonstances que celle d'*althæa*: on s'en sert encore avec succès dans les fièvres ardentes où les urines sont en petite quantité & rouges; dans les maladies aiguës avec ardeur: on substitue le sirop qu'on compose avec cette plante aux autres narcotiques, lorsqu'on craint de procurer un relâchement trop subit dans les maladies aiguës, dans les maux de tête avec chaleur & ardeur. Quelques Auteurs prétendent que cette racine a produit de bons effets dans les pertes immodérées des femmes.

Vertus.

ELLES sont à-peu-près les mêmes que celles de l'*althæa*; elle est un peu plus adoucissante & mucilagineuse, rafraîchissante, un peu narcotique; elle calme par sa partie visqueuse, le trop grand mouvement des humeurs.

Maniere de s'en servir, & ses Doses.

ON l'ordonne de la même manière & à la même dose que la précédente dans les bouillons rafraîchissants; dans les gonorrhées, on donne une ptisane composée avec la racine d'*althæa*, de *nymphaea* & de fraiser; la dose en décoction est depuis une once sur une pinte d'eau: on donne le sirop dans les émulsions depuis demi-once jusqu'à une once & demie.

Pharmacologie rationnelle.

CETTE plante contient à-peu-près les mêmes principes que l'*althæa*, mais beaucoup plus de mucilage, ce qui paroît même au goût, la racine est gluante & amère.

*Le Fraiser, *Fragaria*.*

LE Fraiser dont le fruit s'appelle fraise, *fragum*, est une plante qui pousse de sa racine plusieurs pédicules ou queues menues, dont les unes

portent chacune trois feuilles & les autres de fleurs ; la racine qui est principalement d'usage en médecine , est petite , roussâtre , extérieurement fibreuse , d'une saveur astringente.

Cas.

ON l'ordonne dans les mêmes cas que les deux précédentes ; elle convient aussi dans les obstructions du foie , de la rate & dans les maladies qui en dépendent , comme la jaunisse accompagnée d'ardeur , dans les tempéraments bilieux , lorsqu'il faut ouvrir , débarrasser & tempérer en même temps les humeurs.

Vertus.

CETTE racine peut être regardée comme un diurétique froid , apéritif qui convient dans les maladies des hystériques & des hypocondriaques , dans les tempéraments bilieux.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON l'ordonne en infusion & en décoction de la même façon & à la même dose que les racines précédentes ; on l'associe ordinairement avec la racine d'oseille : elle donne aux bouillons la couleur rouge , dont on leur a donné le nom de bouillon rouge ; ceux qui en font un grand usage s'aperçoivent que leurs excréments sont teints en rouge , ce qui pourroit d'abord en imposer pour un flux hépatique , mais en discontinuant ces bouillons , cette couleur disparaît.

Pharmacologie rationnelle.

CETTE racine est mucilagineuse , le suc qui en est exprimé donne au papier bleu une couleur rouge foncée , les parties salines sont moins enveloppées dans cette plante que dans les deux précédentes ; lorsqu'on a en vue principalement d'adoucir , on doit préférer l'althæa ; mais lorsqu'il faut ouvrir & adoucir en même temps , on doit préférer les racines de fraiser. Les semences farineuses , telles que celles de riz & d'orge. Les quatre semences froides majeures , savoir , celles de courge , de melon , de concombre & de citrouille.

Les sucs aigrelets , comme ceux de limon , d'orange & de grenade.

On

On emploie avec succès ces différents remèdes dans les maladies aiguës, comme les fièvres putrides, malignes, marquées d'un caractère d'acrimonie & de dissolution, ce qu'on connoît, 1°. par le tempérament lorsqu'il est bilieux; 2°. par les causes qui ont précédé, comme l'usage des épiceries, les débauches, les exercices immodérés; 3°. par les symptômes actuels, tels qu'un sentiment de chaleur, d'âcreté, une soif presque inextinguible, comme on l'observe dans les fièvres ardentes, dans les fièvres malignes. à dissolution, dans les maladies inflammatoires; il y a deux sortes d'inflammation, l'érépipélateuse & la phlegmoneuse; dans celle-ci le sang est presque dissout, & le malade éprouve un sentiment d'âcreté & une soif presque inextinguible; dans les maladies chroniques où le sang est desséché & âcre parce que les sels sont plus développés, comme dans la passion hypocondriaque & hystérique, dans les affections chroniques où la masse du sang est presque dans la dissolution, comme dans le scorbut chaud; enfin dans les maladies qui paroissent d'abord ne pouvoir souffrir ces remèdes, comme dans l'hydropisie, lorsque la sérosité paroît abonder par-tout, & que les eaux épanchées sont âcres & tendent à la putréfaction, ce qui fait qu'étant repompées dans la masse du sang, elles occasionnent une petite toux qui est ordinairement un mauvais signe. Dans les différents cas où nous venons de voir que conviennent ces remèdes, on peut aisément déduire leurs vertus.

Maniere de s'en servir, Doses.

LA façon d'administrer ces remèdes est différente selon la différence des remèdes, & d'abord pour ce qui regarde les semences farineuses de riz, d'orge, on les emploie comme un remède simplement ou comme un remède alimenteux; comme remède simplement, on les ordonne sous forme de pûsane: on met, par exemple, une cuillerée de riz ou d'orge dans un pot d'eau & on fait bouillir l'orge jusqu'à crepature, on coule cette décoction dont on fait boire au malade. Il faut observer que si on fait cette pûsane avec l'orge, on jette la première eau lorsqu'elle a commencé de bouillir, & on en met de nouvelle, dans laquelle on fait bouillir l'orge jusqu'à crepature. Dans les maladies aiguës avec ardeur les anciens n'employoient point d'autre nourriture que cette eau, à laquelle ils donnoient plus de consistance en la faisant bouillir plus ou moins, selon qu'ils vouloient nourrir les malades, & ils l'appelloient *Cremor*, crème, lorsqu'elle étoit un peu tenue ou qu'elle avoit bouilli un peu plus long-

temps. C'est avec ces ptisanes ou ces crèmes qu'ils nourrissoient les malades, ils ne faisoient pas usage des bouillons comme à présent ; il seroit à souhaiter qu'on pût faire revivre cette ancienne coutume, sur-tout dans les maladies aiguës où les sucs tendent à l'alkalinité, à la putridité, où par conséquent les bouillons sont capables de nuire, étant composés des sucs des animaux qui peuvent aisément se putréfier dans ces circonstances ; il est vrai cependant que dans les cas dont nous parlons, on choisit les viandes des jeunes animaux, qui sont un peu moins sujettes à la putridité, mais qui ne laissent pas d'avoir leur inconvénient, quoique moindre. On les emploie comme alimenteux dans les maladies chroniques, lorsque le sang est dissout & tend à la putridité, comme dans le scorbut chaud, la passion hypocondriaque & hystérique, on en prépare des crèmes avec l'eau, le bouillon & le lait. Les crèmes des riz au lait sont d'une grande utilité dans le scorbut chaud, qui a cédé quelquefois à ces crèmes, après avoir résisté au petit lait & autres remèdes, elles tiennent lieu alors de remède & de nourriture. A l'égard des quatre semences froides majeures, on les regarde comme un remède propre à arrêter le mouvement de la putréfaction : on s'en sert principalement dans les émulsions ; pour une émulsion de huit ou neuf onces de liqueur, on prend de chacune de ces semences un gros, ou de tout ensemble demi-once, on les dépouille de leur écorce, on les pile légèrement, versant peu-à-peu la liqueur qu'on juge à propos comme l'eau simple ou l'eau d'orge, de riz, suivant qu'on a intention d'adoucir plus ou moins. Les émulsions se donnent ordinairement le soir dans les cas que nous avons indiqués ci-devant. Si le malade passe des nuits inquiettes, on y ajoute le sirop de Pavot ou de Nymphaea, ou quelqu'autre narcotique. On en fait encore des ptisanes, des émulsions dans lesquelles on fait entrer une plus grande quantité de liqueur, & une plus grande dose de semence. Ces ptisanes émulsionnées dont on fait boire au malade suivant la soif, ont lieu dans les fièvres putrides, ardentes, bilieuses, accompagnées d'une soif inextinguible. Lorsque l'eau d'orge ne suffit pas pour adoucir, on peut se servir de celle de poulet pour faire ces ptisanes émulsionnées ; c'est l'eau de poulet émulsionnée, qui quelquefois réussit mieux, parce qu'elle est plus analogue à nos humeurs. Les semences froides sont aussi employées pour fournir un aliment plus adoucissant : on fait un bouillon avec le veau & un jeune poulet dont on farcit le ventre avec une demi-once de semences froides & une cuillerée de riz. Quant au suc aigret des fruits dont nous avons parlé, on ne les emploie jamais seuls, mais on les noie dans une grande quantité

d'eau , jusqu'à agréable acidité , on y ajoute même un peu de sucre. C'est ainsi qu'on prépare la limonade : on ne doit s'en servir qu'après avoir tenté inutilement les autres remèdes adoucissants , parce que l'expérience prouve que les acides sont ennemis des poumons. Or dans les fièvres ardentes , bilieuses , dans lesquelles on fait usage de ces sucres aigres , il y a une disposition à la maladie inflammatoire du poumon , comme on observe par l'ouverture des cadavres ; aussi on doit être fort circonspect dans l'administration de ces sucres en pareils cas. On peut encore se servir des sirops composés avec ces sucres délayés à la dose de demi-cuillerée , dans un verre de pîsane , comme le sirop de grenade.

Pharmacologie rationnelle.

LES semences farineuses contiennent beaucoup de mucilage , & ce mucilage est très-propre à enduire les parois des vaisseaux , à les défendre contre les irritations & envelopper les parties âcres : elles donnent une nourriture qui tend à l'alkalescence , & par conséquent forment un mouvement intestin contraire à celui des humeurs qui tendent à la putridité : elles embarrassent le sang qui est précipité dans son mouvement , & par cette raison arrêtent la putréfaction. Dans les hypocondriaques , les hystériques où le sang est si épaissi par desséchement , que l'eau pure passe par-dessus , & est rendue par les urines telle qu'on l'a prise , il faut l'imprégner de ces semences farineuses , parce que leurs parties savonneuses , mucilagineuses restent plus long-temps avec le sang & le divise insensiblement : il en est de même dans le scorbut chaud ; les semences froides sont chargées d'une huile très-grasse , douce , fine , qui s'étend beaucoup plus , c'est pourquoi on les emploie ordinairement dans la dysurie , l'ischurie , la strangurie , la gonorrhée virulente comme étant plus adoucissante. Pour ce qui est des principes aigres , dont nous avons fait mention , ils consistent dans l'acide qu'ils contiennent , qui en s'unissant avec les sels alkalescents , forment des neutres qui sont détrempés par l'eau que l'on jette en même temps dans la masse du sang , cette eau s'en va ensuite par les urines , ils sont plus diurétiques.

Les quatre Semences froides mineures.

CE sont les semences d'endive , de pourpier , de laitue & de chicorée : elles ont la même vertu que les précédentes , mais dans un degré inférieur ; ainsi on doit préférer les semences froides majeures au défaut

de celles-ci : on pourroit substituer les autres à la même dose & de la même façon , c'est-à-dire , en émulsion.

Diurétiques froids pris du Regne minéral.

Nitre.

LE Nitré ou Salpêtre des modernes est fort différent du Nitre ou *Natrum* des Anciens , qui étoit un sel alkali fixe , au lieu que le nitre ou salpêtre des modernes est un sel neutre. Comme on ne retire le salpêtre que des terres qui ont été imbibées de parties urineuses des animaux ou des végétaux , quelques Chymistes doutent si ce sel appartient au regne animal ou au minéral. Nous le rangerons avec le commun des Chymistes parmi les sels minéraux , parce qu'on le tire immédiatement de la terre , & que ce n'est que par ce moyen qu'on peut le retirer des mines & des excréments des animaux. Le nitre purifié est un sel neutre blanc , dont les cristaux prismatiques ont six faces ; jetté sur les charbons ardents , il déflagre , mais sur la langue il la rafraîchit & excite un sentiment d'amertume.

Cas.

ON s'en sert plus fréquemment dans les pays étrangers qu'en France ; & sur-tout qu'à Montpellier ; en général on l'emploie avec succès dans les fièvres continues , aiguës , bilieuses , putrides , ardentes , dans les fièvres érépipélateuses , dans les fièvres à *dissolutione* , qu'on connoît par les causes qui ont précédés , par le tempérament du malade & par les symptômes actuels , tels que la chaleur âcre répandue sur toute l'habitude du corps , la puanteur de la bouche , les taches rougeâtres ou livides , le pissement de sang. M. *Stahl* assure l'avoir donné avec succès en pareil cas , & même dans les diarrhées colliquatives , symptomatiques qui surviennent dans ces sortes de fièvres malignes ; en général dans les maladies inflammatoires sans exception , dans celles de poitrine , telles que la pleurésie , la péripneumonie ; dans celles du bas-ventre , sur-tout dans celles des reins , de la vessie qui occasionnent des suppressions d'urine , dans la dysurie , dans la gonorrhée virulente , (excepté cependant à Montpellier , comme nous le dirons plus bas) dans le cas d'hémorragie du nez , de pissement de sang , des pertes chez les femmes intérieurement & extérieurement. M. *Stahl* l'a souvent donné avec succès aux femmes nouvellement accouchées en qui les vuidanges étoient supprimées & qui étoient attaquées d'accès de fièvre , en sorte que l'écoulement des vuidanges se rétablissoit tranquillement , & les accès de fièvre se dissipoient. On l'em-

ploie encore avec succès dans quelques maladies chroniques, comme dans l'hydropisie, mais il faut observer qu'il ne convient que lorsqu'il y a beaucoup de soif, d'ardeur, une fièvre lente, de marques de putridité. Dans ce cas quelques-uns l'associent avec des apéritifs forts, comme le safran de mars, mais pour le faire, il faut que les marques de putridité ne soient pas bien considérables. On s'en sert enfin avec succès dans les fièvres intermittentes qui attaquent les tempéraments bilieux. On emploie indistinctement le nitre dans tous les cas que nous venons d'indiquer, en Allemagne, en Angleterre, à Paris même, mais à Montpellier les plus fameux Praticiens craignent l'usage du nitre dans la pleurésie, la péripneumonie & les autres inflammations lorsqu'elles sont phlegmoneuses, & ne s'en servent que lorsqu'elles sont érysipélateuses, où le sang n'est pas si épais. Ils ne l'emploient pas non plus dans la gonorrhée virulente, de peur d'enfermer le loup dans la bergerie & de procurer la vérole en gérissant cet écoulement.

Vertus.

DE tous les cas où l'on emploie le nitre avec succès, il suit que c'est un remède rafraîchissant propre à calmer la chaleur, la soif, qui pousse très-bien par les urines, très-propre contre l'inflammation, ou antiphlogistique & enfin antiseptique.

Maniere de s'en servir, & ses Doses.

ON l'emploie en substance & en dissolution sous forme de ptisane; en substance on l'ordonne depuis trois grains jusqu'à un scrupule, en dissolution ou sous forme de ptisane depuis un gros jusqu'à deux, sur deux ou trois livres d'eau dans le cas d'ardeur excessive, de fièvres bilieuses, de maladies aiguës, de diarrhée putride colliquative. Dans le cas d'hydropisie accompagnée d'ardeur & de soif; si cette ardeur & cette soif ne sont pas excessives, & qu'il n'y ait pas beaucoup de fièvre lente, on peut ajouter sur trois parties de nitre, une partie de safran de mars: cette poudre s'ordonne à la dose de quinze grains, & on la prend quatre fois par jour. Ce remède peut réussir dans les tempéraments un peu relâchés, dans les fièvres intermittentes, bilieuses; il y en a qui associent le nitre avec le kina pour en modérer la vertu échauffante, & alors sur une prise de kina qui est de demi-gros ou d'un gros, on ajoute six ou dix grains de nitre, mais comme nous le dirons en son lieu, il vaut mieux dans ces cas-là ne pas employer le kina.

Pharmacologie Rationnelle.

LES Médecins ne s'accordent pas sur la manière dont le nitre agit dans le corps humain ; tous conviennent qu'il rafraîchit ; mais les uns prétendent qu'il produit cet effet en atténuant les humeurs , & les autres en les coagulant , les derniers se fondent sur ces principes ; 1°. le nitre rafraîchit , disent-ils , donc il coagule ; 2°. sur l'expérience ils assurent que le nitre mêlé avec le sang récemment tiré de la veine d'un animal vivant , se coagule ; il s'en faut assurément beaucoup que ces raisons soient démonstratives , & d'abord quant à la première , elle n'est du tout point concluante ; le nitre rafraîchit , pour que cette proposition fût juste , il faudroit qu'on ne pût pas concevoir qu'un remède rafraîchit & qu'il divise en même tems. Or , rien de plus aisé que de concevoir cela ; la chaleur dans le corps humain dépend du frottement mutuel des fluides & des solides & du mouvement intestin du sang ; les frottements deviendroient plus considérables , si le mouvement & l'épaississement du sang augmentoient ; par conséquent un médicament atténuant peut diminuer le frottement , & par conséquent la chaleur : c'est le cas des maladies inflammatoires où le sang est plus épaissi & passe plus difficilement. En second lieu on dit que le nitre mêlé avec le sang se coagule ; cette expérience est pour le moins très-douteuse , elle n'est pas certainement constante. M. de la Mure a mêlé plusieurs fois du nitre avec du sang récemment tiré & avec d'autre déjà coagulé , & il a remarqué que dans le premier cas , le sang devenoit plus fluide & semblable à la lavure de chair , & dans le second que le *coagulum* devenoit plus mol & la sérosité se teignoit de rouge : à cette expérience on peut ajouter celle de M. Palès qui sans penser aucunement à la dispute dont il est question , dit que voulant injecter du sang dans l'artere pulmonaire d'un animal , il y mêla du nitre pour conserver la fluidité du sang pendant qu'il préparoit l'artere. En troisième lieu on dit avoir observé chez les malades que le nitre coaguloit , mais cette prétendue observation est fondée uniquement sur une hypothèse ; car voici comment on raisonne : j'ai donné le nitre dans les fièvres ardentes & j'en ai vu de bons effets , donc que le nitre coagule. Je dis que l'observation qu'on déduit de ce raisonnement est purement hypothétique , car on suppose que dans les cas où le nitre a produit ces bons effets , le sang étoit dissout & atténué , & voilà ce qu'il faudroit bien établir & démontrer , avant que d'en conclure que le nitre a produit ces

bons effets en coagulant ; ainsi l'observation ne prouve pas que le nitre coagule. Bien plus , elle prouveroit que le nitre dissout ; car par-tout , excepté en France , on emploie le nitre généralement dans toutes les maladies inflammatoires & on l'emploie avec succès. Or , dans ces maladies , le sang est plus épais que dans l'état naturel ; le nitre produit donc ces bons effets dans ces maladies en divisant le sang & l'atténuant. La regle qu'on doit suivre en pratique à cet égard , c'est d'ordonner le nitre dans les cas où tous les Praticiens experts l'ordonnent , comme dans les fievres putrides , bilieuses , éréspélateuses ; 2°. d'être circonspect dans les inflammations phlegmoneuses sur-tout de la poitrine , comme la pleurésie , la péripleurésie , d'autant plus qu'on ne manque pas d'autres remèdes appropriés ; 3°. on craint le nitre dans les ardeurs d'urine produites par le virus vérolé ; dans la gonorrhée aussi on doit s'en abstenir par prudence & circonspection.

Esprits Acides minéraux.

CES Esprits sont ceux de vitriol , de soufre , de sel marin & de nitre : on peut se servir de tous ; mais tant qu'on peut avoir l'esprit acide de vitriol , ou l'esprit acide de soufre , il faut les préférer aux autres.

Cas.

ON les donne avec succès dans les maladies aiguës , comme dans les fievres putrides ou simples qu'ardentes , bilieuses , malignes avec dissolution , lorsque les autres diurétiques froids n'ont pas eu de bons effets ; dans les maladies inflammatoires & éréspélateuses qui ont le même caractère que les fievres putrides ; dans les maladies inflammatoires exanthématiques , c'est-à-dire , accompagnées d'éruption ; lorsque ces éruptions sont accompagnées de beaucoup d'ardeur , de soif , comme dans les petites véroles , quand les pustules au lieu d'un pus louable , contiennent une eau extrêmement âcre & à peu près semblable à celle qu'on trouve dans les pustules qui se forment sur la peau après une brûlure , sur-tout lorsqu'on aperçoit de taches noires au fond des petits boutons , c'est le seul remède qui ait réussi dans ce cas à M. Sydenham ; dans le hoquet qui est symptôme de fievres , quelquefois ces symptômes dénotent seulement une tendance à l'inflammation & la présence des matières putrides rancefcentes qui irritent le ventricule , ce qu'on connoît parce que le pouls est petit , les rapports sont désagréables & fétides , & portent vers le gosier un sentiment d'ardeur , tel que celui qu'on éprouve après avoir mangé du lard

rance ; quelquefois au contraire, le hoquet vient de l'inflammation du ventricule , des intestins. Dans le premier cas les acides minéraux , sur-tout de vitriol ou de soufre , sont fort utiles , ils diminuent les symptômes comme M. de la Mure l'a observé. Dans le second , il ne seroit pas prudent de les ordonner : on les emploie encore avec succès dans les fièvres intermittentes , bilieuses , sur-tout dans les tierces , dans les quartes légitimes qui sont entretenues par un suc épais & desséché par les maladies précédentes. M. de la Mure en a vu de très-bons effets dans un homme âgé de plus de soixante ans , d'un tempérament bilieux qui fut attaqué d'abord d'une fièvre intermittente bilieuse, double tierce , laquelle se changea en fièvre quarte ; cet homme éprouvoit une soif presque inextinguible , la langue étoit enduite d'une croûte noirâtre, épaisse tout au moins de deux ou trois lignes. M. de la Mure lui fit prendre une ptisane dans laquelle il avoit versé quelques gouttes d'esprit acide de soufre , & bientôt il vit la croûte se dissiper , l'épiderme se détacha , la fièvre & tous les symptômes disparurent.

Vertus.

ON peut les déduire aisément des cas où l'on emploie ces esprits avec succès.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

IL n'y a qu'une façon de les donner , c'est-à-dire , dans l'eau commune ou dans l'eau de capillaire , de riz , dans laquelle on verse goutte à goutte un de ces esprits jusqu'à agréable acidité , *ad gratam aciditatem* , comme on dit dans les formules , & on fait boire au malade de cette ptisane pour sa boisson ordinaire dans les cas urgents , comme dans les cas de dissolution putride qui tend à gangrene ; dans les cas moins urgents , on peut user alternativement de cette ptisane & de quelqu'autre appropriée , comme celle de riz , d'orge , & remarquez que ceux qui usent de l'esprit de vitriol , rendent les excréments noirâtres , à cause des parties ferrugineuses qui se mêlent avec ; c'est à quoi il faut faire attention pour n'être pas effrayé en s'imaginant que le malade rend l'atrabile.

Pharmacologie rationnelle.

LES esprits acides minéraux paroissent tous coaguler le sang , soit qu'on les mêle avec le sang extravasé , soit qu'on les jette dans les veines d'un animal vivant. On a observé que deux gros de l'esprit acide de
nitre

nître injecté dans la veine jugulaire d'un chien , produisoient des violentes convulsions & la mort. La même quantité d'esprit de soufre n'a pas produit ces effets ; c'est pourquoi on doit préférer l'esprit de soufre ou de vitriol à tous les autres ; ces esprits s'opposent au mouvement de putridité beaucoup plus que les acides végétaux en s'unissant avec les sels alkalescents développés dans le corps par le mouvement : ils forment des sels neutres qui brident le mouvement de putréfaction. Les acides minéraux , comme les végétaux , ont la propriété de dissoudre les substances terreuses : aussi dans le cas de fièvre quarte où le sang est épaissi , desséché , terreux , ils produisent des bons effets , en divisant cette masse terreuse , & la détrempeant par leur véhicule.

Des Médicaments diaphorétiques & sudorifiques.

COMME la nature tend dans l'état même de santé à délivrer le corps des matieres inutiles ou même dangereuses par la voie des felles & des urines , aussi tend-elle à dépurer le sang par le moyen de la transpiration insensible : il en est de même dans l'état de maladie , la nature s'efforce de délivrer le corps des matieres morbifiques par les felles & par les urines , elle fait de pareils efforts pour dépurer de plus en plus le sang par les voies de l'insensible transpiration. Nous devons imiter la nature autant qu'il est possible & seconder ses salutaires efforts : or de même qu'il y a des médicaments propres à favoriser la nature , soit en poussant par les felles , soit en poussant par les urines , aussi il y en a qui peuvent l'aider en poussant par les couloirs de l'insensible transpiration. Nous avons déjà parlé des premiers en traitant des purgatifs & des diurétiques ; l'ordre que nous nous sommes proposé veut que nous parlions à présent de ceux qui rétablissent ou augmentent l'excrétion ou la sécrétion qui se fait par les couloirs de la peau. Tous les Physiologistes savent quelle est l'utilité de cette sécrétion & de cette excrétion connue sous le nom d'insensible transpiration dans l'état de santé. Tous les Patologistes connoissent aussi les avantages qui résultent de cette insensible transpiration rétablie ou augmentée dans certaines maladies. Les médicaments qu'on donne dans la vue de la rétablir ou de l'augmenter , sont appelés diaphorétiques ou sudorifiques. On les appelle diaphorétiques lorsqu'ils procurent une grande sécrétion & une plus grande excrétion de parties aqueuses & sereuses par les couloirs de la peau , sans exciter la sueur , mais seulement une espece de moiteur : on les appelle sudorifiques lorsque cette excrétion va jusqu'à la ~~chaleur~~ ^{chaleur}. Tout le monde met les médicaments diaphorétiques

au rang des évacuants ; & suivant l'idée que nous en avons donnée , les médicaments évacuants excitent toujours quelqu'évacuation sensible , & c'est aussi ce que font les diaphorétiques en rétablissant ou augmentant l'insensible transpiration jusqu'au point de rendre l'habitude du corps humide , ce qui rend cette évacuation sensible. L'insensible transpiration peut être empêchée par deux états bien différents , c'est-à-dire , par la trop grande tension , par le resserrement des solides & par la grande velocity des fluides , ou bien par le relâchement des solides mêmes qui fait qu'ils agissent moins efficacement sur les fluides , & que ceux-ci agissent réciproquement avec moins d'énergie sur les solides ; en sorte que le sang n'étant pas suffisamment broyé , ne peut passer par les extrémités des artérioles où doit se faire la sécrétion de l'insensible transpiration. C'est ainsi que nous avons vu que la sécrétion de l'urine pouvoit être diminuée ou totalement supprimée , ou par la tension des solides ou la dissolution & l'acreté des fluides , ou par le relâchement des solides & l'épaississement visqueux des fluides ; comme ces deux différents cas , tant les solides que les fluides donnent lieu à la division des diurétiques en chauds & en froids , il semble par la même raison que nous devrions diviser les diaphorétiques en chaud & en froid , suivant les différentes constitutions d'où dépend la diminution de l'insensible transpiration. Cependant l'usage n'admet pas cette distinction pour les médicaments diaphorétiques & les sudorifiques , parce que ces médicaments ne diffèrent entre eux que du plus au moins. Avant que d'entrer dans le détail de ces médicaments , nous examinerons , 1°. les effets qu'ils produisent sur le corps humain , 2°. les cas généraux où ils sont indiqués , 3°. ceux où ils sont contre-indiqués , 4°. les précautions qu'on doit prendre en les administrant.

A R T I C L E P R E M I E R.

Effets des Diaphorétiques & des Sudorifiques.

CES effets sont de deux sortes ; les uns sont sensibles & évidents ; les autres ne sont pas moins certains & évidents quoique moins sensibles ; les effets sensibles sont ceux-ci : quelque temps après l'exhibition de ces médicaments le pouls devient plus fort , plus plein & plus fréquent ; mais cette force , cette plénitude & cette fréquence de pouls sont jointes à la souplesse de l'artere , il se répand en même temps sur toute l'habitude du corps une chaleur aliteuse , comme disoient les anciens , ou va-

poreuse , la peau devient moite par le moyen de ces vapeurs qui s'exhalent de ses couloirs ; enfin les vapeurs deviennent plus sensibles & forment des gouttelettes , ce qui constitue la sueur , tels sont les effets sensibles ; de ceux-là on peut en déduire d'autres qui ne sont pas moins certains , & d'abord puisque le pouls devient plus fort , il s'ensuit que les forces de la circulation sont augmentées , que les solides agissent avec plus d'énergie sur les fluides , que le sang est plus atténué & porté plus efficacement & plus promptement vers tous les couloirs du corps humain , où doivent se faire les sécrétions ; voilà les effets généraux , réels & constants que les diaphorétiques & les sudorifiques produisent. L'effet particulier de pousser par les couloirs de la peau n'est pas aussi constant , parce qu'il dépend de plusieurs circonstances , je veux dire des obstacles qui se présentent vers les couloirs & de l'atténuation plus ou moins considérable du sang ; car si le sang n'est pas assez atténué pour passer dans les extrémités des artérioles d'où partent les couloirs de la peau , il ne se fera pas de sécrétion par ces couloirs , & de même si le sang étant d'ailleurs assez atténué , il se présente des obstacles vers ces couloirs , la sécrétion sera encore empêchée dans ces mêmes couloirs , mais non dans d'autres dans lesquels le sang ne trouvera pas les mêmes obstacles , & delà vient qu'on donne quelquefois sous ce point de vue des diaphorétiques qui deviennent diurétiques , les couloirs des reins présentant quelquefois moins d'obstacles à la sécrétion des humeurs que ceux de la peau. C'est encore par la même raison que l'effet particulier des diaphorétiques & des sudorifiques , qui est de pousser par les couloirs de la peau est si peu constant , & que si on en excepte l'*opium* , il n'y en a peut-être point d'autres dont l'effet particulier soit assuré , quoique tous augmentent les forces de la circulation , divisent les humeurs , le même médicament est quelquefois diaphorétique seulement , quelquefois sudorifique ; ceci dépend encore de l'état des couloirs & de l'atténuation du sang qui peuvent varier dans différentes circonstances , mais cela n'empêche cependant pas qu'on ne donne différents noms à ces médicaments , en appelant diaphorétiques ceux qui le plus ordinairement rétablissent ou augmentent l'insensible transpiration sans exciter la sueur , mais seulement la moiteur , & sudorifiques ceux qui provoquent la sueur le plus ordinairement.

A R T I C L E II.

Cas généraux où les Diaphorétiques & les Sudorifiques sont indiqués.

LES Diaphorétiques & les Sudorifiques conviennent dans les maladies qui dépendent , qui sont entretenues ou renouvelées par la diminution de l'insensible transpiration ; dans le catarre , dans le rhumatisme gouteux ; dans la goutte même ; dans les fievres malignes à *coagulo* , putrides ; dans les maladies inflammatoires , comme dans la pleurésie , la péripleurésie ; dans les maladies inflammatoires exanthématiques , comme dans la petite vérole , la rougeole ; dans les affections cutanées , telles que la démangeaison , la gratelle , la gale ; dans les maladies vénériennes , dans le cas de sueur critique ; dans les maladies épidémiques , qui se guérissent par la sueur ; dans le cas où on veut faire revulsion des humeurs vers la peau , comme dans le diabète , la diarrhée , lorsque ces maladies dépendent de la suppression de l'insensible transpiration. Voilà les cas généraux où les diaphorétiques & les sudorifiques conviennent , mais il faut faire cependant quelques réflexions : 1°. dans le catarre ou le rhume qui dépendent souvent du froid auquel le corps étant chaud a été exposé , ce qui a supprimé l'insensible transpiration & occasionné la toux , qui quelquefois est accompagnée de l'expectoration & quelquefois ne l'est pas ; la première indication est de rétablir l'insensible transpiration qui a été supprimée ; mais dans ce cas il faut faire attention que les poumons sont embarrassés & engorgés , ce qu'on connoît par la difficulté de respirer , qui va quelquefois jusqu'à la suffocation ; ainsi on doit craindre une vraie inflammation des poumons , c'est pourquoi il ne faut employer que des sudorifiques légers ; 2°. dans le rhumatisme , le rhumatisme gouteux , la goutte , ces maladies peuvent dépendre de deux causes différentes , c'est-à-dire , de la tension des solides & de la sécheresse des fluides à *causâ calida* , & alors les sudorifiques nuiroient ; ou bien du relâchement des solides & de l'épaississement des fluides à *causâ frigida* , & c'est dans ces cas-là seulement qu'ils conviennent ; 3°. dans les fievres putrides , malignes à *coagulo* , c'est-à-dire , dans lesquelles le ton des solides est diminué , les fluides sont engourdis , la transpiration arrêtée ; 4°. dans les maladies inflammatoires , telles que la Pleurésie , la Péripleurésie , il faut remarquer que les sudorifiques ne conviennent que vers la fin , & lorsque les humeurs paroissent se déterminer vers les couloirs de la peau par la force de la nature , ce qu'on connoît par la moiteur

de la peau, par la souplesse du poulx ; 5°. dans les maladies inflammatoires exanthématiques , dans lesquelles la nature chasse vers la peau les matieres hétérogenes qui s'amassent en pustules , il faut remarquer que l'éruption peut être empêchée , ou par le trop grand mouvement du sang , ou par le défaut d'activité des organes de la circulation ; c'est dans ces derniers cas seulement que les sudorifiques conviennent ; 6°. dans les affections cutanées , telles que la démangeaison , la grattelle , la gale ; la grattelle en latin *impetigo* , differe de la simple démangeaison , en ce que dans la premiere il y a des petites tumeurs seches qui ne se s'ouvrent pas dans la démangeaison ; dans la gale il y a des pustules qui en s'ouvrant laissent échapper une humeur ou une sérosité extrêmement âcre ; dans ces maladies il s'accumule dans les glandes miliaires , une sérosité qui les irrite & excite la démangeaison : il faut avoir égard au tempérament du malade ; si ces maladies se rencontrent dans un tempérament bilieux avec ardeur , soif , il faut s'abstenir des sudorifiques , ils nuiroient dans ce cas-là , ils conviennent au contraire dans des tempéraments pituiteux ; 7°. dans les maladies vénériennes , ou dans le mal de Naples , les sudorifiques étoient autrefois regardés comme convenables ; aujourd'hui on est persuadé de leur insuffisance , excepté cependant dans un cas que nous remarquerons plus bas. Dans cette maladie la lymphe est épaissie ; si elle ne l'est pas jusqu'à un certain point , comme dans la gonorrhée simple récente , on peut se flatter de pouvoir la diviser , & les sudorifiques peuvent devenir curatifs : mais si la gonorrhée est invétérée , si la lymphe est fort épaissie , si elle s'est cantonnée dans quelques parties , sur-tout dans quelques parties osseuses , les sudorifiques ne sauroient être curatifs : on peut cependant les employer comme palliatifs dans les cas où l'on ne pourroit pas avoir recours au mercure pour empêcher les progrès du mal , en attendant qu'on puisse user de ce dernier. 8°. Dans le cas de sueur spontanée critique. Les sueurs spontanées peuvent être critiques , ou bien symptomatiques , les sueurs critiques se font vers la fin de la maladie , après ce qu'on appelle la coction de la matiere morbifique & avec diminution des symptomes & le soulagement du malade. Les sueurs symptomatiques surviennent dans tous les temps de la maladie , ne diminuent point les symptomes , mais les augmentent plutôt , & abattent les forces du malade ; les sudorifiques ne sont convenables que dans les sueurs critiques , c'est la regle générale de laquelle il faut cependant excepter certains cas particuliers , comme nous le verrons dans la suite. 9°. Dans les maladies épidémiques qui se guérif-

sent par la sueur , on a remarqué dans ce cas-là que ceux qui suient au commencement étoient guéris , & que tous les autres périssoient dans vingt-quatre heures ; c'est la maladie qu'on appelle sueur angloise , parce qu'elle a cela de particulier qu'en Angleterre même elle n'attaquoit que les Anglois & non les étrangers , & qu'elle attaquoit en même temps les Anglois qui étoient hors de leur pays ; dans ce temps-là on n'attendoit pas la coction pour donner les sudorifiques , on les donnoit avec succès dès le commencement de la maladie , 1°. dans le diabete , les diarrhées avec relâchement des solides , parce que les sudorifiques donnent du ton aux solides , & de plus font une espece de revulsion.

A R T I C L E I I I .

Cas généraux où les Diaphorétiques & les Sudorifiques sont contre-indiqués.

EN faisant attention aux effets , soit sensibles , soit plus cachés , mais non moins certains que les diaphorétiques & les sudorifiques produisent dans notre corps , on peut aisément comprendre les cas où ils sont contre-indiqués ; car puisqu'ils augmentent les forces de la circulation , l'activité des solides , il suit évidemment qu'ils sont contre-indiqués dans tous les cas où il y a beaucoup d'ardeur , de chaleur , une soif démesurée , & par conséquent , 1°. dans les fièvres aiguës ardentes ; 2°. dans certaines maladies inflammatoires exanthématiques : ils sont contre-indiqués , 1°. dans les fièvres ardentes , dans lesquelles il y a beaucoup de chaleur , d'ardeur , parce que dans ce cas les diaphorétiques & les sudorifiques augmenteroient le mouvement du sang qui n'est déjà que trop grand. Ceci mérite d'autant plus d'attention , qu'on pourroit faire de grandes fautes , si l'on vouloit s'en rapporter à l'autorité de plusieurs Auteurs célèbres qui ont prétendu qu'ils convenoient dans toute sorte de fièvres. *Pitcarne* , l'un d'entr'eux , a composé un petit Traité exprès pour prouver que la maniere de traiter toutes les fièvres par les sudorifiques , étoit la plus certaine : il s'appuye sur deux principes , 1°. sur les expériences de *Sanctorius* , selon lesquelles nous perdons plus dans vingt-quatre heures par l'insensible transpiration , que dans quinze jours par la voie des selles & par celle des urines , d'où il conclut que le couloir de la peau est le plus étendu , le plus universel , le plus propre par conséquent à dépurer plus promptement le sang , 2°. Il suppose , & en cela peut-être a-t-il raison , du moins il n'est pas contredit par aucun Auteur , il suppose , dis-je ,

que les maladies fievreuses sont produites & entretenues par des matieres hétérogenes , qui se mêlant avec le sang embarrassent son mouvement, & que la nature s'efforce continuellement de chasser hors du corps & d'en dépurer le sang ; or il prétend qu'il n'y a point de voie plus commode pour cela que le couloir de la peau.

Quant au premier principe sur lequel *Pitcarne* se fonde , on pourroit le lui contester , pris au moins dans son universalité ; la quantité de l'insensible transpiration n'est pas la même pour tous les climats & pour tous les tempéraments ; selon les observations de *M. Keill* il y a des pays où l'insensible transpiration n'est pas plus grande , & même quelquefois elle est moindre que les autres évacuations , comme dans les pays du nord ; ainsi les loix de *Sanctorius* sont bornées & particulières à certains pays , comme aux pays chauds ; mais donnons à *M. Pitcarne* que dans l'état de santé les pertes qui se font par l'insensible transpiration excèdent celles des évacuations sensibles , s'ensuit-il que dans l'état contre-nature les matieres hétérogenes mêlées avec le sang , soient propres à être chassées par les couloirs de la peau ? Ont-elles les conditions requises pour cela ? Sont-elles assez atténuées pour enfiler ce couloir ? c'est ce qui reste à prouver à *Pitcarne* ; d'ailleurs l'observation fait voir que les fievres putrides se guérissent souvent par des évacuations critiques qui se font tantôt par les selles , tantôt par les urines , tantôt par l'expectoration , suivant que les matieres hétérogenes sont en état de suivre ces différentes voies ; enfin dans certains cas où le sang est extrêmement agité , & les solides dans un état de constriction , les sudorifiques pourroient empêcher la crise par la peau , bien loin de la procurer ; ainsi les sudorifiques ne conviennent pas dans toutes les maladies fébriles , quoiqu'en dise *M. Pitcarne* ; ils sont contre-indiqués dans toutes les fievres où il y a beaucoup de chaleur , d'ardeur , de soif , excepté vers la fin , lorsqu'une moiteur critique se manifeste ; 2°. ils sont encore contre-indiqués dans certains cas de maladies inflammatoires exanthématiques ; ceci mérite encore quelques réflexions , parce que certains Auteurs croient que les sudorifiques conviennent dans toute sorte de maladies inflammatoires exanthématiques , comme par exemple , dans la petite vérole. Ces Auteurs s'appuyent sur l'Aphorisme d'*Hippocrate* , *quò natura vergit, adducendum & per loca opportuna*. Or , disentils , dans ces maladies la nature paroît faire ses efforts pour déterminer la matiere morbifique vers la peau , c'est donc suivre la nature & l'aider que de donner les sudorifiques dans ces sortes de cas. Ce raisonnement est captieux , on peut cependant en sentir aisément le faux : pour cela il n'y a qu'à se rappeler

ce que nous avons déjà dit , que l'éruption peut être empêchée ; ou par le trop grand mouvement du sang & la constriction des vaisseaux , ou par le relâchement des vaisseaux & le défaut d'activité des organes de la circulation ; dans le premier cas le sang étant extrêmement agité , est porté selon l'axe , sans se porter *ad latera* , comme on remarque dans une rivière rapide dont le lit est étroit , que les corps étrangers qu'on y jette sont mus selon l'axe , au lieu qu'ils se détournent sur les bords lorsque la rivière n'est pas rapide ; ainsi le sang passe des extrémités des artérioles dans celles des venules , sans se détourner aux côtés d'où partent les conduits sécrétoires , d'où vient que la sécrétion est empêchée , ou au moins fort diminuée ; ainsi ce ne seroit pas suivre la nature , mais plutôt aller contre son dessein que de donner des sudorifiques dans ce cas-là : ce que la raison nous fait voir au sujet de la diminution ou de la suppression des sécrétions dans les cas où le sang est extrêmement agité , l'observation le confirme : c'est ainsi que dans les fièvres intermittentes bilieuses après le froid , on remarque que la sécrétion des urines , de la salive , de la transpiration est supprimée , & qu'elle se rétablit quand la chaleur diminue ; la bouche commence alors à s'humecter , la peau devient moite & couverte de sueur : les sudorifiques ne conviennent donc pas lorsque l'éruption est empêchée par le trop grand mouvement du sang , mais seulement lorsqu'elle dépend du défaut d'activité des organes de la circulation ; 3°. les sudorifiques sont encore contre-indiqués dans les sueurs symptomatiques qui doivent plutôt être calmées qu'entretenues , sur-tout si elles sont chaudes , & si elles dépendent d'une dissolution âcre ; mais il y a une espèce de sueur froide qui dépend de la lenteur de la circulation où le sang se partage en deux parties , la sérosité se séparant de la partie rouge ; dans ce cas les humeurs sont épaisses , les sudorifiques sont indiqués.

A R T I C L E I V.

Précautions à prendre.

LES précautions qu'il y a à prendre dans l'administration des diaphorétiques & des sudorifiques sont ou générales ou particulières ; les précautions générales dépendent de l'attention qu'on doit faire aux cas tant indiqués que contre-indiqués que nous venons d'exposer ; les précautions particulières peuvent se réduire , 1°. à faire tenir le malade au lit médiocrement couvert , par ce moyen l'humidité ou la matière de l'insensible transpiration

piration est arrêtée sur la surface de la peau , & y forme une espece d'atmosphère vaporeux qui entretient la souplesse nécessaire pour l'excrétion de la sueur ; 2°. si on veut déterminer plus sûrement la sueur , il convient d'associer aux sudorifiques l'*opium* , dont l'effet est plus assuré que d'aucun autre sudorifique ; 3°. il y a encore une autre précaution à prendre qui dépend du choix que l'on doit faire des différents diaphorétiques & sudorifiques , choix qu'on ne sauroit faire sans la connoissance détaillée de ces médicaments ; nous allons faire le détail des principaux & des plus usités , en suivant l'ordre des trois regnes qui nous les fournissent.

Diaphorétiques & Sudorifiques fournis par le regne végétal.

Bois sudorifique , le Gayac , Guaiacum , seu lignum sanctum.

LE Gayac est un bois solide , compacte , extrêmement pesant , qui va au fond de l'eau , résineux , qui prend feu , d'un verd noirâtre dans sa partie intérieure , entremêlé de lignes noirâtres ; sa partie extérieure est de couleur de buis , ou d'un jaune pâle , d'un goût un peu amer & un peu aromatique , d'une odeur agréable lorsqu'on la brûle , couvert d'une écorce ligneuse , brillante & un peu résineuse & comme formée de plusieurs petites lames : on coupe ce bois d'un arbre qui porte le même nom qui croît aux grandes Indes : on ne le connoît que depuis qu'on a commencé à faire la description de la vérole , il fut apporté en Europe comme spécifique contre cette maladie.

Cas.

ON l'emploie avec succès dans les obstructions anciennes , soit du foie , soit de la rate , pourvu que ce soit dans des tempéraments froids pituiteux , & par conséquent dépendantes du relâchement des solides & de l'épaississement des fluides ; dans les maladies qui dépendent de ces sortes d'obstructions , comme dans l'ictère froid , dans les hydropisies avant que les eaux aient pris un caractère de putridité , dans les asthmes pituiteux ou dans la difficulté de respirer , qui revient par période & qui est accompagné de beaucoup d'expectoration , ce qui caractérise l'asthme pituiteux & qui dépend de l'engorgement visqueux des glandes bronchiques ; dans les différentes affections cutanées , comme la démangeaison , la grattelle , la gale , la lepre lorsqu'elles dépendent de l'épaississement visqueux de la matière , de l'insensible transpiration ou de la sueur qui est trop épaisse pour être portée jusqu'aux extrémités des couloirs , & qui s'arrête

& s'accumule dans les glandes miliaires ou aux extrémités des artérioles ; dans les maladies dolorifiques , telles que le rhumatisme simple , le rhumatisme goutteux , la goutte , la sciatique lorsque ces maladies se trouvent dans des tempéraments pituiteux , & qu'il n'y a point âcreté dans le sang ni de soif.

Vertus.

Si l'on fait attention aux cas où on emploie le gayac avec succès , on verra qu'il fournit un médicament tonique , atténuant , propre à inciser les humeurs , apéritif chaud , très-bon béchique , antispasmodique.

Maniere de s'en servir , Doses.

AUTREFOIS on le donnoit dans les maladies vénériennes & on le regardoit comme spécifique : il succéda au mercure , dont quelques Médecins s'étoient déjà servi , mais qui n'avoient pas toujours eu de bons succès étant administré sans prendre les précautions requises , ce qui fit qu'on l'abandonna , & aujourd'hui on ne le regarde plus comme spécifique dans la vérole ; on l'emploie cependant avec succès dans les gonorrhées sur la fin , pourvu que la vérole ne soit pas confirmée : on s'en sert encore avec succès extérieurement pour déterger les ulcères véroliques ; on le regarde comme un médicament palliatif dont on fait usage pour arrêter les progrès du mal , lorsque les forces ou les affaires du malade ne lui permettent pas d'avoir recours aux frictions mercurielles , voici comment on l'employoit autrefois : on prenoit sept ou huit onces de bois de gayac rapé , on le faisoit bouillir à petit feu jusqu'à diminution de deux tiers dans un pot vernissé , on passoit cette décoction lorsqu'elle étoit refroidie & on la conservoit avec soin dans un vaisseau bien fermé , on appelloit cette décoction crème de gayac : on faisoit encore une autre décoction plus légère pour servir de boisson ordinaire pendant le traitement , on la préparoit de cette sorte : on prenoit six onces de poudre de gayac , on les faisoit macérer pendant quinze heures dans neuf livres d'eau tiède , ensuite on les faisoit bouillir doucement jusqu'à ce que la liqueur fût réduite à sept livres : on commençoit le traitement du malade par la purgation & même par la saignée s'il en avoit besoin ; on l'enfermoit pendant tout le temps de la cure dans une chambre qui n'étoit pas exposée à l'air froid , encore moins au vent : il prenoit le matin sur les cinq heures un verre de la première décoction qui est la plus forte , & un autre sur le soir vers les quatre ou cinq heures , après quoi on le couvroit médiocrement

dans son lit , & s'il ne suoit pas assez , on lui mettoit des vessies pleines d'eau chaude sur la tête , aux genoux & aux pieds , & on l'essuyoit avec des linges chauds , on lui donnoit à manger deux fois par jour , trois ou quatre heures après avoir pris un verre de cette décoction ; la nourriture qu'on lui donnoit étoit très-légère & en petite quantité , comme un peu de biscuit & tout au plus de viande très-tendre , comme de pigeon & de poulet , mais en petite quantité ; sa boisson ordinaire étoit la seconde décoction dont nous avons parlé : on faisoit prendre tous les sept jours quelques purgatifs pour tenir le ventre libre , on continuoît encore le traitement pendant vingt ou trente jours & même plus long-temps jusqu'à ce que les symptômes eussent disparus , & que le virus fût entièrement détruit ; alors on ne se servoit plus de la décoction forte , mais on faisoit encore boire au malade , dans ses repas , la décoction légère de gayac pendant quarante jours. M. *Fernel* a tiré de grands avantages de son bochet fait avec le gayac dans des cas où les frictions mercurielles avoient été sans effet. M. *Boërrhaave* prétend que le Gayac guérit les véroles invétérées où le virus s'est cantonné dans des vaisseaux fort éloignés du principe du mouvement , comme dans les fibres osseuses où le mercure a de la peine à pénétrer. M. *Astruc* au contraire soutient que le mercure pénètre dans ces derniers retranchements , & il assure avoir guéri par ce remède des véroles que M. *Boërrhaave* n'avoit pas guéri par sa méthode. Dans les cas dont parle M. *Boërrhaave* , où il a vu les bons effets du gayac , le virus vérolique pouvoit être combiné & associé avec le virus scorbutique ou quelqu'autre virus , & c'est sans doute dans les mêmes circonstances que M. *Fernel* a mieux réussi par l'usage du gayac que par les frictions mercurielles. On emploie aujourd'hui une décoction légère de gayac : on prend , par exemple , huit onces de gayac rapé qu'on fait macérer dans huit livres d'eau pendant vingt-quatre heures , on les fait bouillir légèrement jusqu'à diminution d'un quart , on en fait boire le matin au malade un verre avant qu'il se leve & le soir quand il est couché ; cette décoction fait fuer légèrement , elle peut emporter des gonorrhées commençantes , on peut y joindre des pillules , mais il vaut peut-être mieux s'abstenir des sudorifiques , sur-tout dans les tempéraments chauds ; il faut observer de le faire macérer d'abord & de ne le pas faire bouillir trop long-temps , autrement sa vertu seroit moindre. Le bois de gayac s'ordonne rarement seul , on l'associe ordinairement avec d'autres sudorifiques , comme avec le saffras , & on en forme une ptisane sudorifique , qui convient dans le cas que nous avons marqué.

Pharmacologie Rationnelle.

IL paroît que son principe actif réside dans la partie résineuse qu'on voit découler du tronc de cet arbre , & qui est d'ailleurs assez bien démontrée par l'odeur que le bois répand quand on le brûle & par son inflammabilité , mais sur-tout dans une partie résineuse volatile , ce qui est prouvé , parce que si la décoction est un peu trop longue , sa vertu est moindre , peut-être même qu'elle agit un peu par sa pesanteur.

Le Sassafras.

C'EST un bois d'un roux blanchâtre , spongieux & léger , dont l'écorce est spongieuse , de couleur de cendre en dehors & de rouille de fer en dedans , d'un goût âcre , douceâtre , aromatique , d'une odeur pénétrante , qui approche de celle du fenouil , d'où vient que quelques-uns l'appellent *lignum faniculatum* , on nous l'apporte de la Floride , de la Virginie & d'autres provinces d'Amérique ; on le coupe d'un grand arbre appelé Sassafras , *arbore ex floridâ fuculnæo folio* ; on choisit le sassafras récent & fort odorant.

Cas.

ON l'emploie avec succès dans les mêmes cas que le gayac , on le regarde comme spécifique à-peu-près dans le catarre froid avec douleur gravative & expectoration des matières visqueuses , tenaces dans les tempéraments pituiteux : on s'en sert avec succès dans les fleurs blanches qui dépendent du relâchement des couloirs , lorsque la matière de l'écoulement n'est pas âcre & ne cause point d'excoriation aux parties voisines , toujours dans les tempéraments pituiteux , & dans ce cas l'infusion de sassafras se fait dans le vin , on y ajoute le succin blanc , comme nous le dirons ci-après.

Vertus.

LE sassafras fournit un médicament incisif , atténuant , apéritif , chaud , béchique chaud , très-propre dans les maladies cutanées.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON l'administre comme le gayac en substance depuis vingt grains jusqu'à un gros , mais il est rare qu'on le prescrive de cette sorte ; on l'ordonne

en infusion plutôt qu'en décoction , parce que ses principes sont beaucoup plus volatils que ceux du gayac , ce qui paroît par son odeur pénétrante aromatique ; on prend demi-once de bois de sassafras pulvérisé avec son écorce , on verse dessus une livre d'eau bouillante , dans laquelle on le fait infuser pendant douze heures , & on en fait prendre au malade deux verres le matin & autant le soir ; lorsqu'on l'ordonne dans les fleurs blanches , l'infusion se fait dans le vin , & on y ajoute dix ou quinze grains de succin blanc préparé ; on associe ordinairement le bois de sassafras à celui de gayac.

Pharmacologie rationnelle.

ELLE est la même que celle du bois de Gayac , excepté que le sassafras est plus volatil , c'est pour cette raison qu'on le fait infuser.

Esquine.

L'ESQUINE , *Chinna* , seu *Schinna* , vel *Smilax aspera chinensis* , est une racine qu'il ne faut pas confondre avec une écorce qu'on appelle Kinakina , dont elle diffère par sa nature & par ses vertus. Elle étoit inconnue aux anciens Médecins. L'Empereur Charles - Quint ayant entendu vanter sa vertu antivénérienne , en fit usage de son propre mouvement , sans consulter ses Médecins , ce fut sans succès ; ce qui n'empêcha cependant pas qu'on ne la mît en vogue pendant quelque temps sous la qualité d'antivénérienne : cette racine est grosse , dure , compacte , noueuse , inégale , garnie de quelques fibres longues , roussâtre extérieurement , intérieurement blanche , sans odeur & sans saveur lorsqu'elle est sèche ; on doit la choisir pesante , récente , non cariée , & qui donne une certaine consistance à l'eau dans laquelle on la fait bouillir.

Cas.

AUTREFOIS on l'employoit comme un remède curatif dans la vérole ; aujourd'hui on ne l'emploie dans ce cas que comme un remède palliatif , & on s'en sert sur la fin des gonorrhées lorsque la vérole n'est pas confirmée : on s'en sert avec succès dans les maladies chroniques , qui dépendent d'une lymphe desséchée & âcre , dans la simple démangeaison , dans la gratelle , la gale , la lepre , dans le rhumatisme simple & dans le rhumatisme goutteux , dans toutes sortes de gouttes lorsque les affections viennent à causé *frigida* , dans les obstructions des viscères du

bas-ventre , du foie , de la rate , qui dépendent de la sécheresse & de l'âcreté de la lymphe , dans les humeurs écrouelleuses , dans les tumeurs qui tendent vers le cancer.

Vertus.

C'EST un atténuant , apéritif , sudorifique qui échauffe peu , assez cependant pour qu'on doive s'en abstenir dans les tempéraments bilieux , dans les hystériques , les hypocondriaques , & toutes les fois qu'on craint d'échauffer , ou qu'on doive au moins le mitiger en l'associant aux adoucissants.

Maniere de s'en servir , Doses.

VOICI quelle étoit la maniere de donner l'Esquine dans les maladies vénériennes : on prenoit une once & demie ou ~~deux onces~~ de racine d'esquine coupée en petites tranches , on les faisoit macérer pendant vingt-quatre heures dans huit ou dix livres d'eau , ensuite on les faisoit bouillir à un feu doux , jusqu'à diminution d'un quart , & on se servoit de cette décoction comme de celle du bois de Gayac , avec cette différence qu'on ne purgeoit pas le malade de sept en sept jours. Sur la fin des gonorrhées on l'emploie ou en la faisant bouillir à la dose de demi-gros dans le lait qu'on donne au malade , ou en la faisant bouillir à part à la même dose dans une livre d'eau dont on coupe le lait ; mais comme nous l'avons dit du bois de Gayac , il est assez inutile d'avoir recours à ces sudorifiques. Dans les obstructions avec la sécheresse & âcreté ; dans les écrouelles , dans les schirres cancéreux , on peut donner le lait dans lequel on a fait bouillir un gros de racine d'esquine , ou le lait coupé avec l'eau dans laquelle on l'a faite bouillir , comme nous l'avons dit.

Pharmacologie Rationnelle.

SA vertu réside vraisemblablement dans sa partie volatile , d'où vient que si on la fait bouillir trop long-temps , elle perd beaucoup de sa vertu ; la partie résineuse n'y est pas si évidemment démontrée dans le Gayac.

La Salsepareille , Salsaparilla.

C'EST la racine d'une espece de *Smilax* qu'on nous apporte de la nouvelle Espagne , du Pérou & du Brésil ; elle est longue , sarmenteuse , cannelée dans sa longueur , couverte d'une écorce mince , brunâtre en

dehors , blanchâtre en dedans & farineuse , d'un goût tant soit peu gluant , un peu amer.

Cas.

ON l'emploie dans les mêmes cas que la précédente ; dans les rhumatismes on s'en sert d'une façon particulière , comme nous le dirons ci-après : on s'en sert en général dans le cas de lymphe épaissie , dans les obstructions qui se trouvent dans des tempéraments pituiteux , lâches , où les fluides sont épaissis avec sérosité , & où il y a cependant un peu d'âcreté.

Vertus.

LES vertus de la Salspareille sont à peu-près les mêmes que celles d'esquine , mais elle échauffe plus que cette dernière racine ; c'est pourquoi dans les écrouelles & dans tous les cas où la lymphe est desséchée , on préfère la racine d'esquine.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON s'en sert dans le petit lait à la dose de demi-gros ou d'un gros. Dans le rhumatisme on farcit le ventre d'un jeune poulet avec un gros & demi ou deux gros de cette racine coupée menue , & on en fait des bouillons avec des plantes appropriées.

Bardane , Bardana , seu Lupa major.

SA racine est épaisse , longue d'un pied , droite , noirâtre en dehors , blanche en dedans , d'une saveur douceâtre & un peu austère : elle est un peu fudorifique , de même que les feuilles & les semences.

Cas.

ON emploie cette racine avec succès , non-seulement dans les maladies chroniques comme les deux précédentes , mais encore dans les maladies fort aiguës , comme dans les fièvres putrides , malignes à *coagulo* , avec relâchement , ce qu'on connoît , parce que le pouls n'est presque pas changé ou même plus petit que dans l'état naturel , par un délire fourd ; dans les maladies inflammatoires , exanthématiques , comme la petite vérole , la rougeole & autres affections cutanées , lorsque l'éruption se fait difficilement à cause de l'épaississement des humeurs ; dans le

rhumatisme , soit simple , soit gouteux , dans la goutte. ^{Forêtier} ~~Forêtier~~ assure qu'un homme fut guéri de la goutte par la décoction de cette racine , & qu'il rendit des urines blanches comme du lait : on l'emploie aussi avec succès dans les maladies vénériennes ; on la préfère même dans ce cas-là aux autres sudorifiques dont nous avons parlé ci-devant , parce qu'elle échauffe moins , sur-tout pour les tempéraments bilieux , & pour les malades qui sont maigres & délicats : on assure qu'Henri III fut guéri d'une maladie vénérienne par la décoction de cette racine.

Vertus.

C'EST un médicament atténuant , incisif , tonique , ce qui est quelquefois nécessaire dans les maladies aiguës dont nous avons parlé ; un bon diurétique dans le cas de goutte , sudorifique qui convient sur la fin des inflammations : on peut se servir des feuilles & des semences de cette plante dans les cas que nous venons d'indiquer , elles sont aussi sudorifiques.

Maniere de s'en servir , Doses.

LA racine s'ordonne en décoction à la dose d'une once ou une & demie sur une livre d'eau ; les feuilles s'ordonnent par poignées , une poignée , par exemple , sur une livre d'eau. Les semences s'ordonnent à la dose d'un gros dans une liqueur appropriée , ou sous forme d'émulsion qu'on fait en les pilant & y joignant la décoction de la racine & des feuilles : on met huit onces de cette décoction dans les maladies aiguës ; il est plus ordinaire de donner cette racine sous forme de ptisane. La Pharmacologie ne nous donne aucune lumière sur les principes dans lesquels réside la vertu de ce médicament.

Scorfonere , ou Cercifi noir , Cercifi d'Espagne.

ON l'appelle Scorfonere ou *Viperaria* , parce qu'on la croit bonne contre la morsure de la vipere ; sa racine est assez menue , d'un roux noirâtre en dehors , blanche en dedans , tendre & facile à rompre ; fraîche , elle donne un suc laiteux très-doux au goût : on la donne en ptisane depuis demi-once jusqu'à une once dans les fièvres malignes à *coagulo* , dans les maladies inflammatoires exanthématiques , en un mot dans tous les cas où l'on emploie la bardane ; cependant les Auteurs préfèrent la bardane dans les maladies aiguës. M. Boerrhaave recommande

mande beaucoup le suc de la racine de scorfonere pris à la dose de quatre onces pendant quelques jours pour les personnes qui craignent d'être empoisonnées : cette vertu est tout au moins douteuse.

La Pharmacologie rationnelle de cette plante n'est pas plus connue que celle de la bardane.

Scordium officinale , Chamædris palustris sive redolens.

C'EST une espece de Germandrée aquatique , les feuilles & les semences sont d'usage , les feuilles sont oblongues , ridées , dentelées dans leurs bords , molles , velues , blanchâtres , d'une odeur d'ail qui n'est pas désagréable & d'un goût amer ; elles entrent dans la composition du *diascordium* , à qui elles ont donné le nom.

Cas.

ON s'en sert avec succès dans les fièvres malignes à *coagulo* , dans les fièvres putrides vermineuses , dans les maladies inflammatoires exanthématiques ; mais , comme nous l'avons déjà dit des autres sudorifiques , dans le cas seulement où l'éruption se fait difficilement & à cause de l'épaississement des fluides , parce que les sudorifiques échauffent , ils seroient nuisibles dans le cas où l'éruption se fait difficilement à cause de la constriction des vaisseaux & du grand mouvement du sang & dans toutes les affections cutanées , la démangeaison , la gratelle , la gale ; dans le cas de coction lésée qui dépend du relâchement des fibres de l'estomac & de l'acescence des matieres , ce qu'on connoît par les rapports insipides ou aigres ; dans l'inappétence qui dépend du même vice ou qui suppose les mêmes dérangements ; dans les obstructions invétérées du foie , de la rate , dans l'ictère froid , dans les pâles couleurs qui viennent de ce que les regles coulent difficilement , comme cela arrive assez souvent ; en un mot , dans tous les cas où nous avons dit en général que les sudorifiques conviennent , & toujours avec les précautions & les conditions que nous avons marquées.

Vertus.

D'OU il est aisé de conclure que le *scordium* est un médicament sudorifique , puisqu'on l'emploie dans les fièvres malignes à *coagulo* , dans les maladies inflammatoires exanthématiques , stomachique chaud , apéritif

chaud , anthelmentique , emmenagogue & très-propre à donner du ton aux folides.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

LES feuilles s'emploient en infusion ou en décoction ; l'usage veut qu'on les emploie en infusion : on fait infuser théiformement , par exemple , une pincée de ces feuilles dans six onces d'eau qu'on fait prendre au malade dans le cas de fièvre maligne dans l'intervalle des bouillons ; dans l'ictère froid , on fait prendre quatre verrées de cette infusion par jour , deux le matin & deux le soir , observant de n'en pas donner dans l'intervalle d'une heure avant le repas. Le *Scordium* entre dans la composition de l'électuaire appelé *diascordium fracastorii*, du nom de son inventeur ; mais il y entre outre cela d'autres médicaments , comme la cannelle , la bistorte , la tormentille , l'opium , ce qui fait qu'à cause des différentes vertus de ces médicaments , le *diascordium* est tonique , stomachique , légèrement astringent , anthelmentique , narcotique ; on l'emploie avec succès dans les cas où il faut calmer les douleurs vives de colique , dans la diarrhée , la dysenterie depuis demi-gros jusqu'à un gros ou un gros & demi. Sur une once de *diascordium* , il y a à-peu-près quatre grains d'opium , par conséquent demi-grain sur une drachme , ce qui est bon de remarquer pour se régler là-dessus dans l'occasion. La Pharmacologie rationnelle du *diascordium* n'est pas évidente , parce que la vertu de cette plante réside dans ses parties volatiles qui se dissipent par le feu , enforte que l'analyse chimique ne les peut recueillir.

Chardon benit , Carduus benedictus , Carduus atracſtylis.

ON se sert des feuilles & des semences ; les feuilles sont découpées , placées alternativement , fort ameres , velues , terminées par des épines courtes & molles.

Cas.

ON s'en sert avec succès dans les fièvres malignes à *coagulo* , dans les maladies inflammatoires exanthématiques , comme dans la petite vérole , la rougeole , dans les maladies inflammatoires de la poitrine , comme dans la pleurésie , la péripleurésie , dans laquelle l'expérience fait voir que le chardon benit facilite extrêmement l'expectoration , & dans ce cas il convient comme béchique & sudorifique ; dans les fièvres vermineuses ou de vers , dans les fièvres intermittentes les plus rebelles , telle que la fièvre quarte , dans les obstructions invétérées du foie , de la rate produites par

l'épaississement des fluides ; dans l'ictère froid , dans les cas où l'on peut soupçonner du sang extravasé , des crevasses dans les vaisseaux , comme après une chute d'un lieu fort élevé & dans le cas de contusion ; il dissout le sang grumelé dans ces occasions , & le fait passer avec les urines ou les sueurs. *M. Baillou* a observé que la décoction de Chardon benit rendoit les urines épaisses & fétides , extérieurement elle est très-utile dans le cas d'ictère. *Simon Poly* rapporte qu'une femme dont la mamelle étoit ulcérée jusqu'aux côtes , fut guérie par la simple poudre du chardon benit qu'elle appliqua sur l'ulcere ; *Arnaud-de-Villeneuve* , Professeur de cette Université , rapporte la même chose d'un ulcere à la jambe.

Vertus.

EN faisant attention à ces différents cas , on voit que cette plante est fudorifique , apéritive , diurétique , stomachique , fébrifuge , anthelmentique , détersive.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON se sert , comme nous avons dit , des feuilles & des semences de cette plante : on emploie aussi le suc qui en est exprimé & dépuré par résidence & l'eau qu'on en distille , les feuilles s'ordonnent par pincées , une ou deux pincées sur une ou deux livres d'eau , en décoction ou en simple infusion. Dans les maladies inflammatoires de la poitrine on en donne le suc dépuré par résidence de quatre en quatre heures entre les bouillons ; il aide extrêmement l'expectoration & excite souvent des sueurs abondantes , après avoir fait précéder les remèdes généraux , la dose de ce suc est de trois onces. Les semences s'ordonnent depuis demi-gros jusqu'à un & demi en émulsion avec une décoction d'orge ou des feuilles de cette plante , on peut y ajouter le sirop de pavot quand il s'agit de calmer la toux. Un gros de ces semences pilées sur lesquelles on avoit versé sept ou huit onces de vin blanc & qu'on prenoit pendant quelque temps un peu avant le frisson , a souvent arrêté les accès de fièvre quarte : on se sert principalement de l'eau distillée de cette plante dont on fait ordinairement la base des potions cordiales & fudorifiques. La Pharmacologie rationnelle du chardon bénit n'est éclaircie que par celle du *scordium*.

Scabieuse , Scabiosa , vulgaris pratensis.

CETTE plante croît presque par-tout , dans les champs , dans les prés ; les feuilles sont oblongues , lanugineuses , découpées profondement , d'un goût un peu âcre : on se sert de ses feuilles , de l'eau distillée de ses feuilles , & de ses fleurs comme dans le chardon bénit.

Cas.

ON prescrit la scabieuse & son eau distillée dans tous les cas où on ordonne le chardon bénit , & outre cela dans les ulcères internes , dans les dartres.

Vertus.

CETTE plante a les mêmes vertus que le chardon bénit , mais elle a cela de particulier qu'elle déterge les ulcères internes , en déterminant les matieres vers les voies urinaires.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

LES feuilles s'ordonnent de la même façon que le chardon bénit , de même que l'eau distillée : on joint ordinairement les feuilles de scabieuse à celles de chardon bénit , de même que l'eau distillée dans les potions cordiales & les sudorifiques : on compose avec le suc de cette plante & le sucre , le sirop de scabieuse qui est très-propre pour les maladies de la peau , pour les dartres : on le donne depuis demi-once jusqu'à une once & demie ; mais il faut pendant l'usage de ce sirop bassiner les parties affectées de la peau avec la décoction de cette plante.

Diaphorétiques & Sudorifiques tirés du regne animal.

LES différents animaux adultes dont nous avons parlé dans la classe des diurétiques , & ceux dont nous parlerons dans les autres classes & sur-tout leurs excréments , peuvent fournir des médicaments diaphorétiques & sudorifiques ; mais on se sert principalement sous ce point de vue de la corne de cerf , de la vipere , du sang de bouquetin.

Corne de Cerf.

ON l'emploie avec succès dans les maladies aiguës où il y a relâchement du tissu des solides & épaisissement visqueux des fluides , comme il arrive souvent dans les maladies vermineuses , & toujours dans les fièvres malignes à *coagulo* , dans les maladies inflammatoires exanthématiques , dans la petite vérole , la rougeole lorsque les solides sont extrêmement relâchés , les fluides épais & la circulation languissante : on regarde dans ce cas-là ce médicament comme le plus approprié , & on n'a recours à la poudre de vipère & à d'autres sudorifiques puissants , que lorsque la Corne de Cerf n'a pas assez opéré dans le flux de ventre , comme la diarrhée , la dysenterie , soit essentielle , soit symptomatique , mais non dans le commencement , car les flux de ventre du moins dans leur commencement sont souvent salutaires ; ce n'est que sur la fin qu'on donne la corne de cerf , lorsque ces flux de ventre diminuent & abattent les forces du malade loin de le soulager , & après avoir employé inutilement tous les autres remèdes convenables : on peut s'en servir encore dans les maladies cutanées lorsqu'on craint de trop agiter le sang par des sudorifiques plus actifs ; enfin on s'en sert avec succès sur la fin de presque toutes les maladies longues , soit qu'il y ait diarrhée ou non , lorsque les forces paroissent abattues , le sang gluant & languissant dans son mouvement : on s'en sert , dis-je , pour atténuer le sang & lui fournir un mucilage propre à garantir les vaisseaux des matières âcres qui y sont mêlées , & à fortifier en même temps le malade.

Vertus.

PAR la considération de tous les cas où l'on emploie la corne de cerf , il est évident qu'elle est un médicament sudorifique , ou plutôt diaphorétique assez doux , puisqu'elle procure une légère moiteur sans incendier le sang , & qu'on l'emploie dans des cas où l'on redouterait l'usage des autres sudorifiques astringents ; mais en prenant ce mot dans une signification générale , en ce sens , elle fournit aux humeurs un mucilage & elle enduit les parois des vaisseaux , ce qui la rend utile dans la dysenterie & la diarrhée ; on peut aussi la regarder comme un remède analeptique ou restaurant , parce que ce mucilage dont nous venons de parler est extrêmement analogue à nos humeurs.

Maniere de s'en servir, & ses Doses.

LA corne de cerf s'ordonne ordinairement en ptisane ; on se sert de la rapure à la dose d'un gros jusqu'à trois dans trois livres d'eau qu'on fait bouillir jusqu'à diminution du tiers , cette ptisane convient dans les cas de fièvre à *coagulo* , de maladies exanthématiques , de diarrhées. M. Sydenham en préparoit une qu'il appelloit *decoctum album* , qu'il faisoit de cette maniere : il prenoit deux gros de corne de cerf rapée , deux gros de mie de pain bien blanc , faisoit bouillir le tout dans trois livres d'eau jusqu'à diminution d'un tiers & y ajoutoit un peu de sucre jusqu'à agréable douceur , & on se servoit de cette décoction blanche dans la petite vérole , lorsque l'éruption se faisoit difficilement à cause du relâchement des solides & de l'épaississement visqueux des fluides ; dans la dysenterie on en fait aussi une gelée : on prend , par exemple , une once & demie ou deux onces de rapure de corne de cerf , on les fait bouillir long-temps dans trois livres d'eau , le mucilage dont l'eau se trouve imprégnée prend en se refroidissant la consistance de gelée , on peut y joindre les chairs de chapon , les vieilles perdrix si on veut nourrir un peu plus le malade ; mais quand on veut seulement atténuer les humeurs , on y joint le veau , on peut aussi y ajouter le citron , un peu de cannelle , des amandes douces pour la rendre plus agréable , on en donne une ou deux cuillerées de quatre en quatre heures entre les bouillons : on se sert encore du sel volatil de corne de cerf à la dose de six grains à quinze ou vingt tout au plus lorsque les forces de la circulation sont languissantes & le sang extrêmement épais , on le donne dans du vin , dans quelques potions cordiales , vers la fin de quelques maladies longues : on donne aussi l'esprit volatil de corne de cerf pour diviser le sang depuis trois gouttes jusqu'à huit ou neuf.

Pharmacologie rationnelle.

LES vertus de la corne de cerf paroissent dépendre du mucilage qui enveloppe un sel volatil très-fin , par-là la partie mucilagineuse de corne de cerf devient nourrissante , elle enduit les parois des canaux , & les défend contre l'irritation ; par son sel volatil elle divise légèrement les humeurs , leur rend leur fluidité pour qu'elles se portent plus facilement vers les couloirs de la peau.

La Vipere.

LA Vipere est une espece de serpent plus venimeux que les autres , qui en differe principalement parce qu'elle fait ses petites vivants , au lieu que les autres font des œufs , & parce qu'elle a deux dents creuses aux côtés de la mâchoire supérieure , c'est dans la cavité de ces dents que coule la matiere venimeuse contenue dans deux vessies placées à la racine de ces dents , & c'est par où elle s'insinue dans les plaies que la vipere fait en mordant avec ces mêmes dents.

Cas.

ON emploie la vipere dans les mêmes cas que la corne de cerf , de façon qu'on doit toujours commencer par la corne de cerf : on s'en sert principalement dans les maladies cutanées , comme dans la gale invétérée , dans la lepre ; il faut cependant remarquer que dans les tempéraments fougueux on ne doit pas s'en servir , mais il arrive rarement que cela soit ainsi ; ces maladies dépendent presque toujours d'un grand épaisissement des humeurs : on recommande aussi la vipere dans la consomption ou l'émaciation : il faut faire attention que l'émaciation ou l'atrophie peut être produite ou par une fièvre lente essentielle qu'on appelle proprement fièvre hectique , ou par une fièvre lente symptomatique ; la fièvre lente symptomatique dépend toujours de quelqu'ulcere , soit interne , comme ceux des poudrons , soit externe , & dans ce cas il est visible que l'usage de la vipere ne sauroit convenir , il seroit même pernicieux ; la fièvre lente essentielle ne dépend d'aucun ulcere , mais de l'épaisissement & de la grossièreté de la lympe qui ne peut pénétrer dans les petits vaisseaux nevrolymphatiques ; dans celle-ci on n'observe point de redoublement si marqué , surtout au commencement , que dans les fièvres lentes symptomatiques ; d'ailleurs dans les fièvres lentes essentielles la peau est sèche & aride ; c'est seulement dans le cas où la consomption est produite par cette dernière espece de fièvre lente que la vipere convient ; enfin on donne encore la vipere avec des cordiaux sur la fin des maladies , lorsque les forces sont entièrement abattues.

Vertus.

LES cas où on emploie la vipere font voir qu'elle fournit un remede diaphorétique ou sudorifique vif propre dans les maladies de la peau , analeptique , cordial.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON se sert de la Vipere seche en substance ; on lui coupe la tête & la queue , quoiqu'il y ait des Auteurs célèbres qui regardent cette précaution comme inutile , mais l'usage l'a consacré , ainsi on doit l'observer : on l'écorche & on ôte les entrailles ; on peut prendre un ou deux troncs de vipere qu'on coupe en tranches , on les fait bouillir deux ou trois heures avec un poulet ou demi-livre de maigre de veau dans un pot exactement fermé : cette précaution est nécessaire si on veut en voir le bon effet qu'on a lieu d'en attendre , parce qu'autrement les parties volatiles d'où il dépend s'évaporeront ; les bouillons de vipere ainsi préparés font bien dans les maladies cutanées chroniques , dans la gale , la lepre , les dartres invétérées & dans l'astrophie ou consommation dans les circonstances que nous avons marquées ci-dessus ; on peut aussi manger de la vipere préparée comme on prépare ordinairement les poissons. On se sert encore de la poudre de vipere qu'on prépare en faisant sécher la vipere au four , & la pulvérisant ensuite ; cette poudre convient dans les maladies aiguës , dans les fièvres malignes à *coagulo* , dans les fièvres exanthématiques , la dose est depuis huit grains jusqu'à quinze ou vingt : on la donne dans du vin ou le plus ordinairement dans une potion cordiale & sudorifique qu'on fait de cette maniere : on prend trois onces d'eau distillée de scabieuse , trois onces d'eau distillée de chardon bénit , demi-gros de confecton d'hyacinthe , demi-gros de confecton d'alkermès , un scrupule de poudre de vipere dont on fait prendre au malade par cuillerée : on se sert aussi du sel volatil de vipere depuis six grains jusqu'à quinze ou vingt , & de l'esprit volatil de vipere depuis trois gouttes jusqu'à six ou huit , mais il faut remarquer que ce sel & cet esprit volatil sont plus actifs que ceux de corne de cerf ; aussi on ne doit les donner què lorsqu'on ne craint point d'échauffer le malade , comme dans les cas où les solides sont relâchés & les fluides épaissis par viscosité.

Pharmacologie Rationnelle.

LA vertu de la vipere réside dans un suc mucilagineux & un sel volatil alkalescent ; sa partie mucilagineuse s'est montrée par la consistance des bouillons , la chymie nous démontre son sel volatil.

Sang de Bouquetin , Sanguis Hirci.

LE sang de Bouquetin n'est autre chose que le sang d'un bouc , soit domestique , soit sauvage , qu'on a fait dessécher au four ; celui du bouc domestique s'appelle proprement sang de Bouquin.

Cas.

ON s'en sert dans tous les cas où l'on emploie la corne de cerf & la vipère ; il convient spécialement pour la pleurésie & dans la péripneumonie , c'est-à-dire , qui ne dépend pas de la fièvre maligne ou de la fièvre putride ; dans ces maladies il est propre à faciliter l'expectoration & à procurer la sueur ; mais on ne doit pas le donner dans le commencement lorsqu'il y a ardeur , sécheresse , que la langue est sèche & aride , sans aucun signe de putridité , mais seulement après avoir employé les saignées , les adoucissants , les purgatifs appropriés , & lorsque la peau est moins aride , moins sèche , qu'elle commence à devenir moite , alors c'est le cas d'employer le sang de Bouquetin.

Vertus.

C'EST un sudorifique très-actif , dont on ne doit pas se servir lorsqu'on craint d'échauffer , lorsque les forces de la circulation sont augmentées ; on le regarde encore comme un bon résolvant dans les cas de contusion , d'échymose lorsqu'il y a une extravasation de sang , soit dans les parties internes , soit dans les parties externes : on croit qu'il est propre à atténuer le sang extravasé , à le résoudre , à le mettre en état d'être repompé , de rentrer dans la voie de la circulation pour être ensuite chassé du corps par la voie de l'insensible transpiration ; supposé qu'il ait cette vertu qui est un peu équivoque , ce n'est qu'autant qu'il augmente la chaleur , l'énergie de la circulation , l'activité des solides & non pas en agissant immédiatement sur le sang extravasé. Quoi qu'il en soit de cette vertu , l'usage veut qu'on s'en serve dans le cas proposé ; enfin quelques-uns l'ont regardé comme un bon lithontriptique qui convient dans les maladies des reins & de la vessie , occasionnées par la pierre ou par le gravier. Pour rendre cette vertu plus sûre , il convient de nourrir le bouc dont on veut employer le sang avec des plantes aromatiques , diurétiques qui ont quelque chose de lithontriptique ; on peut cependant révoquer cette vertu du sang de Bouquetin.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON prescrit le sang de Bouquetin à la dose de dix grains jusqu'à vingt ou trente , dans une potion cordiale ou sudorifique , par exemple , des eaux distillées de scabieuse & de chardon bénit , de chacune trois onces , de confection d'hyacinthe & d'alkermès , de chacune demi-gros & quinze grains de sang de bouquetin : on donne cette potion à cuillerée.

Pharmacologie rationnelle.

LA vertu diaphorétique du sang de Bouquetin réside dans un sel volatil alkalescent : c'est dans le même principe que réside encore la vertu qu'il a d'atténuer & de diviser le sang extravasé immédiatement cependant & dans le sens que nous avons expliqué ci-devant ; non-seulement le sang de Bouquetin est diaphorétique , mais encore le sang & les différentes parties des autres animaux , tant de ceux dont nous parlerons dans la suite , puisqu'on trouve en tous les principes qui rendent le sang de Bouquetin diaphorétique , savoir , un sel volatil alkalescent , d'où il suit qu'on ne devroit pas préférer celui de Bouquetin à celui des autres animaux ; l'usage cependant veut qu'on lui accorde cette préférence dans les cas que nous avons indiqués ; il faut aussi remarquer que plus les animaux sont exercés , plus le sang est alkalescent , & par cette raison on doit préférer les animaux sauvages qui sont plus exercés aux animaux qui le sont moins. C'est encore pour la même raison qu'on emploie dans la même vue les excréments de différents animaux comme contenant un sel volatil alkalescent bien développé , mais sur-tout les excréments & la fiente de chien qu'on appelle *album græcum* , la fiente de poule , de pigeon ; on s'en sert dans le cas où le sang de Bouquetin convient depuis dix grains jusqu'à trente dans les potions cordiales & sudorifiques , les excréments sont encore plus actifs que le sang de Bouquetin : le sang de paon est aussi sudorifique , on lui attribue une vertu antiépileptique , sa dose est pareillement depuis dix grains jusqu'à trente ; on peut l'ordonner à cette dose dans une ou deux cuillerées de bouillon antiépileptique , dans le cas d'épilepsie essentielle où le sang est épais , visqueux.

Antimoine crud.

NOUS avons déjà parlé de l'Antimoine & des différentes préparations émétiques qu'on en fait ; l'antimoine crud n'est pas émétique , à moins qu'il ne soit donné à trop haute dose , ou qu'il n'y ait de grandes dispositions au vomissement : on l'emploie comme sudorifique & atténuant dans les cas suivants.

Cas.

ON s'en sert dans les maladies cutanées , dans la gale , la gratelle , la lepre , dans les obstructions des glandes du mésentère & dans les consumptions qui sont la suite des obstructions. On voit souvent cette espèce de consommation dans les enfants écrouelleux qui ont tout le mésentère obstrué.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON l'emploie concassé grossièrement , on l'associe aux ptisanes sudorifiques à la dose de demi-once ou d'une once , suspendu dans un nouet , mais ces ptisanes n'en tirent pas beaucoup de vertu quoiqu'on les fasse bouillir assez long-temps ; ainsi il est assez inutile de cette façon , il vaut mieux l'employer réduit en poudre impalpable , la dose en est depuis dix grains jusqu'à trente ; on peut l'associer à quelque autre ^{med. camphre} ~~bon~~ approprié ou à quelque autre remède atténuant pour en former des bols avec quelque sirop approprié , comme par exemple , le sirop de scabieuse en cas de maladie de la peau. Pendant l'usage de l'antimoine il faut avoir soin de tenir les premières voies nettes , & que le malade évite les aigres , & tout ce qui tourne à l'acrescence , comme les salades , le vinaigre , le lait , parce que l'acide détachant de l'antimoine les parties régulines , pourroit le rendre émétique : il est vraisemblable que l'antimoine agit par son poids spécifique , ce qui fait qu'il conserve mieux le mouvement qu'il reçoit par les forces de la circulation , & qu'il parvient jusques dans les plus petites filières du corps humain ; c'est peut-être pour cette raison qu'il produit de bons effets dans les obstructions.

Antimoine diaphorétique , ou Chaux d'Antimoine.

ON le fait avec une partie d'antimoine & trois parties de nitre , le tout pulvérisé & mêlé , qu'on jette par cuillerées dans un creuset rou-

ge ; après chaque détonnation on trouve au fond du creuset une masse blanchâtre qu'on fait sécher & qu'on lave , c'est l'antimoine diaphorétique.

Cas.

ON s'en fert dans les maladies aiguës comme dans les fièvres malignes à *coagulo* , dans les maladies inflammatoires exanthématiques , dans les maladies chroniques de la peau , dans les maladies inflammatoires de la poitrine. On l'associe au sang de bouquetin depuis dix grains jusqu'à 30 dans une potion cordiale ; donné à haute dose il pousse par les sueurs & par les urines.

Des Emmenagogues.

LES personnes du sexe sont sujettes à une évacuation de sang périodique qui revient tous les mois qu'on appelle pour cette raison *mois* , *menstrues* , *flux menstruel* , *regles* ; elles sont aussi sujettes après l'accouchement à un écoulement d'abord de sang , ensuite d'une matière laiteuse qui dure trois semaines , un mois , plus ou moins , suivant les différents sujets , c'est ce qu'on appelle *lochies* , *vuidanges* : on comprend sous la classe des emmenagogues , les médicaments qui provoquent les mois & ceux qui provoquent les lochies , quoiqu'on appelle aristolochiques les médicaments qu'on donne sous ce dernier point de vue ; le temps où les règles commencent à paroître n'est pas déterminé ; le plus ordinairement est depuis l'âge de douze ou treize ans jusqu'à dix-sept ou dix-huit , cela varie selon les différents tempéraments & les différents climats ; en général on fait qu'elles paroissent plutôt & qu'elles coulent avec plus d'abondance dans les tempéraments bilieux que dans les tempéraments pituiteux , dans les pays chauds que dans les pays froids , le temps où elles finissent n'est pas déterminé , le plus ordinairement c'est depuis quarante-cinq jusqu'à cinquante ans , cela varie encore selon les tempéraments & les pays. Pour ce qui est de la cause qui détermine le retour périodique du flux menstruel , on a beaucoup travaillé pour la trouver ; les uns ont eu recours à la lune , les autres à d'autres causes qui ne sont pas plus satisfaisantes ; pour nous , après avoir bien réfléchi sur cette question , il nous paroît que la cause à laquelle on s'est le plus attaché & avec le plus de fruit & d'utilité depuis *Galien* jusqu'à présent , c'est la pléthore ou la plénitude , l'abondance de sang ; la pléthore peut être ou universelle ou particulière : elle est universelle lorsque la quantité de sang se trouve augmentée par tout le corps ; elle est particulière lorsque ce n'est que

dans quelques parties : on conçoit cette dernière , par l'exemple de l'inflammation d'une partie dans laquelle le sang se trouve en plus grande abondance qu'avant l'inflammation ; en faisant attention à un grand nombre d'observations , nous sommes déterminés à croire que les deux pléthores universelle & particulière , ou pléthore de l'utérus , se trouvent presque toujours présentes dans le temps du flux menstruel : il y a cependant des cas où la pléthore particulière se trouve seule , que le sang évacué dans le temps des règles est un sang pléthorique , surabondant & inutile , la preuve en est que cette évacuation bien loin d'être nuisible est au contraire salutaire ; les femmes se trouvent mieux ensuite , non-seulement elles n'en sont pas plus faibles , mais encore elles en sont plus fortes. De la suppression combien ne résulte-t-il pas des maux ! Expliquons à présent par quel jeu se fait cette évacuation , ceci nous servira pour entendre la manière dont les remèdes emmenagogues agissent. Le mécanisme de cette évacuation est fort simple & se réduit à peu de chose.

Mécanisme du flux menstruel.

L'UTÉRUS ou la Matrice est un corps spongieux vers le fond duquel il y a des cavités ou des sinus qui d'une part communiquent avec les veines & les artères de ce viscère , & de l'autre s'ouvrent par de petits orifices dans la cavité de l'utérus. MM. Morgagni , Rioland , Malpighi , Litre & Winslow les ont vus & démontrés dans des femmes mortes pendant le temps de leurs règles ou peu de temps après l'accouchement ; M. Tendon , Anatomiste de cette ville , les a démontrés dans une femme morte quatre heures après l'accouchement dans l'amphithéâtre de M. de la Mure. L'existence de ces sinus ne peut être révoquée en doute. Outre ces sinus qui hors le temps des règles ne laissent échapper dans la cavité de l'utérus qu'une lymphe , on voit encore très-distinctement vers le fond de la matrice des fibres musculaires tant intérieures qu'extérieures qui entourent les mêmes sinus. Cette explication anatomique nous suffit pour expliquer le Mécanisme du flux menstruel. Pour expliquer ce mécanisme , il est certain que les sinus des endroits des vaisseaux sanguins sont plus faibles que les autres , le sang qui y arrive ne fera donc pas repoussé par les parois avec la même force qu'il y aborde. Il s'accumulera donc , & ces sinus seront distendus insensiblement jusqu'au point que les fibres musculaires soient irritées ; après un certain temps , ces fibres entreront en contraction , & le sang pressé par cette

contraction se fera jour en jour se portant vers les vaisseaux veineux , soit vers les orifices qui s'ouvrent dans la cavité de l'utérus ; une comparaison rendra ceci plus clair : l'urine se sépare du sang dans les reins & se porte continuellement dans la vessie , ce n'est cependant qu'après que la vessie s'est distendue jusqu'à un certain point , qu'étant irritée , elle se contracte & chasse l'urine par le canal de l'uretre. Ce qui a embarrassé les Auteurs dans cette évacuation & qui les a obligés à recourir à la lune , c'est le merveilleux qu'ils ont cru voir dans la régularité ; il n'y a pas plus cependant que dans les autres excrétiions auxquelles on ne fait point d'attention , parce qu'on les a toujours sous les yeux ; car on voit tous les jours des personnes réglées dans leur manger & leur exercice , aller à la selle une fois par jour , à la même heure & quelquefois au même moment ; trouve-t-on du merveilleux en cela , & a-t-on recours à la lune pour l'expliquer ? L'intestin *rectum* se remplit dans le même temps , il doit donc se vider dans le même temps ; nous pouvons dire la même chose du flux menstruel avec d'autant plus de raison que , comme il y a des irrégularités pour les déjections , il y en a aussi pour les mois qui avancent ou retardent quelquefois trois ou quatre jours , & quelquefois plus , selon les exercices. Ce que nous venons d'observer pour les déjections des matieres fécales , on l'observe aussi pour l'excrétion de l'urine dans plusieurs personnes réglées qui la rendent un certain nombre de fois dans la journée & à des heures marquées ; on peut aisément faire l'application , au lieu d'une vessie , il n'y a qu'à en concevoir un certain nombre. La régularité du flux menstruel ne doit donc pas plus nous étonner que celle des autres excrétiions dont nous venons de parler ; ce mécanisme posé , il est aisé de concevoir comment le flux menstruel peut être arrêté ou supprimé ; car 1°. si le sang s'accumule en trop grande quantité dans ces sinus & qu'il les dilate trop , les fibres musculaires seront portées au-delà de leur ton , elles seront relâchées & comme paralysées & hors d'état de se contracter ; l'évacuation par conséquent n'aura plus lieu , comme on voit que l'excrétion de l'urine est supprimée si la vessie est trop distendue ou paralysée. 2°. Si les fibres musculaires sont trop roides , les parois des sinus n'ayant plus leur souplesse naturelle , le sang ne pourra plus s'accumuler jusqu'au point de vaincre leur résistance. 3°. Le flux menstruel sera encore arrêté ou supprimé si les fibres musculaires sont dans un état d'érétisme ou de contraction spasmodique , comme l'excrétion de l'urine est supprimée par l'érétisme du sphincter de la vessie , dans lesquels cas la suppression d'urine est enlevée par le *laudanum*. 4°. Les

regles seront aussi supprimées si le sang est épais & qu'il résiste trop à l'action des fibres musculaires. 5°. Les regles seront aussi supprimées, si le sang est trop épais, s'il est en même temps en trop grande quantité & qu'il résiste ainsi à raison de sa quantité & de son épaissement. 6°. S'il est âcre, l'âcreté irritant les fibres musculaires, peut resserrer les sinus & empêcher l'écoulement; ainsi la suppression des regles peut venir de plusieurs causes; tant de la part des solides que de la part des fluides, ce qui fait que presque tous les médicaments peuvent devenir emmenagogues, en prenant le mot dans sa signification générale, & selon la force de son étymologie, selon laquelle il marque toute sorte de médicaments qui provoquent les mois; car par ce que nous venons de dire, cette suppression peut venir, 1°. du relâchement ou de la mollesse des fibres, 2°. de la roideur ou plutôt de la dureté de ces mêmes fibres, 3°. de leurs contractions spasmodiques, 4°. de l'épaississement des fluides, 5°. de l'épaississement & de la trop grande quantité des fluides, 6°. de leur âcreté; & si elle dépend de la rigidité ou de la dureté des fibres, il est visible que les relâchants pourroient rétablir les regles; si c'est de la constriction spasmodique, les calmants, les anodins procureront cet effet. Cependant l'usage a restreint la signification des emmenagogues aux remèdes qui peuvent rétablir le cours des regles dont la suppression dépend du relâchement des solides ou de l'épaississement des fluides, remèdes qui agissent en échauffant; ce sont des médicaments qui doivent donner du ton aux solides, diviser les fluides, les rendre plus coulants, ils sont donc toniques, atténuants, échauffants.

Cas où les Emmenagogues proprement dits, sont indiqués.

PAR la raison du contraire ils sont contre-indiqués dans les cas où la suppression dépend de l'éretisme, de la constriction spasmodique des solides, de la sécheresse, de l'âcreté des fluides; c'est la définition des cas où les emmenagogues sont contre-indiqués, voici celle des cas où les emmenagogues proprement dits sont indiqués; par ce que nous venons de dire, il est aisé de voir que les emmenagogues proprement dits sont indiqués dans la suppression des mois dépendante du relâchement des solides & de l'épaississement des fluides; ce que nous disons de la suppression des mois, il faut le dire de celles des lochies,

Précautions.

ELLES sont dans cette matiere de la dernière conséquence , on peut les réduire à l'attention que l'on doit faire , 1°. à l'âge , 2°. au tempérament , 3°. au pays , 4°. à la coutume , 5°. aux circonstances qui se prennent du temps où les femmes sont réglées & de celui où elles ne le sont pas , développons chacun de ces chefs en particulier : je dis qu'il faut , 1°. faire attention à l'âge : nous avons dit que les regles commencent à paroître depuis l'âge de douze ans jusqu'à dix-huit ; mais si à l'âge de dix ans les symptomes qui paroissent dans une fille ne peuvent pas être rapportés aux efforts que fait la nature pour produire les évacuations périodiques , il n'en fera pas de même si ces symptomes paroissent vers le temps où les regles ont coutume de commencer , il se peut faire alors que les symptomes dépendent des regles qui doivent paroître , cette même attention à l'âge nous fera connoître la source des différentes incommodités qui paroissent après la suppression des regles , où elles ont coutume de finir , sur-tout si cette suppression a été subite , on peut dire que ces incommodités dépendent de la suppression des regles , 2°. au tempérament ; le tempérament bilieux est plutôt réglé que le pituiteux , c'est une attention que nous devons faire , 3°. au pays ; dans les climats méridionaux les femmes sont réglées deux ou trois ans plutôt que vers le septentrion ; ainsi dans un pays chaud à un certain âge , nous pouvons attribuer les maladies ou les symptomes qui surviennent , aux efforts que fait la nature pour produire les évacuations , ce que nous ne pourrions vraisemblablement faire dans un pays froid ; la considération du pays peut non-seulement nous guider dans différentes maladies qui surviennent à un certain âge , mais encore par rapport à la quantité du sang qui doit s'écouler ; ces évacuations sont plus copieuses dans les pays chauds que dans les pays froids ; 4°. à la coutume de chaque femme , il y a des femmes qui ne sont pas réglées & qui se portent bien , il y en a d'autres qui le sont deux fois par mois , sans que leur santé soit altérée ; il est donc nécessaire d'interroger la malade sur sa façon d'être par rapport aux évacuations menstruelles pour déterminer s'il y en a trop ou trop peu ; il en est de même des vuidanges dans les femmes accouchées ; il y en a qui ne perdent pas du tout , d'autres perdent peu , les unes perdent en rouge & les autres en blanc , là-dessus il faut s'informer exactement de la coutume de la malade supposé qu'elle ait fait des enfants afin de ne pas ordonner des remèdes mal-à-propos ; si elle n'en a

pas

pas fait , notre regle doit être celle-ci : si outre ces symptomes qui sont la suite naturelle de l'enfantement , il en paroît d'autres qui ne peuvent être attribués qu'à une évacuation supprimée , ou qui devroit se faire , nous devons employer les emmenagogues ; au contraire , si ces derniers symptomes ne paroissent pas , il faut s'en abstenir ; 5°. enfin aux circonstances où l'expérience nous apprend que les femmes ne doivent pas être réglées , tel est le temps de la grossesse où les femmes n'ont pas ordinairement leurs regles dès le premier mois ; la grossesse est la cause naturelle de la suppression des regles ; ainsi si la malade est mariée , on peut l'attribuer à la grossesse , mais il faut être extrêmement circonspect pour porter son jugement ; lorsqu'il s'agit d'une fille qui étant en âge d'être réglée éprouve cependant cette suppression sans en être beaucoup incommodée , il faut s'informer avec toute la décence qui convient à notre art pour découvrir la cause de cette suppression ; si elle vient de la grossesse , c'est un cas très-délicat , il s'agit de la malade & des intérêts de la société , il faut observer si cette suppression n'est pas accompagnée des symptomes de la grossesse : les nourrices ordinairement ne doivent pas avoir leurs regles , vouloir les provoquer dans ce cas , ce feroit supprimer le lait en détournant le cours des humeurs ailleurs ; il y a cependant des nourrices qui par rapport à leur tempérament ont leurs regles , alors on pourroit les provoquer si elles étoient supprimées ; enfin à l'âge de quarante ou cinquante ans les femmes cessent d'avoir leurs regles ; alors nous ne devons pas les provoquer sans des raisons particulieres , mais on peut le faire , si étant supprimées brusquement , il en résulte des symptomes fâcheux.

Signes qui font connoître les causes de la suppression des Regles.

NOUS avons dit que cette suppression venoit ou pouvoit venir du relâchement des fibres , de leur roideur , de leur constriction spasmodique , de l'épaississement seul des fluides , de l'épaississement joint à la trop grande quantité des fluides , enfin de l'âcreté de ces mêmes fluides ; comme donc les emmenagogues ne conviennent que dans le cas de relâchement des solides & d'épaississement des fluides , pour ne rien laisser à désirer dans un sujet si important , il est nécessaire que nous indiquions ici les signes par lesquels on peut reconnoître les différentes causes d'où dépendent la suppression ou la diminution des regles , le tempérament nous porte fort à la connoissance de la cause de la suppression , comme aussi les symptomes que nous allons remarquer ; ainsi le tempérament froid pituiteux ,

des douleurs gravatives qui n'ont rien de tensif , d'aigu , l'habitude molle du corps nous dénotent que la suppression vient du relâchement des solides ; le tempérament mélancholique où les fibres sont roides , les humeurs épaisses par sécheresse nous porte à croire que la suppression vient de la roideur des solides & de l'épaississement sec des fluides , sur-tout si à ce tempérament se joint un exercice violent qui aura précédé , un régime de vie propre à former des humeurs épaisses , un corps robuste : on connoît l'érétisme dans les tempéraments vifs , bilieux , par la vivacité & la trop grande sensibilité aux moindres impressions , & lorsque la malade se plaint d'une douleur vive & lancinante , qu'elle rapporte principalement à la région hypogastrique ; dans ce cas nous devons soupçonner que la suppression vient de l'érétisme , du spasme , ou de l'irritation du genre nerveux qui est produite d'ailleurs dans ce tempérament par l'âcreté des humeurs ; les vices des fluides qui peuvent donner lieu à la suppression des regles , se réduisent , comme nous avons dit à la pléthore & à l'épaississement visqueux , glutineux qui peut être inflammatoire lorsqu'il y a âcreté ; pour ce qui est de la pléthore , les signes sont la rougeur de l'habitude du corps , du visage , des levres , un pouls plein , quelquefois petit , une douleur tensive par tout le corps , particulièrement vers l'hypogastre. Ces signes sont confirmés si la malade n'a pas fait d'exercice , si elle a mangé des aliments pleins de suc & propres à fournir beaucoup de chyle ; de plus s'il n'a pas paru de vices dans les digestions : de-là on déduit que la malade a fait plus de sang qu'à l'ordinaire , qu'ainsi il abonde ; mais le sang étant trop abondant doit s'épaissir , car les forces vitales sont opprimées , le pouls petit , lent , l'épaississement inflammatoire est distingué de l'épaississement gelatineux simple , par le degré de chaleur , par des inflammations qui paroissent en différentes parties du corps ; l'âcreté des humeurs se connoît principalement par la chaleur âcre répandue sur toute l'habitude du corps , par la soif , le tempérament bilieux , le pouls grand , quelquefois la suppression des regles est combinée avec d'autres maladies , dont la cause est toute différente de celle de la suppression. *M. de la Mure* a vu deux ou trois fois dans un tempérament pétéux , avec une habitude œdémateuse , la suppression des regles produite par l'érétisme , ce qui paroissoit par la douleur vive & lancinante rapportée à l'hypogastre ; alors il faut varier les remèdes pour remplir deux indications si différentes. Entre les causes internes de la suppression des regles dont nous venons de parler , il peut y en avoir d'externes par vice de conformation , par exemple ; dans ce cas tout se fait naturellement à l'intérieur , & il arrive cependant

suppression des regles : on voit cela dans les filles imperforées , l'hymen étant dur , quelquefois ossifié , dans ce cas les filles ont des douleurs graves rapportées aux parties de la génération qui paroissent gonflées ; alors le sang s'accumule dans l'utérus , dans le vagin , la sécrétion des regles se fait à l'ordinaire , mais il y a un vice local qui empêche l'excrétion ; il y a des observations par lesquelles il consiste que , quoique l'orifice extérieur du vagin parût bien disposé , il y avoit néanmoins dans l'intérieur des cloisons membraneuses , c'est ce qu'on doit examiner ; l'orifice de la matrice peut être aussi bouché ; dans ce cas les injections , les fomentations , les cataplasmes émollients conviennent. Après avoir examiné les différentes causes de la suppression des regles , nous observerons de nouveau que les emmenagogues proprement dits , ne conviennent que lorsque cette suppression dépend du relâchement des solides & de l'épaississement des fluides , encore faut-il observer que cet épaississement ne soit pas inflammatoire ; dans le cas de pléthore , il faut faire précéder une ou deux saignées , parce que sans cette précaution , les emmenagogues agitant le sang pourroient augmenter le mal & causer quelqu'inflammation : on commence par la saignée du bras , après quoi on peut saigner du pied ; on doit avoir égard à l'état des premières voies & examiner si les digestions se font bien , car très-souvent le mal dépend de ces premières voies ; alors il faut purger s'il y a indication , faire vomir s'il est nécessaire , enfin donner des stomachiques chauds ou froids , selon le cas , ensuite on peut en venir aux emmenagogues ; quant au choix des emmenagogues , il ne peut se faire que par la connoissance détaillée de ces médicaments que nous allons donner , les emmenagogues nous sont fournis par les trois regnes.

Emmenagogues tirés du Regne Végétal.]

La Rue , la Sabine , l'Armoise , la Matricaire.

CE sont les Emmenagogues du regne végétal les plus usités ; on les associe ordinairement dans plusieurs cas , comme nous le verrons ci-après , aussi nous les réunirons dans cet article.

La Rue.

IL y en a de deux especes , celle de jardin , *ruta hortensis* , & la rue sauvage , *ruta sylvestris* , qui ne diffèrent pas essentiellement entre elles , mais seulement par la grandeur de la plante & des feuilles ; la rue sauvage est plus petite , les feuilles plus étroites , elle a aussi l'odeur un

peu plus forte , & le goût un peu plus âcre que celle de jardin ; elles ont d'ailleurs à peu près les mêmes vertus toutes les deux : on préfère pour l'usage celle de jardin.

La Sabine.

IL y en a aussi de deux espèces , la sabine à feuilles de tamarisc , *sabina folio tamarisci* , & la sabine à feuilles de cyprès , *sabina feminea folio cupressi* : elles sont d'usage toutes les deux.

L'Armoise.

SES feuilles sont nombreuses , placées alternativement , d'un verd foncé en dessus , blanchâtres en dessous.

La Matricaire.

LA Matricaire , *Matricaria herba virginea* , très-recommandée dans la chlorose. Nous allons d'abord exposer les cas généraux où ces quatre plantes conviennent ; nous marquerons ensuite les différents degrés de force qui se trouvent dans chacune d'elles , après nous parlerons des cas particuliers où chacune est appropriée.

Cas généraux , où ces quatre Plantes conviennent.

ON les emploie avec succès dans les cas de suppression ou de diminution des règles , pourvu cependant qu'elles dépendent du relâchement des solides & de l'épaississement des fluides , (car c'est une condition nécessaire pour pouvoir se servir de ces quatre emmenagogues & des autres dont nous parlerons dans la suite , ainsi nous ne la répéterons plus) dans le cas des lochies supprimées contre l'ordre naturel , toujours avec les mêmes conditions de la part des solides & des fluides ; dans les accouchements difficiles & laborieux qui dépendent d'une espèce de foiblesse , à cause du relâchement des solides & de l'épaississement des fluides , lorsque le fœtus ne se donne que peu ou point de mouvement , comme lorsqu'il est mort & que l'accouchement doit se faire par les seuls efforts de la nature ; dans les cas qui suivent l'accouchement , comme lorsque l'arrière-faix , c'est-à-dire , les membranes qui enveloppent le fœtus , & le placenta par lequel il est attaché à l'utérus , lors , dis-je , que l'arrière-faix qui doit être chassé bientôt après l'expulsion du fœtus , est retenu dans l'utérus , & y produit des hémorragies considérables , des douleurs &

des inflammations ; dans certaines maladies qui dépendent souvent de la suppression des regles , comme dans la chlorose ou pâle couleur des filles , qui présente un coup d'œil œdémateux , une espece d'état cachétique , accompagné de lassitude spontanée , des douleurs obscures , d'un appétit dépravé , comme de manger du plâtre , de la terre , ou d'un délire mélancolique , comme de compter les carreaux des vitres , les carreaux de la chambre ; dans la passion hystrérique , dans des tempéraments pituiteux , & alors on les donne , soit dans le temps du paroxysme , soit dans l'interval du paroxysme , ou même dans des personnes d'un tempérament vif , mais dans ce dernier cas on ne les donne que dans le temps du paroxysme : tels sont les cas où l'on emploie ces quatre plantes & où même on les associe , elles n'ont pas cependant une égale vertu ou une égale force. La plus active de toutes ces plantes , c'est la sabine qui chauffe extrêmement , qui procure le plus sûrement & le plus constamment l'évacuation des regles , & qui aide le plus puissamment l'exclusion du fœtus & de l'arrière-faix. Parmi les filles de mauvaise vie , il y en a qui font usage de la sabine pour rappeler leurs regles , & se procurer l'avortement : cette plante ne produit pas toujours cet effet , mais elle cause toujours quelqu'hémorragie , soit par la bouche , soit par le nez. *M. de la Mure* a vu une fille qui avoit usé de la sabine dans cette mauvaise fin , qui n'avorta cependant pas , mais qui eut une hémoptisie qu'on arrêta par les remèdes convenables , elle porta son fruit les neuf mois à l'ordinaire ; c'est sans doute quelque cas particulier & semblable à celui-ci où la sabine n'a pas procuré l'avortement , qui a fait douter quelques Auteurs de la vertu de cette plante pour produire cet effet ; mais ce n'est pas par des cas particuliers qui dépendent du tempérament , des dispositions particulières du sujet , qu'on doit juger de la vertu de cette plante aussi bien que des autres , mais par le gros , pour ainsi dire , des observations. Or il est certain que le sentiment général des Auteurs se réunit à regarder la sabine comme un des plus puissants & des plus dangereux emmenagogues : c'est un remède qu'on doit redouter , & dont on ne doit se servir que dans le cas d'un grand relâchement des solides & d'un grand épaisissement des fluides ; sa force est telle qu'on prétend qu'appliquée extérieurement sous la plante des pieds ou portée dans les souliers , elle provoque les regles. Après la sabine , la rue est la plus active des quatre plantes dont nous avons parlé ; c'est un puissant emmenagogue , mais violent & moins mal-faisant que la sabine , ensuite la matricaire qui est assez active , enfin l'armoïse est celle qui est la moins active des quatre.

& celle dont on peut se servir avec moins de crainte d'échauffer : on y joint ordinairement la rue , l'armoïse & la matricaire pour l'usage ; il est rare qu'on emploie la sabine , si ce n'est dans des cas désespérés , comme nous l'avons dit plus haut dans les cas où les solides sont extrêmement relâchés & où les fluides sont extrêmement épaissis , où par conséquent on ne craint point d'augmenter la circulation.

Cas particuliers où chacune de ces Plantes est appropriée.

La Rue.

OUTRE les cas où l'on emploie avec succès comme emmenagogues la rue , elle convient en particulier dans les écrouelles ; on en fait prendre le matin à jeun trois à quatre feuilles aux enfants affligés de cette maladie , ils les mangent avec leur pain , & en continuent long-temps l'usage , ou on leur en fait avaler le suc dépuré à la dose que nous marquerons ci-après. La décoction de rue fournit un bon gargarisme dans le scorbut froid & dans la petite vérole , lorsque les grains occupent l'intérieur de la bouche & du gosier , & gênent la respiration ou la déglutition , ou l'une & l'autre tout ensemble : on fait aussi un bon remède pour dissiper les teignes de la cornée & la cataracte commençante , & dans les suffusions où l'humeur acqueuse est troublée , on fait souffler dans l'œil malade l'odeur de la rue par une jeune personne saine qui en a mâché auparavant , ou bien on en fait recevoir à l'œil malade par un entonnoir renversé la vapeur de la rue dont on a fait une décoction dans le vin blanc ; la rue est encore anthelmentique , on en applique l'huile extérieurement dans ce cas-là.

La Sabine.

ELLE est aussi regardée comme un très-bon anthelmentique dans les affections vermineuses des enfans , on en ordonne le suc mêlé avec le lait & adouci d'un peu de sucre qu'on donne au malade d'heure en heure dans une cuillerée à café , extérieurement on la regarde comme détersive & résolutive , & on l'applique avec succès dans les tumeurs froides , comme sur les loupes. La poudre sèche de sabine est regardée comme escarrotique pour ronger & consumer les chairs , & pour déterger les ulcères baveux & fordides , & elle produit de bons effets , on en saupoudre les ulcères.

L'Armoise.

ELLE n'a pas d'autres vertus bien marquées que les générales ; quelques Auteurs prétendent qu'elle est bonne contre la lassitude après de longs voyages & de grands exercices , & disent s'être bien trouvés des bains ou demi-bains , des lotions de pieds faites avec une décoction de cette plante & de camomille ; d'autres regardent cette vertu comme chimérique , & traitent cette pratique de superstition ; les auteurs qui assurent qu'elle a réussi dans les cas proposés , sont assez respectables pour qu'on ne doive pas regarder tout-à-fait comme imaginaire cette vertu.

La Matricaire.

ON la préfère aux autres plantes dans les coliques venteuses , lorsque les vents sont retenus par des matieres visqueuses , glaireuses , dans les douleurs qui surviennent après l'accouchement & qui dépendent d'un fond de passion hystérique , jointe au vice des premières voies , elle a aussi une vertu anthelmentique assez assurée.

Vertus.

DE tout ce qui vient d'être dit , il suit que ces plantes sont emmenagogues , antihystériques , stomachiques , toniques , carminatives , anthelmentiques , & quelques-unes sont aussi détersives , résolutives & scarroti-ques appliquées extérieurement , nous en parlerons dans la classe des externes.

Façon d'administrer ces Plantes , Doses.

ON se sert de ces plantes en infusion , en décoction & des eaux distillées de ces mêmes plantes. On ordonne les feuilles en infusion & en décoction ; l'infusion vaut mieux à la dose de demi-once pour une livre d'eau , celle de rue à la dose d'une pincée ou d'une pincée & demie dans le vin blanc à cause de son odeur forte & désagréable. On donne la poudre ou associée avec d'autres remèdes sous forme de bol , ou delayée dans quelque liqueur appropriée ; la dose en est depuis dix grains jusqu'à vingt ou trente tout au plus , sur-tout de la sabine. Si on associe la poudre de ces plantes , la dose de chacune doit diminuer à proportion , en mettant , par exemple , quinze grains de chacune si on en emploie deux. Le suc exprimé de ces plantes est dépuré par résidence , s'ordon-

ne depuis une once jusqu'à une & demie ou deux le matin & le soir. On emploie les eaux distillées de ces mêmes plantes pour la base des potions emmenagogues, depuis une once & demie jusqu'à deux onces si la potion doit se prendre dans une seule dose, ou depuis trois onces jusqu'à quatre, si on doit la prendre à cuillerée. L'huile de rue par infusion se prépare de cette manière : on prend six onces de feuilles de rue achées bien menues, on verse dessus une livre de bonne huile d'olive, on laisse le tout pendant une quinzaine de jours exposé au soleil dans une bouteille fermée, on coule ensuite l'huile à laquelle on ajoute de nouvelles feuilles, répétant la même chose une ou une troisième fois, enfin on cuit le tout au bain marie & l'on sépare l'huile qu'on garde pour l'usage : on l'emploie contre les vers, & pour cela on met sur le nombril des enfants qui y sont sujets du coton imbibé de cette huile.

Pharmacologie Rationnelle.

MONSIEUR *Freind* a injecté du suc de ces plantes dans des animaux vivants & en a mêlé avec du sang extravasé, & il observa que ces plantes divisent & atténuent le sang même extravasé, & qu'elles augmentent les forces de la circulation ; elles agissent vraisemblablement par des principes huileux, aromatiques ; mais comment agissent-elles ? C'est ce qu'on ne fait pas encore.

Le Safran , Crocus , crocum.

CE sont de petits filaments qu'on retire d'une plante de ce nom ; leur partie inférieure est plus menue, blanchâtre, d'un jaune pâle, la partie supérieure est un peu plus large, légèrement crenelée & d'un roux tirant sur le pourpre, ses filaments ont une odeur particulière, âcre, agréable, aromatique, subtile, qui se répand beaucoup, qui porte à la tête & qui procure le sommeil, ils sont légèrement amers, il n'en faut qu'une petite quantité pour donner à beaucoup d'eau la couleur jaune, ou la couleur de citron qui approche de la couleur de pourpre ; la plante dont on les tire & qu'on appelle *Crocus sativus*, croît en Europe, en France, en Angleterre comme en Orient, celui d'Europe vaut autant que celui d'Orient ; il y a des peuples qui regardent le safran comme excellent pour assaisonner les viandes, nous nous en servons principalement dans la médecine : on choisit le safran récent, d'une odeur forte, d'une couleur luisante, qui tache les mains lorsqu'on le froisse & qui ne se met pas facilement en poudre.

Cas.

DANS tous les cas de suppression des regles , où les quatre plantes précédentes conviennent , dans la suppression des lochies , dans les accouchements difficiles & laborieux , lorsque l'enfant ne se donne aucun mouvement ou qu'il est mort , dans le cas où l'arriere-faix est retenu dans la matrice , dans la chlorose , dans les obstructions du foie qui dépendent d'une lymphe épaisse , dans les autres maladies qui dépendent de la même cause , dans les maladies de la poitrine , comme dans l'asthme qui dépend souvent d'une lymphe visqueuse , dans la toux invétérée qui dépend de la même cause , dans la phthisie tuberculeuse , lorsque les tubercules ne sont pas schirreux , ni produits par une lymphe âcre , dans la passion hystérique. Quelques-uns croient qu'on le peut employer dans les maladies de la tête , telle que l'apoplexie ; mais il ne seroit pas prudent de s'en servir dans ce cas à cause de sa vertu narcotique.

Vertus.

C'EST un Emmenagogue assez puissant , propre à faciliter l'exclusion du fœtus mort & de l'arriere-faix , apéritif béchique , comme il paroît par les effets qu'il produit dans les affections de la poitrine dont nous avons parlé ; extérieurement c'est un résolutif dont on se sert dans les maladies inflammatoires , mais nous en parlerons sous ce point de vue , dans la *Matiere Médicale* externe , ainsi nous ne nous étendrons pas ici sur ses usages externes.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON l'ordonne ordinairement en poudre , en l'associant à quelqu'autre médicament , & on l'incorpore avec le sirop d'armoïse , ou avec quelqu'autre approprié pour en former un bol ; la dose du safran est depuis dix grains jusqu'à vingt ou trente tout au plus , une plus haute dose pourroit être dangereuse ; il consiste par un grand nombre d'observations qu'une trop haute dose de safran cause non-seulement la pesanteur de tête & le sommeil , mais encore quelquefois des ris immodérés & convulsifs & enfin la mort même ; c'est pourquoi on ne doit s'en servir intérieurement qu'avec modération en commençant toujours par une petite dose , comme par dix grains , & augmenter ensuite s'il le faut ; on ne sait pas dans quel principe réside la vertu du safran.

La Myrrhe , Myrrha electa , Troglodytica.

C'EST un suc gommo-résineux qu'on nous apporte en morceaux de différente grosseur de cette partie de l'Ethiopie qu'on appelloit autrefois le pays des Troglodytes, d'où lui est venu le nom de *Troglodytica*. La ~~gomme~~^{myrrhe} est un suc résineux, puisqu'elle s'enflamme comme les résines, & que d'ailleurs l'esprit de vin rectifié en tire une teinture ou une partie résineuse; elle n'est pas cependant toute dissoute par l'esprit de vin, mais il reste une partie sans odeur & sans amertume qui se dissout dans l'eau; la myrrhe est jaunâtre, assez friable, transparente en quelque maniere & brillante lorsqu'on la brise, on y voit des veines blanchâtres disposées en forme d'ongle, son goût est amer, un peu âcre, aromatique, son odeur est forte & agréable quand on la brûle; les Anciens distinguoient deux sortes de myrrhe, savoir, celle qui étoit liquide qu'ils appelloient *stacte*, & celle qui étoit solide ou en masse: ils distinguoient encore deux sortes de myrrhes liquides, l'une qui étoit naturelle & qui découloit d'elle-même des arbres avant qu'on y fit une incision, ou qu'on l'exprimât des morceaux de myrrhe récente; l'autre qui étoit faite par l'art, étoit une myrrhe récente pilée avec une petite quantité d'eau que les Anciens passoient en l'exprimant fortement: on ne connoît pas aujourd'hui la myrrhe liquide, mais seulement la solide dont nous avons déjà fait la description; on la choisit friable, légère, de même couleur de tous côtés, amere, âcre, odorante.

Cas.

ON s'en sert dans le cas de suppression des regles & dans tous les autres cas où nous avons déjà dit qu'on employoit le safran, dans la suppression du flux hémorroïdal, dans les obstructions de la matrice & des autres viscères, dans le cas de coction lésée par le relâchement des fibres du ventricule & par l'épaississement des sucg gastriques, dans l'asthme, la toux invétérée, la phthisie tuberculeuse, avec les conditions que nous avons indiqué en parlant du safran; dans les affections vermineuses, dans les fièvres malignes, putrides, pestilentiellles, exanthématiques, dans les ulcères, soit internes, soit externes.

Vertus.

LA myrrhe est un emmenagogue très-puissant apéritif chaud, antihelmentique, alexitere, béchique, résolutif; elle échauffe beaucoup,

& rappelle non-seulement les mois des femmes , mais encore toutes les autres éruptions de sang dans quelque partie du corps qu'elles se fassent , & même elle les augmente ; c'est pourquoi on doit être très-circonspect dans son usage & ne la jamais donner aux personnes qui ont été sujettes au crachement ou pissément de sang , ou à quelqu'autre hémorrhagie ; il ne faut pas non plus la donner aux femmes enceintes , de peur qu'elle ne cause l'avortement , enfin on ne doit l'employer que lorsqu'on ne craint pas d'échauffer.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON donne la Myrrhe en substance depuis demi-drachme jusqu'à une sous forme de bol , à cause de sa grande amertume ; on peut l'associer avec des remèdes appropriés aux maladies qu'on traite & suivant les indications qu'on a à remplir , comme avec les apéritifs dans les obstructions , avec les stomachiques dans la coction lésée , & alors on diminue à proportion la dose de la myrrhe.

Elixir de Propriété de Paracelse.

LA Myrrhe entre dans la composition de l'Elixir de Propriété qu'on fait en prenant égale dose de myrrhe , de safran & du meilleur aloès succotrin , dont on tire la teinture par le moyen de l'esprit de vin rectifié ; cet élixir a les propriétés de chacun des médicaments dont on le retire , d'où lui est venu le nom d'élixir de propriété , la dose de cet élixir est depuis dix gouttes jusqu'à vingt. Il y a encore plusieurs médicaments tirés du regne végétal qui sont emmenagogues , nous en parlerons dans la classe des antihystériques.

Emmenagogues tirés du regne animal.

TOUTES les différentes parties des animaux dont nous avons parlé dans la classe des diurétiques chauds & des sudorifiques , peuvent être regardés comme emmenagogues ; on en verra la raison , si on se rappelle les effets généraux que produisent , soit les diurétiques chauds & les sudorifiques , soit les emmenagogues dont nous parlons. Mais parmi ces animaux , il y en a un qui nous fournit un emmenagogue très-assuré : c'est le *Castoreum* qu'on retire du Castor , c'est celui qu'on emploie ordinairement sous ce point de vue , c'est aussi celui dont nous parlerons ici.

Castoreum.

ENTRE les parties postérieures de l'animal amphybie qu'on appelle Castor , on voit quatre poches membraneuses qui doivent être distinguées des testicules du Castor mâle , puisqu'on trouve cette poche dans le Castor femelle , & que d'ailleurs les testicules se trouvent placés sous l'os pubis du castor mâle & dans la cavité du bas-ventre. La fausse persuasion où l'on étoit autrefois que ces poches étoient les testicules du castor , avoit donné lieu à la vieille fable qu'on débitoit , que cet animal se voyant poursuivi des chasseurs , se coupoit lui-même ces prétendus testicules & les leur jettoit pour se délivrer de leur poursuite , on en est revenu depuis long-temps ; les deux poches supérieures sont principalement d'usage , elles sont composées de trois membranes appliquées les unes sur les autres , comme dans les autres viscères creux ; dans ces poches se trouve enfermée une liqueur qui s'épaissit aisément à la chaleur , elle répand une odeur forte , pénétrante & désagréable ; cette liqueur ainsi épaissie , forme un suc concret , noirâtre & onctueux qu'on appelle *Castoreum*.

Cas.

ON s'en sert avec succès dans les cas des lochies supprimées , d'arrière-faix retenu après l'accouchement , dans l'accouchement difficile & laborieux , dans la suppression des règles , toujours lorsque ces cas dépendent de l'épaississement des fluides & que les solides sont relâchés , ou du moins aussi mols que dans l'état de santé , en un mot lorsqu'on ne craint pas d'échauffer ; il y a cependant un cas où , quoiqu'au premier coup-d'œil il paroisse qu'il y a à craindre d'échauffer , on peut & on doit employer le *Castoreum* , c'est lorsque les symptômes dépendent d'un éréthisme hystérique de l'utérus , ce qui arrive assez souvent après l'accouchement. En parlant des antihystériques , nous donnerons les signes par lesquels on connoît la passion hystérique : on se sert aussi du *Castoreum* avec succès dans les maladies convulsives , comme dans l'épilepsie , soit essentielle , qui dépend du vice seul du cerveau , soit symptomatique ou accidentelle qui survient après quelqu'autre maladie , dans les coliques venteuses ; en général on appelle colique , une douleur plus ou moins grande qu'on ressent dans quelque viscère du bas-ventre : il y en a de plusieurs especes , celle dont nous parlons en est une , elle est commune aux hystériques & aux hypocondriaques , on la connoît principalement aux signes suivants :

on voit un gonflement général de l'abdomen causé par des matieres vaporeuses , élastiques , aériennes contenues dans les boyaux , l'abdomen présente beaucoup de résistance & il y a beaucoup de douleur , une douleur tenfve , en le frappant on entend à peu-près un son semblable à celui d'une caisse : à ces symptômes qui caractérisent la colique venteuse , il s'en joint un autre , savoir , que lorsque les malades peuvent se délivrer de ces matieres vaporeuses , élastiques , aériennes , soit par le haut , soit par le bas , ils se sentent soulagés , on ne doit plus douter qu'ils ne soient atteints d'une colique venteuse , alors quelques gouttes de *Castoreum* calmement les douleurs. Le *Castoreum* convient aussi dans le hoquet lorsqu'il est produit par des mouvements convulsifs , soit du ventricule , soit de l'œsophage , ce qui arrive ordinairement ; en général il convient dans tous les cas où il s'agit de donner du ton aux solides , d'atténuer les fluides , dans les obstructions , dans la chlorose , dans la cachexie.

Vertus.

EN faisant attention à tous ces cas , on voit évidemment que le *Castoreum* est un très-bon emmenagogue , sur-tout s'il faut employer un emmenagogue dans le cas où la passion hystérique est de la partie ; c'est un bon antihystérique , carminatif , apéritif dans les cas d'obstructions dépendantes des fluides épaissis ; il agit , atténue le sang , donne plus d'activité aux organes de la circulation.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON ordonne le *Castoreum* en substance pulvérisé ou bien la teinture de *Castoreum* ; en substance on l'ordonne depuis huit grains ou dix jusqu'à trente-un dans une cuillerée d'eau de fleurs d'orange ; on peut aussi l'associer avec le safran & avec les poudres de rue , de myrrhe & de sabine , & alors on incorpore ces poudres avec le sirop d'armoïse pour en former des bols : on tire du *Castoreum* une teinture par l'esprit de vin , cette teinture dont on se sert ordinairement se donne depuis huit gouttes jusqu'à vingt ou vingt-cinq.

Pharmacologie Rationnelle.

IL est vraisemblable que le *Castoreum* agit par ses parties volatiles , alkalescentes , sulphureuses , inflammables dont il est imprégné ; nous sa-

vons que ces parties ont la vertu d'irriter les solides , de diviser , d'atténuer les fluides , c'est ainsi que le *Castoreum* agit comme emmenagogue & comme apéritif. De plus , selon les expériences de M. *Haller* , rien n'est plus propre que les exhalaïsons sulphureuses pour diminuer & détruire le ressort des vapeurs élastiques , ainsi l'on connoît comme il agit dans les coliques venteuses.

Emmenagogues tirés du regne minéral.

LES différents minéraux que nous avons mis parmi les purgatifs , les diurétiques chauds & les sudorifiques peuvent être aussi regardés comme emmenagogues , si on fait attention aux effets généraux que produisent ces différents médicaments. Nous ne parlerons pas ici du fer , de ses différentes préparations , quoique ce soit un bon emmenagogue , parce que nous aurons lieu d'en parler dans la classe des apéritifs , nous nous contenterons de parler du Borax.

Le Borax.

C'EST une substance saline , d'un goût salé , âcre & piquant , qui se dissout aisément dans l'eau , & se cristallise , & forme des cristaux assez semblables à ceux d'alun ; autrefois les Vénitiens nous l'apportoient , c'est pourquoi on l'appelle Borax de Venise ; présentement il n'y a gueres que les Hollandois qui le mondifient & le vendent.

Cas.

ON l'emploie dans la suppression des regles & dans les maladies qui en dépendent , comme les pâles couleurs , dans la suppression des lochies , dans l'accouchement difficile & laborieux , sur-tout lorsque l'arrière-faix est retenu dans la matrice : on l'emploie , dis-je , dans ces maladies avec succès , quand on n'a pas trop à craindre d'un tempérament vif ; on s'en sert aussi dans les obstructions des viscères du bas-ventre qui dépendent d'une lymphe épaissie & du relâchement des vaisseaux , dans la cachexie ou bouffissure de l'habitude du corps avec un coup d'œil œdémateux ; dans l'hydropisie commençante , lorsque les eaux épanchées ne sont point âcres & qu'il n'y a pas beaucoup de soif , c'est un bon emmenagogue , apéritif chaud , diurétique chaud , tonique , atténuant.

Manière de s'en servir , Doses.

ON le donne en substance sous forme solide à la dose de dix grains jus-

qu'à vingt feul dans une cuillerée de bouillon , ou quelquelqu'autre véhicule , ou affocié avec quelqu'autre emmenagogue ; comme avec le fafran , la myrrhe ; dans le cas de paffion hystérique , on l'affocie avec le *Castoreum* , en substance sous forme liquide on le donne de la même façon que le nitre ; on le réduit en poudre & on le fait infuser dans l'eau à la dose de trois grains jusqu'à trente sur un livre d'eau dont on fait prendre au malade par verrées en guise de ptifane.

Pharmacologie Rationnelle.

SA vertu paroît résider dans son principe salin alkali fixe dont l'action est modérée par le sel sédatif. L'on ne fait pas bien comment on le compose ; mais les chymistes en retirent le sel sédatif de M. *Hombert* dont on ne connoît pas la composition : on en retire aussi un sel alkali fixe semblable à la base du sel marin ; M. *Baron* en réunissant le sel sédatif avec la base du sel marin , a formé du borax ; le sel alkali fixe domine dans le borax , mais il n'est pas seul , car quoique la solution du borax donne la couleur verte au sirop des violettes , cependant mêlée avec un sel acide , elle n'entre pas en effervescence , ce qui prouve qu'il n'est pas un sel alkali fixe ; il n'est pas non plus un pur acide , puisqu'il n'entre pas en effervescence quand on le mêle avec un alkali , il est donc composé comme nous avons dit , du sel sédatif , dont on ne connoit pas encore bien la composition intérieure , & d'un sel alkali fixe tel que nous avons désigné.

Les Béchiques.

TOUT le monde fait que la respiration est une des fonctions vitales peut-être la plus nécessaire à la vie : on fait aussi que les organes de la respiration sont les poumons & les voies aériennes ; la lésion de cette fonction essentielle & des organes qui y servent , mérite donc toute notre attention , les remèdes qu'on emploie dans les maladies qui attaquent le poumon ou les voies aériennes ou les organes de la respiration , sont appelés en général pectoraux ou thorachiques ; or on a remarqué que l'expectoration , c'est-à-dire , l'évacuation , l'expulsion des humeurs , soit des vésicules des poumons , soit des bronches , on a , dis-je , remarqué que l'expectoration étoit salutaire dans toutes les maladies de la poitrine ; c'est pourquoi on s'est appliqué à chercher des remèdes qui pussent procurer & faciliter l'expectoration , & on les a appelés Béchiques , ainsi les béchiques sont des remèdes qu'on ordonne dans la vue de procu-

rer ou d'aider l'expectoration ; les matieres qui doivent être expectorées ou chassées , peuvent résister à la force de l'air qui fait effort pour les emporter , ou parce qu'elles sont trop épaisses , visqueuses , adhérentes aux parois des vésicules ou des bronches , ou bien parce qu'elles sont trop tenues & fluxiles ou en petite quantité , avec une certaine acrimonie par laquelle elles irritent les vésicules & les bronches éludant l'action de l'air par leur ténuité & leur fluxilité ; c'est cette considération qui a fait diviser les médicaments béchiques , en béchiques incisifs & béchiques incraissants ; les premiers en atténuant les matieres , font qu'elles offrent moins de résistance à l'action de l'air , qui dès-lors devient propre & suffisant pour détacher & amener avec lui ces matieres ; les autres en enveloppant les matieres âcres & tenaces d'une espece de mucilage , émoussent & arrêtent d'une part , leur action contre les parois des vésicules & des bronches , qui sont pareillement enduites du même mucilage capable de les défendre contre l'acrimonie des matieres , & de l'autre ils donnent du corps à ces matieres tenaces ; enforte qu'elles présentent assez de surface à l'action de l'air , & deviennent capables de mieux recevoir ses impressions & d'être chassées par l'expectoration.

Indications.

EN général les Béchiques , soit incisifs , soit incraissants , sont indiqués dans toutes les maladies de la poitrine , les maladies qui affectent les poumons , & les autres organes de la respiration , soit aiguës , soit chroniques. Les maladies aiguës sont ou aiguës inflammatoires ou aiguës simples , les maladies aiguës de la poitrine sont la pleurésie & la péripneumonie , la pleurésie , selon quelques-uns , affecte la Plevre costale , selon d'autres les muscles intercostaux , & selon d'autres la plevre qui recouvre & enveloppe les poumons mêmes. Voici les signes auxquels on reconnoît cette maladie ; la difficulté de respirer plus ou moins grande , une douleur pongitive , rapportée à différentes parties de la poitrine , c'est-à-dire , quelquefois au devant de la poitrine & très-souvent & pour l'ordinaire aux côtes , d'où vient que les anciens appelloient cette maladie , *morbus lateralis* , une fièvre aiguë avec un pouls dur & une toux qui survient & qui accompagne presque toujours la pleurésie. Tout le monde convient que ces symptomes viennent de l'inflammation de quelque partie de la poitrine ; quoiqu'on ne convienne pas précisément du siege de la maladie , la plupart des Auteurs cependant croient à présent que

c'est

c'est la plèvre costale : or en supposant ce sentiment on peut concevoir qu'il peut y avoir tout ce que nous avons dit ; car par-là la respiration est gênée , de-là le cours du sang par les poumons n'est pas si libre , le sang agit alors avec plus de force dans ses vaisseaux , il doit comprimer les cellules ou les vésicules pulmonaires ; cette compression donne un embarras suffisant pour occasionner la toux. La péricnemonie qui est une inflammation du poumon , est marquée par une difficulté de respirer , avec une douleur gravative , rapportée à la poitrine , à une partie de la poitrine seulement , soit à toute la poitrine avec une fièvre aiguë , un pouls mol ; la toux survient aussi accompagnée d'une expectoration , tantôt jaunâtre , tantôt rougeâtre ou sanguinolente , & souvent même purement sanguine : on a observé que ces maladies sont ordinairement guéries par l'expectoration , ainsi les béchiques sont ordonnés dans ces cas , mais il faut que les inflammations soient érépélateuses ou phlegmoneuses ; dans ces deux cas la constitution du sang est différente , il faut des remèdes différents. L'inflammation érépélateuse se connoît par le tempérament du malade bilieux où le sang est fluide & âcre. 2°. Par le caractère de la chaleur qui est âcre ; on la sent en tenant quelque temps la main appliquée sur l'habitude du corps du malade , on l'appelle ardeur. 3°. Par la soif que le malade éprouve qui est extrême ; les signes de la maladie phlegmoneuse sont, 1°. le tempérament sanguin ; 2°. une chaleur douce , c'est-à-dire , sans sentiment d'ardeur , quoique la chaleur soit augmentée ; 3°. par la soif ou du moins une soif modérée ; dans celle-ci le sang est épais , visqueux , de même que les matieres qui doivent être expectorées. Les béchiques incisifs conviennent par conséquent ; au lieu que dans l'inflammation érépélateuse le sang étant fluide & âcre , & les matieres qui doivent être expectorées ayant le même défaut , parce que la lymphe participe de la nature du sang , les béchiques incrassants sont indiqués. Il y a cependant des cas assez rares où le sang paroît participer & de l'âcreté érépélateuse & de l'épaississement phlegmoneux ; dans ces cas il faut avoir égard à ce qui domine , & approprier les remèdes ou les manier ensemble. Telles sont les maladies aiguës inflammatoires de la poitrine où les béchiques sont indiqués ; il y a encore d'autres maladies aiguës de la poitrine , mais aiguës sans caractère bien marqué d'inflammation où ils sont pareillement indiqués ; ces maladies aiguës non inflammatoires sont le catarre. Le catarre est une difficulté de respirer plus ou moins accompagnée d'un toux fréquente & quelquefois de la fièvre occasionnée par le froid auquel on a exposé le corps chaud ; lorsque cette difficulté

de respirer est si grande qu'elle semble menacer le malade de suffocation ; on l'appelle catarre suffoquant ; le catarre ne s'étend pas ordinairement au delà de vingt jours, quelquefois même il se termine dans quatre ou cinq jours sans aucune mauvaise suite ; cependant comme il attaque une fonction des plus nécessaires à la vie , on le range parmi les maladies aiguës. Le Catarre est de deux especes , l'un qui est pour ainsi dire sec & qu'on appelle catarre ferrein , l'autre qu'on appelle catarre humide ; le premier est accompagné d'une toux sèche , c'est-à-dire , des efforts que l'on fait pour expectorer sans que cependant on expectore que peu ou point du tout ; l'autre au contraire est accompagné d'expectoration copieuse & visqueuse. Dans le catarre ferrein les matieres qui provoquent la toux & qui doivent être expectorées , sont âcres , les béchiques sont indiqués ; dans le catarre humide les matieres sont visqueuses & tenaces , comme il paroît par l'expectoration , les béchiques incisifs conviennent ; enfin les béchiques sont encore indiqués dans les maladies chroniques qui attaquent les poudrons ou les autres organes de la respiration , tels que l'asthme , l'emphyse & la phthisie. L'asthme est une difficulté de respirer plus ou moins considérable qui revient par paroxysmes , parce qu'il n'est pas nécessaire que cette difficulté de respirer soit continuelle , puisqu'on trouve des asthmatiques qui respirent avec autant de liberté après les paroxysmes que dans l'état de santé , quoique néanmoins pour l'ordinaire cette difficulté de respirer soit habituelle , c'est-à-dire , que les malades se plaignent toujours de cette difficulté même après les paroxysmes. On divise l'asthme en humide & en sec , mais il faut prendre garde que ce n'est pas seulement par l'expectoration qu'on doit juger de la nature de l'asthme & des remèdes qui y conviennent , parce qu'il y a en a qui étant attaqués d'une asthme sec , expectorent cependant beaucoup ; je suppose un homme d'un tempérament vif , ardent & tournant vers le mélancholique , attaqué d'un asthme , il expectorera des sérosités , cependant les béchiques incisifs échauffants seront nuisibles ; d'où vient donc l'expectoration dans ce cas ? de ce que le sang est séché dans ce tempérament , en sorte que la lymphe ne se mêle pas exactement avec le sang ; la partie sereuse surnage pour ainsi dire aux autres parties du sang & paroît surabondante , quoiqu'elle ne la soit pas effectivement & qu'au contraire elle soit moindre ; ainsi ce n'est pas seulement par l'expectoration , mais par le tempérament & les causes qui ont précédé , qu'on doit juger de la nature de l'asthme. L'asthme vrai pituiteux se connoît non-seulement par la toux humide , mais encore par le tempérament pituiteux , par le relâchement des soli-

des : il dépend d'une lymphe épaissie , visqueuse , dans celui-ci les béchiques incisifs conviennent ; l'asthme sec au contraire dépend d'une lymphe épaissie , non par viscosité , mais par sécheresse avec âcreté qui engorge les glandes des vésicules pulmonaires & des bronches ; dans cet autre les béchiques incraissants conviennent , les incisifs nuiroient & causeroient des inflammations : il y a une autre espece d'asthme qu'on appelle convulsif qui s'observe chez les hommes hypocondriaques & chez les femmes hystériques ; dans celui-ci la respiration est libre après le paroxysme , il y a un gonflement venteux du bas-ventre , le malade sent le mouvement de quelque corps qui roule indifféremment dans le bas-ventre & qui semble quelquefois le menacer de suffocation , il rend des vents , soit par le haut , soit par le bas , qui le soulagent. Les médicaments indiqués dans ce cas-là ne sont pas proprement les béchiques , mais les antispasmodiques qui font alors les fonctions des béchiques. Les béchiques sont aussi indiqués dans l'hémopthisie héréditaire , périodique : on distingue deux fortes d'hémopthisie , l'une est adventice , l'autre héréditaire ; l'hémopthisie adventice dépend de quelque effort violent , de quelque exercice forcé , elle doit être attribuée à l'impétuosité du sang qui distend les vaisseaux & les rompt même , en sorte que le sang s'épanche dans les cavités pulmonaires & bronchiques ; les remèdes les plus propres dans ce cas-là sont les saignées , le repos , les béchiques ; l'hémopthisie héréditaire dépend de la foiblesse du tissu des poumons qui donne lieu à des tubercules qui croissent & pressent les poumons , les vaisseaux sanguins , en sorte que le sang croupit , s'accumule , devient âcre & ronge par son acrimonie les membranes des vaisseaux qui crevent à la fin après plusieurs efforts de toux sèche. Les béchiques incraissants sont alors indiqués pour empêcher que le sang âcre n'irrite les poumons ; les incisifs nuiroient parce qu'ils augmentent la circulation , l'impétuosité du sang. Enfin les béchiques sont indiqués dans la phthisie. La phthisie est une consommation successive de tout le corps accompagnée d'une fièvre lente qui redouble quelquefois le soir , quelquefois le matin , quelquefois à toute heure de la journée , d'une légère difficulté de respirer , d'une toux & d'une expectoration de matieres purulentes ; elle dépend d'un ulcere , ou des tubercules ulcérés dans le poumon : il faut déterger les ulceres en procurant l'évacuation du pus qui en séjournant sur les bords , pourroit former des callosités , occasionner des nouvelles inflammations & de nouveaux ulceres , les béchiques conviennent ; incisifs , si la matiere expectorée est vis-

queuse , tenace , & ne peut se détacher ; incrassants , si elle est ichoreuse , c'est-à-dire , tenue & âcre.

Contre-indications.

EN faisant attention aux cas où les béchiques tant incisifs qu'incrassants sont indiqués , on comprend aisément ceux où ils sont contre-indiqués ; car les béchiques incrassants sont contre-indiqués dans les cas où les béchiques incisifs sont indiqués & *vice versa*.

Précautions.

LES précautions qu'on doit prendre dans l'administration des béchiques sont les suivantes : 1°. l'on doit faire une attention sérieuse aux cas où les béchiques incisifs sont indiqués & à ceux où les incrassants conviennent , pour ne pas donner les premiers lorsque les autres sont indiqués ; 2°. il faut aussi faire attention aux maladies qui exigent ces remèdes & observer que les maladies inflammatoires de la poitrine dont nous avons parlé , & dans lesquelles nous avons dit que les béchiques étoient indiqués , peuvent être ou essentielles ou bien symptomatiques ; car la péripneumonie , par exemple , peut être essentielle , & c'est alors que les béchiques sont principalement indiqués ; ou symptomatiques , c'est-à-dire , qu'elle peut être ce qu'elle est souvent , sur-tout à Montpellier , symptôme de la fièvre putride , & alors on doit songer à détruire la matière dans son fond , c'est-à-dire , la fièvre putride , & pour cet effet les meilleurs remèdes sont les émétiques & les catartiques ; cependant cela n'empêche pas que pour obvier aux symptômes urgents de la péripneumonie on ne prescrive les béchiques , quoiqu'on n'en attende pas la guérison de la maladie , comme dans la péripneumonie essentielle ; 3°. il arrive souvent que la difficulté de respirer dépend de l'inflammation du foie qui fait que le diaphragme ne peut s'abaisser autant qu'il le faudroit pour l'inspiration , ce qui gêne la respiration & occasionne une toux sèche , dans ce cas les béchiques sont inutiles ; il faut tourner toute son attention du côté de l'inflammation du foie , alors les saignées , les fomentations émollientes conviennent ; 4°. il arrive aussi très-souvent que la toux chez les enfants est symptôme d'une affection vermineuse , dans ce cas les béchiques sont pareillement inutiles ; il faut attaquer la cause du mal , la matière vermineuse ou les vers par les anthelmentiques , les stomachiques ; 5°. dans les maladies même aiguës inflammatoires des organes de la respiration où les béchiques sont le mieux indiqués , il faut s'attacher à ces médicaments sans cependant

négliger les autres secours. Cependant plusieurs Médecins célèbres ont blâmé dans ces maladies les saignées & les autres secours , comme les purgatifs , crainte que l'expectoration qui est le moyen ordinaire dont la nature se sert pour guérir ces maladies , ne fût empêchée ou suspendue ; néanmoins il est certain que la saignée produit dans ces sortes de cas des très-bons effets ; elle arrête la grande impétuosité du sang , prévient les stagnations ; il faut alors , pour ainsi dire , oublier le fonds de la maladie , pour obvier aux symptômes les plus dangereux & les plus urgents : ainsi on doit saigner toutes les fois que la saignée est indiquée , & elle l'est toutes les fois que le cours du sang est trop rapide , quand il y a une trop grande difficulté de respirer , & sur-tout dans les tempéraments pléthoriques. M. Sydenham assure qu'il n'a presque point guéri de pleurétiques , qu'il ne leur ait tiré trente-deux onces de sang : il croyoit la saignée nécessaire dans ce cas-là , non-seulement comme un remède palliatif , mais même comme curatif : il est vrai que sur la fin de la maladie , quand l'expectoration se fait assez bien , la saignée pourroit nuire , mais dans le commencement de la maladie , il n'y a qu'une extrême foiblesse qui puisse contre-indiquer la saignée ; car si la foiblesse n'est pas si considérable , on doit faire saigner , mais moins souvent , & tirer même moins de sang à chaque saignée. 6°. Enfin on doit faire un choix exact des béchiques selon les cas , choix qui ne peut se faire que par la connoissance détaillée de ces médicaments à laquelle nous allons passer en commençant par les béchiques incisifs.

Béchiques incisifs.

ILS sont tirés des trois regnes , du regne végétal , du regne minéral , & du regne animal.

Béchiques incisifs pris du regne végétal.

La Camphrée de Montpellier , Camphorata Monspelienfis , offic.

CETTE plante est ainsi appelée à cause d'une odeur aromatique & qui approche un peu du camphre , qu'elle répand lorsqu'on la froisse entre les doigts ; sa saveur est un peu âcre , elle vient communement dans tout le Languedoc , on la trouve en quantité aux environs de Montpellier : on ne connoit bien sa vertu que depuis la fin du siècle dernier ; c'est à M. Burlet , premier Médecin d'Espagne , que nous en devons la découverte.

Cas.

LA camphrée est recommandée spécialement, selon les observations de M. *Burlet*, dans l'asthme humide, c'est-à-dire, qui non-seulement est accompagnée d'expectoration copieuse, mais encore qui se trouve dans des tempéraments vraiment pituiteux, soit que l'asthme soit simple, soit qu'il soit compliqué avec l'hydropisie; mais M. *Burlet* observe que cette plante ne convient que dans les hydropisies commençantes où il n'y a ni fièvre, ni toux, ni chaleur, ni signes de pourriture & d'âcreté: elle peut aussi être employée avec succès, selon le même Auteur, dans la cachexie, dans la chlorose, dans les obstructions des viscères, mais récentes & dépendantes du relâchement des solides & de l'épaississement visqueux des fluides, & dans le scorbut froid où les solides sont relâchés & les fluides épaissis par viscosité.

Vertus.

IL paroît par les cas où l'expérience a fait voir que la camphrée convenoit, que c'est un béchique incisif, apéritif assez actif, hydragogue, assez bon diurétique chaud, diaphorétique & sudorifique, poussant tantôt par le couloir des reins, tantôt par ceux de la peau; mais il faut prendre garde qu'elle échauffe beaucoup, comme l'a observé M. *Burlet*, & après lui plusieurs autres Médecins. M. de la Mure a éprouvé la même chose, aussi on ne doit s'en servir que dans les cas où l'on ne craint pas d'échauffer; M. *Burlet* ne la donnoit que dans l'asthme vraiment pituiteux, & même dans ce cas-là n'en pas continuer trop long-temps l'usage, mais il faut l'interrompre de temps en temps.

Maniere de s'en servir, Doses.

ON peut l'ordonner en décoction & en infusion; la meilleure façon de s'en servir c'est en infusion sous forme de ptisane qu'on prend pour boisson ordinaire: on prend pour cela les extrémités des tiges les plus menues & les plus chargées de feuilles, on les fait infuser à la dose ~~de~~ ^{d'une} ~~trois~~ drachme, jusqu'à trois ~~& demie~~ dans une livre d'eau; en cas d'hydropisie avec cachexie, on peut l'infuser à la même dose dans une pinte de vin blanc, ou si l'on craint d'échauffer dans l'eau commune.

Pharmacologie Rationnelle.

EN faisant attention à ses effets de pousser par les urines & par les sueurs, il paroît que sa vertu réside dans les parties aromatiques, & qu'elle agit en augmentant le jeu des vaisseaux & la circulation; par ce moyen la quantité qui surabonde de sérosité est chassée dehors, & c'est ainsi qu'elle aide l'expectoration, & facilite la respiration dans l'asthme humide.

Lierre terrestre, Hædera terrestris.

ON se sert principalement de ses feuilles qui sont amères, un peu aromatiques, cette plante est très-usitée.

Cas.

ON se sert avec succès du lierre terrestre dans l'asthme vraiment pituiteux, spécialement dans les maladies du poulmon qui dépendent de quelque ulcère de cette partie, comme dans la phthisie pulmonaire; on s'en sert aussi dans les ulcères des autres parties: c'est un Médicament très-propre à procurer l'évacuation de la matière purulente & à déterger les ulcères: on l'emploie dans le cas de suppuration aux poulmons qu'on ne peut caractériser d'ulcères, comme lorsque la péripleumonie se termine par la suppuration ou qu'il se forme une vomique. *Ethmuler* rapporte qu'une phthisie scorbutique fut guérie radicalement par la seule décoction de cette plante; plusieurs assurent la même chose de la vomique. *M. de la Mure* en a fait l'expérience avec succès dans une femme qui avoit été attaquée d'une péripleumonie qui fut suivie de suppuration; la malade rendoit par les crachats une matière purulente extrêmement épaisse & de mauvaise qualité: elle fut guérie par l'usage de cette plante; mais il faut remarquer que le lierre terrestre chauffe beaucoup, & qu'ainsi on ne doit l'employer dans les cas que nous venons de proposer, que lorsque la matière purulente est épaisse, visqueuse & tenace, & lorsqu'on ne craint pas d'échauffer. Quelques auteurs recommandent le lierre terrestre dans l'hémophthisie, dans la dysenterie, dans le pissement de sang; mais comme cette plante chauffe beaucoup, comme nous venons de le dire, on ne peut l'employer dans tous ces cas indistinctement, & on doit faire une sérieuse attention à la constitution du sang, au tempérament, sans quoi on risqueroit de tomber dans des erreurs pernicieuses, si on prescrivoit ce remède dans tous les cas proposés, sur

le temoignage des auteurs qui le prescrivent un peu trop généralement ; ainsi le lierre terrestre ne fauroit convenir dans les hémophthísies héréditaires qui se trouvent dans des tempéraments bilieux , & qui ont coutume de dégénérer en phthisie : on ne peut l'employer que lorsque le sang est naturellement épais par viscosité , ce qui fait qu'il croupit dans les vaisseaux des poumons & les rompt , d'où vient le crachement de sang , comme il arrive dans le scorbut froid avec relâchement des solides & épaisissement des fluides sans douleur vive : il en est de même de la dysenterie lorsqu'elle est essentielle , c'est-à-dire , lorsqu'elle dépend du vice des premières voies où les sucs sont aigres , les intestins relâchés , le lierre terrestre peut convenir , mais dans la dysenterie symptomatique qui dépend de l'irritation des intestins ou de leur inflammation , il ne peut convenir , il augmenteroit ou occasionneroit l'inflammation ; enfin il ne convient pas dans le pissement de sang que lorsque cette hémorragie dépend du relâchement des vaisseaux ; c'est avec ces reflexions qu'il faut suivre les auteurs , lorsqu'ils recommandent le lierre terrestre dans ces sortes d'hémorragie. Le lierre terrestre convient aussi dans le cas de coction lésée , dans lequel cas les matieres tournent vers l'acide , ce qu'on connoît par les rapports aigres , par l'absence de la soif , les solides sont relâchés , & il y a une accumulation de sucs épaissis ; dans ce cas le lierre terrestre est indiqué , il détruit l'acide des premières voies , ce qu'il fait en donnant du ton aux vaisseaux , aux intestins ; pour la même raison on l'ordonne avec succès dans les affections vermineuses des enfants qui dépendent d'un semblable vice des premières voies , du relâchement des solides , des matieres qui tournent vers l'acide , comme on le voit par les rapports qu'ils rendent qui sentent l'aigre : on le prescrit aussi dans les obstructions des viscères du bas-ventre , pourvu qu'elles dépendent du relâchement des solides & de l'épaississement visqueux des fluides. Dans les maladies qui dépendent de ces sortes d'obstructions , par exemple , dans l'ictère froid : on s'en sert aussi avec succès dans les coliques néphrétiques dépendantes des matieres glaireuses engagées dans les voies urinaires , des graviers , des calculs avec relâchement des solides , mais pourvu qu'on ne craigne pas d'échauffer ; enfin l'on observe que le lierre terrestre est très-bon dans les maux de tête même invétérés , & on emploie alors le suc dépuré par résidence que l'on fait renifler. M. Ray assure qu'il a connu des personnes tourmentées depuis plus de dix ans , par des douleurs très-vives , qui avoient été soulagées aussi-tôt après avoir

fait

fait usage de ce suc, & qui n'avoient jamais senti d'accès depuis ce temps-là.

Vertus.

EN faisant attention aux différents cas où nous venons de voir que le lierre terrestre étoit employé avec succès, on voit que c'est un béchique incisif très-propre à déterger les ulcères, & à faciliter l'évacuation des matieres purulentes, épaissies & visqueuses, astringent assez actif qu'on doit éviter toutes les fois qu'on craint d'échauffer, bon apéritif chaud, stomachique chaud très-propre à s'opposer à la formation de l'acide, propre aussi à le détruire, anthelmentique, diurétique chaud qu'on doit employer avec circonspection, enfin, selon M. Ray, bon céphalique dans les maux de tête invétérés.

Maniere de s'en servir, Doses.

ON l'emploie de différente façon, 1°. en prisane ; on fait infuser théiformement une ou deux pincées de lierre terrestre dans deux ou trois livres d'eau, & on en fait prendre au malade pour boisson ordinaire dans les cas de péripneumonie suppurée qui jette le malade dont la phthisie pulmonaire. 2°. Si on craint d'échauffer, on se sert de cette infusion pour couper le lait, soit à égale partie, c'est-à-dire, mettant moitié lait & moitié infusion de lierre terrestre, soit au tiers ou au quart, c'est-à-dire, joignant seulement au lait un tiers ou un quart de la même infusion, suivant que l'on craint plus ou moins d'échauffer. Dans ce cas on l'ordonne non-seulement comme médicament, principalement pour déterger, mais aussi comme subsidiaire, pour faire que le lait passe mieux & ne s'aigrisse pas dans les premières voies. 3°. On l'ordonne aussi avec le petit lait, on y jette une pincée de lierre terrestre pour empêcher pareillement qu'il ne s'aigrisse dans les premières voies : on s'en sert de la sorte dans les cas où l'on veut délayer la masse du sang. 4°. On l'ajoute au bouillon & apozemes rafraîchissants, non-seulement comme stomachique, mais encore comme atténuant & apéritif. 5°. On le prescrit en poudre depuis demi-gros jusqu'à un gros, & alors on l'associe avec l'antihéctique de *Poterius* ou avec la poudre de la camphrée, en l'incorporant avec le sirop même de lierre terrestre, mais il vaut mieux l'ordonner en infusion théiforme, ou avec le lait, le petit lait ou les bouillons, on peut aussi ordonner le suc exprimé de lierre terrestre & dépuré par résidence à la dose de trois drachmes ou trois drachmes & demies dans tous les cas où nous

avons dit que la plante convenoit : on emploie principalement ce suc comme médicament errein dans les maux de tête invétérés. 6°. On se sert encore du sirop de cette même plante , c'est le sirop approprié pour les maladies du poumon lorsqu'on ne craint pas d'échauffer trop , car si l'on craint d'échauffer , on lui substitue le sirop de capillaire : on emploie ordinairement ce sirop pour incorporer les médicaments pectoraux dans le cas d'asthme piteux , on peut y ajouter ce sirop depuis ~~une once~~ *une once* jusqu'à trois & ~~deux~~ à l'infusion du lierre terrestre ou à celle de la camphrée , on fait prendre un verre de cette infusion avec le sirop de deux en deux heures dans le cas indiqué. Nous ne dirons rien de la Pharmacologie du lierre terrestre , parce que nous n'avons rien de certain à cet égard.

Le Benjoin , Benjoinum , Beljoe.

C'EST un suc résineux , dur , friable , inflammable , formé de différentes miettes ou petits morceaux brillants , tantôt jaunes , blanchâtres , réunis ensemble & qui font une masse d'un goût résineux & gras , d'une odeur agréable & pénétrante , sur-tout lorsqu'on le brûle : on en trouve de deux sortes dans les boutiques , le premier s'appelle *amygdaloides* : il est pâle ou d'un rouge brun , il contient des grains blancs comme des amandes ; l'autre est noirâtre , il n'a point de taches blanches , ou très-peu ; on l'apporte du royaume de Siam & des isles de *Java* & de *Sumatra* ; on choisit celui qui est luisant , qui contient des taches blanches semblable à des amandes , qui a une odeur agréable & qui n'est pas chargé de parties hétérogènes. L'arbre qui donne le benjoin s'appelle *Benjoinum* , M. *Linæus* l'a placé parmi les lauriers , parce que ses fleurs sont semblables à celles de cet arbre.

Cas.

ON s'en sert dans l'asthme piteux , dans la phthisie pulmonaire ; dans les ulcères & la suppuration des poumons , lorsque la matière purulente expectorée est épaisse , visqueuse , & qu'on ne craint pas d'échauffer.

Vertus.

C'EST un béchique incisif , atténuant , assez actif & échauffant.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

COMME c'est un remède résineux qui ne se dissout point dans l'eau , on le donne dans un jaune d'œuf , on le dissout dans quelque liqueur

graisseuse ou huileuse à la dose de dix grains jusqu'à quinze grains , on peut aller jusqu'à vingt ; mais comme c'est un remède échauffant , il vaut mieux commencer par une petite dose : on peut augmenter la dose dans la suite s'il est nécessaire. On se sert aussi dans les mêmes cas des fleurs de benjoin qu'on prépare de cette manière : on prend quantité suffisante de benjoin concassé , on le met dans un pot de terre couvert d'un cornet de papier sur un feu doux , il s'élève de belles fleurs blanchâtres & luisantes qui s'attachent au cornet , on les retire du cornet avec une plume & on continue l'opération jusqu'à ce que les fleurs commencent à devenir jaunes : on ordonne les fleurs de la même manière que le benjoin , c'est-à-dire , dans quelque véhicule graisseux & huileux , mais à moindre dose , & seulement depuis quatre grains jusqu'à dix ou douze , parce qu'elles sont plus actives que le benjoin. La vertu du benjoin paroît résider dans sa partie résineuse volatile qui atténue , divise les fluides & irrite les solides.

Capillaire , Capillus veneris , Adiantum.

ON distingue dans les boutiques plusieurs espèces de capillaire , le vrai capillaire ou le capillaire de Montpellier , *Adiantum verum* ou *capillus veneris Monspeliensis*. Celui du Canada , le capillaire commun ou noir , le capillaire rouge ; de tous les capillaires usités en médecine , les plus connus sont celui de Montpellier & celui du Canada , ils sont connus de tout le monde , nous n'en ferons pas la description.

Cas.

ON s'en sert avec succès dans les maladies aiguës inflammatoires du poulmon , dans les maladies aiguës simples , dans les maladies chroniques. 1°. Dans les maladies aiguës inflammatoires , comme dans la pleurésie , la péripneumonie , mais sur-tout lorsque le sang a un caractère d'épaississement , comme lorsque l'inflammation est phlegmoneuse , parce que le capillaire échauffe toujours un peu ; ainsi dans l'inflammation éréthysélateuse il est mieux de s'en abstenir quoiqu'il n'y ait pas beaucoup à craindre de son usage même dans ce cas-là , mais seulement pour garder , s'il est permis de parler ainsi , une plus grande précision dans la pratique de la Médecine. 2°. Dans les maladies aiguës simples , comme dans le catarre , mais dans le catarre humide entretenu par une lympe bronchique , épaisse , visqueuse ; on l'emploie avec moins de succès dans le catarre ferrein dé-

pendant d'une lymphe tenace & âcre. 3°. Dans les maladies chroniques ; comme dans l'émopthisie , mais sur-tout lorsque le sang a un caractère d'épaississement , sans âcreté du moins considérable , dans l'asthme humide , dans la phthisie , lorsque la matiere purulente est un peu épaisse , visqueuse & tenace , dans tous les cas où le lierre terrestre s'emploie , on peut à plus forte raison employer le capillaire ; il est vrai qu'il a moins de vertu , mais il échauffe moins ; enfin on l'emploie avec succès dans les obstructions des viscères du bas-ventre , comme du foie , de la rate , du mésentère qui dépendent des matieres épaisses & visqueuses , qui engorgent les glandes de ces viscères. Quelques Auteurs même le regardent comme spécifique dans les obstructions de la rate & du mésentère dans la fièvre lente des enfants qui dépend très-souvent de ces dernières obstructions.

Vertus.

C'EST un très-bon béchique incisif , qui échauffe peu , apéritif dans les cas d'obstructions dont nous avons parlé.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON emploie le plus souvent le capillaire en infusion ; on fait infuser à chaud demi-poignée ou une poignée de sommités de capillaire dans un pot d'eau , on coule cette infusion , & on la garde pour servir de boisson ordinaire. M. Fournier , Docteur de la Faculté de Montpellier , assure avoir guéri par cette seule infusion un grand nombre d'enfants desséchés & presque consumés par la fièvre lente produite par les obstructions du mésentère : on se sert de cette infusion , non-seulement dans les cas que nous avons indiqués , mais encore dans presque toutes les maladies aiguës , pourvu qu'il n'y ait pas d'acrimonie , car dans ce cas on préfère la ptisane ou l'eau de riz , de poulet. L'infusion ou la ptisane de capillaire pousse ordinairement par les urines , par les sueurs , elle atténue & dissipe le sang. On ajoute le capillaire aux apozemes & aux bouillons apéritifs , & alors on peut employer toutes les especes de capillaire ensemble ou une seule espece , à la dose d'une poignée. On se sert aussi du sirop fait avec le capillaire de Montpellier pour donner de la consistance aux bols béchiques , dans le cas où l'on craint que celui du lierre terrestre n'échauffe trop ; la dose en est depuis demi-once jusqu'à une , on ajoute quelquefois le même sirop à l'infusion de capillaire à la même dose.

*La Bourrache , Borrago.**Cas.*

ON s'en fert dans toutes les maladies inflammatoires de la poitrine ; soit qu'elles soient phlegmoneuses , soit qu'elles soient érépisélateuses , mais avec plus de succès dans les premières que dans les autres ; dans le catarre humide produit par la suppression de l'insensible transpiration , dans l'asthme piteux , dans les cas de tubercules qui dépendent d'une lymphe épaisse & visqueuse , en un mot dans toutes les maladies où il y a difficulté de respirer : il faut remarquer que cette plante , quoique rangée parmi les béchiques incisifs qui sont échauffants , n'échauffe presque pas , ou même elle est rafraîchissante plutôt qu'échauffante selon quelques Auteurs : On s'en fert aussi dans les cas d'émophtisie , dans les obstructions des viscères dépendantes d'humeurs desséchées attrabilaires , comme parloient les Anciens , & même dans la passion hystrérique & hypocondriaque.

Vertus.

C'EST un béchique incisif dont on se fert non-seulement dans les maladies chroniques , mais même dans les maladies inflammatoires ; apéritif , qui n'échauffe pas , léger sudorifique ou diaphorétique , qui produit aussi cet effet sans échauffer ; diurétique , qui tient en quelque façon le milieu entre les diurétiques chauds & les diurétiques froids , c'est une plante très-usitée en médecine.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON se fert principalement du suc de bourrache ou simplement dépuré par résidence & crud , ou qu'on fait bouillir un peu & dépuré par résidence ; si on craint qu'étant dépuré simplement par résidence , il ne fatigue pas trop l'estomac , & à cette raison nous remarquerons que le suc de la bourrache & des autres plantes peut se dépuré ou se clarifier par le repos ou par l'ébullition & la colature. Les suc dépurés par le seul repos ont plus de vertu , mais ils nuisent à ceux qui ont l'estomac foible , car ils sont pesants , c'est pourquoi ils ont besoin d'une légère ébullition dans ce cas-là. Cette ébullition diminue un peu la vertu , mais ne la leur fait pas perdre entièrement : ainsi dans le cas de péripneumonie , si l'estomac est robuste , il faut donner le suc de bourrache dé-

puré simplement par résidence , mais si l'estomac est foible , il faut le faire légèrement bouillir & puis le laisser dépurer. On donne le suc de bourrache depuis une once jusqu'à deux ou trois onces deux heures après le bouillon de quatre en quatre heures. On continue son usage tant que l'on croit que la respiration est gênée , que l'expectoration se fait difficilement , ou même tout le temps. qu'il soulage le malade , quand même l'expectoration & la respiration se feroient aisément. On se sert des feuilles de bourrache pour faire la décoction & la base des purgations dans le cas de pleurésie & de péripneumonie , on prend une poignée de bourrache , on la fait bouillir dans suffisante quantité d'eau pour un ou deux verres : vers la fin de l'ébullition , on ajoute les purgatifs qu'on a dessein d'employer , & si on purge en deux verres , on délaye dans la colature du premier verre deux onces de manne , & dans le second une once ou une once & demie. On peut aiguïser ce purgatif par quelques grains de tartre émétique. On ajoute les feuilles de bourrache à la dose de demi-poignée ou d'une poignée aux bouillons & apozemes dans les cas d'obstructions des viscères & d'affection hystérique & hypocondriaque. On se sert aussi de l'eau distillée des fleurs de bourrache pour base des juleps dans les maladies du poulmon & dans les obstructions. Quelques Auteurs mettent cette eau au rang des eaux cordiales ; d'autres s'élèvent contre ce sentiment , suivant en cela le préjugé , comme il arrive assez souvent : on s'en sert aussi pour base des potions cordiales. On observe que les feuilles de bourrache desséchées , jetées sur le feu , furent comme le nitre , & que la décoction leur fait perdre une partie de leur vertu. Il est vraisemblable que leur vertu réside dans un principe salin nitreux & volatil , mais on ne sauroit déterminer quel est ce principe , ni comment il agit.

Velar , Erysif^mum.

ON se sert ici du sirop d'Erysif^mum principalement , & rarement de la plante en substance : elle est cependant usitée ailleurs & très-utile dans les cas suivants.

Cas.

ON l'emploie avec succès dans l'asthme piteux , dans la toux invétérée dépendante d'une lympe épaisse , glutineuse , visqueuse , tenace , qui engorge les glandes & les tuyaux sécrétoires & excrétoires des poulmons & des bronches ; dans les phthisies vers la fin , quand les malades manquent de forces pour expectorer : c'est un très-bon remède dans

toutes les maladies chroniques des poumons , mais on ne l'emploie pas dans les maladies aiguës inflammatoires de la poitrine , parce qu'il échauffe trop & augmente beaucoup la circulation : on peut l'employer dans le catarre humide dépendant des matieres visqueuses & tenaces , mais sans caractère d'inflammation ni de chaleur : on l'emploie aussi dans les extinctions de voix , dans les enrouements qui dépendent d'une humeur visqueuse ou qui enduit les cordes vocales ou les vaisseaux aériens. *Rondelet*, Professeur de l'Université de Montpellier , guérit par ce seul remède plusieurs Chantres qui avoient entièrement perdu la voix , & il les guérit très-prompement ; c'est pourquoi on appelle le sirop de cette plante , sirop des Chantres : on s'en sert encore dans la colique d'estomac dépendante de l'accumulation des matieres glaireuses qui occasionnent l'accescence dans les premières voies ; il convient aussi dans la colique proprement dite , produite par la même cause. *M. Riviere* a guéri plusieurs personnes attaquées de ces sortes de coliques par la seule décoction du velar ; enfin on s'en sert encore dans le scorbut froid , dans lequel le jeu des solides est ralenti , la circulation lente , les fluides sont épaissis avec un caractère d'âcreté.

Vertus.

C'EST un béchique incisif qui échauffe beaucoup , ainsi il faut bien distinguer les cas où on doit l'employer , apéritif chaud , stomachique chaud , antiscorbutique chaud.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON peut s'en servir en décoction ou en infusion ; la décoction lui fait perdre une partie de sa vertu , on s'en sert en infusion : on les fait infuser demi-poignée de feuilles d'*Erysimum* dans une livre d'eau , & on en fait prendre au malade quatre ou cinq verres par jour : on les ajoute aussi aux bouillons antiscorbutiques , à la dose d'une poignée , hachées ou pilées même légèrement ; le sirop d'*Erysimum* ou des Chantres se fait avec le suc exprimé de cette plante & le miel ou le sucre. Celui de *Lobel* tire sa principale vertu de l'*Erysimum*. On se sert du sirop d'*Erysimum* dans le cas d'enrouement , d'extinction de voix depuis une once jusqu'à une & demie ; on peut ajouter ce sirop à l'infusion d'*Erysimum* , à celle de bourrache , de capillaire , à la même dose & dans les mêmes cas que nous avons marqués ci-devant , suivant qu'on craint plus ou moins d'échauffer.

Les principes dans lesquels réside la vertu de l'*Eryfinum* sont extrêmement volatils , puisqu'on les perd par l'ébullition , on en connoît seulement les effets secondaires qui sont d'aiguillonner les solides , d'augmenter leur jeu , d'agiter & d'atténuer les fluides.

Béchiques incisifs tirés du Regne animal.

LE regne animal ne nous fournit qu'un médicament qu'on puisse ranger parmi les béchiques , c'est le Blanc de Baleine.

Blanc de Baleine , Sperma Ceti.

CE médicament a été absolument inconnu aux Anciens , il n'y a que peu de temps qu'on le connoît ; c'est une substance tendre , blanche , assez semblable au suif , moins grasse cependant & plus friable , d'un goût un peu visqueux , & qui n'a presque pas d'odeur. Le nom de Sperme qu'on lui a donné , en latin , *Sperma Ceti* , fait assez connoître l'idée qu'en ont eu certains Auteurs : ils ont cru que c'étoit le sperme ou la semence de la baleine mâle , qui après le congrès sortoit en partie de la nature de la baleine femelle , se répandoit dans la mer & surnageoit ensuite sur la surface de l'eau , d'où on la retiroit pour la préparer ; d'autres au contraire ont cru que c'étoit une matiere bitumineuse , ou un bitume minéral qui étoit apporté d'ailleurs dans la mer , & s'accumuloit sur la surface de l'eau ; mais à présent on est très-assuré par les recherches des Savants qui ont voyagé dans le Nord , où l'on prépare le blanc de baleine , que ce n'est ni la semence de la baleine mâle , ni un bitume minéral , & on est convaincu qu'on le retire de l'intérieur du crâne de la baleine mâle , mais les sentiments sont partagés touchant la matiere dont on le compose. Il y en a qui croient que c'est avec une huile qu'on trouve abondamment dans l'intérieur du crâne autour du cerveau de cet animal monstrueux , d'autres que c'est avec la propre substance du cerveau : on ne s'accorde pas non plus sur la façon dont on le prépare. Plusieurs disent qu'on fait bouillir de la baleine avec une forte lessive imprégnée de quelque alkali fixe jusqu'à ce qu'il ait pris une certaine consistance : on met , disent-ils , cette masse dans des vaisseaux appropriés pour la faire refroidir , il s'en sépare une huile qui surnage , on ôte cette huile , on fait fondre de nouveau cette masse solide , ensuite on la laisse refroidir pour qu'elle reprenne une forme solide , alors on la coupe en morceaux tels qu'on nous les envoie ; d'autres croient qu'on en sépare la substance huileuse en passant le
tout

tout à travers un sac , & qu'ensuite on fait macérer le résidu dans une lessive faite avec la chaux vive & les cendres jusqu'à ce qu'il ait pris une certaine consistance. On choisit le blanc de baleine qui a un beau blanc , on rejette celui qui commence à jaunir , parce que c'est une marque qu'il commence à rancir.

Cas.

LE blanc de baleine est extrêmement en usage , tant intérieurement qu'extérieurement ; nous parlerons de ses derniers usages dans la *Matiere Médicale externe* : on s'en sert avec succès dans toutes les maladies aiguës des poumons , soit simples , soit inflammatoires , soit que les inflammations soient phlegmoneuses , soit qu'elles soient érépipélateuses ; dans le catarre , soit humide , soit ferrein , soit suffoquant ; dans toutes les especes d'asthme , soit piteux , soit sec , soit même convulsif ; dans la phthisie , dans la dysenterie avec exulcération , dans les coliques vives dépendantes des matieres âcres & irritantes , dans les affections spasmodiques & convulsives , dans les maladies des reins & des voies urinaires , dans les ulcères internes , sur-tout ceux qui attaquent les reins , les ureteres ou la vessie , dans les douleurs vives des accouchées , & dans ce dernier cas il est d'un grand usage.

Vertus.

C'EST un béchique incisif qui n'échauffe pas du moins sensiblement , puisqu'on l'emploie même dans les inflammations érépipélateuses où il y a plus à craindre d'échauffer , il est aussi détersif , on s'en sert dans les ulcères internes : on peut aussi le regarder comme diurétique dans les maladies des voies urinaires.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON l'ordonne ordinairement dans l'huile d'amandes douces ou dans l'huile de lin exprimée sans feu , à la dose de demi-gros jusqu'à trois. *Baglivi* le regardoit presque comme spécifique dans la pleurésie & la péripneumonie : on peut l'ordonner de la sorte dans ces maladies le soir , une ou deux heures après le bouillon : on peut aussi l'ordonner dans les bouillons même de quatre en quatre heures , & alors la dose est seulement de sept grains jusqu'à huit , ou quinze tout au plus dans une cuillerée de bouillon ; il faut que le bouillon soit un peu chaud , car autrement le blanc de baleine ne se dissoudroit pas , cette façon de donner le blanc de baleine est très en

usage & très-salutaire en cas de maladies inflammatoires : on peut aussi l'ordonner de la même façon dans les différentes espèces de catarre : on donne encore le blanc de baleine sous forme de solide , on peut l'associer avec quelqu'autre béchique , & l'incorporer avec le sirop de velar , de lierre terrestre ou de capillaire , suivant qu'on craint plus ou moins d'échauffer , pour former des bols , la dose en est alors depuis quinze grains jusqu'à trente , ou de dix jusqu'à quinze si on doit renouveler souvent les bols ; dans la phthisie , dans tous les autres cas , lorsque les crachats viennent difficilement , on le donne sous forme de looc qu'on fait avec deux gros de blanc de baleine & une once de sirop violat ou de sirop de capillaire ou d'*Erysimum* , & on fait succer ce looc au bout d'un bâton de réglisse émoussé , afin qu'il demeure plus long-temps dans la bouche & qu'il soit porté plus directement dans le poulmon , dans le temps de l'inspiration.

Pharmacologie rationnelle.

ELLE n'est pas connue , il est vraisemblable qu'il agit comme adoucissant par sa partie huileuse , pourvu que le blanc de baleine ne soit pas rance , c'est pourquoi on doit le choisir blanc ; c'est aussi à cause de sa partie huileuse qu'il ne se dissout pas dans l'eau , mais seulement dans quelque menstrue gras comme le jaune d'œuf : il atténue par sa partie saline qu'il tire de sa préparation , car en le préparant , on le fait macérer dans une lessive assez forte.

Béchiques incisifs tirés du regne minéral.

Le Soufre , Sulphur.

LE Soufre qui est le principal béchique incisif qu'on tire du regne minéral , est un suc minéral coagulé , solide , sec , friable , qui se fond au feu , qui s'enflamme aisément lorsqu'il ne fait que toucher les charbons ardens , & qui étant allumé donne une flamme bleue , une odeur forte , pénétrante , acide & nuisible aux poulmons : on distingue deux sortes de soufre , le soufre naturel qui n'a point été passé par le feu , le soufre factice est celui qui a été dépuré par le feu & qu'on retire de certaines eaux minérales , comme des eaux chaudes d'Aix-la-Chapelle en Savoie , ou des mines , comme dans la Campagne de Rome , ou d'un certain pyrite , comme dans le pays de Liege : on dépure le soufre factice par le feu , on le dépouille des parties hétérogènes , & ensuite on en forme de grandes masses ,

qu'on appelle communément soufre en masse , & on le coule dans des canons de fer qu'on a frottés d'huile , il a alors la forme de bâton , & on l'appelle communément soufre en canons. Le soufre ainsi purifié , s'appelle soufre commun dont nous nous servons , l'usage du soufre en médecine , est très-ancien. Hippocrate le regardoit comme un très-bon antihystérique , il l'employoit en fumigation.

Cas.

ON s'en sert avec succès dans les maladies aiguës simples & sans inflammation qui affectent la poitrine , comme dans le catarre humide : on s'en sert sur-tout & plus sûrement dans les maladies chroniques , comme dans l'asthme pituiteux , dans l'asthme tuberculeux lorsque les tubercules sont produits par une lymphe épaissie , visqueuse ; dans les hémoptisies héréditaires qui dépendent des tubercules ; dans la suppuration des poumons lorsque les crachats sont épais , visqueux , comme dans les phthisies scorbutiques ou écrouelleuses ; car si les crachats étoient clairs , comme dans les suppurations d'un mauvais caractère , il faudroit s'en abstenir : on se sert encore du soufre intérieurement dans les affections cutanées , comme dans la gratelle , la gale , &c. dans ce cas le soufre aide & augmente la transpiration , (ce qu'on reconnoît aisément par l'odeur du soufre qu'exhalent les corps de ceux qui en ont pris intérieurement , & cela peu de temps après qu'ils en ont pris) atténue & divise le sang , ôte les embarras produits par des matieres épaisses : on a même observé qu'il étoit purgatif & qu'il lâche doucement le ventre.

Vertus.

LE soufre est un béchique incisif , médiocrement actif , qui échauffe très-peu , fondant , très-bon diaphorétique & sudorifique dans les affections cutanées , légèrement purgatif.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON se sert du soufre commun & de ses différentes préparations ; le soufre commun s'ordonne lavé plusieurs fois ; pour cet effet on le pile , on le lave dans l'eau chaude dix , douze ou seize fois plus ou moins : ces lotions affoiblissent l'acide vitriolique qui est dangereux , car les acides , soit végétaux , soit minéraux , sont extrêmement nuisibles à la poitrine ;

ainſi lavé on le prend ordinairement depuis dix grains juſqu'à quinze ; (une moindre doſe peut ſuffire comme nous le dirons ci-après) dans les maladies du poumon on va juſqu'à un ſcrupule ou même juſqu'à trois ; dans les ulcères des autres parties du corps qui n'exigent pas tant de ménagement que les affections du poumon , comme auſſi lorsqu'on veut exciter la diaphoreſe dans les affections cutanées : on ſe ſert auſſi des fleurs de ſoufre qu'on prépare de cette manière : on pile la quantité de ſoufre qu'on veut & que l'on met dans une cucurbite de terre ſur un petit feu , on couvre la cucurbite d'un pot de terre renverſé , les fleurs ſe ſubliment dans le pot , ce ſont les parties intégrant les plus fines du ſoufre qui s'élevent en forme de farine ; les fleurs de ſoufre s'ordonnent comme béchiques depuis dix grains juſqu'à quinze dans un jaune d'œuf , ou alliées avec d'autres béchiques & incorporées avec quelque ſirop approprié , comme celui d'*Eryſinum* , de lierre terreſtre , de capillaire , deux ou trois fois par jour , obſervant dans ce dernier cas que dans chaque priſe il n'y ait pas plus de dix grains de fleurs de ſoufre : on ordonne ces mêmes fleurs depuis quinze grains juſqu'à trois ſcrupules comme ſudorifiques , telle eſt la doſe à laquelle on preſcrit ordinairement , ſoit le ſoufre commun , ſoit les fleurs de ſoufre : elle paroît cependant un peu forte , on pourroit la diminuer ſans inconvéniement , mais même avec utilité. M. de la Mure a eu ſouvent occaſion de faire uſage du ſoufre , il l'a toujours preſcrit à une moindre doſe , & il ſ'en eſt bien trouvé dans deux occaſions entre autres , il ne l'a preſcrit qu'à la doſe de cinq ou ſix grains & il en a vu de très-bons effets ; dans l'une le malade étoit attaqué d'une phthiſie lente , il fut guéri par l'uſage du ſoufre priſ le matin à jeun , à la doſe de ſix grains dans un jaune d'œuf ; dans l'autre cas il ſ'agiſſoit d'une affection cutanée , accompagnée de puſtules & d'une conſtipation qui duroit depuis deux ou trois ſemaines , le malade n'allant à la ſelle qu'au moyen des lavements ; M. de la Mure lui fit prendre le ſoufre à la doſe ſuſdite , dès le ſecond jour le malade alla du ventre & fut extrêmement ſoulagé de ſes démangeaiſons cutanées qui ſe diſſipèrent entièrement , de même que les puſtules par l'uſage continué du ſoufre avec le laitage : il eſt donc prudent de ne donner le ſoufre qu'à cette doſe de cinq ou ſix grains , de commencer au moins par cette moindre doſe : on peut augmenter ſucceſſivement cette doſe ſi elle n'opere pas aſſez , comme cela pourroit arriver dans certains cas. Cette précaution eſt d'autant plus ſage que le ſoufre échauffe toujours , & qu'on doit éviter cet inconvéniement quand on veut en avoir de bons effets ; dans l'aſthme humide & dans la phthiſie lente on emploie aſſez communé-

ment le baume de soufre , on le prépare de cette manière : on prend du soufre ou de fleurs de soufre à volonté , on verse dessus , soit de l'huile simple , soit de l'huile de térébenthine , d'anis & de fenouil , de succin en assez grande quantité , pour qu'elle surpasse le soufre de trois ou quatre doigts : on fait digérer au bain de sable à une douce chaleur jusqu'à ce que le soufre soit bien dissout , ce qu'on connoît par la couleur rouge qu'il prend , on laisse alors refroidir la liqueur , on la sépare de la lie & on la garde pour l'usage : il y en a qui donnent à ce baume la consistance de sirop en faisant évaporer. On appelle ce baume de soufre térébenthiné anisé , fenouil succiné , selon les différentes huiles qu'on emploie ; la dose de ce baume est depuis trois ou quatre gouttes jusqu'à dix ou quinze tout au plus dans une once de quelque sirop approprié , comme de capillaire , de lierre terrestre ; le baume de soufre anisé est plus actif que les autres ; celui qu'on prépare avec l'huile de succin est préféré dans les affections hystériques & hypocondriaques & dans les différentes maladies de la matrice ; le baume de soufre entre dans la composition des pilules balsamiques de Richard *Morton* , dont on se sert dans la phthisie lente des scorbutiques & des écrouelleux où la fièvre est très-petite s'il y en a , & les crachats épais & visqueux , la suppuration purement lymphatique , c'est uniquement dans ces cas que ces pilules peuvent convenir ; elles nuiroient dans la phthisie avec fièvre lente manifeste : il y a encore une autre préparation du soufre qui est préférée à toutes celles dont nous avons déjà parlé , c'est le baume de soufre de *M. Homberg* , qui se fait en tirant avec l'esprit de vin une teinture de la partie bitumineuse du soufre dégagée de tout acide & de toute terre , & épaissie jusqu'à consistance de sirop , c'est le baume de soufre le plus naturel & le plus excellent dans les affections du poudon ; la dose en est depuis trois ou quatre gouttes jusqu'à dix ou quinze , de la même manière que les précédentes , c'est-à-dire , avec quelque sirop approprié.

Pharmacologie rationnelle.

NOUS connoissons les principes qui composent le soufre , mais nous n'en sommes par plus avancés , pour expliquer comment ces principes agissent ; par l'analyse chymique on retire du soufre presque une égale quantité de trois substances entièrement différentes , dont l'une est d'acide vitriolique , l'autre est bitumineuse , & la troisième terreuse & fixe ; ainsi le soufre est composé d'un sel vitriolique , d'une huile bitumineuse & d'une terre subtile , ce qu'on fait aussi par l'analyse ou par la décomposition du soufre , on le fait aussi par sa composition artificielle , car en mettant

du bitume avec du sel vitriolique on forme un soufre factice , ainsi nous connoissons tant par l'analyse que par la composition artificielle , les principes du soufre , & quoique nous ne puissions pas expliquer comment ils agissent , nous en connoissons cependant les effets secondaires , ce qui suffit pour la pratique ; ces effets secondaires sont d'atténuer le sang sans pourtant l'incendier , car il arrive quelquefois que ceux qui usent du soufre font du sang par les selles sans avoir senti la moindre chaleur , symptôme qui disparoît si on suspend l'usage du soufre ; il atténue , divise les matieres tenaces & visqueuses , & déterge les ulceres.

Béchiques incrassants.

ILS sont presque tous tirés du regne végétal ; nous allons commencer par les gommes , nous passerons ensuite aux racines & aux semences mucilagineuses , aux fruits & aux huiles qu'on emploie sous ce même point de vue ; nous avons déjà donné la définition des béchiques incrassants , ainsi nous ne la répéterons pas ici.

Gommes Béchiques.

La Gomme Arabique , Gummi Arabicum.

C'EST un suc gommeux épais , réduit en morceaux de différente grosseur & de différente figure , les uns étant ronds & les autres longs , cylindriques & tortillés comme des vers , ces morceaux sont transparents , d'un jaune pâle , ou même entièrement jaunes , luisants , ridés ordinairement à leur surface , brillants , fragiles en dedans comme du verre , ils s'amollissent dans la bouche & s'attachent aux dents , ils donnent à l'eau dans laquelle on les dissout une viscosité gluante & sans goût : on nous apporte la gomme arabique d'Égypte , d'Arabie & des côtes d'Afrique : on choisit pour l'usage celle qui est blanche ou d'un jaune pâle , transparente , luisante , sèche & qui n'est point chargée de parties hétérogenes ; ce suc découle , soit naturellement , soit par incision du tronc & des branches de l'arbre qu'on appelle *Acacia folio scopivides leguminosa* ; celui qui découle naturellement des pruniers , des cerisiers & d'autres arbres de notre pays , lui est extrêmement analogue , & lui est souvent substitué dans les boutiques , on y trouve cependant la vraie gomme arabique ; ce suc est absolument gommeux & ne se dissout que dans l'eau.

Cas.

ON l'emploie avec succès dans les maladies des poumons , soit chroniques , soit aiguës sans inflammation , dans lesquelles on remarque un

caractere d'âcreté & d'ardeur dans le sang : on s'en fert rarement dans les maladies aiguës inflammatoires du même viscere , mais communément au contraire dans les maladies aiguës simples avec la constitution du sang que nous avons déterminée , comme dans le catarre ferrein où l'on sent une certaine chaleur , ardeur , âcreté au fond du gosier , & dans la trachée-artere , & où les malades font des efforts presqu'inutiles ou insuffisants pour cracher ; dans l'hémoptisie héréditaire dépendante du sang âcre qui irrite & corrode les vaisseaux pulmonaires ; dans les phthysies pulmonaires où la matiere est tenue , lymphide , âcre & excite beaucoup de picotement & une toux sèche , opiniâtre avec un sentiment d'ardeur rapporté au fond du gosier & à la trachée-artere ; dans l'asthme sec du même caractere. On emploie outre cela la gomme arabique dans les ulceres internes des autres parties , sur-tout dans les ulceres des reins , de la vessie accompagnés de beaucoup de chaleur , d'ardeur lorsque la matiere est tenue & âcre ; dans l'ardeur d'urine , la dysurie , la strangurie , la dysenterie dans laquelle il y a beaucoup d'âcreté dans les premieres voies , qui corrode & enleve le mucus de la tunique veloutée des intestins.

Vertus.

C'EST un très-bon béchique incrassant propre à donner de la consistance aux matieres trop tenues & fluxiles , à envelopper & émousser leur âcreté , à en défendre par conséquent les parois des vaisseaux des intestins , à suppléer au mucus qui manque à ces derniers en induisant leurs parois.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

LA gomme arabique s'ordonne de plusieurs façons ; en substance sous forme solide depuis dix grains jusqu'à demi-drachme ou même une drachme , on l'associe avec la poudre de réglisse & on l'incorpore avec quelque sirop adoucissant , comme celui de capillaire , de *simphitum* pour en former des bols qu'on donne de quatre en quatre heures : on l'ordonne à la dose de demi-once dissoute dans l'eau d'orge , ou dans l'eau commune pour servir de base aux émulsions avec les semences froides , on y ajoute quelque sirop adoucissant , par exemple , celui d'althæa ; on le prescrit de la sorte dans les suites de dysenterie , de diarrhée tormineuse lorsque le mucus des intestins est emporté ; dans la dysurie , la strangurie , dans les maladies du poumon , on l'ordonne sous forme de looc ; par exemple , on dissout une drachme ou une drachme & demie de gomme arabique dans

quatre ou cinq onces d'infusion de capillaire ou de bourrache , on fait bouillir jusqu'à consistance de sirop , on peut ajouter à ce mucilage quelque sirop approprié , comme une once de sirop violat ou de sirop de pavot blanc si la douleur est vive , & une once d'huile d'amandes douces ; on fait prendre ce looc par demi-cuillerées ou avec un cuiller à café.

Pharmacologie Rationnelle.

LA gomme arabique contient des parties mucilagineuses , glutineuses , très-propres à envelopper les parties âcres , à se coller aux parois des vaisseaux & des intestins , & à suppléer au défaut du mucus lorsqu'il est emporté.

Gomme adragant , Tragacantha ou Tragacanthum.

C'EST un suc gommeux qu'on nous apporte en morceaux de différente grosseur & de différente figure , quelquefois jaune , transparent , sec quoiqu'un peu gluant , sans odeur , sans goût. La gomme adragant découle d'elle-même ou par incision que l'on fait au tronc ou aux branches d'une plante qui s'appelle *Tragacantha cretica incana flore parvo lineis purpureis strato*. On trouve cette plante dans l'isle de Crete , la Grece & l'Asie ; on choisit pour l'usage celle qui est blanche , on rejette celle qui est rougeâtre ou noirâtre , ou chargée de parties hétérogenes : on emploie la gomme adragant dans les mêmes cas , de la même façon & à la même dose que la gomme arabique ; elle a par conséquent les mêmes vertus , ainsi nous ne les répéterons pas : il faut seulement remarquer qu'étant dissoute dans l'eau , elle forme un mucilage plus épais que la gomme arabique.

Racines mucilagineuses.

Racine de Réglisse.

LA Réglisse est une racine longue , farmenteuse , de la grosseur du doigt , de couleur grise ou rousâtre en dehors , jaune en dedans , d'une saveur douce , c'est la racine d'une plante qui porte le même nom & qui vient d'elle-même en Espagne , en Italie , en Allemagne , en Languedoc.

Cas.

ILS sont les mêmes que ceux où nous avons dit que conviennent la gomme arabique & adragant , c'est-à-dire , dans le catarre ferrein , l'asthme sec , la phthisie , l'hémopthisie avec secheresse , âcreté.

Maniere

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON la prescrit en substance sous forme solide , par exemple , on prend demi-drachme ou une drachme de poudre de réglisse à laquelle on ajoute les gommes susdites pour former des bols avec quelque sirop approprié , on la prescrit plus souvent en ptisane : on prend , par exemple , une poignée d'orge bien lavée , on la fait bouillir dans quatre livres d'eau , on y ajoute une drachme ou une drachme & demie de réglisse , on la laisse bouillir jusqu'à ce qu'il se fasse une écume sur la surface , alors on coule la décoction & on la garde pour l'usage. Dans les ptisanes de riz , d'althæa & autres adoucissantes , on ajoute ordinairement une drachme ou une drachme & demie de réglisse sur la fin de la décoction. Ces ptisanes s'ordonnent non-seulement dans les cas où nous avons dit que les béchiques incraissants conviennent , mais encore dans toutes les maladies aiguës où il y a beaucoup d'ardeur & d'âcreté : on se sert aussi du suc de réglisse qui est de plusieurs sortes , entr'autres le blanc & le noir ; le suc de réglisse blanc se fait avec la poudre de réglisse , d'iris de Florence , d'amidon & le sucre blanc pulvérisé , on mêle le tout avec le mucilage de la gomme adragant dissout dans l'eau de fleurs d'orange , on fait une pâte solide dont on forme des bâtons qu'on sèche à l'ombre ; le suc de réglisse noir se prépare avec l'extrait de réglisse , le sucre pulvérisé , la gomme arabique dissoute , le mucilage de gomme adragant extrait dans l'eau de fleurs d'orange ; on mêle le tout pour former des tablettes ou des petits bâtons : on se sert du suc de réglisse comme d'une espece de looc qu'on fait sucer au malade ; la réglisse agit par sa partie mucilagineuse , comme nous venons de le dire des deux médicaments ci-dessus. Parmi les racines mucilagineuses , on compte celle d'althæa ou de guimauve , elle a à-peu-près les mêmes vertus ; elle convient dans les mêmes cas , & s'ordonne de la même façon que celle de réglisse ; nous en avons déjà parlé au rang des diurétiques froids.

Semences mucilagineuses , Semences de Psyllium.

CES semences sont menues , oblongues , noirâtres , lisses , douces au toucher , luisantes & ressemblantes à des puces , tant par la figure que par la couleur , ce qui leur a fait donner le nom de *psyllium* ou de *herba pullicaris* , herbe aux puces , à la plante qui les produit.

Cas.

On emploie les semences de *Psyllium* dans les maladies du poulmon ; dans les affections des voies urinaires & dans tous les autres cas où on nous a dit que la gomme arabique convenoit.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

On se fert principalement du mucilage extrait de ces semences pour la base des loocs pectoraux ; on prend , par exemple , trois onces de ces semences & quantité suffisante d'infusion de bourrache ou de capillaire , on fait cuire le tout jusqu'à consistance de sirop , on ajoute une once d'huile d'amandes douces ou d'huile de lin & une once de sirop d'althæa ou de quelqu'autre approprié , ce looc convient dans le catarre ferrein , dans l'asthme sec ; on peut joindre ces semences aux émulsions au nombre de trente sur-tout dans l'ardeur d'urine en cas d'inflammation érisipélateuse , d'ulceres des voies urinaires ; quelques-uns donnent l'infusion de ces semences au nombre de onze ou treize dans sept ou huit onces d'eau pour purger les enfans dans le cas de colique vermineuse ; cette vertu est douteuse , & ces semences peuvent même augmenter le mal en fournissant aux intestins un mucilage qui souvent n'est que trop abondant dans ce cas.

Semences de Coing.

ELLES conviennent dans les mêmes cas que les précédentes & ont les mêmes vertus , avec cette différence pourtant qu'elles ont quelque chose d'astringent , ainsi dans le cas d'hémopthisie , on a coutume de préférer ce mucilage à celui des autres semences pour base des loocs , on peut aussi joindre ces semences avec les autres.

*Fruits Mucilagineux.**Les Jujubes, Jujubæ vel Ziziphæ.*

CE sont des fruits de la figure , de la grosseur d'une olive , composés d'une pellicule un peu épaisse , d'un jaune rouge & dont la pulpe est blanchâtre , molle , fongueuse , d'un goût vineux placée autour d'un rouge oblong , pointus aux deux bouts , l'arbre qui les porte s'appelle jujubier , *ziziphus* : on le cultive en Provence , en Languedoc ; on doit choisir les

jujubes pesantes , remplies de beaucoup de chair , succulentes , molles , douces & cependant vineuses.

Cas.

ON emploie les jujubes avec succès dans les maladies du poutmon , soit aiguës , soit chroniques , soit aiguës simples , soit aiguës inflammatoires lorsque l'inflammation est érépisélateuse , dans la toux invétérée , sèche , avec un sentiment d'ardeur & d'âcreté. Dans l'hémopthisie héréditaire où le sang est âcre & corrode les vaisseaux , ce qui arrive le plus souvent dans la pleurésie , la péripneumonie , dans la phrithisie pulmonaire accompagnée d'une toux sèche où la matiere est âcre , tenue & fluxile & excite beaucoup de picotement , dans les ulceres internes des autres parties & sur-tout des premieres voies , dans la dysenterie avec exulcération & phlogose , dans les ulceres des reins , des uréteres , de la vessie , dans l'ardeur d'urine , en un mot dans tous les cas où la gomme arabique convient.

Vertus.

C'EST un médicament béchique , incrassant , adoucissant.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON les ordonne le plus ordinairement dans les ptisanes pectorales avec la réglisse par nombre depuis sept jusqu'à quinze ; on peut les prescrire en plus grand nombre si elles sont petites ; on peut aussi les ordonner dans les bouillons béchiques au même nombre ; leur vertu paroît résider dans cette pulpe moëlleuse , visqueuse.

Les Sebestes , Sebesten.

LES Sebestes sont de petits fruits semblables à de petites graines desséchées , elles sont noirâtres , recouvertes d'une pellicule qui contient une pulpe brune , visqueuse , douce au goût , fort adhérente à un petit noyau qui quelquefois est applati & quelquefois à trois côtes , l'arbre qui les porte s'appelle *sebestena domestica* , il naît en Egypte , il faut choisir les sebestes pleines , grasses , charnuës , douces : on les emploie dans les mêmes cas que les jujubes , mais il faut remarquer que les sebestes sont plus visqueuses ; ainsi dans le cas où l'estomac ne fait pas bien ses fonctions on doit préférer les jujubes , dans le cas au contraire où il y a beaucoup d'âcreté & que l'estomac fait bien ses fonctions , on préfere les sebestes.

Raisins secs.

LES Raisins secs ou passerilles sont des fruits mûrs de vigne, desséchés au soleil ou au four. On préfère pour l'usage ceux qui ont été desséchés au soleil, & non au four, car ces derniers contiennent trop d'acide. On distingue trois principales sortes de raisins secs. Ceux de damas qui sont les plus gros, ceux qui tiennent le milieu, comme ceux du Languedoc qu'on appelle vulgairement passerilles, raisins de Provence, & ceux qui sont les plus petits, comme ceux de Corinthe. On emploie indifféremment ces trois especes de raisins, après avoir ôté les pepins, dans les ptisanes pectorales à la dose de demi-once ou d'une once, ou dans les bouillons, on les ajoute sur la fin de la coction. Ils conviennent dans les mêmes cas que les autres bēchiques incrassants dont nous avons parlé ci-devant. Ils agissent par leur suc mielleux & doux qui est moins visqueux que celui des jujubes & des sebestes.

Figues seches.

CE sont de figues mûres & séchées au soleil, on doit les choisir molles, pesantes, remplies intérieurement d'un suc & d'une graine jaune, d'un goût mielleux, on rejette celles qui sont noires & qui ont une mauvaise odeur. On les emploie dans les mêmes cas que les médicaments précédents, on les ordonne par nombre depuis quatre, sept ou huit suivant leur grosseur pour une livre de ptisane pectorale. Elles sont moins visqueuses que les jujubes, le degré d'âcreté des humeurs & l'état de l'estomac doivent nous déterminer pour ceux de ces fruits qui sont plus ou moins visqueux; plus il y a d'âcreté, plus le ton de l'estomac est grand, plus ces fruits doivent être choisis visqueux; nous joindrons encore ici l'huile d'amandes douces & de lin comme bēchiques incrassants.

Huiles d'amandes douces & de lin.

ON emploie encore fréquemment les huiles d'amandes douces, de lin récentes & exprimées sans feu comme bēchiques incrassants, & on les préfère même dans le cas de phlogose: on s'en sert dans tous les cas où les autres bēchiques conviennent, dans les affections vermineuses des enfants avec un caractère d'âcreté, dans les maladies des voies urinaires où il y a ardeur, dans la dysurie, la strangurie, dans les irritations des voies urinaires dépendantes des graviers qui irritent & causent des

contractions spasmodiques ; dans ce dernier cas on donne les huiles avec l'eau ou la décoction de pariétaire , le sirop de limon ou celui de guimauve , ou quelqu'autre approprié. Dans les maladies de la poitrine on les donne sous forme de looc' qu'on peut faire de cette manière ; sur trois onces ou quatre de mucilage de graine de coing , on ajoute une once d'huile d'amandes douces avec un sirop approprié , ou bien dans la même quantité de ce mucilage on peut dissoudre une once de blanc de baleine ou ajouter une once d'huile d'amandes douces. *Baglivi* regardoit ce remede comme spécifique dans les maladies de la poitrine inflammatoires , dans la péripneumonie , par exemple , lorsqu'elle est putride & qu'on ne peut pas employer des purgatifs plus actifs , on peut faire prendre deux onces d'huile d'amandes douces de quatre en quatre heures , ce remede agit dans ce cas-là comme purgatif & comme béchique ; dans les autres maladies on peut ordonner l'huile d'amandes douces jusqu'à trois onces , & répéter même cette dose de trois en trois ou de quatre en quatre heures.

CHAPITRE SECOND.

D E S A L T É R A N T S.

EN divisant les médicaments internes en évacuans & en altérans , nous avons dit que les évacuans sont ceux qui changent les dispositions vicieuses de notre corps , en produisant des évacuations sensibles ; & que les altérans sont ceux qui opèrent le même changement ou qui rétablissent l'ordre de l'économie animale , sans produire aucune évacuation du moins sensible. En considérant les altérans sous ce point de vue , plusieurs doutent s'il y a vraiment des médicaments altérans , c'est-à-dire , des médicaments qui rétablissent l'ordre de l'économie animale , sans produire d'évacuations sensibles , prétendant que les médicaments qu'on range parmi les altérans , produisent leurs bons effets , en occasionnant toujours quelques évacuations. On ne peut pas douter cependant qu'il n'y ait des médicaments qui rétablissent l'ordre naturel sans produire aucune évacuation , tels sont les médicaments cardiaques. On voit aussi tous les jours que le mercure guérit des véroles les plus invétérées , sans produire aucune évacuation du moins sensible. Il y a même des médicaments qui bien loin de rétablir l'ordre naturel en produisant quelque évacuation , opèrent

ce changement en arrêtant les excrétiions ou des évacuations sensibles ; comme les astringents , mais il faut convenir que parmi les médicaments altérants , il y en a beaucoup qui produisent des évacuations. Pour obvier donc à l'inexactitude qui naît de la définition des altérants , on pourroit lui en substituer un autre qui reviendroit au même , sans souffrir le même inconvénient , en appelant médicaments altérants , ceux dont l'action sur le corps humain , n'emporte pas avec elle l'idée nécessaire de quelques excrétiions sensibles. Cette définition convenant à toutes les especes d'altérants , il nous suffira d'en faire l'application à une seule , savoir aux apéritifs. On connoît aisément que des médicaments peuvent ouvrir des voies obstruées , embarrassées , sans produire cependant aucune évacuation sensible. L'action des apéritifs n'emporte donc pas avec elle l'idée nécessaire de quelque excrétiion sensible. Il en est de même des autres altérants : les altérants qui selon la définition que nous venons de donner , sont des médicaments dont l'action sur le corps humain n'emporte pas avec elle l'idée nécessaire de quelque excrétiion sensible , les altérants , dis - je , rétablissent l'ordre naturel de l'économie animale , où cet état dans lequel l'homme fait ou peut faire avec facilité , alacrité & constance les actions qui lui sont propres , en changeant & en corrigeant simplement l'état vicieux soit des solides , soit des fluides. En faisant donc attention aux différents vices qui peuvent se rencontrer , soit dans les solides , soit dans les fluides , nous trouverons la division que nous devons faire des altérants. Or ces vices peuvent être considérés sous deux points de vue différents , c'est-à-dire , en général & en particulier ; en général , en tant qu'ils se trouvent dans les solides ou dans les fluides , sans faire attention à aucune maladie particulière , n'y ayant aucune partie spécialement affectée. En particulier , eu égard à une maladie en particulier , à une cause déterminée de quelque maladie , de quelque symptome , ou enfin à quelqu'autre partie spécialement affectée. Delà naît la division des médicaments altérants en généraux & en particuliers ou spécifiques , ainsi appelés , parce qu'un long usage les a pour ainsi dire consacrés pour certains cas particuliers. La bonne méthode exige que nous commençons , par ce qu'il y a de général , avant que nous passions au particulier ; suivant les loix de cette méthode , nous allons commencer par les altérants généraux , nous parlerons ensuite des altérants spécifiques.

S E C T I O N P R E M I E R E.

Altérants Généraux.

IL n'est pas aisé de déterminer la division qu'on doit faire de ces médicaments; à la vérité il n'est pas douteux que cette division ne puisse être prise du vice des solides & des fluides , le même vice pouvant être combattu par des médicaments très-différents , delà vient une difficulté pour la division que l'on veut faire. Il paroît cependant qu'on peut établir une division assez méthodique & assez satisfaisante , en faisant sur ces vices les réflexions suivantes. D'abord nous remarquerons que les solides considérés simplement comme ~~solides~~ ^{solides} , sont absolument indifférents à toutes fortes d'états de tension ou de relâchement , de dureté ou de mollesse ; & de même les ~~fluides~~ ^{fluides} considérés comme fluides , sont indifférents pour l'état d'épaississement ou de fluxilitéé ; il n'en est pas de même si on les considère par rapport à l'économie animale ; sous ce point de vue ils doivent avoir entr'eux un certain rapport qu'on ne sauroit précisément déterminer parce qu'ils diffèrent selon les différents sujets. Les solides agissent par deux fortes de forces , par leur force de ressort ou d'élasticité & par leur force de ton ; le ressort est cette propriété par laquelle les parties d'un corps , après avoir été éloignées de leur situation naturelle , la reprennent ensuite dès que la cause qui les éloignoit cesse : plus elles la reprennent subitement & exactement , plus elles sont élastiques. La force ou le ton est cette disposition des corps animés qui les rend susceptibles de contraction & d'irritation spontanée. Le ressort peut se trouver dans tous les corps naturels , & se trouve effectivement même dans les cadavres : le ton au contraire ne se trouve que dans les corps animés. Les solides peuvent donc pécher ou par trop ou par défaut de ton , par trop ou par trop peu de ressort ; toutes les fois qu'il y a trop de ton dans les solides , il y a aussi trop de tension. C'est ce que l'on voit tous les jours dans une partie enflammée , la tension est augmentée , le ton naturel des solides est aussi augmenté au point que le même corps irritera & causera de la douleur sur la partie enflammée , qui n'auroit fait que chatouiller si cette partie eût été dans l'état naturel ; il en est de même du défaut du ton , toutes les fois qu'il n'y a pas assez de ton dans les solides , il n'y a pas non plus assez de tension ; il doit y avoir des médicaments propres à remédier à ces deux vices ; les médicaments stimulants augmentent la tension , ils sont donc bons quand les

solides pechent par défaut de ton ; ceux qui relâchent diminuent la tension , sont donc propres lorsque les solides pechent par trop de ton. Les solides peuvent aussi pécher par trop ou par trop peu de ressort , comme nous avons dit ; le ressort ou la propriété élastique dépend du tissu plus ou moins ferré des parties : ainsi quand l'élasticité est augmentée , le tissu est plus ferré. Les médicaments qui augmentent les ressorts , resserrent donc davantage le tissu des parties , ou les appelle astringents ; ceux qui diminuent les ressorts rendent le tissu moins ferré , & on les appelle émollients ; les fluides peuvent pécher par trop de consistance ou par trop de fluxilité , ils peuvent être trop épais ou trop fluxiles : s'ils sont trop épais , ils causent des embarras , des obstructions de différente nature , selon les différents vaisseaux dans lesquels se font les embarras. Les remèdes convenables à cet état sont les apéritifs & les atténuants : si au contraire les fluides n'ont pas assez de consistance , s'ils sont trop fluxiles , il se fait des épanchements contre nature , soit dans les vaisseaux , soit dans leurs orifices. Les médicaments propres à remédier à ce vice des fluides sont les incrassants. Enfin les fluides peuvent pécher par âcreté , ils peuvent être trop alkalescents par le développement des parties salines , sulphureuses. Les médicaments propres à envelopper & à émolliër cette âcreté , sont les adoucissants ; delà nous pouvons déduire la division des médicaments altérants considérés en général en *stimulants* , *relâchants* , *astringents* , *émollients* , *apéritifs* , *incrassants* & *adoucissants* ; nous allons commencer par les stimulants.

Des Stimulants ou Cardiaques.

LES médicaments stimulants sont ceux qui rétablissent le ton des solides lorsqu'il est diminué. Nous ne les appellerons pas toniques parce que ce mot tonique présente naturellement à l'esprit l'idée d'un médicament qui rétablit le ton , soit lorsqu'il est diminué , soit lorsqu'il est trop augmenté , au lieu que les stimulants ne rétablissent le ton que lorsqu'il est diminué. Les médicaments stimulants ne sont point différents des cardiaques qui sont des médicaments qui rétablissent promptement le ton des solides considérablement diminué , on les appelle Cardiaques , parce qu'ils rétablissent l'exercice des actions dont le cœur est le principe.

Effets sensibles des Stimulants.

LE ton naturel des solides dépend d'un certain degré de tension , les stimulants augmentent le ton & par conséquent la tension des solides :

ils

ils agissent aussi sur les fluides , soit immédiatement , soit médiatement en tant qu'ils augmentent le jeu , l'action des solides sur eux , ils broient , atténuent , divisent les fluides ; tels sont les effets sensibles que les stimulants produisent ordinairement dans le corps humain ; je dis ordinairement , parce que les stimulants de même que les purgatifs & les autres médicaments ne produisent pas toujours leurs effets sur toutes sortes de sujets , & que comme il n'y a aucun purgatif , par exemple , dont l'effet soit assuré , de même il n'y a aucun stimulant dont l'effet soit constant sur tous les sujets : c'est ainsi qu'il y a des personnes qui tombent en syncope à l'odeur du musc , de la rose , tandis que d'autres personnes en sont réveillées & affectées agréablement : par où l'on voit que ce qui augmente le ton dans les uns , le diminue dans les autres , ce qui n'empêche pas qu'on ne reconnoisse des médicaments stimulants ; il suffit pour cela qu'ils produisent le plus ordinairement , le plus constamment , les effets que nous avons indiqués , comme il suffit pour appeller un médicament purgatif , qu'il produise le plus ordinairement des évacuations par les selles , quoiqu'il puisse arriver qu'il n'ait pas cet effet dans quelques sujets dans certaines circonstances ; à l'égard de la manière dont les stimulants produisent leurs effets , elle ne nous est pas bien connue , & il n'est pas aisé de la déterminer.

Indications.

SELON la définition que nous avons donné des stimulants , ils sont indiqués en général toutes les fois que le ton est diminué : on connoît que le ton est diminué par la diminution des mouvements naturels , soit vitaux , soit musculaires , & par la diminution de sensibilité , par conséquent ils sont indiqués dans les maladies syncopales , savoir , 1°. dans la lipothymie , qui arrive lorsque les forces vitales commencent à diminuer , ce qu'on connoît par la foiblesse du pouls , & que les forces musculaires & l'exercice des sens , comme du tact , de l'ouïe sont diminuées subitement , la chaleur subsistant encore ; 2°. dans la léthargie dans laquelle les forces vitales & les forces musculaires sont presque nulles. La chaleur est beaucoup diminuée , les mains , les pieds & le visage sont froids , & le sentiment presque éteint ; 3°. dans la syncope proprement dite qui est un abattement subit de toutes les forces vitales & musculaires , dans laquelle les malades deviennent tout d'un coup pâles & froids , & qui est accompagnée d'un pouls petit & imperceptible , d'une sueur froide , d'une perte de connoissance & de sentiment , & d'une respiration presque insensible ; dans

l'asphixie qui est une privation subite , non-seulement du mouvement & du sentiment , mais même du pouls & de la respiration ; en sorte que quelques moyens que l'on prenne pour s'assurer s'il y a quelque respiration , il n'est pas possible d'en appercevoir le moindre mouvement , ce qui fait que les malades restent comme morts , d'où vient qu'on dit que cette maladie *est imago simillima mortis* ; les stimulants & les cardiaques sont encore indiqués dans les affections soporeuses , caractérisées par la perte ou par la diminution des forces musculaires & du sentiment jointe à un penchant vers un sommeil constant & profond ; dans ces affections le malade perd l'usage des sens & l'exercice des mouvements volontaires , tout entre dans le relâchement , les forces vitales subsistent , cependant avec cette différence que dans les unes les forces sont augmentées & dans les autres elles sont comme dans l'état naturel ou même diminuées. Dans les affections soporeuses sanguines , le pouls est souvent plus vigoureux que dans l'état naturel , la respiration est quelquefois augmentée ; dans les pituiteuses le pouls est plus petit , la respiration diminuée , tout est dans un plus grand relâchement , les stimulants conviennent principalement dans les affections soporeuses pituiteuses , ils conviennent aussi dans les sanguines , à cause du relâchement qui se trouve par rapport au mouvement musculaire & à l'exercice des sens ; ainsi les stimulants ou les cardiaques sont indiqués dans l'apoplexie , le carus , la léthagie , dans le coma *somnolentum* , soit que ces maladies soient essentielles , soit qu'elles soient symptomatiques comme il arrive quelquefois dans le cours des fièvres malignes à *coagulo* ; ils sont encore indiqués dans les maladies paralytiques , dans lesquelles un ou plusieurs membres sont privés du sentiment ou du mouvement , ou seulement de l'un ou de l'autre , sans que l'esprit soit affecté , ni que l'on puisse attribuer à la douleur , ni à la convulsion cette immobilité ou cette insensibilité , ces maladies dépendant du relâchement des parties nerveuses & musculieuses. La paralysie est ou universelle ou particulière ; universelle , si elle afflige tout le corps , ou du moins une grande partie ; particulière , si elle n'afflige qu'une partie ou un membre. La paralysie succède souvent à l'apoplexie : on l'appelle hémiplegie lorsqu'elle occupe tout un côté du corps , paraplégie lorsqu'elle occupe une partie considérable du corps , comme depuis le torax jusqu'aux pieds ; les stimulants conviennent dans toutes ces maladies , mais dans les particulières les stimulants topiques conviennent mieux : ils sont encore indiqués dans toutes les maladies aiguës , dans les fièvres où les forces sont extrêmement abattues , comme dans les fièvres malignes à *coagulo* , marquées par un abattement universel

des forces musculaires & vitales qui se fait connoître par la petitesse du pouls , par un penchant aux affections soporeuses. Dans ce cas-là ils sont indiqués non-seulement comme palliatifs , mais même comme préservatifs , sur-tout dans les fièvres malignes à *coagulo* , lorsqu'on attend tout d'un émétique ou d'un purgatif ; parce que ces remèdes affoiblissant par eux-mêmes , comme nous l'avons remarqué , il est nécessaire dans ces cas que nous venons d'indiquer , de les marier avec les stimulants ou les cardiaques , qui alors remédient à l'abattement actuel des forces , & préviennent celui qui pourroit suivre l'administration de l'émétique ou du purgatif.

Contre-indications.

ELLES se présentent d'elles-mêmes en faisant attention aux effets que les stimulants produisent , puisqu'ils augmentent le ton , il est visible qu'on doit s'en abstenir toutes les fois que les solides pechent par excès de ton , ainsi les stimulants sont contre-indiqués , 1°. dans toutes les maladies aiguës inflammatoires lorsque le pouls est fort & tendu , sur-tout dans les tempéraments vifs & bilieux ; 2°. outre ces cas où les stimulants sont contre-indiqués , il y en a d'autres , où quoique du premier coup d'œil ils paroissent indiqués avec une légère attention , on voit qu'ils sont contre-indiqués ; nous avons dit qu'ils étoient indiqués dans le cas où tout est relâché , le pouls lent , les forces vitales & musculaires abattues : il est cependant des cas où quoique les malades aient ainsi les forces abattues , les extrémités froides , des sueurs froides répandues sur l'habitude du corps , les stimulants ou les cardiaques sont néanmoins contre-indiqués ; je suppose qu'un homme soit épuisé à la suite d'une hémorragie produite par des vaisseaux considérables , je dis que dans le temps que l'hémorragie subsiste , l'usage des cardiaques & des stimulants seroit extrêmement préjudiciable. Il faut alors tourner toute son attention sur l'hémorragie , pour la détourner par tous les moyens possibles & s'abstenir de tous les remèdes qui augmentent la circulation , & qui dans ce cas-là ne manqueroient pas d'augmenter le mal bien loin de le diminuer ; ce que la raison dicte , l'expérience le confirme. *M. Boerrhaave* fut appelé pour voir un homme qui avoit reçu un coup d'instrument tranchant à l'épaule par-devant , qui avoit coupé l'artere axillaire ; l'hémorragie avoit été si considérable que tout le corps du blessé étoit presque froid & qu'il se trouvoit à la dernière extrémité. *M. Boerrhaave* jugea prudemment que les cordiaux seroient contraires dans ce cas , il se contenta de lui faire donner de temps en temps un peu d'eau seulement ; le bras du côté blessé devint paralytique & se

dessecha , sans cependant tomber en gangrene. *M. Louver* rapporte qu'un jeune homme fut extrêmement affoibli par une hémorragie qui se fit par le nez , on se contenta de le soutenir avec du bouillon , sans employer les Cardiaques , & le malade guerit. *M. de la Mure* a vu un homme septuagénaire qui à la suite d'une fièvre putride , eut une hémorragie par les selles si considérable qu'elle le jetta dans la plus grande foiblesse , il ne se servit point des cardiaques , il se contenta de lui faire prendre des bouillons en petite quantité de trois en trois heures & de lui faire mettre de quatre en quatre heures une petite cuillerée de vin dans la bouche , par ce moyen le malade se remit très-bien. Ainsi dans le cas de foiblesse extrême occasionnée par quelqu'hémorragie , quoique les cardiaques paroissent d'abord indiqués , il est visible cependant qu'ils sont contre-indiqués si l'hémorragie est considérable & qu'elle se fasse par la rupture de quelque vaisseau considérable , c'est de quoi l'on peut s'assurer si l'hémorragie a été occasionnée par des causes externes , par exemple , par une blessure qui n'a point pénétré dans aucune cavité ; il est plus aisé de juger du diametre des vaisseaux ouverts & de la nécessité d'user ou de s'abstenir des cardiaques. Il est plus difficile de porter son jugement là-dessus , lorsque les vaisseaux ouverts sont internes ; cependant si les déjections de sang sont fréquentes , copieuses , & que le sang soit fluide & d'un rouge vif , il paroît que les vaisseaux ouverts sont considérables , & qu'ainsi les cardiaques sont contre-indiqués ; si au contraire le sang est noirâtre ou coagulé & que les déjections soient éloignées l'une de l'autre & en petite quantité , on juge alors qu'il n'y a que de petits vaisseaux ouverts , & dans ce dernier cas on peut donner les cardiaques en les mariant avec les astringents ; 3°. enfin il est des cas où quoique les cardiaques soient indiqués , ils nuiroient cependant si on les donnoit seuls & sans précaution ; c'est ce qui arrive quelquefois dans la syncope , lorsqu'elle est produite par des douleurs extrêmement vives , alors elle dépend d'un resserrement universel des vaisseaux , les forces du cœur ne peuvent surmonter les résistances ; dans ce cas-là les cardiaques donnés seuls ne feroient qu'augmenter la crispation & le mal ; il en est de même dans la passion hystérique ou hypocondriaque , il faut alors au moins associer les cardiaques avec les relâchans , les joindre , par exemple , à l'*opium* ou donner le *laudanum* liquide dans la composition duquel entrent des médicaments cardiaques : on peut le donner dans l'eau de fleurs d'orange , de même dans le *cholera morbus* si le pouls est perdu , le corps froid ; s'il paroît des convulsions , il convient de donner le *laudanum* liquide dans l'eau de fleurs d'orange , qui est un léger cardiaque.

Précautions.

LES principales précautions qu'on doit prendre en administrant les cardiaques ou stimulants roulent sur les cas où l'on doit les donner, & sur ceux où l'on doit s'en abstenir : c'est ce qu'on peut connoître en faisant attention aux cas où nous avons vu qu'ils étoient indiqués & à ceux où ils sont contre-indiqués, à ceux où quoiqu'ils paroissent du premier coup d'œil indiqués, ils sont cependant contre-indiqués, & enfin à ceux où quoiqu'indiqués, ils ne doivent être indiqués qu'avec ménagement, & associés avec d'autres médicaments appropriés ; enfin il faut faire attention au choix des différens cardiaques ; on fera en état de le faire par le détail que nous en allons donner. Les médicaments stimulants ou cardiaques nous sont fournis par les trois regnes, le regne végétal nous en fournit abondamment, tous les bois, toutes les écorces, racines, en un mot toutes les plantes aromatiques peuvent être rangées parmi les stimulants ou les cardiaques, ainsi la plupart des purgatifs, les diaphorétiques, les diurétiques chauds sont cardiaques ; le regne animal nous fournit aussi plusieurs cardiaques ou stimulants ; nous n'en parlerons pas ici, parce que nous l'avons déjà fait dans la classe des sudorifiques, en parlant de la poudre de corne de cerf, de la poudre de vipere : nous allons commencer par les stimulants tirés du regne végétal, nous parlerons ensuite de ceux qui nous sont fournis par le regne minéral.

Stimulants ou Cardiaques tirés du regne végétal.

ILS sont en très-grand nombre ; nous ne parlerons que de ceux qui sont les plus usités sous ce point de vue : outre ceux dont nous avons déjà parlé dans la classe des purgatifs, des diurétiques, des sudorifiques, nous aurons occasion de parler de plusieurs autres, lorsqu'il sera question des céphaliques, des fébrifuges, des antihystériques, des antispasmodiques. Nous ne nous bornerons pas aux stimulants simples, nous passerons encore aux composés qui sont le plus en usage, tels que la confection d'hyachinte, la confection d'alkermès, la teinture des métaux, connue sous le nom de *lilium de Paracelse*.

Les Santaux, Santala.

IL y a trois sortes de Santaux, favoir, le jaune ou le citrin, le blanc & le rouge. Le santal citrin, *santalum flavum vel citrinum*, est un bois

compacte , pesant , solide , ayant des fibres droites , ce qui fait qu'on peut le fendre aisément en de petites planches , d'un roux pâle & jaunâtre & tirant un peu sur le citrin , d'une odeur aromatique & pénétrante , d'un goût un peu amer , mais dont l'amertume n'est pas désagréable. Le *santal blanc*, *santalum album*, ne diffère du citrin que par sa couleur qui est plus pâle , & par son odeur qui est plus foible , car au reste , la substance est la même ; on croit que l'un & l'autre viennent du même arbre , il naît dans les Indes orientales. Le *santal rouge*, *santalum rubrum*, est un bois solide , compacte , pesant , dont les fibres sont tantôt droites , tantôt mondées , d'un rouge foncé sans odeur manifeste & presque sans goût ; l'arbre qui donne le *santal rouge* s'appelle *Pantaga* ; il naît aussi dans les Indes orientales , le *santal citrin* est le plus en usage comme cardiaque.

Cas.

ON s'en sert dans tous les cas où le ton des solides est diminué , dans la diminution ou la foiblesse du pouls , dans le cours de ventre sereux , dans l'asthme pituiteux qui dépend du relâchement des vaisseaux & de l'accumulation de la lymphe , dans les vaisseaux excrétoires & sécrétoires , dans la palpitation accompagnée d'abattement de force & de défaillance , & en général dans toutes les palpitations , mais sur-tout dans les symptomatiques ; c'est aussi un bon remède contre les obstructions des viscères du bas-ventre , spécialement du foie , mais seulement lorsque les obstructions sont lentes , c'est-à-dire , lorsqu'elles dépendent du relâchement des solides ou de l'épaississement visqueux des fluides , comme par exemple , du relâchement des tuyaux biliaires & de l'épaississement visqueux de la bile , dans les cas d'obstructions du foie : on s'en sert encore dans le cours de ventre , soit bilieux , soit même sanguin , comme dans le flux hépatique , dans lequel il paroît qu'il y a un relâchement considérable dans les premières voies & où le sang est comme aqueux , cours de ventre qui est souvent entretenu par les obstructions du foie. M. *Riviere* les recommande dans les flux de sang invétérés , accompagnés même de beaucoup d'ardeur ; nous voyons cependant qu'on doit s'en abstenir dans les cas où il y a ardeur , où les solides sont tendus , parce qu'ils ne pourroient qu'augmenter le mal : il est vrai que M. *Riviere* les donnoit pour lors tous les trois ensemble en décoction , & de cette manière la portion la plus active s'étoit dissipée en partie & ils n'étoient presque qu'astringents ; ce qui suffit pour justifier la pratique de M. *Riviere* , mais non pour employer

les fantaux dans les cas indiqués, soit en substance, soit en infusion, sur-tout le fantal citrin : on peut les employer aussi en décoction dans le flux de sang où il n'y a pas de chaleur, ni dissolution, mais relâchement & attonie des vaisseaux.

Vertus.

LES fantaux sont stimulants, cordiaux, béchiques, incisifs, assez actifs, hépatiques, apéritifs, & même on peut les regarder en certains cas comme astringents; ces vertus se trouvent dans les trois fantaux, mais à différents degrés; le plus actif, c'est le citrin, le blanc vient après, enfin le rouge est le moins stimulant, le moins cardiaque, on l'emploie principalement comme astringent.

Maniere de s'en servir, & ses Doses.

ON ordonne les fantaux, mais sur-tout le fantal citrin qui est le plus en usage, en substance, en infusion & en décoction; en substance on l'ordonne depuis dix grains jusqu'à vingt ou ~~trois~~ ^{quatre grains} tout au plus, cette dose est suffisante, une plus haute dose pourroit être nuisible. M. de la Mure a donné le fantal à une personne soupçonnée d'une œdeme dans les poudrons dont les forces étoient extrêmement abattues, & dans laquelle tout étoit extrêmement relâché; il l'a, dis-je, donné à la dose de dix grains dans une cuillerée de bouillon, & il a observé que cette petite dose donnée deux ou trois fois n'avoit pas laissé d'échauffer considérablement le malade; c'est pourquoi dans l'usage de ce remede comme dans bien d'autres, il est plus prudent de commencer par de petites doses, on en est quitte pour augmenter ensuite si elles ne suffisent pas: on peut l'ordonner en substance ou dans une cuillerée de bouillon, ou bien en l'associant avec quelque autre médicament de la même classe, & l'incorporant avec quelque sirop approprié, comme le sirop d'alkermès; en infusion on l'ordonne depuis vingt grains jusqu'à demi-drachme ou une drachme tout au plus: on peut faire une infusion théiforme en versant par exemple six onces ou sept d'eau bouillante sur trois onces de fantal. On l'ordonne aussi en décoction lorsqu'il faut purger, dans les cas où l'on craint que le purgatif n'affoiblisse trop, comme dans les fièvres malignes, dans les cours de ventre sereux; dans ces cas il est cependant nécessaire de purger, pour évacuer les matieres des premières voies qui en passant dans les secondes, pourroient augmenter le mal; alors il est assez nécessaire d'ajouter à la décoction de la purgation trois drachmes de fantal ci-

trin ou même un peu plus : on se sert aussi de la décoction des trois fantaux préparés , comme celle du bois de gayac dans les cas d'obstructions des viscères invétérées , dans le flux hépatique , dans le cours de ventre fereux : on prend de chaque fental réduit en poudre une once , on fait macérer pendant vingt-quatre heures dans deux livres d'eau commune , ensuite on fait bouillir jusqu'à diminution d'un tiers , & on fait prendre au malade une ou deux verrées de cette décoction le matin & autant le soir mettant deux heures d'intervalles entre chaque verrée ; quand on veut supprimer ou arrêter quelque évacuation , on doit préférer le fental rouge , mais s'il s'agit de relever le ton , de soutenir les forces , il faut choisir le citrin.

Pharmacologie Rationnelle.

LA vertu stimulante des fantaux paroît résider dans leurs parties huileuses , aromatiques , volatiles ; ce qui se prouve , 1°. par la façon de les administrer , car dans la décoction ils perdent beaucoup de leur vertu ; 2°. le fental cytrin qui est le plus stimulant de tous , est celui dont l'huile est plus subtile & plus abondante , & au contraire le fental rouge qui est le moins stimulant , contient une huile beaucoup plus épaisse & plus pesante , d'où il suit que leur vertu stimulante dépend de cette partie huileuse volatile. Au reste nous ne devons pas passer sous silence qu'il y a parmi les Praticiens , une dispute au sujet des cas généraux où les fantaux conviennent , les uns les regardent comme des remèdes rafraîchissants & qui temperent le bouillonnement du sang , les autres les placent parmi les échauffants : si on fait attention à leurs effets , à leur odeur aromatique , on sera plus porté pour ce dernier sentiment , c'est aussi celui que nous avons suivi avec le plus grand nombre des Praticiens les plus fameux. D'ailleurs l'usage journalier fait voir qu'ils sont cardiaques , propres à rétablir & augmenter le ton , & par conséquent échauffants : ils ont pu ne pas paroître tels à ceux qui les ont donnés en décoction , sur-tout si la décoction a été forte & faite sans précautions.

Racines Cardiaques.

IL y en a plusieurs qui ont cette vertu ; nous ne parlerons ici que de celles qui ont plus de force & qui sont les plus usitées sous ce point de vue.

Racine d'Angélique.

C'EST la racine d'une plante appelée en Latin *Angelica Sativa* ou *Imperatoria Sativa*. M. Tournefort rapporte cette plante au genre des impératoires, à cause de la ressemblance des graines & des fleurs : elle croît en Bohême, sur les Alpes, sur les Pyrénées & même sur les montagnes de l'Auvergne, d'où on nous apporte sa racine sèche. Cette racine est grosse de trois doigts, se divise en plusieurs branches & a beaucoup de fibres, elle est ridée, d'un brun grisâtre, blanche en dedans, grisâtre en dehors, d'un goût âcre, amer, d'une odeur aromatique assez agréable, on doit choisir celle qui est entière & non cariée.

Cas.

ON s'en sert dans tous les cas où les stimulants conviennent, lorsque les forces, soit vitales, soit musculaires, sont abattues, le ton diminué dans la lipothymie, la léthargie, la syncope même, principalement hors de l'attaque dans les personnes qui y sont sujettes, car durant l'attaque il faut avoir recours à des médicaments plus vifs, plus actifs; dans les fièvres malignes à *coagulo*, dans lesquelles le pouls est petit, lent ou petit, mais fréquent, la chaleur au dessous de la naturelle, les syncopes fréquentes, les forces abattues; dans les fièvres malignes pestilentiellles qui ne diffèrent de celles-ci que par des bubons, des charbons & autres éruptions cutanées; dans les maladies chroniques de la poitrine, telles que l'asthme humide dans lequel les tuyaux bronchiques sont extrêmement relâchés & gorgés d'une lymphe épaisse & visqueuse; dans les maladies aiguës de la poitrine qui sont de la même nature, comme dans le catarre humide sans signes d'inflammation; dans les coctions lésées dépendantes du relâchement des fibres de l'estomac & des intestins où les matières de la digestion tournent vers l'acide; dans ces circonstances, il s'accumule dans les premières voies des matières glaireuses qui donnent lieu à l'affection vermineuse, il survient aussi très-souvent des coliques venteuses produites par la raréfaction de l'air emprisonné, pour ainsi dire, dans les matières glaireuses, elle est recommandée dans l'un & l'autre cas.

Vertus.

LA racine d'Angélique est un stimulant cardiaque, alexipharmaque ou propre à résister au venin, bon béchique, incisif, actif, qu'on ne peut

employer que dans l'asthme vraiment piteux , dans le catarre humide ; c'est un stomachique chaud , carminatif.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON la prescrit en substance , en infusion & en décoction , on se sert aussi de l'eau distillée de sa plante. En substance , en poudre depuis un scrupule jusqu'à deux ou trois tout au plus dans quelque eau cordiale ou sudorifique , par exemple , dans celle de scabieuse , de chardon bénit. On peut aussi l'associer avec la poudre de quelque autre stimulant & en former des bols , en les incorporant avec quelque sirop approprié , comme avec celui d'alkermès ou celui d'œillet qui sont appropriés dans ces circonstances. En infusion depuis demi - drachme jusqu'à trois tout au plus. [Il faut remarquer qu'il y a dans Monsieur *Geofroi* à l'article de l'Angélique une faute considérable dans la première formule , car il fait monter la dose jusqu'à une once , c'est vraisemblablement une faute d'impression , puisque dans la formule suivante la dose n'est que d'un demi-gros.] On la fait infuser dans cinq ou six onces de quelque liqueur spiritueuse , comme dans du vin blanc , dans du bon vin vieux , généreux , comme on dit , par exemple , dans le vin d'Espagne ou le vin muscat , choisissant le plus généreux , selon qu'il est nécessaire de reveiller le ton. En décoction depuis une drachme jusqu'à une drachme & demie dans le cas d'hydropisie récente , où il n'y a pas de fièvre , de soif , ni d'ardeur , mais où les humeurs sont dans une espèce de viscosité , dans ce cas-là on peut l'ajouter aux bouillons appropriés à la dose indiquée. On peut aussi dans le même cas la donner en poudre dans une cuillerée de bouillon. On peut encore l'ordonner en décoction à la même dose dans le cas de fièvre maligne à *coagulo* , de dysenterie. Alors on l'ajoute à la décoction qui doit servir de base à la purgation pour soutenir les forces. On la regarde comme alexipharmaque , & sous ce point de vue plusieurs Médecins conseillent en cas de peste de la faire macérer dans du vinaigre & d'en boire tous les matins deux cuillerées , ou bien de mettre un morceau de cette racine sur la langue & de la mâcher. On prétend que ceux qui en usent de la sorte sont moins en danger de contracter la peste par le commerce qu'ils ont avec ceux qui en sont déjà atteints. On saupoudre les habits avec la même poudre ; si cette vertu n'est pas hors de doute , du moins elle n'est pas contraire à la raison , puisqu'on fait que l'Angélique relève le ton des solides , & les met par con-

féquent en état de n'être pas si aisément entamés par les miasmes pourrissants & pestilentiels.

Pharmacologie rationnelle.

LA vertu de l'Angélique réside vraisemblablement dans sa partie huileuse, aromatique, volatile : elle a l'odeur aromatique, le goût piquant ; ainsi sa vertu est mieux conservée quand on la donne en substance ou en infusion qu'en décoction ; c'est pourquoi, si on la donne en décoction, il faut que cette décoction soit légère, & il vaudroit mieux peut-être la donner en infusion théiforme.

Impératoire, Astringia, Magistringia vel Ostringium.

LA racine qui porte tous ces noms, mais qu'on trouve dans toutes les boutiques principalement sous le nom d'impératoire ou d'otruche, est oblongue, de la grosseur du doigt, ridée & comme sillonnée, fibreuse, brune en dehors, blanche en dedans, d'une odeur aromatique, pénétrante, d'un goût âcre & piquant, & qui chauffe la bouche quand on la mâche pendant quelque temps ; la plante dont on la tire s'appelle *Impatoria major* ou *Astringia* : elle se plaît sur les Alpes & les Pyrénées, c'est delà qu'on nous apporte cette racine sèche.

Cas.

LA racine d'impératoire convient absolument dans tous les mêmes cas que celle de l'Angélique, mais elle est plus spécialement alexipharmaque : on la préfère dans le cas des plaies faites par des instruments empoisonnés lorsque le poison est coagulant : elle est extrêmement vantée dans l'hydropisie récente, dans les fièvres quartes invétérées, pourvu qu'elles soient entretenues par le relâchement des solides, & par une lymphe épaisse, visqueuse, tenace, selon la remarque d'*Hoffman*. *Simon Pauli* assure avoir guéri plusieurs dartres invétérées, avec un onguent composé avec trois onces ou trois onces & demies de poudre de cette racine & un peu de saindoux ; mais il faut remarquer qu'il y a certains dartres qu'il seroit dangereux de guérir ou d'empêcher de fortir. La matière morbifique est quelquefois jetée sur la partie extérieure où elle produit des dartres, des ulcères, dans ce cas-là on ne doit pas les guérir.

Vertus.

CETTE racine convenant dans les mêmes cas que celle d'Angelique, ses vertus sont aussi les mêmes, avec cette différence seulement que sa vertu alexipharmaque est plus marquée.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON l'ordonne aussi de la même façon que l'Angélique depuis dix grains jusqu'à un scrupule ou demi-drachme tout au plus dans le cas de paralysie, d'hémiplégie, de paraplégie. En infusion depuis vingt grains jusqu'à trente tout au plus dans le vin blanc : on peut cependant aller jusqu'à deux drachmes, mais alors on fait prendre l'infusion par cuillérées, & dans le cas des coliques venteuses produites par des matières glaireuses. En décoction la dose en est depuis une drachme jusqu'à deux tout au plus : on l'ajoute à cette dose aux bouillons & aux décoctions des purgations dans le cas où l'on a besoin d'un cardiaque pour soutenir les forces d'un malade qu'on veut purger. Les principes dans lesquels réside la vertu de cette racine paroissent être les mêmes que ceux de l'angélique, mais ils sont plus pénétrants, plus actifs.

La Zédoaire , Zeodori.

ON l'apporte de la Chine, mais on ne connoît pas bien encore la plante dont on la tire : cette racine est tubéreuse, dense, solide, longue de trois ou quatre pouces, de la grosseur du doigt, elle se termine par les deux bouts en une pointe mouffe; elle est de couleur de cendre en dehors, blanche en dedans, d'un goût légèrement amer, elle a peu d'odeur. On emploie la racine de zédoaire dans les mêmes cas que nous avons dit qu'on se servoit de celle d'angélique & d'impératoire, ses vertus sont les mêmes. Nous ne les répéterons pas, elle est plus active que les deux autres, quoiqu'elle soit moins odorante, moins aromatique : c'est pourquoi on ne l'ordonne en substance que depuis quinze grains jusqu'à une demi-drachme tout au plus, en infusion depuis une drachme jusqu'à trois tout au plus. On se sert plus communément de l'angélique & de l'impératoire qu'il est plus aisé d'avoir : la Zédoaire se trouve souvent cariée, parce qu'elle nous est apportée de la Chine. Elle s'emploie par préférence dans les affections vermineuses des enfants, associée avec le mercure

doux : elle paroît avoir les deux mêmes principes que les deux racines précédentes ; on l'emploie rarement en décoction.

La Cannelle , Cinnamomum.

C'EST l'écorce de l'arbre appelé *Cinnamomum* ou *Cannella Zelanica* ; elle est mince de l'épaisseur d'une carte à jouer , quelquefois de deux lignes roulée en cornets plus ou moins longs , d'un pouce de large le plus souvent , d'une substance ligneuse & fibreuse , cassante cependant , dont la superficie est quelquefois ridée , quelquefois unie , de couleur d'un jaune noirâtre , d'un goût âcre , piquant , mais agréable , douceâtre , aromatique , d'une odeur douce & pénétrante ; le cannellier ou l'arbre dont on tire cette écorce , naît dans l'île de Ceylan.

Cas.

ON s'en fert dans tous les cas où les forces tant vitales que musculaires sont abattues ; dans ~~la prostration~~^{la proplexie} , dans la lipoplexie , les affections soporeuses , dans les paralysies , soit universelles , soit particulières qui en sont souvent les suites ; dans le cas de coction lésée dépendante des matières glaireuses , dans les coliques venteuses , dans les accouchements difficiles & laborieux , lorsque les forces ou les efforts de la mère deviennent trop foibles pour procurer l'exclusion du fœtus , dans l'hydroplisie récente où il n'y a ni ardeur , ni chaleur , ni soif ; dans la suppression des règles qui dépend du relâchement de l'attonie des fibres , dans le cas de cachexie , des pâles couleurs chez les filles ou de chlorose , l'eau de cannelle , soit spiritueuse , soit orgée dont nous parlerons ci-après , entre dans presque tous les médicaments qu'on donne comme cordiaux lorsque les forces sont abattues.

Vertus.

C'EST un stimulant , cardiaque , alexipharmaque , stomachique chaud , actif , carminatif , emmenagogue.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON donne la cannelle en substance & en infusion , rarement en décoction , le plus ordinairement en infusion ; en substance on peut l'ordonner en poudre depuis dix grains jusqu'à un scrupule dans une cuillerée de vin ou dans l'eau de scabieuse & de chardon-bénit : on l'associe aussi

avec d'autres cardiaques, & on en forme des opiates ou des bols, en les incorporant avec le sirop d'alkermès ou d'œillet : en infusion depuis un scrupule jusqu'à une demi-drachme ou une tout au plus ; on fait infuser par exemple, demi-drachme dans quatre onces de bon vin vieux qu'on fait prendre au malade dans le cas de coction lésée, de vomissement, de diarrhée dépendante de la rapidité des humeurs : on se sert aussi de l'eau de cannelle, il y en a de deux sortes, l'eau de cannelle spiritueuse & l'eau de cannelle orgée ; l'eau de cannelle spiritueuse se prépare de cette façon : on prend une livre de cannelle concassée, trois livres de vin blanc, deux onces d'orge, trois livres d'eau de Mélisse distillée, on fait macérer pendant vingt-quatre heures ; on distille la liqueur à un feu convenable, & on conserve pour l'usage les trois livres d'eau qui viennent les premières, c'est l'eau de cannelle spiritueuse qui est chargée des parties spiritueuses du vin. L'eau de cannelle orgée se prépare de la même manière avec une décoction d'orge dans laquelle on a fait macérer la cannelle & qu'on a fait distiller ensuite, celle-ci est plus foible : on s'en sert lorsqu'on craint l'activité d'un remède trop échauffant. Dans les potions cordiales on ordonne d'ajouter une once ou une once & demie d'eau de cannelle. On ajoute aussi la cannelle à la dose de trois scrupules dans les crèmes de riz qu'on fait prendre aux convalescents, dans les cas où les fibres de l'estomac ou du canal intestinal sont trop relâchées, on fait bouillir la cannelle avec le riz pendant qu'il cuit.

Pharmacologie Rationnelle.

LA vertu de la cannelle réside dans sa partie huileuse aromatique volatile qui est contenue principalement dans la pellicule fine qui revêt intérieurement cette écorce ; car on retire plus de cette partie huileuse ou de cette huile, d'une livre de cette pellicule, que de six livres de cette écorce ; le reste de cette écorce n'en est cependant pas dépourvu.

Les Cloux de Girofles, Cariophili aromaticis.

CE sont des fruits cueillis avant leur maturité, de figure de cloux presque quadrangulaires, d'un brun noirâtre, qui ont à leur sommet quatre petites éminences en forme d'étoile ; ils sont âcres & un peu amers, agréables, leur odeur est très-pénétrante, lorsqu'ils sont mûrs on le appelle *antrophili*, ils sont rares chez nous, l'arbre qui les porte s'appelle giroflier. Il naît dans les îles Moluques ; les Hollandois le cultivent aussi

avec grand soin dans l'isle *Ternata* : on se sert des cloux de girofles principalement dans les cuisines , on les emploie aussi en Médecine.

Cas.

ILS conviennent dans tous les cas où nous avons dit que les stimulants étoient employés , dans les syncopes , dans la paralysie de la langue , on peut alors en faire mâcher dans le cas de coction lésée lorsqu'il y a relâchement des solides , & accumulation de matieres glaireuses , en un mot dans tous les cas où la cannelle & les autres stimulants conviennent.

Vertus.

LES cloux de girofles sont des stimulants assez actifs , stomachiques chauds , bons carminatifs , emmenagogues qu'on peut employer dans les cas de suppression des regles & d'accouchements laborieux.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON les ordonne en substance depuis six grains jusqu'à dix ou quinze tout au plus , seuls ou associés à la cannelle ou à la noix muscade ; on se sert aussi de l'huile de girofles intérieurement , à la dose de deux , trois ou quatre gouttes dans quelque eau cordiale , comme l'eau de girofles , de cannelle dans le cas d'apoplexie pituiteuse pour donner du ton , dans les cas de coliques venteuses dépendantes de l'atonie des vaisseaux & de l'accumulation des matieres visqueuses , glaireuses ; plusieurs ordonnent l'huile de girofles intérieurement , dans les accès de fièvre intermittente , sur-tout quotidienne , quartes légitimes , lorsque le froid est excessif , & qu'on craint une syncope mortelle : on s'en sert aussi alors dans l'eau de cannelle ; on se sert encore de cette huile extérieurement. Les principes dans lesquels réside la vertu des cloux de girofles paroissent être les mêmes que ceux de la cannelle , mais ils sont plus actifs.

La Noix Muscade , Nux Moscata , nux miristica & aromatica.

C'EST le noyau du fruit d'un arbre appelé *muscadier* qui vient de lui-même dans les isles Moluques ; ce noyau est ferme & compacte , fragile , cependant odorant , d'une couleur presque cendrée , parsemé en dedans de veines d'un rouge brun & d'un jaune blanchâtre , répandues de côté & d'autre sans ordre , d'un goût âcre & agréable quoiqu'amer , d'une

substance huileuse & onctueuse , il est couvert de trois enveloppes ou de trois écorces , la premiere est épaisse , charnue , molle , pleine de suc , velue & rousse , d'un goût acerbe & astringent ; sous celle-ci on en trouve une seconde en forme de réseau d'une substance visqueuse , huileuse , mince & comme cartilagineuse , d'une odeur aromatique fort agréable , d'un goût âcre mêlé d'un peu d'amertume , de couleur de safran ou jaunâtre , c'est cette seconde enveloppe qu'on appelle *Macis* ; à travers les mailles de cette seconde enveloppe , il en paroît une troisieme qui est une coque dure , mince , ligneuse , d'un brun rousâtre , cassante , laquelle contient le noyau ou la noix muscade proprement dite , on fait un grand usage de la noix muscade dans les cuisines , on s'en sert aussi en médecine dans les cas suivants.

Cas.

LA noix muscade convient dans tous les cas où les stimulants ont lieu , spécialement dans le cas d'une difficile déglutition produite par la paralysie des organes de la déglutition , sur-tout dans les vieillards & à la suite des longues maladies des affections soporeuses ; cette paralysie se connoît par les causes qui ont précédé & parce qu'on n'apperçoit aucune tumeur ni à l'intérieur ni à l'extérieur , & que les malades ne se plaignent d'aucune douleur. M. *Etmuller* la recommande beaucoup dans ce cas-là : elle est aussi recommandée dans le cas de coction lésée dépendante de matieres glaireuses , dans les coliques venteuses , & sur-tout en fumigation dans le cas des lochies supprimées & d'enflure de la matrice (*inflation uteri*) où l'utérus paroît extrêmement gonflé de matieres aériennes , ce gonflement vient à la suite des accouchements. M. *de la Mure* l'a observé une fois dans une fille , on conduit alors la vapeur par un tuyau dans le vagin.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON ordonne la noix muscade en substance , réduite en poudre depuis six jusqu'à quinze grains , ou un scrupule tout au plus , seule ou associée avec la poudre de cannelle ; dans la diarrhée qui survient pour avoir trop mangé , ou avec trop de voracité & qu'on appelle communément bénéfice de de la nature , on fait une rôtie au vin & on y ajoute la noix muscade , c'est un bon astringent dans ce cas-là ; la vertu de la noix muscade réside pareillement dans un principe huileux , aromatique volatil : ceux qui en font un trop grand usage tombent dans une espece de somnolence.

Le Macis.

C'EST la seconde enveloppe de la noix muscade , nous l'avons dit ci-dessus.

Cas.

ILs sont les mêmes que ceux où la noix muscade convient , sa vertu est aussi la même , mais plus active ; c'est pourquoi on la préfère à la noix muscade dans le cas d'accouchement difficile , de lochies supprimées.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON l'ordonne en substance réduite en poudre depuis six grains jusqu'à un scrupule tout au plus , seul ou associé avec la cannelle sous forme de bols , en infusion dans du bon vin depuis un scrupule jusqu'à une demi-drachme tout au plus dans le cas des diarrhées fereuses , de coction lésée ; on s'en sert plus ordinairement dans les maladies des femmes , dans la cachexie , la chlorose : il faut l'employer avec beaucoup de circonspection , parce que son usage n'est pas sans danger. *Hoffman* raconte qu'une jeune fille tomba dans le délire , pour avoir pris trop de *Macis* pour faire venir ses regles ; les principes actifs du *macis* sont les mêmes que ceux de la noix muscade , mais plus énergiques : voilà les principaux médicaments stimulants simples qui sont en usage , nous allons parler de quelques compositions que l'on emploie très-communément dans la même vue.

Confection de Kermès.

ELLE tire son nom d'un médicament qui entre dans sa composition , & qui paroît le plus lui communiquer sa vertu stimulante , c'est la graine de kermès ou graine d'écarlate , *granum infectorium* : on la trouve sur les feuilles & sur les branches d'une espece de chêne appelé *ilex aculeata cocciglandifera*, qui est commun en Languedoc & en Provence ; les Auteurs ont beaucoup disputé sur l'origine de cette graine , & sur le regne auquel elle doit être rapportée. M. de Réaumur a démontré que c'est une espece d'insecte de la famille de ceux qu'il appelle *galle-insectes* ; cette graine est une coque membraneuse de la grosseur d'un pois unie , brillante , d'un rouge brun , couverte d'un duvet très-fin ou d'une poussiere grise remplie de petits œufs rougeâtres , ou même d'animaux qui étant pressés entre les doigts , répandent une liqueur de couleur d'écarlate , d'un goût un

peu âcre , un peu amer & d'une odeur qui n'est pas désagréable , le kermès est employé dans les arts mécaniques & dans la médecine ; en Médecine , on l'emploie en poudre , on en forme aussi un sirop dont on se sert pour la base de la confection de kermès ; le kermès entre encore dans plusieurs autres préparations : en poudre , il s'ordonne depuis un scrupule jusqu'à demi-drachme dans du vin ou dans quelque eau cordiale , il est stimulant , cordial ; on s'en sert avec succès dans la syncope , dans la lipothymie , en un mot toutes les fois qu'il faut soutenir les forces abattues ; outre cela il est aussi astringent sur-tout lorsqu'il est récent , mais pourtant assez desséché pour être mis en poudre : on s'en sert spécialement dans les accouchements difficiles , & pour prévenir l'avortement après des coups , des chûtes , c'est pourquoi les femmes grosses qui craignent de faire des fausses couches avalent souvent un morceau de foie cramoisi ; les bons effets qu'elles en éprouvent ne peuvent venir que du kermès dont cette foie a été imprégnée dans la teinture. M. Geoffroi dit qu'il a connu plusieurs femmes qui n'avoient jamais pu parvenir à leur terme sans avorter , & qui se sont heureusement accouchées au bout de neuf mois sans aucun accident , après avoir pris le remède suivant : il prenoit une drachme de graine de kermès récente , autant de confection d'hyacinthe & un scrupule de germe d'œuf desséché & réduit en poudre , (au lieu de germe d'œuf on pourroit substituer pareille dose de santal rouge) & suffisante quantité de sirop de kermès , il mêloit le tout & faisoit neuf pillules pour trois doses qu'il faisoit prendre de six en six heures , faisant avaler par-dessus un verre de bon vin mêlé avec de l'eau , ou avec une eau cordiale convenable.

Sirop de Kermès.

ON prépare le sirop de kermès de cette manière : lorsque les graines de kermès sont dans leur maturité au mois de Mai & de Juin , on les cueille , on les pile dans un mortier , on les laisse ensuite digérer dans un lieu frais pendant sept ou huit heures , afin que le suc se divise un peu & soit moins tenace ; alors on l'exprime & on le met à l'écart pendant quelques heures , afin que les parties grossières aillent au fond du vaisseau , on verse la liqueur & on la sépare de la lie qui est épaisse ; on mêle avec le suc dépuré une partie de sucre égale , & on le fait cuire à un feu doux jusqu'à la consistance d'un sirop épais ; on appelle ce mélange sirop de kermès ; à Montpellier on mêle trois parties de sucre avec une seule partie du suc de kermès pilé , & on macere pendant un jour dans

un lieu frais. Ce suc étant passé & exprimé acquiert la consistance de sirop, il est meilleur que le précédent, auquel le feu a enlevé une grande portion des particules volatiles, le sirop de kermès s'ordonne depuis une once jusqu'à une once & demie, soit qu'on le donne seul, soit qu'on l'ajoute aux potions cordiales, ou qu'on s'en serve pour incorporer quelques médicaments; dans la confection de kermès, le sirop de kermès sert de base, on y ajoute la poudre de cannelle, de santal citrin, l'ambre gris & le musc qui sont des stimulants cordiaux, & la pierre lazuli qui est un fort purgatif, avec quelques feuilles d'or. Cette confection est considérablement stimulante, cordiale, on peut en retrancher la pierre lazuli, comme on fait à Paris.

Cas.

ON se sert de la confection de kermès dans tous les cas où il faut rétablir les forces abattues, dans les fièvres putrides, dans les maladies longues, aiguës, malignes à *coagulo*, exanthématiques lorsque les forces sont abattues; la dose en est depuis demi-drachme jusqu'à une drachme & demie, on l'associe souvent avec la confection d'hyacinthe.

Quelques Auteurs croient que le trop grand usage de la confection de kermès n'est pas sans danger, & qu'elle occasionne quelquefois des douleurs vives, des dysenteries, ces mauvais effets ne peuvent être attribués qu'à la pierre lazuli; si cette pierre est retranchée, il n'est pas probable que la confection de kermès puisse nuire, pourvu qu'elle soit prise modérément.

Confection d'Hyacinthe.

ELLE tire son nom d'une pierre précieuse, nommée hyacinthe, qui entre dans sa composition: elle est d'un jaune rouge & éclatant, & nous est apportée des Indes orientales & autres pays. Les trois fantaux, le safran, la myrrhe, la terre sigillée, les graines de kermès, le topaze, le zaphire, l'émeraude & quelquefois l'ambre gris, le musc, les feuilles d'or, d'argent, y entrent aussi: pour incorporer les drogues qui entrent dans cette composition, on se sert du sirop de limon fait avec le seul suc de limon & le sucre, les anciens attribuoient aux pierres précieuses qui entrent dans cette confection une vertu alexipharmaque: nous n'examinerons par ici les vertus particulières de chaque drogue de cette composition, mais seulement celles de l'ensemble ou de la confection d'hyacinthe.

Cas.

ON s'en sert toutes les fois que le poulx devient petit , que les forces sont abattues , dans les fievres aiguës malignes à *coagulo* , pestilentielles lorsqu'il faut relever les forces abattues , dans les foiblesses qui surviennent ou qui dépendent des diarrhées sereuses , dans celles qui sont occasionnées par un vomissement dépendant des matieres glaireuses , épaisses , aigres , qui séjournent dans les premieres voies ; dans les cas de cette espece , on la donne , non-seulement comme remede palliatif pour relever les forces , mais même comme remede curatif , parce qu'elle contient dans sa composition des médicaments astringents : ces diarrhées & cette sorte de vomissement que nous avons déterminé , sont principalement les cas où on la préfere aux autres : on peut la joindre à la confection de kermès , s'il faut relever des forces extrêmement abattues.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON la donne de plusieurs façons ; dans les cas des fievres ou des maladies aiguës qui ont un peu traînées , aiguës par décadence lorsque les forces sont abattues , on la donne de quatre en quatre heures à la dose de demi-drachme délayée dans une ou deux cuillerées de bouillon , & on boit par dessus le reste du bouillon , ou bien dans une cuillerée d'eau de fleurs d'orange dans l'entre-deux des bouillons de quatre en quatre heures pareillement. Dans les cas de fièvre putride avec foiblesse , cas où il faut purger , quoique les purgatifs paroissent contre-indiqués à cause de la foiblesse , dans ces cas , dis-je , pour soutenir les forces pendant les évacuations , ou bien on ajoute une drachme de confection d'hyacinthe aux purgatifs , ou bien on donne à cuillerée la potion cordiale faite avec trois onces d'eau de scabieuse , trois onces de ^{drachme} chardon bénit ou quatre onces d'une seule de ces eaux cordiales , une ~~drachme~~ d'hyacinthe , une drachme de confection de kermès & deux cuillerées d'eau de fleurs d'orange , par ce moyen l'on soutient l'action de ce purgatif. Si après les premieres prises de cette potion cordiale les forces se soutiennent assez , il faut cesser de la donner , parce qu'elle releveroit trop le ton : si au contraire cette potion n'étoit pas suffisante , on pourroit y ajouter le *lilium de Paracelse* : on peut encore donner la confection d'hyacinthe comme un stomachique chaud dans le cas de coction lésée avec foiblesse dans les tempéraments pituiteux lorsque les matieres tournent vers l'aigre. Il n'est pas

aisé de déterminer dans quel principe réside précisément la vertu de la confection d'hyacinthe, quoiqu'on sache qu'il entre dans sa composition plusieurs médicaments dont on connoît les vertus, l'union de tous ces ingrédients peut faire une vertu plus marquée.

Lilium de Paracelse, ou Teinture des Métaux.

CETTE teinture se prépare ainsi : on prend du régule de mars, d'étain & de cuivre, on les fait fondre ensemble, on en compose une masse réguline, en la faisant refroidir on la pulvérise ensuite, & on y ajoute le tartre crud & le sel de nitre; on fond le tout ensemble, le jettant cuillerée à cuillerée dans un creuset rouge, observant chaque fois de couvrir le creuset pour laisser passer la détonnation & la fumée, on continue de même jusqu'à ce qu'on ait employé toute la poudre; lorsque le tout est bien fondu, on le jette dans un mortier pour avoir la régule qu'on met en poudre dans un matras, versant dessus deux pots d'esprit de vin : on le place sur un feu de sable pendant quinze jours, le remuant de temps en temps, après quoi on filtre la liqueur, & on a le *lilium de Paracelse*, ainsi appelé du nom de son inventeur, ou la teinture des métaux. C'est un cordial extrêmement vif & actif qu'on emploie lorsqu'il s'agit de relever les forces extrêmement abattues, de les relever, dis-je, promptement, comme dans les fièvres malignes à *coagulo*, dans l'apoplexie, dans le carus, dans les cas où le sang est extrêmement épaissi pour empêcher un épaississement mortel; on l'ajoute aux potions depuis dix gouttes jusqu'à vingt-cinq. Lorsque tout est dans une attonie extrême & qui menace d'une mort prochaine, on peut le donner depuis vingt grains jusqu'à quarante, ou même sans doser, si la foiblesse est extrême, seul ou dans l'eau de fleurs d'orange : on a observé que quoique ce médicament soit un stimulant, il ne laisse cependant pas des marques considérables de chaleur, ce qui prouve que son action est extrêmement vive mais passagère; on a fait entr'autres, cette remarque dans un cas où une trop grande dose de *laudanum* avoit jetté le malade dans une affection soporeuse qui menaçoit d'une mort prochaine : on lui donna une demi-once de *lilium de Paracelse*, il ne fut pas échauffé, il revint sans aucune suite fâcheuse.

Eau de la Reine de Hongrie, Aqua Regina Hungariæ.

POUR avoir l'Eau de la Reine de Hongrie on fait macérer pendant trois ou quatre jours de romarin dans l'esprit de vin, ensuite on

distille à un feu de sable , c'est un cordial vif : on s'en sert le plus ordinairement extérieurement , on la fait flairer , on l'applique sur les tempes , au poignet. On peut s'en servir aussi intérieurement dans une cuillerée d'eau de cannelle orgée , ou bien d'eau de cannelle spiritueuse , à la dose de huit ou neuf gouttes ; ce que nous avons dit de l'eau de la Reine de Hongrie peut s'appliquer à l'eau de mélisse.

La Thériaque , Theriaca.

IL faut la distinguer en récente & en vieille ; la récente est en même temps cordiale & narcotique à cause de l'*opium* qui y entre & qui y domine alors ; c'est pourquoi elle est bonne dans le cas d'affoiblissement occasionné par des superpurgations , par des cours de ventre ou autres évacuations , mais en vieillissant elle perd cette qualité , le *laudanum* étant exalté & perdant sa force. L'ancienne est donc particulièrement cordiale : on l'emploie dans les mêmes cas que la confection d'hyacinthe , elle est sur-tout recommandée prise intérieurement contre les morsures des animaux venimeux , & contre les poisons coagulants , c'est de-là même qu'elle tire son nom. Nous aurons lieu de parler encore de la thériaque dans la classe des relâchants.

Des Relâchants ou Narcotiques.

LES relâchants sont ceux qui diminuent le ton des solides trop augmentés , ils sont absolument opposés aux stimulants qui , comme nous avons dit , augmentent le ton des mêmes solides trop diminués. Le ton est trop augmenté ou il peche par excès quand il y a trop de sensibilité & trop de contractilité ou de mouvement , le trop de mouvement suit de trop de sensibilité. Les Anciens distinguoient trois sortes de relâchants : voici sur quoi ils se fondoient. Le ton peut être trop augmenté dans une partie déterminée , & de-là en conséquence dans toute la machine , par exemple ; supposé qu'une aiguille ou une épine soit fichée dans une partie tendineuse , il est sûr que le ton est augmenté dans cette partie affectée , & souvent toute la machine souffre en conséquence de cette partie affectée ou piquée , car il suit souvent des convulsions. Le ton par conséquent est augmenté dans tous les solides dans ce cas-là , mais seulement en conséquence du ton augmenté dans la partie affectée ou piquée. Cela posé , les Anciens appelloient médicaments relâchants ceux qui agissoient immédiatement & diminoient le ton dans la partie affectée , d'où l'augmenta-

tion du ton qui se répandoit , ou suivoit dans toutes les autres parties , étoit en même temps diminué , & ceux qui diminuoient le ton , en diminuant la trop grande sensibilité , étoient appelés anodins. Il peut se faire aussi que le ton soit aussi diminué en ôtant la cause qui l'avoit augmenté , comme dans la supposition que nous avons faite ci-devant , en ôtant l'éguille ou l'épine qui étoit fichée dans une partie ; car cette cause étant ôtée , le ton ou la sensibilité diminuera dans cette partie , & par conséquent dans toutes les autres dans lesquelles il n'étoit augmenté qu'en conséquence de la partie affectée. Les médicaments qui diminuoient le ton , en ôtant la cause qui l'avoit trop augmenté , étoient appelés chez eux *Parégoriques* , c'est-à-dire , consolants , parce que la cause étant ôtée , les malades se sentoient soulagés & comme consolés. Enfin ils concevoient des médicaments relâchants qui n'opéroient le relâchement qu'en diminuant la faculté de sentir , sans agir immédiatement & spécialement sur la partie affectée , mais en agissant sur tout le système nerveux , sur l'origine des nerfs , & ils les appelloient narcotiques. Ceux qui relâchoient & en même temps produisoient le sommeil , étoient appelés proprement hypnotiques. Ce que nous venons de dire n'empêche pas qu'en général par le mot anodin on n'entende tout médicament qui calme la douleur , mais pris à la rigueur , *in sensu subdiâo* , signifie un médicament qui calme la douleur en agissant immédiatement & spécialement sur la partie affectée dont il diminue le ton ; de même on entend en général par narcotiques , les médicaments qui font dormir en agissant immédiatement sur l'origine des nerfs , sur tout le système nerveux , quoique les médicaments qui produisent cet effet soient appelés proprement hypnotiques. Nous parlerons des anodins proprement dits dans la *Matiere Médicale* externe , nous ne parlerons ici que des relâchants de la troisième classe , c'est-à-dire , des Narcotiques qui sont presque tous tirés du pavot & de ses différentes préparations.

Effets sensibles des Narcotiques.

CES effets sont ou généraux ou particuliers ; nous appellons effets généraux des narcotiques , ceux qu'ils produisent le plus ordinairement , le plus constamment ; les effets particuliers sont ceux qu'ils produisent , en égard à certaines circonstances particulières.

Effets généraux.

QUELQUE temps après qu'on a donné les narcotiques à une personne , l'exercice des sens diminue peu-à-peu ; cette personne se sent appesantie ,

les organes des sens se refusent de plus en plus à leurs actions , le mouvement diminue , l'assoupissement vient , la chaleur augmente , le pouls devient plus fort , plus plein , plus souple ou plus mol , sans augmenter cependant en fréquence , la peau paroît moite & se couvre ensuite de sueurs : si on excepte l'excrétion de la peau qui augmente , toutes les autres sont diminuées avec les forces ou même supprimées , comme , par exemple , l'excrétion de l'urine , de la salive , le sommeil est plus ou moins long , plus ou moins profond , suivant l'activité du narcotique & la disposition du sujet ; la personne s'éveillant sent sa tête appesantie , se trouve comme engourdie , & se plaint d'une espèce de langueur d'estomac , ce qui arrive toujours si le remède n'a pas été donné avec une certaine précaution.

Effets particuliers.

ILS dépendent , 1°. du tempérament de la personne ou de l'idiosyncrasie , 2°. de l'habitude , 3°. de certaines causes particulières. 1°. De l'idiosyncrasie , par exemple , l'expérience fait voir que les narcotiques loin de marquer les effets ci-devant , produisent des insomnies , des veilles opiniâtres , des vomissements , dans des tempéraments bilieux , dont la tête se prend aisément , comme chez les femmes hystériques. 2°. De l'habitude ou de la coutume : elle met de grandes différences dans les effets des narcotiques , car on observe tous les jours que les personnes qui se sont accoutumées peu-à-peu aux narcotiques ont besoin quelquefois d'une grande dose d'*opium* pour faire leurs fonctions avec une certaine aisance , autrement ils sont pesants , engourdis : c'est ainsi que les Turcs habitués à l'*opium* , au lieu de prendre de l'eau-de-vie pour s'animer au combat , comme dans les autres pays , prennent au contraire une forte dose d'*opium* , par où l'on voit que les effets particuliers sont bien différents des généraux , soit à cause du tempérament , soit à cause de la coutume. 3°. Des causes particulières : il arrive assez souvent que les excrétions , comme celles de l'urine , de l'expectoration , sont supprimées à cause du spasme , de l'éristisme des parties , sur-tout des spincters. C'est ainsi pareillement que les lochies peuvent être supprimées , & le sont même assez souvent à cause d'un *infultus* hystérique. Dans ce cas les narcotiques qui diminuent naturellement les excrétions étant administrés , bien loin de diminuer ou de supprimer ces excrétions , les rétablissent en ôtant la cause qui occasionnoit cette suppression ; ainsi il est des causes particulières qui sont que les narcotiques produisent en apparence des effets opposés aux généraux.

Indications.

Indications.

LES narcotiques sont indiqués , 1°. dans les maladies dolorifiques aiguës , 2°. dans les veilles opiniâtres , 3°. dans les maladies spasmodiques , 4°. dans les maladies évacuatoires , soit sanguines , soit séreuses ou blanches , 5°. dans les maladies où les excrétiions sont supprimées à cause de l'érétisme ou de la convulsion. 1°. Ils sont indiqués dans les maladies dolorifiques si la douleur dépend de la distension des fibres nerveuses qui menacent une rupture prochaine ; ainsi une partie affectée de douleur , est une partie dont la tension , la sensibilité , le ton sont augmentés ; par conséquent tout ce qui pourra diminuer la sensibilité diminuera aussi le ton ; les narcotiques produisent aussi cet effet comme nous l'avons vu ci-devant ; ils sont donc indiqués dans les maladies dolorifiques ; mais il faut distinguer plusieurs maladies dolorifiques , car il y a des douleurs vives , c'est principalement dans ce cas que les narcotiques conviennent , & il y a des douleurs sourdes , obscures , gravatives , & alors on ne doit les donner qu'avec beaucoup de circonspection. 2°. Dans les veilles opiniâtres ou dans l'insomnie , soit qu'elle soit essentielle , soit qu'elle soit symptomatique. L'insomnie est quelquefois essentielle , c'est ce qui arrive quelquefois dans les personnes qui ont beaucoup travaillé d'esprit ; souvent elle est symptomatique , comme presque dans toutes les maladies aiguës , fièvres , où l'insomnie se trouve de la partie , le sommeil est nécessaire pour rétablir les forces , ainsi on doit tâcher de le procurer pour les rétablir. 3°. Dans les maladies spasmodiques convulsives , mais seulement dans celles qui dépendent d'une tension dolorifique , comme il arrive dans une attaque de passion hystérique , ou à l'occasion d'une piquure , d'une blessure ; dans l'épilepsie essentielle les narcotiques seroient dangereux. 4°. Dans les maladies évacuatoires , lorsqu'elles affoiblissent le malade , les narcotiques qui suspendent & arrêtent les évacuations sont indiqués , soit que les évacuations soient séreuses comme dans les cours de ventre séreux , soit qu'elles soient sanguines comme dans le vomissement de sang ; dans la dysenterie , dans l'hémoptisie produite par un sang âcre qui a corrodé les vaisseaux , lorsque les malades toussent presque continuellement & expectorent peu ; en un mot , dans toutes les maladies évacuatoires qui affoiblissent notablement le malade , excepté cependant dans les cas de sueur , parce que , comme nous l'avons remarqué , les narcotiques , bien loin de diminuer cette excrétiion , l'aug-

mentent au contraire ou les procurent. 5°. Dans les maladies dans lesquelles les évacuations ou les excréctions sont difficiles , laborieuses , diminuées , suspendues ou supprimées à cause de l'érétisme & de la convulsion de quelque partie , sur-tout de quelque sphincter , comme dans une espece d'ischurie ou entiere suppression d'urine qui dépend de l'érétisme du sphincter de la vessie ; dans le cas d'accouchement difficile & laborieux , lorsqu'il dépend du spasme de l'utérus ; dans le cas d'expectoration difficile , lorsqu'elle est occasionnée par l'érétisme des vésicules pulmonaires ou des vaisseaux aériens.

Contre - indications.

EN faisant attention aux effets que les narcotiques produisent , on voit les cas où ils sont contre-indiqués ; nous avons observé , & l'expérience journaliere fait voir que les narcotiques relâchent ou diminuent le ton , la sensibilité , la contractilité , le mouvement des parties ; ils affoiblissent sur-tout lorsqu'ils ne sont pas donnés avec toute la précaution requise , laissent des lassitudes , des pesanteurs de tête , ils dérangent l'estomac ; enfin en diminuant la sensibilité , ils peuvent masquer ou pallier la maladie , sur-tout dans les maladies évacuatoires , les douleurs peuvent disparaître par leur usage , & par-là le Médecin ne pourra pas distinguer la maladie dont elles sont la suite. Delà on peut aisément déduire les cas où les narcotiques sont contre-indiqués , car puisqu'ils affoiblissent , il s'ensuit qu'on doit s'en abstenir , ou du moins qu'on ne doit les donner qu'avec une très-grande circonspection. 1°. Dans le cas d'affoiblissement des malades , quoique d'ailleurs ils paroissent indiqués , par exemple , je suppose un phthisique : dans ce cas il est important de calmer la toux , de tenir les poumons en repos pour prévenir de plus grandes irritations qui pourroient occasionner des déchirures des vaisseaux , d'ailleurs le sommeil rétablit les forces. Ces raisons paroissent donc indiquer les narcotiques , & effectivement dans ce pays on est fort en usage de le donner dans ce cas assez indistinctement ; nous croyons cependant qu'il faut alors se comporter avec beaucoup de circonspection ; car quoique d'abord le sommeil rétablisse les forces , cela n'est pas vrai généralement de toutes sortes de sommeil ; le sommeil procuré par le *Laudanum* n'est pas naturel , il est agité par des rêves , & bien loin que les malades soient toujours & constamment refaits par un tel sommeil , souvent ils se plaignent d'être plus foibles le matin après avoir dormi ; de plus les narcotiques excitent les sueurs : or , sur la fin les sueurs affoiblissent considérablement les phthi-

siques ; ainsi non-seulement on ne rétablit pas les forces de ces malades , mais même on les diminue , outre cela le *laudanum* dérange l'estomac dont les fonctions cependant doivent bien être considérées & ménagées dans les phthifiques : cela fait que l'usage du lait qui est si nécessaire dans ce cas-là devient beaucoup plus difficile , & peut-être ce qui le rend impraticable à l'égard de plusieurs phthifiques ne vient que de l'usage des narcotiques. Il est vrai que les narcotiques suspendent ou diminuent la toux , l'irritation des poumons , ce qu'on doit avoir principalement en vue ; c'est aussi par cette raison qu'on est porté dans ce cas à donner les narcotiques , mais alors on doit faire une espèce de comparaison , & se déterminer par le parti qui souffre le moins d'inconvénients. Si les inconvénients qui résultent du défaut de sommeil ne surpassent pas ceux qui résultent de l'usage des narcotiques , c'est-à-dire , si la toux n'est pas trop violente ni trop fréquente , il faut s'abstenir de l'usage des narcotiques , & n'y avoir recours que lorsque la toux & l'irritation sont si considérables qu'elles surpassent les inconvénients qui résultent de l'usage des narcotiques ; d'autant plus que pendant le sommeil les matières s'accumulent dans les voies aériennes & peuvent causer ensuite une plus grande irritation , & occasionner une plus grande rupture des vaisseaux. 2°. Quant aux évacuations , il est des cas où les narcotiques sont indiqués , d'autres où ils sont contre-indiqués : il faut user de beaucoup de prudence pour ne pas faire des fautes à cet égard ; si les évacuations sont portées à un très-haut point qu'il y ait convulsion , les narcotiques ne sont pas alors contre-indiqués , mais dans les commencements ils le sont , par exemple , dans le commencement du *cholera morbus* , le *laudanum* seroit très-préjudiciable , il exciteroit des inflammations , des météorismes , parce qu'en arrêtant dans les commencements l'évacuation , on retiendroit le loup dans la bergerie ; ainsi dans le commencement il faut laisser agir la nature , donner des adoucissants , ce n'est que vers la fin qu'on peut employer les narcotiques ; il en est de même dans les cas de superpurgations : on a vu quelquefois des effets très-funestes , l'inflammation , la mort même s'ensuivre de l'administration trop prompte des narcotiques , il faut employer auparavant les adoucissants : il faut être très-circonspect sur l'usage des narcotiques , lorsqu'il s'agit de quelque évacuation naturelle , par exemple , du flux menstruel ; leur administration , dans ce cas , risqueroit de causer des inflammations , des météorismes du bas-ventre , des inflammations de poitrine. Si on veut les employer , ce n'est que dans les cas où les insomnies seroient très-considérables , les douleurs extrêmes , autrement si la douleur n'est pas pressante , il faut s'en ab-

tenir ; c'est pourquoi dans les cas des maladies des femmes où les narcotiques paroissent indiqués , il faut être attentif de les interroger sur les regles : si elles les ont actuellement , ou si elles sont prochaines , c'est une raison pour s'abstenir des narcotiques , pourvu qu'il n'y en ait pas de plus pressante pour les donner ; enfin dans les maladies évacuatoires , on doit s'abstenir des narcotiques dans les commencements non-seulement , parce que par-là on retient le loup dans la bergerie , mais encore parce que par-là on se cache l'état de la maladie qui se trouve palliée ou masquée par les narcotiques. En général il faut observer & savoir les effets que produisent les narcotiques ; pour bien distinguer les cas où ils sont indiqués de ceux où ils sont contre-indiqués , si le ton n'est pas extrêmement augmenté , si les symptômes ne sont pas trop violents , il faut s'en abstenir. Il faut aussi avoir égard aux effets particuliers qu'ils produisent , eu égard au tempérament , à l'habitude , pour cela il faut interroger les malades sur les effets que produisent chez eux les narcotiques , supposé qu'ils en aient déjà usé , nous avons vu qu'ils causoient quelquefois des delires , des insomnies , des vomissements ; il est donc très-important de les interroger sur les effets qu'ils ont produits chez eux , comme aussi sur les especes des narcotiques dont ils se sont servis , & de la dose qu'ils en ont prise.

Précautions.

ELLES se déduisent des cas où les narcotiques sont indiqués & de ceux où ils sont contre-indiqués , elles dépendent du choix qu'on doit faire & qui sera connu par le détail où nous allons entrer. Les narcotiques les plus en usage sont le pavot & ses différentes préparations surtout du pavot qu'on appelle *papaver hortenſe ſemine albo*. Nous allons parler de ces différentes préparations & de la maniere dont on les administre , à l'égard des cas où on les emploie , nous n'en dirons rien ici pour éviter la répétition ; on s'en sert dans tous les cas où nous avons dit que les narcotiques en général étoient indiqués.

Décoction de Tête de Pavot.

LE Narcotique le plus simple est la décoction de pavot même : on prend pour cela une tête de pavot ordinaire , (si elles sont petites , on peut en prendre deux ou trois suivant la grosseur , comme aussi on n'en prend que la moitié , si elles sont trop grosses) on coupe cette tête en petits morceaux , on rejette les semences & on fait bouillir dans six

livres d'eau jusqu'à diminution de la moitié, on peut adoucir cette décoction avec un peu de sucre, il vaut mieux l'ordonner sans sucre si le malade n'est pas rebuté. On rend cette décoction plus légère en ne faisant bouillir que jusqu'à diminution d'un tiers, & alors on pourroit s'en servir pour base d'une émulsion narcotique qu'on feroit ainsi : on pileroit dans un mortier les semences de pavot auxquelles on pourroit ajouter par-dessus les semences froides, versant en même temps la décoction légère dont nous parlons, on pourroit y ajouter le sirop de nymphæa.

Syrop de Pavot blanc, ou de Diacode de Méconium.

ON se sert de la tête de Pavot, on le prépare ainsi : on prend une once de tête de pavot qu'on coupe en morceaux & dont on rejette les semences, on les fait macérer pendant vingt-quatre heures dans quatre onces d'eau de fontaine, ensuite on les fait bouillir jusqu'à diminution de la moitié, on coule avec expression ; on mêle avec cette colature quatre onces de sucre, & on fait cuire jusqu'à consistance de sirop. Le sirop de pavot blanc est le narcotique le plus usité dans les maladies aiguës inflammatoires.

L'Opium.

C'EST un suc concret gomme-résineux, pesant, compacte, pliant, d'un roux noirâtre, d'une odeur désagréable, d'un goût amer, âcre, formé en gâteau aplati : on nous l'a apporté de la Natolie, de l'Egypte & des Indes. Il découle par incision de la tête du pavot dans plusieurs provinces de l'Asie mineure. On sème les champs de pavot blanc, comme nous semons ici le bled. Les Auteurs ne s'accordent pas sur la manière dont on retire ce suc des têtes du pavot. M. Tournefort rapporte que la plus grande quantité d'*opium* se tire par la contusion & l'expression des têtes de pavot ; mais d'autres savants qui ont été sur les lieux où l'on prépare l'*opium*, ne parlent point de cette façon de le tirer. Le pavot étant presque mûr, on fait des incisions à la tête de cette plante, le lendemain on recueille le suc qui a coulé, c'est le plus estimé. Le surlendemain on fait une deuxième incision & quelquefois une troisième, & on recueille de même le suc qui découle, mais il est moins estimé que le premier. Le suc de la première incision est brunâtre, l'autre est plus noirâtre ; le suc ainsi recueilli s'épaissit bientôt, on y fait une préparation en l'humectant avec un peu d'eau ou de miel, on le remue avec une grosse spatule de bois jusqu'à ce qu'il ait acquis la consistance & la visco-

sité de la poix qu'on prépare avec soin , après quoi on en fait de petits gâteaux , tels qu'on nous l'apporte.

Le Laudanum.

IL est chargé de parties hétérogenes , on le purifie avec deux sortes de menstrues , savoir avec les menstrues aqueux & avec les menstrues spiritueux , parce que c'est un suc gomme-résineux , on procede de cette maniere : on prend la quantité d'*opium* qu'on veut , on le coupe par morceaux , on le met dans un matras , versant par-dessus de l'esprit de vin jusqu'à l'éminence de deux ou trois travers de doigt ; on fait digérer à un feu modéré jusqu'à ce que le menstrue soit chargé d'*opium* ; ayant retiré cette teinture , on y verse encore du même esprit de vin qu'on retire de même lorsqu'il est chargé d'*opium* , ce qu'on réitere jusqu'à ce que l'esprit de vin ne se charge plus ; ensuite on y verse de l'eau de pluie pour avoir une autre teinture , alors on mêle ensemble ces deux teintures , & on les fait évaporer jusqu'à consistance d'extrait , c'est le *Laudanum* solide ou l'*opium* dépuré. L'*opium* pris intérieurement est le plus agissant narcotique , il entre dans plusieurs compositions. Dans la Thériaque , on préfere la thériaque récente à la vieille lorsqu'il faut fortifier , mais en même temps relâcher. Dans les pillules de cinoglosse , ces pillules sont assez en usage dans certains pays à la dose de six grains jusqu'à quinze , elles réussissent quelquefois dans des cas où le *Laudanum* ne réussit pas.

Laudanum liquide de Sydenham.

ON se sert aussi de l'*opium* pour faire le *laudanum* liquide de Sydenham ainsi appelé , parce que cet Auteur est le premier qui en a fait la description , ou même qu'il en est l'inventeur : on prend pour cela deux onces d'*opium* en tranches petites , une once de safran oriental , une drachme de cannelle en poudre , une drachme de cloux de girofle ; on fait digérer le tout au bain marie pendant deux ou trois jours dans du vin d'Espagne ou dans du vin de Canarie ; on décante , on filtre la liqueur , c'est-là le *laudanum* liquide de Sydenham.

Maniere de se servir de ces Médicaments , Doses.

ON les donne dans tous les cas où nous avons dit que les narcotiques étoient indiqués , & on les évite dans tous ceux où ils sont contre-indiqués : on se sert de la décoction de la tête de pavot dans les cas où

On veut calmer sans faire dormir , comme dans le catarre où la toux est incommode , fréquente , on fait cette décoction jusqu'à diminution de la moitié ou du tiers , selon le besoin. Le sirop de pavot s'ordonne dans les adultes depuis trois drachmes jusqu'à quatre ou six ou même une once , dans les enfants depuis une drachme jusqu'à deux ou trois. On l'ajoute aux émulsions dans les fièvres aiguës inflammatoires quand la douleur est vive & qu'elle interrompt le sommeil ; on prépare alors l'émulsion avec les semences de pavot blanc & des semences froides , qu'on pile en versant dessus une décoction appropriée , & on y ajoute demi-once de sirop de pavot : il faut observer que le sirop de pavot produit quelquefois chez les femmes hystériques des mauvais effets , comme le vomissement , les convulsions ; c'est pourquoi dans ce cas-là on donne la décoction des têtes de pavot ou le *laudanum* solide délayé dans un peu de vin ou d'eau , ou enfin le *laudanum* liquide de Sydenham. Le *laudanum* solide s'ordonne depuis demi-grain jusqu'à un grain ou deux , il a beaucoup plus d'énergie que la décoction des têtes de pavot & que le sirop : on le donne aux femmes hystériques sur-tout , quoique chez elles le *laudanum* liquide passe assez bien : on s'en sert aussi dans des cas où il s'agit d'arrêter des évacuations qui affoiblissent trop les malades sur la fin , comme nous l'avons dit plus haut , ou pour calmer des douleurs extrêmement vives , des coliques extrêmement fortes : on commence à le donner par demi-grain aux personnes qui n'ont jamais usé des narcotiques ; si demi-heure après on ne voit pas l'effet désiré , on peut en donner encore demi-grain , ainsi de suite jusqu'à ce qu'on voie qu'il opere. La dose du *laudanum* liquide est depuis six gouttes jusqu'à vingt : on s'en sert chez les femmes hystériques ; c'est aussi la préparation la plus convenable dans le cas d'épuisement causé par un vomissement ; dans le *Cholera morbus* , dans les superpurgations : on en donne dix gouttes , par exemple , dans une cuillerée d'eau de fleurs d'orange , de menthe. On peut substituer le *laudanum* & à ses préparations (supposé que le malade ne puisse pas les supporter) demi-drachme ou une drachme de thériaque , ou huit ou neuf grains de pillules de cinoglosse.

Pharmacologie Rationnelle.

ELLE ne nous apprend rien de bien satisfaisant ; les Anciens regardoient l'*opium* comme un poison froid au quatrième degré , ils ne l'employoient que très-rarement , & encore l'associoient-ils à des médicaments chauds ; nous savons cependant que ce n'est pas un médicament

froid , puisqu'il est en partie résineux , & que les résines échauffent bien loin de refroidir : il est composé d'une partie résineuse. Quelques-uns ont dit que sa vertu narcotique dépendoit de sa partie gommeuse ; cette partie gommeuse , selon eux , étant dissoute par les suc de l'estomac & ensuite portée dans le sang vers les tuyaux sécrétoires des esprits , les bouchent en quelque façon , & empêche le cours de ce fluide , d'où suivoit ce relâchement : ils attribuoient à la partie résineuse l'augmentation de la circulation , de la chaleur ; l'excrétion de la peau , disoient-ils , n'étoit pas interrompue , parce que cette excrétion se fait par des pores ou des tuyaux qui ne sont pas entourés de vaisseaux sanguins ; mais il reste toujours à demander pourquoi la partie gommeuse n'intercepte pas le cours des esprits qui vont au cœur & aux organes vitaux : il n'est pas aisé d'y répondre ; d'autres expliquent aujourd'hui son action par sa partie résineuse , cette partie étant mêlée avec le sang , le raréfie , distend les vaisseaux , d'où s'ensuit la compression des vaisseaux sécrétoires , le relâchement , cette opinion souffre les mêmes difficultés que la précédente. M. Mead dit que l'*opium* cause dans l'estomac une espèce de chatouillement extrêmement agréable , qui occupe tellement l'ame , que toutes les autres sensations sont suspendues , comme on voit tous les jours dans les personnes fortement occupées de quelque objet , qu'elles sont insensibles à tous les autres : il admet aussi d'une part l'action de la partie résineuse. Suivant ce sentiment on peut aisément expliquer pourquoi l'*opium* lorsqu'on y est accoutumé , n'opere plus son effet étant donné à la même dose , parce que nos organes se font aux impressions , s'y accoutument , de sorte qu'ils n'en sont pas affectés , à moins que l'impression ne devienne plus forte. Par-là aussi on explique pourquoi l'*opium* produit son effet , si on augmente la dose chez les personnes qui y sont habituées ; on explique encore pourquoi il produit quelquefois des effets opposés , comme le vomissement , parce que plusieurs personnes ont l'estomac extrêmement sensible. Avant que de finir cet article nous remarquerons que l'*opium* étant un suc gommo-résineux , la partie gommeuse ne se dissout que dans l'eau , & l'esprit de vin ne retire que la partie résineuse ; de cette diversité de menstrues naissent différentes teintures d'*opium* qui produisent des effets bien différents. M. Geoffroi a observé que la teinture d'*opium* tirée seulement avec l'esprit de vin , a une vertu beaucoup plus forte & cause quelquefois des délires maniaques aux hypocondriaques. Il a observé que ces personnes dorment d'un sommeil tranquille lorsque dans les insomnies on leur faisoit prendre la teinture d'*opium* tirée avec l'eau ,

l'eau , & qu'au contraire elles devenoient phrénétiques lorsqu'elles prenoient de la teinture d'*opium* faite avec l'esprit de vin. La teinture d'*opium* faite avec l'eau est moins dangereuse , mais elle se garde moins.

Les Astringents.

LES médicaments astringents sont ceux qui augmentent le ressort trop diminué des organes solides du corps humain ; ce ressort diminué peut être augmenté de plusieurs façons , c'est ce qui a obligé de distinguer plusieurs genres d'astringents. Cette définition est extrêmement importante pour la pratique : 1°. on peut concevoir que les organes du corps n'ont pas le ressort qui leur est naturel , parce que leur tissu est moins ferré & que la cohésion des fibres est diminuée , ils pechent par mollesse , & alors les astringents convenables ont été appelés par les anciens pignotiques ou condensants ; 2°. cet état de mollesse ou ce tissu moins ferré peut dépendre des parties aqueuses qui s'insinuent entre les fibres , diminuent leur cohésion & les éloignent plus ou moins du point de contact. Les médicaments propres à remédier à ce vice ôtent , enlèvent promptement pour ainsi dire , ces parties aqueuses , on les appelle astringents absorbants. 3°. Le ressort des vaisseaux doit être entier ; non-seulement dans toute la longueur de leur trajet , mais même dans leurs extrémités. Or il y a bien des maladies caractérisées par des écoulements qui se font par l'extrémité des vaisseaux. Ces écoulements ou ces évacuations contre-nature peuvent être empêchés par ces médicaments qui augmentent la force systaltique en resserrant ces parties qui ne retiennent pas les humeurs : ces médicaments sont appelés *astringents stegnotiques* , ou *resserrants* par excellence. 4°. Ces écoulements peuvent être aussi arrêtés par des médicaments qui enduisent les parois des vaisseaux , par des matières visqueuses , glutineuses , mucilagineuses , qui bouchent pour ainsi dire les orifices par lesquels se faisoient l'écoulement : on appelle ces médicaments *astringents emphratriques* ou *invisquants* ; en faisant quelques légères réflexions sur les différents genres d'astringents on en sentira l'utilité pour la pratique : il est évident que les astringents *absorbants* peuvent ne pas convenir dans des cas où les astringents pignotiques ou condensants conviennent & *vice versa* ; de même les astringents emphratriques ou invisquants peuvent convenir dans une infinité de cas où les stegnotiques ne conviendroient pas.

Effets sensibles des Astringents.

CES effets sont généraux ou particuliers ; les astringents condensants ou pignotiques ont les mêmes effets que les absorbants : après avoir donné ces médicaments , les forces , soit vitales , soit musculaires , paroissent plus grandes , le poulx augmente , la chaleur aussi , les fonctions particulieres paroissent se rétablir ; lorsqu'on donne les astringents proprement dits reserrants ou stegnotiques , on voit que les évacuations cessent ou diminuent beaucoup , les forces reviennent , le poulx augmente , tout rentre dans l'état naturel.

Indications.

POUR marquer les cas où ces différents genres d'astringents sont indiqués , nous suivrons l'ordre que nous en avons donné ; ainsi , 1°. les astringents pignotiques ou condensants sont indiqués dans les maladies chroniques dans lesquelles le tissu des solides est mol , les fibres extrêmement relâchées par défaut de cohésion ; dans la cachexie ou dans cette mauvaise habitude du corps dans laquelle le corps paroît bouffi ou enflé mais enflé œdémateusement , dans la chlorose ou pâles couleurs des filles , dans l'hydropisie , soit ascite ou du bas-ventre , soit même de la poitrine , mais dans l'hydropisie récente , dans laquelle il n'y a ni fièvre , ni ardeur , ni soif , & alors on les ordonne principalement non dans le dessein d'évacuer les eaux déjà épanchées , mais pour empêcher qu'il ne s'en épanche ou qu'il ne s'en accumule davantage ; dans les obstructions des visceres dépendantes du relâchement des fibres des vaisseaux & de l'épaississement visqueux des fluides ; dans les maladies qui dépendent de ces sortes d'obstructions , comme par exemple , dans l'ictère froid dépendant d'une semblable obstruction du foie ; dans les fièvres intermittentes opiniâtres qui dépendent aussi d'obstructions , & alors on associe les astringents avec les fébrifuges ; dans l'asthme humide ou vraiment piteux dépendant des tubercules produits par une lymphe épaisse , visqueuse ; 2°. les astringents absorbants dont il n'y a que quelques-uns de salins , & dont la plupart sont terreux , conviennent dans les maladies des premières voies , comme dans la coction lésée ou par des matieres âcres , aigres , ce qu'on connoît par les rapports aigres alkalescents , ou lésée par des matieres glaireuses & insipides , ce qu'on connoît par les rapports insipides ; dans le vomissement occasionné par cette coction lésée dont nous venons de parler ;

dans les cours de ventre dépendants du relâchement des fibres des intestins ou produit par des matieres alkalescentes ; 3°. les astringents stegnotiques ou proprement dits reserrants , conviennent dans les mêmes cas que les absorbants , comme par exemple , dans les cours de ventre qui ont résisté aux absorbants : outre cela ils conviennent dans les vomissements de sang , dans le flux de sang considérable , dans le pissement de sang , dans le flux immodéré des menstrues , des lochies ; en un mot dans toutes les hémorragies , excepté toutefois dans celles qui viennent des poumons , parce que ces médicaments ont la propriété de coaguler le sang. Or le sang ainsi coagulé ramassé dans les vaisseaux du poumon , comprimeroit les vésicules pulmonaires & pourroit suffoquer le malade , ou bien il pourroit survenir une inflammation , ainsi on doit être très-circonspect dans l'usage de ces médicaments dans le cas d'hémopthisie , & on doit s'en abstenir , à moins que l'hémopthisie ne soit considérable , qu'elle mette le malade dans un danger évident ; 4°. les astringents emphratiques ou inviscquants conviennent dans le vomissement de sang produit par une matiere âcre corrodante , dans les diarrhées bilieuses , dans la dysenterie , en un mot dans toutes les maladies évacuatoires produites par une matiere âcre & corrodante , dans les hémorragies des premieres voies produites par un sang dissout & âcre , dans le pissement de sang qui a ce caractère.

Contre-indications.

EN faisant attention aux cas où ces différents médicaments sont indiqués , on voit ceux où ils sont contre-indiqués , & où ils ne conviennent pas : 1°. les astringents pignotiques sont contre-indiqués dans toutes les maladies aiguës dans lesquelles il se trouve un caractère marqué d'inflammation & où les solides sont dissouts & âcres , à moins qu'il ne se présente du côté des premieres voies des symptômes qui les indiquent , comme le vomissement produit par des matieres acescentes , en un mot dans toutes les maladies aiguës , même simplement fievreuses , lorsque sur-tout le mouvement du sang est augmenté ; 2°. les astringents absorbants sont contre-indiqués dans les mêmes cas ; 3°. les astringents stegnotiques sont contre-indiqués dans les hémorragies qui viennent des poumons , à moins que , comme nous l'avons dit , elles ne soient si considérables qu'elles mettent le malade dans un danger évident ; dans toutes les évacuations périodiques qui se font avec le soulagement du malade , comme dans le flux menstruel , dans le flux hémorroïdal , chez les hommes qui y sont sujets ;

4°. les astringents emphratiques sont contre-indiqués dans les mêmes cas que les astringents absorbants. Ces médicaments sont propres à ramollir le tissu des solides & à épaissir les fluides.

Précautions.

LES précautions qu'il faut prendre dans l'administration des astringents consistent à bien distinguer les cas où un astringent de tel genre doit être employé par préférence à un autre d'un autre genre. C'est ce qui a fait sentir de plus en plus l'utilité de la distinction que nous avons faite des différents genres d'astringents ; de plus dans le cas des maladies évacatoires , on doit être circonspect & examiner sérieusement si telle ou telle évacuation doit être supprimée avant de se déterminer pour se servir ou pour s'abstenir des astringents ; nous allons à présent entrer dans le détail de ces médicaments suivant l'ordre que nous en avons proposé.

P R E M I E R G E N R E.

Les Pignotiques ou Condensants.

LES astringents pignotiques ou condensants sont des médicaments qui rétablissent le ressort diminué des solides , en rapprochant , pour ainsi dire , les fibres les unes des autres , & en augmentant les points du contact : ils nous sont fournis par le ^{végétal} & le règne minéral , nous ne parlerons ici que de ces derniers ; nous aurons occasion de traiter de ces premiers dans la classe des stomachiques chauds , & dans celle des fébrifuges ; les pignotiques minéraux sont les martiaux parmi lesquels sont le fer & ses différentes préparations dont nous allons parler.

Le Fer & ses différentes préparations.

LE fer est le plus dur de tous les métaux , il ne se fond qu'après avoir rougi , & pris la couleur blanche , mais d'un blanc livide lorsqu'il est poli , & noir lorsqu'il n'est pas poli. Sa gravité spécifique est à celle de l'or environ comme trois à sept. Ce sont là les principales propriétés par lesquelles on peut distinguer le fer des autres métaux , si on y ajoute encore celle qu'il a d'être attiré par l'aimant. Les principaux médicaments astringents qu'on tire du fer , sont la limaille de fer , le safran de mars , le tartre calybé , les fleurs martiales. 1°. On se sert de la limaille de fer ; pour cela on pulvérise le fer , on le porphyrise , on le réduit en

une poudre très-fine , en le passant à travers un tamis , on dit qu'alors il est alkoolisé ; 2°. on se sert aussi du safran de mars apéritif préparé à la rosée du mois de mai ; ce n'est autre chose que la limaille de fer exposée à l'humidité de l'air de la nuit pendant le mois de mai. Cette alternative d'humidité & de secheresse le fait rouiller , on le nomme safran de mars apéritif , *crocus martis aperiens* , pour le distinguer d'un autre safran de mars qu'on prépare en imbibant souvent la limaille avec le vinaigre : on appelle ce dernier safran de mars astringent , *crocus martis adstringens* ; 4°. on prépare ainsi la teinture de mars : on prend dix ou douze onces de safran de mars apéritif préparé à la rosée de mai , deux livres de crème de tartre qu'on fait bouillir dans l'eau pendant douze ou quinze heures , on passe la liqueur toute chaude , & on l'expose derechef à une ébullition lente jusqu'à ce qu'elle ait acquis la consistance de sirop , c'est la teinture de mars.

Tartre calybé soluble.

ON fait le tartre calybé soluble en prenant une livre de teinture de mars & quatre onces de sel de tartre : on fait bouillir le mélange dans une suffisante quantité d'eau pendant une heure , on le passe tout bouillant par une piece de drap , & on fait évaporer ensuite jusqu'à siccité , on a alors le tartre calybé soluble.

Fleurs Martiales.

ON les prépare de cette manière : on prend trois parties de safran de mars apéritif , deux parties de sel ammoniac en poudre , on met le mélange dans une cucurbite de terre couverte de son chapiteau , on pousse le feu peu-à-peu , il s'élève des fleurs qu'on appelle *fleurs martiales* : telles sont les préparations les plus usitées , sous le point de vue que nous les envisagerons ici.

Cas.

ON emploie ces différentes préparations martiales dans tous les cas où les fibres sont extrêmement relâchées , soit par défaut de cohésion , soit par imbibition aqueuse ; ainsi on les ordonne , sous ce point de vue , dans toutes les maladies cachétiques où l'habitude du corps paroît enflée , mais enflée œdémateusement dans la chlorose , dans l'hydropisie , soit de la poitrine , soit principalement du bas-ventre , pourvu qu'elle soit récente , & qu'il n'y ait ni fièvre , ni soif , ni ardeur , ni chaleur dans les obstruc-

tions des viscères dépendantes du relâchement des solides & de l'épaississement des fluides ; car il faut remarquer que ces médicaments ne conviennent point dans les obstructions dures, schirreuses, parce qu'ils augmentent les forces & la circulation, & pourroient occasionner des inflammations, ainsi on doit s'en abstenir dans ces circonstances ; ou bien si on les donne, on doit le faire avec beaucoup de circonspection, en les joignant, par exemple, à des médicaments adoucissants : on s'en sert aussi dans l'ictère froid, dans lequel on ne remarque ni soif, ni ardeur dans les maladies évacuatoires, comme dans les cours de ventre où les déjections sont sereuses, & qui dépendent de la sérosité qui relâche les fibres ; mais ils nuiront dans le cours de ventre accompagné de soif, d'ardeur, de chaleur, d'acrimonie, comme par exemple, dans la diarrhée bilieuse, dans la dysenterie : on les emploie encore quelquefois dans les hémorragies, comme par exemple, dans le flux immodéré des règles, mais seulement lorsqu'elles dépendent du relâchement des vaisseaux ou des obstructions des viscères, & qu'il n'y a ni fièvre ni ardeur ; dans ce cas seulement ils réussissent, parce qu'ils ôtent les embarras des viscères qui gênoient la circulation dans ces parties, ce qui étoit cause que le sang se portoit avec plus grande abondance vers l'utérus. Les embarras étant ôtés le sang passe plus librement dans les viscères, & se porte en moindre quantité vers l'utérus dans les obstructions produites par des virus particuliers, comme par exemple, par les écrouelles lorsque les matières qui forment ses embarras sont épaisses, visqueuses, tenaces, sans caractère d'acrimonie ; dans les fièvres intermittentes qui se trouvent dans les tempéraments pituiteux, comme dans les fièvres quotidiennes légitimes, dans les fièvres intermittentes bâtarde qui dépendent des matières épaisses, visqueuses, tenaces ; dans les fièvres quarte rebelles qui dépendent des obstructions des viscères, on les associe avec les fébrifuges ordinaires. On s'en sert aussi dans les fleurs blanches des femmes qui dépendent du relâchement des vaisseaux excrétoires, ou de l'épaississement visqueux des matières lorsque la matière ne cause aucune démangeaison, ni aucune exulcération, ni excoriation. S'il y a des exulcérations, on doit s'abstenir des martiaux, ils seroient nuisibles ; dans les passions hystériques & hypocondriaques, M. Sydenham les regardoit comme les seuls qui pouvoient être employés avec succès ; mais il faut remarquer que ces affections peuvent se trouver quelquefois dans des tempéraments pituiteux chez lesquels les fibres sont beaucoup relâchées & où la sérosité abonde, & alors les martiaux conviennent ; d'autrefois au contraire & même plus souvent elles se

rencontrent dans les tempéraments bilieux chez qui les solides ne sont déjà que trop tendus , la lymphe peche par secheresse ; dans ce cas-là il ne seroit pas prudent de donner les martiaux , ou si on les donne , ce ne doit être qu'après avoir délayé , humecté , & encore faut-il les joindre aux adoucissans : on donne aussi les martiaux pour rétablir des évacuations supprimées , comme dans la suppression des regles , pourvu qu'elle dépende du relâchement des solides & de l'épaississement visqueux des fluides ; ce que nous disons de cette évacuation supprimée , on doit l'entendre de toutes les autres , & avoir les mêmes attentions.

Vertus.

IL est aisé de les déduire des cas où nous venons de voir que les martiaux convenoient , ils sont apéritifs chauds , astringents , condensans.

Maniere de s'en servir , Doses.

1°. ON se sert du fer même en substance sans le diviser pour faire l'eau ferrée ; pour cela on fait rougir au feu quatre ou cinq cloux neufs plus ou moins suivant leur grandeur , & on les éteint dans l'eau , c'est ce qu'on appelle *eau ferrée* : on la donne dans les cours de ventre fereux , dans la cachexie , dans les pâles couleurs. 2°. On se sert aussi du même moyen pour donner une vertu un peu astringente au petit lait , & en même temps pour empêcher qu'ils ne s'aigrissent dans l'estomac en lui donnant du ton : on doit faire rougir au feu , un , deux ou trois cloux s'ils sont petits , & on les éteint dans le lait pendant la clarification , après quoi on coule le lait , & on s'en sert. 3°. On se sert de la limaille de fer porphyrisée , tamisée , alkoolisée , comme nous avons dit ci-devant : on s'en sert , dis-je , sous forme solide ; on l'associe aussi à d'autres médicaments astringents à la dose de six grains jusqu'à quinze ou vingt , & on en forme de bols , dans les cas de cachexie , des pâles couleurs après avoir fait précéder les saignées , les purgatifs & les apéritifs simples ; on donne aussi la limaille de fer à la dose de dix ou douze grains dans la premiere cuillerée de soupe dans les mêmes cas. On se sert plus souvent du safran de mars pour former de bols , il entre dans presque toutes les compositions où l'on croit avoir besoin des astringents condensans apéritifs , il pese moins sur l'estomac que la limaille de fer , c'est pourquoi on le préfère : on l'associe aux autres médicaments astringents dans les opiates à la dose pareillement de six jusqu'à quinze ou vingt grains , après avoir fait précéder les remèdes généraux &

Les autres apéritifs plus simples , on le donne à la dose de six grains jusqu'à dix dans la première cuillerée de soupe : on l'enferme aussi dans un nouet à la dose d'une drachme jusqu'à demi-once qu'on suspend dans les bouillons apéritifs lorsqu'on veut leur donner une vertu plus énergique. 5°. La teinture de mars se donne à la dose d'une drachme ou deux dans quelque liqueur , dans un bouillon apéritif ou dans un bouillon ordinaire , elle est moins énergique que le safran de mars , elle se donne dans les mêmes cas. 6°. Le tartre calybé est le plus foible des martiaux , c'est par celui-ci qu'on commence ordinairement à la dose de six grains jusqu'à quinze ou vingt : on s'en sert pour aiguïser les bouillons apéritifs , on le fait dissoudre dans une cuillerée de bouillon qu'on fait prendre au malade , & le reste du bouillon par-dessus. Il y en a qui le dissolvent dans le bouillon même , ce qui donne une couleur noire au bouillon ; c'est pourquoi on appelle ces bouillons , bouillons noirs : on peut épargner ce désagrément au malade , en le dissolvant dans la première cuillerée. 7°. On se sert aussi des fleurs martiales , ou martiales du sel ammoniac , c'est le plus actif de tous les martiaux : on s'en sert principalement dans les hydropisies dépendantes d'un grand relâchement , la dose en est depuis cinq grains jusqu'à quinze , il est rare qu'on les donne seules , on les joint aux bouillons apéritifs préparés au bain-marie avec ~~le vin~~^{le vin} & les plantes apéritives : on hache la viande & les plantes séparément , & on les range par couche dans le pot , mettant une couche de viande & une couche de plantes , on jette les fleurs martiales sur les différentes couches & on laisse le bouillon au feu pendant huit ou douze heures ; ici on craint la vertu extrêmement active de ce remède , d'ailleurs il est très-bon. Nous croyons devoir placer ici quelques réflexions sur l'usage des médicaments martiaux.

Réflexions sur l'usage des Martiaux.

1°. Nous croyons qu'on doit toujours commencer par les martiaux les moins énergiques , parce qu'on a toujours à craindre , soit dans les tempéraments foibles , soit dans les tempéraments sanguins tournant vers le bilieux ou le mélancolique ; dans les tempéraments foibles , il peut se faire que ces médicaments en augmentant l'attribution des vaisseaux , augmentent la résistance aux contractions du cœur , d'où il peut résulter des inflammations. Dans les tempéraments sanguins tournant vers le bilieux ou le mélancolique , parce que si le ressort n'est pas beaucoup affoibli , si les vaisseaux ne sont pas trop relâchés , & que le sang soit trop épais , il peut en résulter pareillement des inflammations , & à plus forte raison lorsqu'on

lorsqu'on donne les martiaux dans les embarras des viscères produits par une matière épaisse par sécheresse, sur-tout lorsqu'il y a âcreté : on doit dans ces circonstances non-seulement commencer par les moins énergiques, mais même il est à propos de les faire précéder par des bouillons apéritifs. M. de la Mure a eu souvent occasion de traiter des personnes attaquées des pâles couleurs, il a observé que quand il faisoit prendre le bouillon avec le tartre calybé, quoique ce soit le plus foible des martiaux, il en résultoit quelquefois de petites inflammations érisipélateuses aux parties inférieures, & qu'en suspendant pour quelque temps l'usage du tartre calybé, & ordonnant simplement les bouillons apéritifs végétaux, ces symptômes dispa-roissoient & ne revenoient plus dans la suite. 2°. Il y a des Médecins qui regardent les martiaux comme spécifiques dans les passions hystériques, & si ces affections se trouvent dans des tempéraments pituiteux, cela est vrai ; mais dans les tempéraments mélancoliques ou bilieux, si les vais-seaux sont obstrués par des matières épaissies par sécheresse, s'ils sont sus-ceptibles d'une grande irritation, on doit être très-circonspect : alors on doit faire précéder un long usage des délayants pour diminuer la tension des solides, donner le petit lait, & associer toujours les martiaux avec les adoucissants, les relâchants, commençant par les moins énergi-ques & même par les plus petites doses, comme par trois ou quatre grains, augmentant ensuite successivement selon le besoin. 3°. Les mar-tiaux conviennent dans les fièvres intermittentes qui sont rebelles invé-térées, entretenues par des obstructions des viscères ; mais dans ce cas ils ne réussissent jamais mieux que lorsqu'on les associe aux autres ~~ap~~^{ap} ~~eritifi~~^{eritifi} ~~catifs~~ ; on les donne sous forme d'opiat, mais à dose moitié moindre, & on incorpore ces opiates avec le sirop ~~de hyacinthe~~^{de Labrynth} ou avec le sirop de chicorée composé avec la rhubarbe. 4°. Dans les obstructions qui sont ou scorbutiques ou vénériennes, on doit se donner de garde des martiaux. 5°. On fait faire de l'exercice aux malades pendant l'usage des martiaux, autrement ils ne produisent pas de si bons effets, mais ils occasionnent des pesanteurs, des lassitudes ; la raison en est que le fer condense les solides, resserre les vaisseaux, & par-là rend la circulation plus difficile ; l'exercice, le mouvement aident la circulation & augmentent aussi le mou-vement du cœur.

Pharmacologie rationnelle.

Le goût des martiaux est stiptique, ils laissent sur la langue une astringtion bien marquée, ils resserrent le tissu des solides, & augmentent par-là

leur élasticité & la circulation , comme on le voit dans la cachexie ; c'est par cette seule propriété qu'ils ont de resserrer qu'on peut expliquer la maniere dont ils agissent dans les différens cas. Nous avons observé que les martiaux rétablissent les excrétiions supprimées , & suspendent quelquefois les excrétiions immodérées étant dans un cas apéritifs dans un autre astringent : ces deux effets ne sont opposés qu'en apparence ; le fer les produit l'un & l'autre en resserrant. Dans les excrétiions supprimées , comme par exemple , dans la suppression des regles , il arrive souvent que le sang est gluant , la lymphe étant trop tenace & comme grumelée , d'où vient que le ressort des fibres des vaisseaux n'est pas capable de les pousser , ce qui donne lieu à des obstructions & à la suppression des regles ; dans ce cas les martiaux resserrent le tissu des solides par leur vertu astringente , les vaisseaux se contractent avec plus de force , broient la lymphe épaisse , ôtent les obstructions & rétablissent les regles par leur astringence ; d'autrefois les martiaux suspendent ou arrêtent les excrétiions immodérées , par exemple , les diarrhées séreuses , les évacuations immodérées des regles encore en resserrant. Les diarrhées séreuses dépendent du relâchement des fibres & de l'abondance de la sérosité qui est ~~abondante~~ ^{excessive} dans les intestins. Les martiaux resserrent les fibres , leur donnent du ton & rétablissent les excrétiions ordinaires & les sécrétions , ainsi la sérosité est distribuée également par tout le corps , ils arrêtent donc les diarrhées en resserrant , il en est de même des hémorragies utérines : on ne les donne dans ce cas-là que lorsqu'on a lieu de soupçonner un embarras dans des viscères produits par un sang épais , visqueux , ce qui donne lieu à l'engorgement & à la rupture des vaisseaux utérins. Que faut-il faire alors pour arrêter l'hémorragie ? il ne s'agit que de débarrasser les viscères & d'augmenter la circulation , c'est ce que le fer produit par sa vertu stip-tique en resserrant les solides ; cependant outre cette vertu astringente , il est à présumer que le fer augmente aussi le ton des vaisseaux & leurs oscillations , & cela en les irritant , en les piquotant , par conséquent il n'agit pas toujours en resserrant simplement.

S E C O N D G E N R E .

Astringents absorbants.

NOUS appellons médicaments astringents absorbants ceux qui augmentent le ressort trop diminué des solides , en absorbant les sérosités dont ils sont imbibés & les acides qui se trouvent , soit sur-tout dans les premie-

res voies , soit même dans les secondes , comme cela arrive quelquefois : on a coutume de ranger sous ce genre toute sorte de terres sans distinction ; nous en bannirons suivant la définition que nous avons donnée , la terre sigillée qui n'absorbe pas les acides , de même que le bôl d'Arménie qui est plutôt astringent resserrant ; nous ne parlerons ici que de la craie des yeux d'écrevisse , du corail & des terres alkalines animales.

La Craie , Creta vulgaris.

C'EST une substance terreuse , dense , maigre , friable ; qui s'attache promptement à la langue , sans y exciter aucun goût d'astringtion & qui tache les mains ; il y a plusieurs especes de craie par rapport à la couleur , la craie blanche ou la vraie craie , la terre de Crete ainsi appelée , parce qu'autrefois on en apportoit de cette îlle qui étoit fort estimée : on en trouve à présent en bien d'autres endroits : il y a aussi la craie rouge , la craie verte , la craie noire ou noirâtre , telle que la craie de Briançon en Dauphiné dont on se sert communément ici , quoiqu'elle n'ait pas la vertu d'absorber les acides.

Cas.

ON l'emploie avec succès dans le cas de coction lésée par le relâchement du tissu de l'estomac dans les tempéraments pituiteux , & lorsque les aliments tournent vers l'aigre : dans les maladies qui suivent ces fortes de coction lésée , comme dans le vomissement des matieres acescentes , dans les diarrhées aussi acescentes qui sont accompagnées de douleurs vives , mais dans lesquelles cependant il n'y a point de chaleur , mais un pouls petit sans fièvre ; dans les dysenteries essentielles qui dépendent essentiellement du vice des premieres voies des matieres acescentes qui y sont contenues ; dans la toux violente & opiniâtre produite par une pituite âcre , dans la maladie commune en Allemagne & connue sous le nom de *foda* qui dépend des matieres âcres qui corrodent l'estomac ; c'est une espece de cardialgie vive accompagnée d'ardeur.

Vertus.

C'EST un médicament propre à absorber les sérosités , les acides , & à guérir les maladies qui dépendent de ces vices : on ne peut l'ordonner dans la toux que lorsque la matiere tourne vers l'aigre.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON l'emploie en substance , en poudre depuis dix grains ou vingt , ordinairement on ne passe pas une drachme ; on peut l'associer avec les yeux d'écrevisse , les coraux , les terres animales alkalines , & l'incorporer avec quelque sirop approprié , tel que le sirop de roses rouges ou le sirop de coing : on l'emploie aussi sous forme liquide , sur-tout en cas de dysenterie ; pour cela on fait bouillir , par exemple , demi-livre de craie dans trois livres d'eau de fontaine jusqu'à diminution d'un tiers , on coule , & on fait prendre la colature au malade pour sa boisson ordinaire : on se sert de cette décoction à la dose de six onces pour base des émulsions qu'on fait avec les semences de pavot & les semences froides dans le cas de dysenterie : on s'en sert sur-tout en substance dans le cours de ventre fereux , & lorsqu'il y a des acides dans les premières voies chez les enfants ; dans les fièvres lentes avec un caractère d'acrimonie ; dans les phthysies pulmonaires on est obligé de donner le petit lait un mois ou deux de suite. Dans ce cas on ordonne la craie pour empêcher que le lait ne tende vers l'acide , & afin que les acides déjà formés soient détruits.

Les Yeux d'Ecrevisse , Oculi vel Lapides Cancrorum.

CE sont des concrétions pierreuses de la grosseur d'un pois , ordinairement convexes d'un côté , concaves de l'autre , blanches , sans goût & sans odeur , on les trouve dans le ventricule des écrevisses au nombre de deux , une de chaque côté dans les temps que ces animaux muent ou changent d'écailles. Ces yeux ou concrétions pierreuses doivent même servir à former la même écaille , selon les observations de MM. *Vanhelmont* & *Réaumur* , on les prépare de cette manière : on les pulvérise , on les porphyrise , ensuite on les humecte avec l'eau de roses ou de plantain & on leur donne une consistance un peu mollassé , après quoi ou en forme de petits pains ou de petites boules ; on s'en sert dans tous les cas où la craie convient , on les emploie même plus ordinairement que la craie. De plus on les regarde comme propres à arrêter les hémorragies utérines , le flux hémorroïdal ; mais lorsque ces hémorragies dépendent d'un sang dissout par aquosité avec relâchement des vaisseaux , on les regarde aussi comme diurétiques chauds & lithontriptiques , mais cette dernière propriété est fort douteuse : on s'en sert aussi lorsque les fonctions de l'esto-

mac sont dérangées , dans les coctions lésées par le relâchement des fibres , dans les coliques des enfants dépendantes des matieres acefcentes , c'est un bon anti-acide.

Doses.

ON les ordonne ordinairement sous forme de bols depuis dix grains jusqu'à vingt , on les joint aux coraux & à la craie de Briançon , ils sont très-propres à détruire l'acide du lait , des émulsions : sous ce point de vue , on les préfère aux coraux & à la craie.

Le Corail , Corallia rubra præparata.

LE corail se prépare de la même maniere que les yeux d'écrevisse , c'est une substance dure qui vient du fond de la mer , sous forme d'arbrisseau de la hauteur d'un pied environ : il y en a de blancs , de rouges , on ne fait pas à quel regne on doit les rapporter. Quelques-uns les rangent parmi les minéraux , d'autres parmi les végétaux , d'autres enfin parmi les animaux : quoiqu'il en soit , on se sert beaucoup en médecine du corail rouge préparé dans les cas suivants.

Cas.

ILS sont absolument les mêmes que ceux où les médicaments précédents conviennent ; on l'associe aux yeux d'écrevisse , sur-tout dans les hémorragies utérines ; le corail a été aussi regardé comme antiseptique , antispasmodique , sans doute à cause des bons effets qu'il produit dans l'épilepsie puérile , qui est symptome de crudité des premieres voies , ou qui dépend des matieres acefcentes vermineuses qui y sont contenues : on s'en sert aussi avec succès dans toutes les maladies des enfants qui dépendent de ces sortes de matieres acefcentes : on l'ordonne de la même façon & à la même dose que les deux précédents en forme de bol en l'associant avec les autres absorbants , & en l'incorporant avec le sirop de roses rouges , de *symphitum* ou de coing.

Terres alkalines animales.

CE sont les cendres des parties les plus dures des animaux préparés par la calcination & ensuite porphyrisés comme les yeux d'écrevisse , par exemple , les cendres des os des animaux , de corne de cerf , des écailles d'huit-

tré , de coquille d'œuf , ont pourroit y rapporter aussi les yeux d'écrevisse : on ordonne ces terres dans les mêmes cas , de la même façon , à la même dose que les médicaments précédents , rarement on pousse la dose de demi-scrupule à demi drachme. M. de la Mure a employé avec succès la poudre de coquille d'œuf dans les cas d'acidité , de leucophlegmatie chez les enfants ; quand on craint d'échauffer , il faut préférer la craie aux terres alcalines.

T R O I S I E M E G E N R E .

Astringents stegnotiques , ou Reserrants proprement dits.

LES astringents stegnotiques sont ceux qu'on ordonne par préférence pour arrêter quelque écoulement qui se fait contre nature & qui produisent cet effet en reserrant les vaisseaux , ils sont tirés du regne minéral & du regne végétal , nous commencerons par les minéraux.

Astringents stegnotiques , tirés du regne minéral.

Alun , Alumen.

IL y a deux especes d'alun , le naturel est connu des anciens & qui est à présent très-rare , l'autre est factice , on l'appelle *alumen rupeum* , à cause de la matiere dont on le tire , on en fait en différents endroits ; celui qui se fait auprès de Rome , *alumen romanum* , est le plus estimé ; les anciens se servoient de l'alun naturel , on n'emploie gueres à présent que l'alun factice : l'alun est une substance saline , blanche , minérale , transparente , compacte , pesante , qui imprime sur la langue une saveur qu'il est difficile de définir , mais qui est aisée à reconnoître quand on en a goûté une fois , il y produit cependant une espece d'astringtion , il se fond dans l'eau , & se boursoufle sur le feu , l'usage de l'alun est très-ancien dans la Médecine , Hippocrate s'en servoit.

Cas.

ON l'emploie avec succès dans les vomissements considérables qui dépendent du relâchement , de la foiblesse de l'estomac & des matieres muqueuses , acides , des crudités , dans les cours de ventre sereux lorsqu'ils n'ont pas cédé aux autres remedes , & qu'ils affoiblissent trop les malades , dans les maladies évacuatoires sanguines des premieres voies dont les sui-

tes sont très-dangereuses , & dans lesquelles il faut des remèdes qui agissent principalement & efficacement , comme dans le vomissement de sang , dans l'hémorragie intestinale , dans la dysenterie même , dans les évacuations des mois immodérées. Quelques Médecins s'en servent même dans l'hémophthie : on n'a pas borné son usage aux maladies évacuatoires , on le recommande encore dans les fièvres intermittentes.

Vertus.

DE ce détail il résulte que l'alun est un médicament astringent stiptique très-puissant.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON le donne en substance principalement , on peut le donner aussi sous forme liquide , en substance depuis dix grains jusqu'à vingt tout au plus : on peut l'associer au bol d'Arménie ou au sang de dragon & on le fait ordinairement , on incorpore ces poudres avec le sirop de roses rouges ou celui de coing.

Pillules astringentes d'Helvétius le pere.

M. Helvétius composoit ses pillules astringentes si célèbres de la manière suivante : prenez alun de roche bien pulvérisé deux onces , faites-le fondre au feu , ensuite ajoutez-y du sang de dragon bien pulvérisé demi-once , on fait des pillules de la grosseur d'un pois avec ce mélange avant qu'il soit durci , la dose est depuis un scrupule ou demi-drachme ou une drachme qu'on réitere de quatre en quatre heures jusqu'à ce que l'hémorragie soit arrêtée , ensuite on en donne une ou deux doses tous les jours pendant quelque temps : on fait boire au malade une ou deux verrées d'une liqueur convenable après avoir pris ces pillules , par exemple , un verre de décoction de bistorte , de tormentille , de symphitum ou de quelqu'autre décoction astringente. Ces pillules conviennent dans les hémorragies utérines , dans le pissement de sang. Les Auteurs qui prétendent qu'on doit donner l'alun dans les fièvres intermittentes , forment pour cela la poudre suivante : prenez alun , nitre , noix muscade un scrupule , mêlez & faites une poudre que le malade prendra avant l'accès. Si remède n'a pas son effet , ils veulent qu'on y ajoute un grain d'*opium* & un scrupule de sel de saturne , ce remède est très-recommandé par M. Sydenham : on pourroit l'employer dans les fie-

vres invétérées & rebelles lorsque les solides sont extrêmement relâchés ; il faut l'essayer avec beaucoup de circonspection ; sous forme liquide , on le donne à la dose de demi-once ou d'une once dissout dans six ou huit onces d'eau , on peut y joindre le sirop de coing ou celui de roses rouges : il est plus ordinaire de se servir des pillules astringentes de M. *Helvétius*.

Précautions.

1°. L'ALUN resserre extrêmement le tissu des solides & coagule très-formement ; le sang qu'on tiroit au malade , après l'usage de l'alun , étoit très-dense & reprenoit sa fluidité lorsqu'on suspendoit son usage ; il doit donc être suspect lorsqu'il y a des obstructions dans les viscères du bas-ventre produites par des matieres seches , puisqu'il épaisit les humeurs. 2°. Il est très-important souvent de ne pas arrêter trop brusquement les évacuations du sang , de peur d'occasionner quelque inflammation : il faut examiner avant si elles sont trop fortes , si elles affoiblissent trop le malade ; c'est dans ce cas seulement qu'on doit s'en servir en commençant par de petites doses , par exemple , par cinq ou sept grains , il faut même faire précéder des astringents moins actifs. 3°. Il faut remarquer que l'alun produit très-souvent des envies de vomir , des cardialgies ; ainsi dans le cas où il est indiqué , & où on veut prévenir ces inconvénients , on ajoute l'*opium* ou les gouttes anodines ; par exemple , on fait prendre au malade cinq ou six grains d'alun associé avec six gouttes anodines , par-là on remédie assez bien à ces inconvénients. 4°. L'alun , comme tous les autres stiptiques astringents , resserre extrêmement les vaisseaux des premieres voies , & cause souvent des constipations ; dans ce cas-là il faut donner des lavements avec des plantes émollientes.

Pharmacologie Rationnelle.

L'ALUN est composé de l'acide vitriolique avec une terre cretassée ou bolaire ; on ne fait pas précisément par laquelle de ces deux parties il est stiptique , mais c'est un astringent des plus forts ; il resserre extrêmement les solides , tant intérieurement qu'extérieurement , & coagule les fluides : il faut appliquer à l'alun en particulier ce que nous avons dit ci-devant des astringents stegnotiques en général , qu'on ne doit l'employer dans le cas d'hémopthisie que lorsqu'elle est considérable , que le malade risque de périr tout d'un coup ; car autrement par les stiptiques &

par

par l'alun sur-tout , l'hémorragie s'arrête à la vérité , mais il en peut résulter l'inflammation du poulmon.

Le Bol d'Arménie , Bolus Armenia vera.

C'EST une substance terrestre , pesante , grasse , friable , qui laisse sur la langue une adhésion bien marquée , il est de couleur de safran ou d'un jaune rouge , c'est un médicament stiptique , moins énergique que l'alun , on l'associe aux absorbants : on peut cependant l'associer à l'alun en tant que stiptique , il convient dans les mêmes cas que l'alun , on pourroit même le préférer à l'alun & au sang de dragon dans les cas où les stiptiques forts sont à craindre , comme dans l'hémoptisie : on l'ordonne en substance depuis dix grains jusqu'à vingt , & on en forme différents opiatés en l'associant à d'autres stiptiques , il cause des constipations comme l'alun ; toutes les réflexions que nous avons faites sur ce dernier médicament conviennent ici.

Astringents Stegnotiques végétaux.

Le Sang de Dragon , Sanguis Draconis.

C'EST un astringent stegnotique dont la vertu paroît évidemment par les effets qu'il produit lorsqu'on s'en sert intérieurement ; c'est un remède dont les Dentistes se servent fréquemment pour affermir les dents ébranlées , ce qu'il n'opère qu'en resserrant les gencives : d'ailleurs il resserre pareillement les bords des plaies & les rapproche les unes des autres. Le sang de dragon est une substance sèche , résineuse , friable , qui se fond aisément au feu , inflammable , d'un rouge foncé extérieurement , d'un rouge assez vif lorsqu'il est pulvérisé ; porté dans la bouche , il n'y imprime aucun goût déterminé , il est aussi sans odeur : il a été appelé sang de dragon , *sanguis draconis* , parce que les premiers qui s'en sont servis s'étoient faussement imaginés qu'à cause de la couleur , c'étoit le sang de quelque dragon desséché : on est aujourd'hui assuré que c'est le suc qui découle du tronc ou qu'on retire du fruit d'un arbre qu'on appelle *Draco arbor* , qui croît dans les isles Canaries ; dans les boutiques on le trouve de deux façons , en larmes ou en gouttes , c'est de celui-ci dont on se sert pour l'usage de la médecine & en masse : celui-ci est moins pur & mêlé d'écorce , de terre ou d'autres corps hétérogènes ; les maréchaux s'en servent pour les chevaux.

On trouve encore différentes especes de sang de dragon falsifié , une troisième entr'autres falsifiée , composée de différentes especes de gommes auxquelles on donne la couleur avec du vrai sang de dragon ou avec du bois de Brésil , mais il est aisé de le distinguer du vrai sang de dragon qui est inflammable , & qui ne se dissout pas dans l'eau , au lieu que celui-ci n'est pas inflammable & se dissout dans l'eau.

Cas.

Le sang de dragon convient dans tous les cas où l'alun & le bol d'Arménie conviennent : on le joint le plus souvent à l'alun , comme dans les pillules d'*Helvétius* , on le joint aussi à l'*acacia* , aux cachoux & aux autres astringents , il est rare qu'on le donne seul. Il faut rapporter au sang de dragon les réflexions que nous avons faites au sujet de l'alun : on l'ordonne en substance seul depuis dix grains jusqu'à vingt ou trente ; si on l'associe avec d'autres astringents , il faut diminuer la dose & ne l'ordonner , par exemple , que jusqu'à dix ou quinze grains tout au plus ; on l'incorpore avec quelque sirop approprié , par exemple , avec le sirop de roses rouges ou avec celui de coing , ou bien avec les conserves de Kinaroden ou de roses rouges. On joint aussi aux potions astringentes dont la base est l'eau de plantin ou l'eau de renouée , dans laquelle on fait dissoudre l'alun , le sang de dragon , on l'associe presque toujours avec l'alun : il faut remarquer que quoiqu'il resserre , il ne le fait pas cependant avec autant d'énergie que l'alun.

L'Acacia.

On s'en sert rarement ici , on en trouve deux especes dans les boutiques , savoir , celui d'Egypte qu'on appelle *Acacia vera* , *succus Acaciæ* : on le tire du même arbre que la gomme d'Arabie , c'est-à-dire , de l'*Acacia folio scorpioides leguminosæ*. C'est un suc concret , gommeux , noirâtre en dehors , jaunâtre ou roussâtre en dedans , d'une consistance ferme , dure , s'amollissant dans la bouche , d'un goût astringent & austere , à peu-près semblable à celui des fruits qui ne sont pas mûrs : il se dissout bien dans l'eau , on exprime le suc des gousses de cet arbre avant la maturité ; l'autre *Acacia* est celui de notre pays , *Acacia nostras* , *Acacia germanica* : c'est un suc concret , sec , dur , noir , brillant en dedans , d'un goût acide , austere ; on exprime ce suc des fruits non mûrs du prunelier , *prunus sylvestris* , il a à peu-près les mêmes vertus que l'*acacia* véritable.

Cas.

ON l'emploie dans les mêmes cas où l'on se sert de l'alun & du sang de dragon. *Prosper Alpin* rapporte que les Egyptiens font prendre tous les matins une drachme de suc d'Acacia dissout dans quelque liqueur à ceux qui crachent le sang : il est plus prudent alors de s'abstenir des stiptiques, excepté dans des cas extrêmement urgents : on ordonne ce suc intérieurement depuis demi-drachme jusqu'à une sous forme de bol ou dans quelque liqueur convenable.

L'Hypociste , Hypocistis.

C'EST un suc desséché , noir , brillant , austère , la plante dont on le retire s'appelle *hypocistis* : elle naît sur les racines de différentes espèces de ciste ; pour faire ce suc , on pile les fruits récents & on exprime le suc que l'on fait ensuite sécher au soleil , & que l'on épaisit jusqu'à la consistance d'extract solide : c'est un suc gommeux qui se dissout dans l'eau. *Farnel* remarque qu'il a la vertu stiptique plus marquée que l'Acacia , on l'ordonne depuis quinze grains jusqu'à vingt dans l'eau de plantin , on l'ajoute aux autres astringents pour en former des opiats , des bols.

Le Cachou , Catechu , & improprement Terra Japonica.

IL est très-usité dans ce pays-ci ; c'est une substance résino-gommeuse , qui se dissout dans l'eau & dans l'esprit de vin , friable , sèche , brunâtre en dehors & en dedans , qui se fond dans la bouche & y laisse un goût astringent , un peu amer d'abord , ensuite plus doux & plus agréable , sans odeur : on l'appelle improprement terre du Japon , puisqu'on ne trouve dans ce pays-là que le cachou qui en est apporté : d'ailleurs on a cru pendant long-temps que c'étoit une terre , aujourd'hui tout le monde convient que c'est un suc , il se dissout aisément dans l'eau , sans laisser aucun vertige terreux , s'il est pur ; de plus il s'enflamme , brûle dans le feu , ne laissant que peu de cendres , ce qui ne convient pas à la terre ; mais on ne convient pas de son origine , ni de la plante dont on le tire , ou plutôt c'est un suc que l'on tire par la décoction de plusieurs plantes.

Cas.

ON s'en sert dans tous les cas où les astringents stegnotiques conviennent , mais sa vertu astringente est beaucoup plus modérée que celle des

autres astringents stegnotiques ; ainsi on peut l'employer plus sûrement dans les crachements de sang , dans les cas de coctions lésées dépendantes du relâchement des fibres de l'estomac & des matieres glaireuses avec une tournure vers l'acide ; dans les vomissements & les diarrhées dépendantes des mêmes causes ; dans les dysenteries essentielles qui dépendent des matieres acides , acrimonieuses contenues dans les premieres voies : on le regarde aussi comme propre à rétablir les fonctions de l'estomac , on le donne pendant l'usage du lait pour donner du ton à l'estomac , & pour empêcher que le lait ne s'aigrisse , on s'en sert aussi avec les yeux d'écrevisse.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON donne le Cachou seul ou associé avec d'autres astringents ; on l'ordonne depuis dix grains jusqu'à vingt ou vingt-cinq , associé depuis dix grains jusqu'à douze. On en forme des bols qu'on fait prendre au malade tous les jours ou de deux en deux jours ou de trois en trois jours suivant les indications : il est moins astringent que les autres médicaments , c'est pourquoi il paroît qu'on doit commencer par lui. *Vedetius* rapporte qu'un jeune homme guérit par l'usage du Cachou d'une hernie variqueuse. On peut aussi dissoudre le Cachou dans l'eau avec du sucre , & y ajouter de l'ambre , de la rhubarbe , de la cannelle , & en former des pastilles de la grosseur d'un pois que l'on tient dans la bouche ; dans les catarrhes c'est aussi un bon stomachique dans les cas où les déjections se font lentement.

Racines astringentes stegnotiques.

La Bistorte , Bistorta.

ON trouve dans les boutiques deux sortes de Bistorte qu'on vend pêle-mêle , & qui ont à-peu-près les mêmes vertus , l'une dont la racine est moins tortue , *Bistorta vulgaris radice minus intortâ* , ou *Bistorta major radice minus intortâ* , & l'autre dont la racine est plus tortue , *Bistortâ radice magis intortâ*. On se sert des racines de cette plante qui sont épaisses , oblongues , noueuses , plus ou moins repliées , garnies de plusieurs filets capillaires , noirâtres en dehors , rougeâtres en dedans , d'un goût un peu austere & astringent.

Cas.

ON s'en sert dans tous les cas où les astringents stegnotiques conviennent , dans les maladies évacuatoires ; soit blanches , soit rouges , dans

le vomissement fereux , dans le vomissement de sang , dans les diarrhées fereuses , dans la dysenterie , dans le pissement de sang , dans l'hémoptisie , dans les mois immodérés. Outre cela on s'en sert dans les maladies aiguës , dans les fievres exanthématiques , comme dans la rougeole , la petite vérole , accompagnées de flux de ventre colliquatifs , dans les fievres malignes à *dissolutione putridâ* sur-tout lorsqu'il survient des flux de ventre ou des hémorragies , soit hémorragies par le nez , soit hémoptisie , soit vomissement de sang. *Etmuller* dit s'être servi de cette racine avec succès dans une hémorragie qui venoit de fievre maligne , c'est pourquoi on la regarde comme alexipharmaque. On la regarde aussi comme sudorifique , mais elle lui est disputée par plusieurs Auteurs ; il ne paroît pas même qu'elle ait cette vertu par elle-même , par exemple , dans les fievres exanthématiques qui portent vers la peau , il survient des diarrhées , elles suspendent le cours des humeurs vers la peau qui se porte alors vers le canal intestinal ; un médicament qui arrête les diarrhées , peut très-bien en empêchant le cours des humeurs vers les intestins , occasionner des moiteurs , & c'est aussi ce qu'on observe presque toujours quand on donne les astringents dans le cas de flux de ventre , mais dans ce cas-là la moiteur n'est pas l'effet immédiat des médicaments astringents , mais seulement une suite du resserrement qu'ils produisent & qui empêche le cours des humeurs vers les intestins : il est vraisemblable que la bistorte n'est pas sudorifique par elle-même ; selon *Jean Ray* , demi-drachme de bistorte en poudre mêlée avec autant de succin dans un œuf à la coque pris tous les jours pendant quelque temps , empêche l'avortement. *Sylvius* réunit cette racine à quelque emmenagogue , pour chasser quelques particules de l'arriere-faix retenues dans la matrice , & pour arrêter les hémorragies qui en dépendent.

Vertus.

C'EST un astringent stegnotique qui resserre les fibres & coagule le sang , comme il paroît dans les fievres malignes où le sang est dissout & âcre ; dans ce cas les autres astringents , comme l'alun , l'acacia , seroient trop forts.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON donne cette racine principalement en décoction , on peut aussi la donner en infusion & en substance. En substance réduite en poudre depuis dix grains jusqu'à demi-drachme , on l'associe avec la tormentille pour faire des bols , & on incorpore le tout avec quelque sirop , comme de

roses sechées , ou avec la conserve des mêmes roses , ou avec celle de kinarodon , en décoction depuis trois onces jusqu'à trois & demies pour trois ou quatre livres d'eau : on ratisse la racine , & on la coupe menue , on fait bouillir jusqu'à diminution d'un tiers ou de la moitié , suivant les indications , on coule , & on fait prendre au malade cette décoction par verrées ; en cas d'hémorragie intestinale , de diarrhée , on donne des lavements avec la décoction de bistorte , de tormentille , d'écorce de grenade , la bistorte agit principalement par un sel assez semblable à celui de l'alun , par l'analyse chymique on en retire un sel acide , un peu de terre & beaucoup d'huile qui tempere les vertus de cette racine.

La Tormentille , Tormentilla.

SA racine qui est principalement d'usage en Médecine , est tubéreuse , assez épaisse , raboteuse , garnie de quelques fibres capillaires , noirâtre extérieurement , intérieurement un peu rougeâtre , mais moins que la bistorte , d'un goût un peu astringent , elle resserre moins que la bistorte , aussi on la préfère à cette dernière lorsqu'on craint de trop resserer les solides , ou de trop épaisir le sang. On a nommé cette plante tormentille , parce qu'on a prétendu que la racine pulvérisée , puis mêlée avec un peu de pyrethre & d'alun & mise dans la bouche , soulageoit le tourment ou la rage que cause la douleur des dents. D'ailleurs on l'emploie dans les mêmes cas , de la même façon & à la même dose que la bistorte , & souvent on les associe ensemble. On se sert aussi de cette racine en infusion , en guise de ptisane , la décoction vaut mieux , parce qu'il faut plus de temps pour développer ses principes lorsqu'on la fait infuser seulement.

Ecorce de Grenade , Malicorium.

ELLE est médiocrement épaisse & comme de cuir , un peu dure cependant & cassante , extérieurement rougeâtre , intérieurement jaunâtre , d'un goût amer & austere , astringente : on se sert de l'écorce de grenade de jardin ; quelques Médecins ont fait un secret de la poudre de cette écorce qu'ils associoient aux autres remèdes dont nous avons parlé ci-devant , dans les diarrhées colliquatives qui réduisoient les malades à l'extrémité.

Cas.

ON s'en sert dans le vomissement dépendant du relâchement des fibres de l'estomac , dans les hémorragies , soit des premières , soit des secondes

voies. Son action est plus prompte que celle de la bistorte ; mais après avoir employé celle-ci , avant de passer à l'alun , au sang de dragon , il est bon de se servir de cette écorce , on peut l'employer sur-tout dans le flux de ventre sereux.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON l'emploie en substance & en décoction ; en substance réduite en poudre depuis dix grains jusqu'à vingt seule , ou ce qui est le plus ordinaire associée à l'alun , au sang de dragon ; en décoction depuis demi-drachme jusqu'à une & demie pour trois ou quatre livres d'eau , on fait bouillir jusqu'à diminution d'un tiers ou de la moitié suivant le besoin : on s'en sert aussi dans les lavements astringents ; sa vertu astringente dépend d'un acide uni à une matière terreuse astringente semblable à celui de l'alun quoique moins actif.

Les Balaustes ou fleurs de Grenadier sauvage , Balaustica.

ON appelle Balaustes les fleurs de grenadier sauvage , on se sert principalement de celles-ci en Médecine , quoiqu'on puisse se servir de celles des grenadiers de jardin ; elles ont un goût acerbe très-marqué , leur vertu astringente ne le cede point à celles de grenade.

Cas , Doses.

ON les emploie dans les mêmes cas , de la même manière & à la même dose que les médicaments précédents : on joint ordinairement la poudre de *Malicorium* à ces fleurs , sur-tout dans les cours de ventre colliquatifs , dans les hémorragies intestinales internes lorsqu'il faut les arrêter promptement.

Roses rouges ou de Provins , Rosæ rubræ seu Provinciales.

LES roses rouges qu'on appelle aussi roses seches , sont d'une belle couleur rouge foncée & veloutée , d'une odeur fort douce & agréable mais foible ; elles ont tiré leur nom de Provins , ville de France , où elles viennent en grande abondance , ce sont même les plus belles & les plus estimées , on les cultive aussi dans les jardins , dans les autres endroits.

Cas.

LES roses rouges conviennent dans tous les cas où nous avons dit que convenoient les racines astringentes dont nous avons parlé ; elles ont aussi une vertu astringente stégnotique , mais beaucoup moins énergique que des médicaments que nous venons d'indiquer.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON s'en sert intérieurement sous forme de ptisane qu'on appelle teinture de ~~roses~~ roses ou de roses seches.

Teinture de Roses rouges ou de Roses seches.

ON la prépare ainsi : on fait infuser une demi-poignée ou une poignée dans trois ou quatre livres d'eau bouillante , & on y ajoute quelques gouttes d'esprit de vitriol ou de soufre jusqu'à une agréable acidité avec un peu de sucre : on donne cette ptisane ou teinture à grands verres tiède dans toutes les hémorragies violentes , & elle réussit souvent dans des cas désespérés , & lorsque tous les autres astringents ont été employés inutilement , l'acide qu'on y ajoute la rend plus active ; mais si on vouloit employer cette teinture dans l'hémoptisie , il faudroit retrancher les acides , parce que nous l'avons souvent remarqué , les acides sur-tout tirés du regne minéral sont contraires aux affections de la poitrine ; mais on les y laisse dans les autres cas où on veut resserrer puissamment les solides & coaguler le sang trop dissout , comme dans les fièvres malignes à dissolutione putrida , dans les fièvres pestilentielles , dans les fièvres exanthématiques : on se sert aussi du sirop de roses seches qu'on prépare ainsi.

Sirop de Roses seches.

ON met dans un pot de terre vernissé une livre de roses seches , dont on separe la partie blanche qu'on appelle onglets , on verse par-dessus trois livres d'eau bouillante , & on laisse infuser pendant huit ou neuf heures , après quoi on fait bouillir jusqu'à diminution d'un quart ; on coule avec expression & dans la colature on jette deux livres de sucre , on clarifie le coulage & on fait cuire jusqu'à consistance de sirop , c'est le sirop de roses seches. On s'en sert pour incorporer les bols , les opiats astringents , on l'ajoute aux potions , aux juleps astringents où l'on fait entrer les médicaments

dicaments ci-dessus , on peut aussi le donner seul à la dose de demi-drachme ou une & demie dans l'eau de roses. On se sert aussi de la conserve de roses rouges qui a les mêmes vertus que la teinture & le sirop de roses rouges dont nous venons de parler , on s'en sert pareillement pour incorporer les médicaments astringents , on peut aussi la donner seule depuis deux drachmes jusqu'à demi-once. On l'emploie avec succès non-seulement dans les cas indiqués ci-devant , mais encore dans la toux , dans le rhume , on la regardée comme appropriée dans le cas de phthisie , d'asthme tuberculeux produit par des matieres épaisses , visqueuses , d'ulceres internes , de fièvre lente , en faisant en même temps usage du lait de vache : il y a des observations par lesquelles il conste que des phthisiques ont été guéris par l'usage du lait de vache & de la conserve de roses , continuée long-temps ; en sorte qu'un de ces malades employa en deux mois plus de trente livres de cette conserve & un autre plus de vingt , elle peut être regardée dans ce cas-là comme stomachique ; elle peut resserrer les solides , empêcher les sueurs , resserrer les bords des vaisseaux du poulmon , les déterger pour ainsi dire ; ainsi de toutes les conserves dont on se sert pour faire passer le lait dans ces circonstances , on peut donner la préférence à celle-ci. La conserve de kinarodon est-aussi très-vantée dans le même cas , & suivant même plusieurs Auteurs , elle doit avoir la préférence sur toutes les autres , on s'en sert de la même façon , à la même dose. M. Sydenham incorporoit le kina avec le sirop ou la conserve de roses rouges dans le cas de fièvre quarte , lorsqu'il employoit le kina non pas tant pour guérir la fièvre que pour en suspendre pour ainsi dire l'action : on se sert aussi des roses rouges extérieurement. Nous en parlerons dans la *Matiere Médicale externe*. Pour achever ce que nous avons encore à dire des astringents stegnotiques , il nous reste à parler de trois médicaments que tous les Médecins regardent à la vérité comme astringents , mais dont la façon d'agir paroît différente à différents Auteurs ; en sorte que les uns les rapportent aux astringents stegnotiques , & les autres aux astringents incrassants ; c'est du plantin , du fymarouba & de l'ortie dont nous voulons parler.

Le Plantin , Plantago.

IL y a plusieurs especes de plantin ; les plus communes en médecine sont le grand plantin ou le plantin à feuilles larges , & le plantin étroit ou le petit plantin , plantin à feuilles étroites.

Le Plantin large.

IL a les feuilles larges, luisantes, couchées par terre, marquées de nervures très-apparentes sur-tout au revers qui les parcourent dans toute leur longueur dont le goût a paru amer à quelques-uns, insipide aux autres : on se sert communément de cette espece de plantin, parce qu'elle est la plus commune, à son défaut on emploie la suivante.

Le Plantin étroit.

LE plantin étroit ou le plantin long, *plantago minor*, *plantago angustifolia*, a des feuilles longues, étroites, pointues, légèrement dentelées, velues, marquées de sept nervures dont trois sont plus apparentes que les autres au revers de chaque feuille, on peut se servir indifféremment de toutes ces especes de plantin.

Cas.

ON s'en fert avec succès dans tous les cas où les astringents stegnotiques conviennent, dans les diarrhées sereuses, tormineuses, dans la dyssenterie, dans l'incontinence d'urine, dans le pissement de sang, dans les regles immodérées, dans les fleurs blanches, en un mot dans toutes les hémorragies. De tous ces cas il paroît qu'on peut conclure que le plantin est un médicament stegnotique, cela paroît encore par son goût d'astringence ; outre cela il est recommandé par plusieurs Auteurs comme fébrifuge, & alors on prend sept ou huit racines avec une poignée des feuilles qu'on fait infuser pendant la nuit dans six onces d'eau bouillante, on passe le tout le lendemain avec expression, & on fait prendre la colature au malade une heure avant le frisson. Les Auteurs qui parlent de ce remede ne font pas mention de l'espece de fièvre où il convient ; il est vraisemblable que c'est dans celles qui se trouvent avec un relâchement des fibres de l'estomac, ou des premières voies, ou même un relâchement universel, par exemple, dans les fièvres quotidiennes légitimes, dans les tempéraments pituiteux.

Maniere de s'en servir, Doses.

ON ordonne les feuilles de plantin depuis une demi-poignée à une poignée dans les bouillons qu'on fait prendre dans les cas de diarrhée, soit blanche, soit sanguine ; on se sert plus communément du suc exprimé

des feuilles & dépuré par résidence dans tous les cas ci-devant , comme dans l'hémophtisie , & on le donne de quatre en quatre heures entre les bouillons à la dose de deux onces ou deux & demies , on fait dépurer ce suc ou simplement par résidence & sans ébullition ; ou bien si l'estomac est foible , comme il arrive assez souvent , on le fait bouillir légèrement , & ensuite on le laisse dépurer par résidence , il est vrai qu'alors il n'est pas si énergique.

Symarouba.

LE Symarouba est un médicament qui n'est connu en France que depuis 1713 , c'est l'écorce d'un arbre inconnu jusqu'à présent qui croît dans la Guienne & que les habitans ont appelé symarouba ; elle est plus ou moins épaisse , d'un gris jaunâtre , sans odeur , attachée au bois duquel on le sépare aisément. L'an 1718 , M. *Jussieux* s'en servit heureusement ; il y avoit eu de grandes chaleurs en été , elles furent suivies de plusieurs flux dyssentériques qui non - seulement résistoient à l'ipécacuanha & aux autres médicaments ordinaires , mais qui devenoient encore plus considérables par l'application de ces remedes. M. *Jussieux* réussit parfaitement & guérit ces dysenteries par l'usage du symarouba ; voici ce qu'il observoit après l'exhibition de ce remede : les douleurs étoient apaisées dans l'espace d'un jour , le sommeil revenoit aussi-tôt , les urines devenoient plus copieuses & plus lymphides , les évacuations étoient plus rares , l'odeur fétide des excréments cessoit , leur couleur changeoit , de liquides ils devenoient épais , les malades recouvroient l'appétit & les forces , & étoient bientôt rétablis. Ce remede convenoit principalement dans les dysenteries essentielles qui dépendoient des matieres acrimonieuses contenues dans les premières voies , lorsqu'il n'y avoit pas de fièvre. M. *Jussieux* donnoit le symarouba en décoction depuis une drachme jusqu'à deux sur deux livres d'eau qu'il faisoit bouillir jusqu'à diminution d'un tiers , & qu'il faisoit prendre au malade de trois en trois heures par verrées ; il l'ordonnoit aussi en substance ; il faisoit raper cette écorce & la donnoit depuis dix grains jusqu'à trente délayée dans deux onces de quelque eau appropriée , comme l'eau de plantin , ou bien il l'incorporoit avec le sirop de capillaire ou de roses rouges pour en former un bol ; on peut regarder le symarouba comme un astringent puisqu'il est utile dans la dysenterie , mais il n'est pas aisé de décider alors s'il agit par une vertu spécifique ou par sa saveur amere qui peut resserrer , & par son principe onctueux qui peut envelopper les matieres âcres : on doit faire attention aux conditions des dysente-

ries dans lesquelles M. Jussieu l'a employé avec succès, c'est-à-dire, dans les dyssenteries essentielles, c'est alors seulement qu'on peut l'employer utilement.

L'Ortie, Urtica.

IL y a plusieurs especes d'ortie; la grande ortie piquante, *urtica major*, *urtica ureus maxima*, la petite ortie ou l'ortie grecque, *urtica minor*, *urtica ureus minor*; l'ortie romaine, *urtica romana*, les deux premieres sont les plus communes & les plus usitées.

Cas.

ON s'en sert dans les mêmes cas que ceux où le suc de plantin convient: on n'observe pas que l'ortie ait les inconvénients des autres astringents stegnotiques, qu'on ne peut donner dans l'émopthisie que lorsque le malade est dans un danger évident de périr, c'est pourquoi on s'en sert dans toutes les maladies évacuatoires, soit blanches, soit sanguines; dans les diarrhées sereuses même accompagnées de quelques douleurs légères, dans les dyssenteries, dans l'émopthisie, dans le pissement de sang, dans les mois immodérés, dans les fleurs blanches, dans l'incontinence d'urine ou le diabete. On se sert du suc exprimé de cette plante & dépuré simplement par résidence, ou après une légère ébullition, on le donne de quatre en quatre heures dans l'intervalle des bouillons depuis deux onces jusqu'à trois. Tout le monde convient que l'ortie est astringente, mais les uns croient qu'il faut la rapporter au genre des stegnotiques, & qu'elle agit en irritant, en piquotant, en resserrant les vaisseaux: les autres au contraire croient qu'il faut la ranger parmi les astringents inviscquants, à cause du goût fade & gluant qu'on trouve dans ses feuilles quand on les mâche. Nous sommes plus portés pour ce dernier sentiment à l'égard du plantin, il nous paroît plutôt appartenir au genre des stegnotiques.

Q U A T R I E M E G E N R E.

Astringents emphractiques ou inviscquants.

LES astringents emphractiques ou inviscquants sont des médicaments qui arrêtent les écoulements contre nature en bouchant pour ainsi dire les vaisseaux par lesquels se font ces écoulements, en induisant leurs parois d'une matiere macilagineuse, & en enveloppant les parties trop âcres des fluides.

des qui y font contenus ; par conséquent on peut rapporter à ce genre d'astringents tous les diurétiques froids , excepté cependant les acides minéraux : on doit aussi y rapporter les béchiques incrassants , ces deux sortes de médicaments produisent les effets que nous venons d'indiquer ; nous nous contenterons de parler ici de la terre sigillée & de la grande confoude qui n'ont pas trouvé leur place parmi les deux classes que nous avons citées.

La Terre sigillée ou Terre de Lemnos , Terra Lemnia , Terra sigillata ou Sigillum capræ.

ON nous apporte cette terre en pastilles ou en petits gâteaux marquée de différents caractères de l'isle de Lemnos , appelée statiment , dans laquelle on la tire des entrailles de la terre. C'est une terre argilleuse , grasse , gluante , glissante à peu près comme le savon , d'un rouge pâle & d'un jaune tirant sur le rousâtre ; elle ne laisse point d'astringion sur la langue , se dissout aisément dans l'eau & ne fermente pas avec les acides. Ces qualités sensibles nous empêchent de la ranger parmi les absorbants avec lesquels on l'associe assez souvent , & nous engageant à la rapporter aux incrassants ou aux inviscquants : on l'appelle terre sigillée , ou le sceau de la chevre , *terra sigillata* , *sigillum capræ* , parce qu'autrefois on imprimoit sur ces pastilles l'image d'une chevre.

Cas.

ON se sert de la terre sigillée dans toutes les hémorragies qui dépendent d'un sang âcre dissout avec tension des solides , dans les dyssenteries symptomatiques ou qui sont symptômes des fièvres aiguës bilieuses , dans le cours de ventre bilieux , dans les diarrhées tormineuses , dans l'incontinence d'urine , dans les fleurs blanches quand la matière de l'écoulement est tenace , âcre , & qu'elle corrode les parties voisines.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON la donne sous forme de potions ou sous forme de bols ; sous forme de potion depuis trois drachmes jusqu'à trois drachmes demies & six onces de quelque eau appropriée , par exemple , d'eau de plantin / de renouée , & on y ajoute une once de quelque sirop convenable , comme celui de coing , on mêle le tout , & on fait une potion à prendre par cuillerée , sous for-

me de bol, on la donne ou seule ou associée avec d'autres médicaments astringents ; seule depuis dix grains , vingt & même trente ; associée depuis dix grains jusqu'à vingt , on incorpore les bols avec quelque conserve ou quelque sirop approprié , par exemple , avec la conserve de kinarodon ou celle de roses seches ou avec le sirop de *symphitum* , il paroît le plus approprié.

La Grande Consoude , Consolida major , seu Symphitum majus.

QUELQUES Auteurs la rangent parmi les béchiques incrassants , sa racine qui est principalement d'usage en médecine , est plus ou moins épaisse , garnie de plusieurs fibres charnues , noires en dehors , blanches en dedans , visqueuses & gluantes : elle est plus mucilagineuse que la racine de guimauve , c'est pourquoi l'on préfère celle-ci dans les cas où il ne faut pas trop inviscquer & ingluier ; il ne faut pas faire bouillir long-temps le *symphitum* , il seroit trop mucilagineux , chargeroit l'estomac & seroit même désagréable au goût.

Cas.

ON emploie le *symphitum* dans toutes les hémorragies qui dépendent du sang âcre & dissout , dans l'hémopthisie héréditaire qui attaque des personnes dans lesquelles le tissu des poumons est foible & en même temps irritable , le sang âcre & dissout ; le mucilage de cette racine invisque ou enduit les vaisseaux d'une part , & de l'autre il enveloppe les parties âcres du sang qui par-là ont moins de force pour irriter & corroder les vaisseaux : on s'en sert pour la même raison dans les cours de ventre avec douleur , dans les diarrhées bilieuses , dans la dysenterie , en un mot dans toutes les maladies évacuatoires où il y a beaucoup d'ardeur , d'âcreté , comme dans les tempéraments bilieux où les solides sont tendus , le sang âcre & dissout ; c'est un bon astringent invisquant.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON donne la racine de *symphitum* en poudre depuis dix grains jusqu'à demi-drachme , on l'associe à la terre sigillée ou à quelqu'autre astringent approprié , on incorpore ces poudres avec le sirop de *symphitum* même pour en former des bols qu'on prend de trois en trois heures ou de quatre en quatre heures entre les bouillons : on prescrit aussi la racine de *symphitum* en décoction sous forme de pîsane. La dose en est alors depuis trois

onces jusqu'à trois & demies sur trois ou quatre livre d'eau qu'on fait bouillir légèrement de peur que la liqueur ne fût trop mucilagineuse , on peut faire bouillir jusqu'à diminution d'un tiers ou d'un quart suivant le besoin.

Les Emollients.

LES médicaments émollients sont ceux qui ont la propriété de ramollir ou de rendre le tissu des solides moins serré , ainsi ils sont directement opposés aux médicaments , qui comme nous avons vu , ont la propriété de resserrer davantage ce même tissu le ; tissu des solides peut être relâché par des parties aqueuses , par des parties mucilagineuses , ou enfin par des parties huileuses , qui en s'insinuant & s'interposant entre les fibres & les parties des fibres , diminuent leur cohésion & éloignent les points du contact ; ainsi les émollients peuvent se réduire aux émollients simplement aqueux , aux émollients mucilagineux & aux émollients huileux.

Emollients aqueux.

ILS conviennent dans les cas de sécheresse , d'aridité des solides par défaut de sérosité dans les humeurs , ce qui arrive dans les tempéraments secs , bilieux , mélancoliques , dans les hystériques , les hypocondriaques après de longues maladies , après de grandes sueurs , des exercices immodérés , dans le cas d'épaississement de sang gelatineux ; ils se donnent ou seul , mais principalement extérieurement sous forme de bains , d'embrocations , de fomentations , ou intérieurement sous forme de ptisane , & alors on y associe d'autres médicaments dans les maladies inflammatoires où le sang est épais & âcre , on peut y joindre les capillaires , la racine de chiendent.

Emollients mucilagineux.

LES émollients peuvent aussi agir par des parties mucilagineuses qui sont plus grossières dans les végétaux , plus fines dans les animaux ; les parties aqueuses se trouvent enveloppées par le mucilage , s'insinuent entre les fibres , éloignent les points du contact , diminuent le ressort , rendent les parties plus molles ; ainsi tous les mucilages peuvent être rangés parmi les émollients. Nous en avons déjà parlé lorsqu'il a été question des béchiques incrassants & des diurétiques froids : ces sortes d'émollients conviennent principalement dans le cas de sécheresse des solides dépendante

du défaut des parties aqueuses dans la masse du sang : ils nuiraient lorsqu'elles dépendent de l'épaississement du sang , tel qu'il se trouve dans l'état inflammatoire phlegmoneux.

Emollients huileux.

IL y a aussi des émollients huileux : on peut ranger sous ce genre l'huile de lin , d'amandes douces , & toutes les autres huiles qu'on peut tirer des fruits ; mais il faut remarquer qu'elles sont sujettes à se rancir , & qu'étant rancies , elles sont plutôt astringentes qu'émollientes ; c'est pourquoi on ne les donne qu'avec précaution , sur-tout dans les tempéraments bilieux , & on ordonne de les tirer sans feu ; si elles ne sont pas récentes , il vaut mieux leur préférer les émollients mucilagineux. Nous avons déjà parlé des huileux , en parlant des semences froides , du lin & des amandes douces.

Les Atténuants.

NOUS avons parlé des médicaments qui remédient aux vices des solides ; nous devons parler à présent de ceux qui sont propres à combattre les vices généraux qui peuvent se trouver dans les fluides. Nous commencerons par les atténuants qu'on appelle aussi apéritifs , parce qu'en atténuant , en divisant les humeurs trop épaisses ils sont propres à déboucher , à ouvrir en ôtant les embarras qui se trouvent dans les vaisseaux. En général , par atténuants on entend les médicaments qui sont propres à rendre au sang sa fluxilité naturelle. Les différences de ces médicaments sont connues en faisant attention aux différentes manières dont le sang peut perdre sa fluidité : il la perd , 1^o. par l'épaississement visqueux ou gelatineux , comme quelques-uns l'appellent , ce qui arrive lorsque la partie lymphatique ou mucilagineuse qui lie , pour ainsi dire , les particules du sang , est surabondante , comme on peut l'observer dans les tempéraments sanguins & dans ceux qui sont sujets aux paroxysmes épileptiques ; lorsque ces paroxysmes constituent une maladie idiopatique ou essentielle , comme aussi dans l'état inflammatoire phlegmoneux. Les médicaments propres à rétablir la fluxilité du sang lorsqu'il pèche ainsi par viscosité , sont les atténuants proprement dits. 2^o. Le sang peut perdre sa fluxilité par sécheresse ou par défaut de sérosité ; lorsque la sérosité manque dans le sang les molécules du sang sont plus rapprochées les unes des autres , & alors il est épaissi par sécheresse. Les médicaments propres à rendre au sang sa fluxilité naturelle dans ces circonstances , sont les émollients , soit aqueux simplement ,
soit

soit mucilagineux , soit huileux. A l'égard des atténuants qui conviennent , comme nous avons dit ci-devant lorsque le sang est épaissi par viscosité , tous les purgatifs , les diurétiques chauds , les sudorifiques , les emmenagogues peuvent être rangés sous cette classe : on peut aussi y ranger les martiaux qu'on regarde principalement comme atténuants , les astringents condensants dont nous avons déjà parlé , & de plusieurs autres médicaments dont nous parlerons lorsqu'il sera question des céphaliques , des hépatiques. Tous ces médicaments atténuent , divisent le sang , la lymphe , ils conviennent par conséquent lorsque le sang est épaissi par viscosité.

Des Incrassants & des Adoucissants.

LES médicaments incrassants sont ceux qui remédient à la trop grande fluxilité du sang , & qui lui donnent une consistance plus épaisse , ils sont opposés aux atténuants. La fluxilité du sang peut être augmentée ou par l'abondance de la sérosité ou par la dissolution putride du mucilage ; dans le premier cas qui se présente , par exemple , dans la chlorose les astringents condensants , les martiaux , les astringents absorbants , les astringents reserrants , les purgatifs , sur-tout les hydragogues , les diurétiques & spécialement les sudorifiques conviennent. Dans le second cas , c'est-à-dire , dans la dissolution putride ou par défaut de mucilage , les huileux , les mucilagineux , les incrassants conviennent en tant qu'ils rendent au sang un mucilage : on peut ranger sous la même classe les diurétiques froids , sur-tout ceux qui sont tirés du regne minéral , excepté cependant dans les cas où cette dissolution putride dépend de quelque ulcère principalement du poulmon , mais ils conviennent dans les autres cas , comme dans le scorbut chaud , dans les fièvres malignes à dissolution , dans les maladies inflammatoires érépisélateuses : on peut aussi ranger sous cette même classe le lait & ses différentes préparations qui conviennent dans le cas de dissolution du sang avec beaucoup d'âcreté , & c'est par cette raison que tous les adoucissants pourroient être rangés sous cette classe , en ce qu'ils détruisent l'âcreté. Le lait est un incrassant adoucissant , propre à remédier à cette dissolution putride du sang , à rétablir son mucilage.

Le Lait.

NOUS diviserons en plusieurs chefs ce que nous avons à dire touchant le lait : 1°. nous considérerons le lait chimiquement , 2°. physiologiquement , 3°. nous exposerons les différentes especes de lait , 4°. les cas où le

lait est indiqué , 5°. ceux où il est contre-indiqué , 6°. la maniere de l'administrer & les précautions qu'il faut prendre pour cela.

Examen du Lait considéré chymiquement.

TOUT le monde fait que le lait est une liqueur blanche , d'un goût doux & agréable , d'une consistance médiocre , séparée dans les mamelles des animaux femelles : ce sont là les qualités qui doivent se trouver dans le lait pour qu'il soit bon. Le lait de vache nouvellement trait , mis dans une terrine & exposé à une chaleur modérée , présente les phénomènes suivans ; dans l'espace de dix ou douze heures il s'élève à la surface du lait une matiere épaisse , grasse , huileuse , c'est ce qu'on appelle la crème ; on enleve doucement cette crème avec une cuillere , on la met dans un autre vaisseau & on la conserve. Le lait qui aura été ainsi écrémé sera moins épais qu'auparavant ; si toute la crème n'en a point été séparée il s'en rassemblera encore de nouvelle à sa surface ; au bout d'un certain temps il faut l'enlever comme la premiere ; au bout de deux ou trois jours le lait écrémé sera coagulé en une masse molle qu'on appelle lait caillé , il a alors une saveur & une odeur aigre. Si on coupe cette partie coagulée , en petits morceaux , il s'en séparera aussi-tôt une grande quantité de sérosités. Si on met le tout sur un linge suspendu en l'air en plaçant dessous un vaisseau pour recevoir la sérosité à mesure qu'elle s'écoulera , il restera sur le linge quand la partie sereuse ou aqueuse aura cessé de couler , une matiere blanche un peu plus ferme que n'étoit le caillé ; cette matiere est ce qu'on appelle le fromage , & la sérosité qui s'en est séparée est appelée petit lait. Telle est la décomposition qu'éprouve le lait laissé à lui-même sans le secours de la distillation , ni de l'addition d'aucune matiere étrangere : il se fait une espece d'analyse spontanée par laquelle il est partagé en trois substances différentes , savoir , en *crème* ou partie *butyreuse* , en *fromage* ou partie *caseuse* , & en *serum* ou petit lait : il faut remarquer cependant que la crème telle qu'on la ramasse à la surface du lait où elle s'est rassemblée , n'est pas la partie butyreuse pure , mais qu'elle est encore mêlée avec une assez grande quantité de parties caseuses & sereuses qu'il faut séparer pour la réduire en beurre : on peut hâter la coagulation du lait en se servant des sels acides , ou bien des sels alkalis fixes , avec cette différence cependant que les alkalis fixent coagulent le lait en séparant en même temps d'avec le petit lait le fromage qui nage en grumeau dans la liqueur , ce que les acides ne font pas. L'Art a décom-

posé chacune des trois parties dont le lait est composé ; l'analyse chimique prouve que le beurre est chargé de parties huileuses , de parties acides , de parties terreuses , & qu'en outre il contient beaucoup de parties séreuses qui n'ont pu en être séparées en le faisant. Le beurre est donc la partie huileuse du lait figée par l'acide avec de l'eau & de la terre. On retire du fromage frais les mêmes principes du phlegme en quantité , ensuite un phlegme acide , une huile moins épaisse que celle du beurre , enfin l'on trouve au fond de la cornue une matiere charbonneuse , mais beaucoup plus abondante que celle que laisse le beurre , ce qui prouve que le fromage contient une beaucoup plus grande quantité de partie terreuse. Le petit lait est composé pour la plus grande partie de phlegme ou de partie aqueuse ; il contient outre cela les autres parties du lait qui sont dissolubles dans l'eau , c'est-à-dire , ce qu'il y a de salin & de savonneux : aussi son analyse démontre-t-elle qu'il contient une huile réduite par un acide dans un état parfaitement savonneux , c'est-à-dire , rendue intimement miscible avec l'eau , c'est ce qui se prouve par la parfaite diaphanéité de cette liqueur , qui est la marque d'une dissolution complète. Lorsqu'on distille le petit lait , la matiere savonneuse se décompose , la partie saline de cette matiere monte la premiere , c'est-à-dire , l'acide qu'on en retire , après quoi vient l'huile séparée d'avec le principe qui la rendoit miscible avec l'eau ; la matiere charbonneuse qui reste au fond de la cornue étant exposée à l'air s'y humecte , ce qui prouve qu'elle contient un sel marin qui a cette propriété ; enfin si on lessive cette matiere , & qu'après l'avoir faite évaporer on la laisse sécher & brûler jusqu'à ce qu'elle soit réduite en cendre , la lessive de cette cendre donnera des indices d'alkali fixe. Tous les laits donnent les mêmes principes que ceux que nous venons de voir qu'on retire du lait de vache.

Lait considéré Physiologiquement.

LE lait considéré physiologiquement est un chyle préparé qui résulte du mélange du suc exprimé des aliments végétaux avec les humeurs du corps , de maniere cependant qu'il est exactement séparé dans les organes de la sécrétion du lait , de ces humeurs du corps ou de ces sucs animaux avec lesquels il a d'abord été mêlé , c'est la principale différence qu'il y a entre le lait & le chyle ; car le lait ne fournit point du tout d'alkali volatil , au lieu qu'il est vraisemblable que si on pouvoit ramasser une assez grande quantité de chyle pour en faire aisément l'analyse , il

fourniroit beaucoup d'alkali volatil , parce qu'il est mêlé & confondu avec une grande quantité de fucs animaux , comme avec la salive , les fucs gastriques & pancréatiques avec la bile & la lymphe qui en fournissent tous ; mais le lait filtré dans les mailles ne fournit point d'alkali volatil : on peut donc le regarder comme le suc extrait récemment des aliments végétaux , suc qui est plus travaillé & qui a plus de consistance que le chyle , & dont les acides sont émoussés sans être alkalescents. On ne peut pas regarder le lait avec les anciens comme une liqueur séparée du sang déjà travaillée & toute formée. Le sang des animaux ne fournit point d'acides si ce n'est par la violence du feu , au lieu que dans le lait l'acide se manifeste presque de lui-même ; d'ailleurs le sang laissé à lui-même ne fermente pas aceteusement ; le contraire arrive dans le lait. De plus le *caput mortuum* du lait donne par la lessivation des indices d'alkali fixe , celui du sang lessivé n'en donne point du tout.

Différentes especes de Lait.

ON se sert en médecine du lait de femme , du lait de vache , du lait de chevre & du lait d'ânesse. Le lait de femme est le plus analogue à nos humeurs , c'est aussi le plus convenable lorsqu'on peut en avoir. Le lait de vache est celui qui contient le plus de parties butyreuses & de parties caseuses & le moins de parties séreuses. Le lait de chevre contient plus de parties séreuses que celui de vache , mais cependant il contient assez de parties butyreuses & de parties caseuses. Enfin le lait d'ânesse est celui qui contient le plus de parties séreuses & moins de parties butyreuses & caseuses.

Cas où le Lait est indiqué.

NOUS ne distinguerons pas ici les cas où les différentes especes de lait conviennent ; nous en parlerons lorsqu'il sera question de la façon de les administrer , nous ne ferons qu'indiquer ici les cas généraux où le laitage convient. On emploie le lait dans presque toutes les maladies , 1^o. dans les maladies évacuatoires , tant des premières que des secondes voies produites ou entretenues par une matière âcre dissoute , soit que les évacuations soient blanches , soit qu'elles soient rouges. Dans les premières voies , comme dans les diarrhées colliquatives où les humeurs sont si âcres qu'il semble qu'elles se fondent toutes pour ainsi dire , en sorte que tout le corps s'amaîgrit considérablement ; dans les diarrhées tormineuses , quoiqu'elles ne soient pas colliquatives , mais invétérées ; les douleurs fournissent une

preuve de l'acrimonie des humeurs dans les dysenteries longues entretenues par des ulcères des intestins qui rendent ces dysenteries en quelque façon chroniques. Dans le flux hépatique qui abat considérablement les forces du malade , sur-tout s'il vient à la suite de quelques maladies vives du foie ou à la suite de la dysenterie , ce qui est le plus ordinaire , mais non si elle dépend de l'obstruction skirreuse du foie ; dans le flux de sang dépendant d'un sang âcre & dissout ; dans le teneisme qui dépend le plus ordinairement des matieres qui se cantonnent dans les valvules du *rectum* , & qui font que les malades se présentent souvent & presque inutilement à la selle , n'ayant pas d'ailleurs d'autres matieres dans les intestins ; dans les hémorroïdes qui coulent avec trop d'impétuosité , & où le sang est dissout & âcre ; dans les maladies évacuatoires des secondes voies , comme dans l'hémoptisie héréditaire qui est devenue chronique , dans laquelle le tissu des poudons est foible & le sang âcre & dissout , quand même il y auroit fièvre , après avoir fait précéder cependant les remèdes généraux ; dans le pissement de sang qui dépend aussi d'un sang âcre & dissout , dans les pertes immodérées des femmes , soit celles qui arrivent dans le temps de l'accouchement , soit celles qui surviennent dans tout autre temps ; dans l'ischurie ou entière suppression d'urine ; dans la dysurie , sur-tout lorsqu'elle accompagne la gonorrhée virulente & toujours avec âcreté & dissolution du sang. 2°. Le lait est très-souvent indiqué dans les maladies doulorifiques , comme dans la goutte qui est une douleur vive qui attaque à certains périodes les articulations ; dans les douleurs rhumatismales produites par une lympe âcre , on le regarde alors comme spécifique ; dans les douleurs de tête dépendantes d'un sang âcre & dissout ; dans les douleurs vives dépendantes des matieres calculeuses , soit que ces matieres soient arrêtées dans les reins ou dans les uretères ou dans la vessie , dans ce cas-là le sang est âcre & dissout. 3°. Le lait convient encore dans certaines maladies convulsives , comme dans la passion hystérique , hypocondriaque , parce que tous les symptomes de ces affections montrent qu'il y a beaucoup de tension dans les solides & beaucoup d'âcreté & de sécheresse dans les fluides. 4°. Dans les maladies dyspnœiques , comme dans les asthmes convulsifs , dans les asthmes tuberculeux où la matiere est âcre & épaisse par sécheresse. 5°. Dans les maladies cachétiques dont le caractère est pris de quelque vice de l'habitude du corps , mais sur-tout dans les maladies cachétiques tabides , c'est-à-dire , dans les maladies de consomption de tout le corps. Ces maladies sont ou essentielles ou symptomatiques ; essentielles , lorsqu'elles dépendent

de la sécheresse du sang qui fait que le suc nourricier n'est pas porté dans les vaisseaux, on les connoît sous le nom de fiebres hectiques ; symptomatiques , lorsqu'elles dépendent de quelque ulcère interne , comme du poulmon , du foie , de la rate , des intestins , comme il arrive à ceux qui sont attaqués de la fistule à l'anus ou de quelques ulcères externes de mauvaise qualité qui ne cedent pas aux remèdes. Le lait convient dans toutes les maladies tant essentielles que symptomatiques. 6°. Dans le scorbut qui peut se rapporter aux maladies cachétiques , mais dans le scorbut chaud qui se rencontre dans les tempéraments chauds & bilieux , où il y a douleur & chaleur avec un caractère d'acrimonie & de dissolution ; dans ce cas-là non-seulement les malades sont soulagés , mais même ils sont guéris par l'usage du lait. Le lait a aussi lieu dans les fiebres intermittentes qui dépendent de ce virus scorbutique , quoiqu' d'ailleurs il soit contre-indiqué en général dans les fiebres intermittentes. 7°. Dans les maladies cachétiques dépendantes du virus vérolique , non-seulement le lait précède & suit autant qu'il est possible , le traitement qu'on fait par les grands remèdes , mais même il est palliatif. 8°. Dans les maladies cutanées , comme la gratelle , la gale , la lepre dépendantes de l'âcreté & de la dissolution de la lymphe. En Angleterre on se sert du lait dans les maladies aiguës inflammatoires , comme dans la pleurésie , la péripneumonie. A Paris même on suit assez cet usage , mais ici on ne donne point le lait dans les maladies inflammatoires ; on donne cependant quelquefois le petit lait , mais c'est pour servir de véhicule aux purgatifs.

Cas où le lait est contre-indiqué.

HIPPOCRATE nous l'apprend dans un aphorisme où il dit qu'il ne faut pas donner le lait , 1°. à ceux qui ont des maux de tête , 2°. à ceux qui ont la fièvre , 3°. à ceux qui ont les hypocondres élevés & qui éprouvent de borborigmes , 4°. dans les déjections bilieuses , 5°. dans les fiebres aiguës , 6°. à ceux qui sont tourmentés par une soif presque inextinguible , 7°. enfin à ceux qui ont éprouvé de grandes hémorragies : tels sont les cas généraux où , selon *Hippocrate* , on ne doit pas donner le lait , & où il est par conséquent contre-indiqué. Ces cas proposés généralement méritent quelque réflexion & quelques éclaircissements pour n'être pas jetté dans l'erreur en leur donnant plus d'étendue qu'il ne convient , 1°. *Hippocrate* dit qu'il ne faut pas donner le lait à ceux qui ont des maux de tête. Cette proposition ne doit pas être prise trop généralement ; car le mal de tête

peut entraîner avec lui la lésion des fonctions de l'estomac, des obstructions du bas-ventre, comme dans les femmes cachétiques, de matieres acefcentes dans les premieres voies, ou bien il peut dépendre de tous ces vices, & c'est ce qui arrive le plus souvent. Or dans ces circonstances il est évident que le lait ne convient pas, par la raison qu'il s'aigrirait & se gâterait dans les premieres voies : mais le mal de tête peut aussi être symptôme du virus scorbutique, du scorbut chaud dans lequel les humeurs sont âcres & dissoutes, ou bien il peut aussi être symptôme du virus vérolitique. Dans les maux de tête symptomatiques non-seulement le lait n'est pas contre-indiqué lorsqu'il n'y a pas de mauvaises matieres dans les premieres voies, mais même il convient comme palliatif, en attendant que les malades puissent guérir radicalement par l'usage des grands remèdes ; bien plus quand les fonctions de l'estomac ne se feroient pas bien, ce ne seroit pas une raison pour renoncer entièrement au lait, il faudroit seulement faire précéder les stomachiques, & en venir ensuite au lait pour adoucir & pallier le mal. 2°. *Hippocrate* veut qu'on ne donne pas le lait à ceux qui ont la fièvre, quelques-uns entendent cela des fièvres aiguës ; il paroît cependant que ce n'est pas la pensée d'*Hippocrate*, puisqu'il spécifie plus bas les fièvres, & qu'ainsi dans cet endroit il veut parler des fièvres en général, & sur-tout des fièvres chroniques, des fièvres lentes ; mais il faut remarquer que ces sortes de fièvres sont souvent à la vérité jointes à la lésion de l'estomac, mais non pas toujours. Il arrive quelquefois & même assez souvent que ces fonctions se font assez bien chez ceux qui sont attaqués de fièvre lente, d'ailleurs il faut distinguer plusieurs degrés dans ces fièvres ; quelquefois les malades éprouvent une soif, une chaleur & une fièvre considérable, quelquefois au contraire la fièvre n'est pas considérable, non plus la chaleur & la soif ; lorsque les premieres voies paroissent bien disposées & que la chaleur & la soif ne sont pas considérables, le lait convient, mais au contraire si les premieres voies sont dérangées, si la fièvre, la chaleur & la soif sont considérables, le lait pourroit non-seulement s'aigrir, mais même tourner vers la putréfaction, & par conséquent il est alors contre-indiqué. 3°. On ne doit pas non plus le donner à ceux qui ont les hypocondres élevés & chez qui on entend un bruit qui court d'un endroit des intestins à l'autre, ce qu'on appelle borborigmes, ce sont là des signes qui font connoître que les digestions ne se font pas bien, & qu'il y a dans les grands intestins contenus pour la plus grande partie dans les hypocondres des matieres épaisses & glaireuses qui retiennent l'air raréfié d'ailleurs par la chaleur ;

dans ce cas il est visible que le lait s'aigrirait, il est donc contre-indiqué; les hypocondres peuvent être aussi élevés non-seulement par ce vice des premières voies, mais encore par des obstructions du méfentere & des viscères qui servent à la digestion, produites par des matières épaissies, tenaces, comme il arrive chez les enfants écrouelleux; le lait est pareillement contre-indiqué dans ce cas-là, parce que les sucs digestifs sont alors mal travaillés, les digestions se font mal; le lait de vache est encore plus spécialement contre-indiqué, parce qu'il épaisserait davantage les humeurs qui ne sont déjà que trop épaissies. Les autres espèces de lait ne conviennent pas non plus par les raisons que nous avons indiquées. 4°. On ne doit pas donner le lait dans le cas des déjections bilieuses sur-tout accompagnées de fièvre, d'ardeur, de soif, soit que ces déjections bilieuses soient essentielles ou dépendantes du vice des premières voies, de l'accumulation des mauvais sucs, soit qu'elles soient symptomatiques ou symptôme de fièvre bilieuse, parce que le lait s'aigrirait, & que s'unissant à la bile il en augmenterait l'âcreté; on voit cela dans les enfants dont les déjections sont fréquentes & verdâtres, c'est le signe auquel les Praticiens connoissent que le lait s'aigrit. 5°. *Hippocrate* ne veut pas qu'on donne le lait dans le cas des fièvres aiguës, parce qu'alors il y a beaucoup de chaleur, & que les premières voies ne travaillent pas les aliments comme il faut, ce qui paroît par le défaut d'appétit, ou même par l'aversion que les malades ont pour les aliments, par les rapports aigres, insipides ou même nidoreux; par les douleurs de colique, par les borborigmes. Cependant on ne doit pas entendre ceci de toutes sortes de lait ou de toutes sortes de préparations de lait; car les anciens faisoient usage du petit lait dans les fièvres aiguës, & parmi les modernes il s'en trouve beaucoup qui le prescrivent dans le même cas. En Angleterre on donne le petit lait pour boisson ordinaire dans les fièvres aiguës, comme dans la pleurésie, dans la péripneumonie, & cela pour tempérer & délayer le sang: on suit aussi cet usage à Paris. Nous croyons cependant qu'il faut user alors de beaucoup de circonspection & bien distinguer les cas; car si la fièvre aiguë est putride, nous croyons alors que le petit lait même est contre-indiqué, parce qu'alors les premières voies se trouvent infectées de mauvais sucs, en passant des premières voies dans les secondes, & cause des diarrhées qu'il est souvent très-difficile d'arrêter; si au contraire les fièvres aiguës ne sont pas accompagnées d'un caractère de putridité, & que les premières voies soient bien nettoyées, dans ce cas le lait peut être utile: il y a encore une exception à faire pour les fièvres aiguës qui se

se trouvent jointes à l'émopthisie , car dans ce cas les autres remèdes ne font souvent que blanchir , & le lait de vache qui est pourtant celui qui se corrompt le plus aisément , étant donné pour toute nourriture , fait de merveilles , il faut cependant faire précéder les autres remèdes adoucissans. 6°. On ne doit pas le donner à ceux qui sont tourmentés d'une soif presque inextinguible accompagnée d'ardeur , parce qu'elle dépend des matieres âcres & putrides qui passent des premieres voies dans les secondes , c'est ce qu'on peut remarquer dans l'hydropisie ; car on observe dans cette maladie qu'il y a souvent plus d'eau épanchée au commencement que vers la fin ; cependant la soif ne se fait bien sentir que vers la fin , lorsque les eaux épanchées tournent vers la putridité , & qu'étant résorbées par leurs propres vaisseaux , elles sont rapportées dans les secondes voies , ce qui donne lieu à la soif , à la fièvre , à la toux , or dans ce cas on sent bien que le lait ne pourroit qu'être nuisible. 7°. Enfin Hippocrate veut qu'on ne donne pas le lait à ceux qui ont éprouvé de grandes évacuations de sang. Nous remarquerons d'abord qu'il parle de ceux qui ont déjà éprouvé ces évacuations & non pas de ceux qui les éprouvent actuellement , puisque , comme nous l'avons vu , le lait convient dans le cas d'hémopthisie , mais le lait ne convient pas après les hémorragies , parce que les personnes qui ont souffert ces évacuations , ayant perdu beaucoup de sang , elles ont les vaisseaux affaiblis , leur pouls est petit , elles sont pâles & foibles , sujettes à des épaissemens d'humeurs qui se corrompent , l'habitude de leur corps devient languissante & œdémateuse , & on remarque en elles un caractère de froid , de-là la cachexie humide , la chlorose , dans ces circonstances le lait seroit nuisible , il est contre-indiqué.

Maniere d'ordonner les différentes especes de Lait , & leurs préparations.

QUAND on ordonne le lait , on met à la diete du lait : il y a trois sortes de diete de lait , la diete légère ou tenue , la diete médiocre & la diete forte qu'on appelle communément la diete blanche. La diete légère ou tenue consiste à donner le lait une fois par jour seulement , & c'est ordinairement le matin ; dans la diete médiocre on le donne deux fois par jour , & c'est ordinairement le matin à jeun & le soir en se couchant. Les deux autres repas se font alors avec des aliments de facile digestion ; enfin la diete forte ou la diete blanche , c'est lorsqu'on ne donne que le lait au malade pour toute nourriture. Nous avons déjà dit qu'on se servoit en.

Médecine de différentes especes de lait , savoir du lait de femme , du lait de vache , du lait de chevre & du lait d'ânesse , nous allons donner la maniere d'employer chacune de ces especes de lait.

Lait de Femme.

C'EST celui qui convient le mieux , il est plus analogue à nos humeurs , c'est pourquoi on doit le préférer quand on peut en avoir , sur-tout dans le cas de phthisie , de consomption , de marasme , d'ulcere cancreux ; la meilleure façon de le donner & la plus universellement reçue , c'est que le malade suce le lait immédiatement à la mamelle de la femme , il est sûr que si on faisoit traire le lait de la femme dans un vaisseau , dans le temps qu'on mettroit à en ramasser une suffisante quantité , le lait perdrait & exhaleroit plusieurs parties volatiles qui sont cependant très-bonnes & qui tournent au profit du malade quand on l'applique immédiatement au mamelon de la femme : il y a une foule prodigieuse d'observations qui prouvent les bons effets que cette façon de prendre le lait de femme a produit dans des phthisiques désespérés ; on peut ordonner le lait de femme une ou deux fois par jour , ou même pour toute nourriture si la femme en fournit assez , en permettant au malade de manger dans les intervalles quelques morceaux de pain blanc.

Lait de Vache.

LE lait de vache , selon ce que nous avons dit , contient beaucoup de parties butyreuses & de parties caseuses & peu de *serum* , par conséquent il contient beaucoup de parties huileuses , de parties grasses , de parties terrestres , & convient lorsqu'il faut nourrir , & dans le cas où il faut adoucir les humeurs & où l'on a moins en vue de détremper , il est très-propre à envelopper les parties âcres. Il faut remarquer qu'il se distribue plus lentement , qu'il reste plus long-temps dans l'estomac ; l'expérience prouve qu'il passe plus difficilement & qu'il s'aigrit plus aisément , ce qui vient de la plus grande quantité d'acides qu'il contient , & qui sont renfermés , comme nous avons vu , dans la partie caseuse & dans la partie butyreuse principalement.

Cas où le Lait de Vache convient.

LE Lait de vache convient sur-tout dans le cours de ventre fereux , mais avec un caractère d'âcreté , ce qu'on connoît par les tranchées vives

que les malades éprouvent , & par les douleurs âcres qu'excitent les matieres en passant par le fondement comme on dit ; il convient aussi dans les dyssenteries essentielles dépendantes pareillement des matieres âcres , soit qu'elles aient été engendrées dans les premieres voies , soit qu'elles y aient été portées d'ailleurs , comme par quelque poison corrosif. C'est le lait le plus propre à envelopper ces parties âcres ; il convient encore dans le vomissement & dans le flux de sang dépendant des matieres âcres , dans les ulceres intérieurs entretenus par des matieres ichoreuses & fluxiles lorsqu'il s'agit de lubrifier & d'adoucir , tels que sont les ulceres qu'on observe dans les voies urinaires ; c'est dans cette vue que quand les cantharides qu'on a employées extérieurement portent sur les voies urinaires & y causent des pissements de sang , des ulceres , on doit préférer le lait de vache ; on doit aussi le préférer si le malade peut le supporter quand on le met à la diete blanche , ou au lait pour toute nourriture , par la raison que le lait est plus nourrissant.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON donne le lait de vache simplement coupé une fois par jour , on commence par la dose de six onces & on va ensuite jusqu'à quinze ou seize , augmentant successivement de deux onces par jour , on le coupe avec l'infusion de lierre terrestre , quand on craint qu'il ne passe pas bien ; c'est un bon stomachique & en même temps détersif , comme nous l'avons vu en parlant des béchiques incisifs , on peut aussi le couper avec l'infusion de capillaire ou avec la décoction d'orge , par-là on le rend plus aqueux , il passe mieux ; quand on craint l'acrescence ou même qu'il ne tourne vers la putridité , comme dans les tempéraments bilieux chauds , on le fait crêmer , pour cela on le fait chauffer doucement , & on enleve la pellicule qui paroît sur la surface , & on en ôte deux ou trois couches , de cette maniere on enleve la crème composée , comme nous avons dit , des parties acides & des parties huileuses très-propres à s'aigrir ; on donne le lait de vache ainsi écrémé , ou seul ou coupé , on coupe à demi ou tiers ou quart mêlant pour cet effet avec le lait , la demi , le tiers , le quart d'une infusion appropriée , suivant que l'on craint plus ou moins que le lait ne s'aigrisse , ou suivant qu'on veut le rendre plus ou moins aqueux. Quand on ne coupe le lait que pour tâtonner pour ainsi dire , les fibres de l'estomac , pour s'assurer si le lait passe bien , on doit diminuer peu-à-peu , & retrancher insensiblement l'infusion dont

on se servoit pour le couper , puis on le donne pur , & on vient ensuite peu-à-peu à la diete blanche , ou au lait pour toute nourriture, on le lui donne le matin & le soir à la dose de huit onces jusqu'à quinze ou même dix-huit , faisant prendre cette dose à midi & autant le soir. Quand on donne le lait de vache pour resserrer , comme dans le cours de ventre fereux , on lui ôte sa partie sereuse en y éteignant plusieurs fois des cloux ou des petits cailloux rougis au feu. On tire aussi le petit lait qu'on prépare de plusieurs façons : on se sert principalement des acides pour coaguler le lait , comme du vinaigre , du jus de limon , cette maniere de le préparer est un peu longue ; c'est pourquoi quand on est pressé on peut le faire sur le champ comme il suit : on prend , par exemple , une livre de lait , & on y jette à plusieurs reprises de la crème de tartre autant qu'il en peut contenir sur la pointe d'un couteau ordinaire à chaque fois. Cette méthode est la plus courte , & il est bon de savoir pour s'en servir dans le cas où l'on est extrêmement pressé d'administrer le petit lait : on se sert aussi pour tirer le petit lait & c'est peut-être le meilleur moyen , de la pressure qui n'est autre chose qu'un reste de lait caillé , dense , d'gré & devenu aigre qu'on trouve dans l'estomac des veaux. Pour clarifier le petit lait , on le fait bouillir & on y ajoute le blanc d'œuf , c'est pendant la clarification qu'on ajoute les médicaments appropriés qu'on veut employer. Le petit lait , quand il est bien fait , est très-propre à adoucir & en même temps à diviser , à délayer le sang & la lymphe trop épaisse par sécheresse , comme aussi à déterger les ulceres froids , lorsque le pus s'aglutine , soit au fonds , soit au bord & à la surface de l'ulcere , c'est une espece de savon qui résulte du mélange de l'huile avec l'acide , ou plutôt c'est la partie aqueuse du lait qui tient en dissolution les parties huileuses & les parties acides qui forment une espece de savon doux & léger très-propre à mêler la sérosité avec les humeurs desséchées & à procurer une détente du sang : on peut aussi le considérer comme chargé de parties salines , du sel marin qu'on découvre par l'analyse. Le petit lait convient dans les hystrériques , les hypocondriaques attaqués d'un virus cancéreux , dans les obstructions , dans les tubercules des poudrons qui se trouvent sur-tout chez les personnes que nous avons désigné ; dans les ulceres cancéreux , dans les ulceres internes , sur-tout des voies urinaires dans lesquels la matiere est épaisse , tenace & visqueuse & en même temps âcre , il incise cette matiere & en corrige l'âcreté. Le petit lait convient même dans des cas où le lait ne pourroit convenir , comme dans les obstructions produites par une lymphe épaisse , par sécheresse avec un caractère

d'âcreté , d'ailleurs il se corrompt moins aisément que le lait. On ordonne le petit lait comme le lait même depuis six onces jusqu'à douze , en augmentant successivement depuis cette première dose à la seconde : on se sert aussi du petit lait pour base des purgations dans les fièvres putrides avec météorisme ou tension douloureuse du bas-ventre. On le fait boullir avec la casse , comme nous avons dit en parlant de ce purgatif , & on fait ce qu'on appelle *dilutum* de casse.

Lait de Chevre.

LE Lait de chevre tient le milieu entre le lait de vache & le lait d'ânesse , il est moins sereux que le lait d'ânesse , mais il l'est plus que celui de vache : on emploie le lait de chevre dans les mêmes cas que celui de vache , quand on ne peut avoir de celui-ci : on le substitue au lait de vache , lorsqu'on a lieu de craindre que le lait de vache ne s'aigrisse , le lait de chevre contenant plus de parties sereuses & moins de parties caseuses & butyreuses passe aisément : on donne le lait de chevre depuis six onces jusqu'à douze comme celui de vache , on en tire pareillement le petit lait qu'on prescrit à la même dose.

Lait d'Anesse.

Le lait d'ânesse est extrêmement sereux & assez analogue au petit lait , il convient dans les cas où il faut adoucir & même délayer , diviser , comme dans les ulcères des poulmons où le sang est épais par sécheresse avec un caractère d'âcreté : on le préfère aussi dans les affections de goutte & de rhumatisme , sur-tout lorsqu'elles se trouvent dans des tempéraments vifs & ardents où les humeurs ont besoin d'être délayées , en un mot dans tous les cas où il s'agit principalement de détremper ; on s'en sert de la même manière que de celui de vache & à la même dose : il faut remarquer par rapport au lait de chevre & celui d'ânesse qu'on les prend l'un & l'autre tous chauds immédiatement après qu'il a été trait de l'animal , on étend pour cela un linge sur le vaisseau dans lequel on doit recevoir le lait , & sur le linge on met une once de sucre en poudre , afin que le lait tombe immédiatement sur le sucre , qu'il soit plus doux & moins propre à s'aigrir , si on ne peut avoir le lait dans le moment qu'on le trait , il faut le faire chauffer au *bain marie*.

PREMIERE PRECAUTION.

Pour préparer à l'usage du lait.

ON peut craindre que le lait pese sur l'estomac , qu'il ne s'aigrisse ou même qu'il ne s'y corrompe par putréfaction ; c'est pourquoi on doit faire

une attention singulière à l'état de l'estomac , & s'en bien assurer avant que d'en venir à l'usage du lait. Ainsi si l'estomac paroît pécher par relâchement, s'il y a des rapports aigres , il est évident qu'il faut commencer par vider les premières voies des mauvaises matières & donner en même temps du ton , on doit donc faire précéder la purgation qui doit être préparée avec des médicaments appropriés comme dans le cas que nous venons de déterminer avec de purgatifs toniques , tels que la rhubarbe , les mirobolans auxquels on ajoute la manne si l'estomac pèche par un vice contraire , comme dans les tempéraments bilieux s'il y a des rapports nidoreux avec ardeur & soif, alors la purgation doit être composée avec des médicaments légèrement acéscentés & antiseptiques , comme avec la manne , la casse , les tamarins , les fleurs de violette ; dans les tempéraments où les solides sont extrêmement tendus , comme chez les hystériques & les hypocondriaques , nous avons dit ailleurs qu'on alloit avec succès , la casse & les tamarins ; en un mot , on doit varier les purgatifs suivant les indications qui se présentent dans les cas où l'on juge à propos d'y avoir recours , mais si l'estomac étoit bien disposé , que l'appétit se soutînt & que les digestions se fissent bien , on pourroit s'abstenir de purger ; la purgation n'est absolument nécessaire que lorsque l'estomac est dérangé , & si on l'ordonne autrement ce n'est que *ad majorem cautelam*. M. de la Mure a souvent donné le lait sans faire précéder la purgation dans des cas où l'estomac & les premières voies paroïssent bien disposées , & il n'a jamais observé qu'il en résultât aucun mauvais inconvénient. Après la purgation , il faut songer à conserver le ton de l'estomac & des intestins , c'est pourquoi il est fort d'usage chez les personnes dont l'estomac a été dérangé long-temps , d'ordonner des bouillons faits avec le veau ou le poulet & des médicaments appropriés , comme les stomachiques chauds : on fait prendre ordinairement huit ou dix de ces bouillons le matin à jeun , puis on fait repurger le malade de la façon que nous avons dit ci-devant , alors on donne le petit lait pendant quelque-temps , sur-tout s'il y a des embarras dans les viscères , par-là on accoutume l'estomac à l'usage du lait entier , & d'ailleurs il convient très-fort dans les obstructions produites par une lymphe épaissie par sécheresse : on le fait prendre pendant quinze jours ou trois semaines ou un mois selon le besoin : on peut ajouter au petit lait le suc de quelques plantes stomachiques , celui de menthe est le plus propre pour corriger l'acéscence du lait , c'est pourquoi on ajoute au petit lait , pendant la clarification , une ou deux pincées de feuilles de menthe vertes ou seches , ou bien deux cuillerées de son suc ,

lorsque le lait est clarifié & coulé & on y ajoute une once de sucre sur douze onces de petit lait, après l'usage du petit lait on repurge le malade & ensuite on lui fait prendre pendant deux ou trois jours un bol fait avec les médicaments absorbants dont nous avons déjà parlé, comme avec les yeux d'écrevisse, les coraux préparés, la craie de Briançon, on se sert principalement de ce dernier médicament à Montpellier immédiatement après le bol, on peut faire prendre une tasse d'infusion de mélisse ou de menthe, ce qui est mieux pour corriger l'acrescence après le petit lait, on passe au lait de vache ou de chevre ou d'ânesse, & on le coupe plus ou moins avec les infusions de lierre terrestre ou de capillaire ou avec la décoction d'orge : on le fait prendre ainsi sept ou huit jours & au bout de ce temps, si l'état du malade exige qu'on le mette à la diète blanche après lui avoir fait prendre le lait une fois par jour, pendant sept ou huit jours comme nous venons de le dire, on le met à la diète médiocre, c'est-à-dire, qu'on lui donne le lait deux fois par jour pendant sept ou huit jours pareillement, après quoi on peut passer à la diète blanche; dans le temps que le malade est à la diète légère & à plus forte raison quand on l'a mis à la diète médiocre, il faut faire attention au lait, il doit éviter les aliments salés, épicés, les fruits crus, les salades, les acrescents, le vinaigre & sur-tout le vin qu'il faut bannir entièrement, s'il est possible ou qu'il faut diminuer entièrement & baigner de beaucoup d'eau, on doit nourrir le malade avec la soupe faite avec l'eau & la volaille & permettre seulement les viandes blanches, comme le poulet, le veau, l'agneau : on peut faire prendre le soir des crèmes de riz, d'orge ou d'avoine, qu'on appelle avenat préparé à l'eau ou au laitage, ou bien avec les amandes douces.

SECONDE PRECAUTION.

Choix du Lait qui convient.

APRÈS s'être assuré de l'état de l'estomac, il faut se déterminer sur le choix du lait, ce qui dépend des différentes maladies qu'on a à combattre, ainsi s'il s'agit de nourrir & d'adoucir seulement, on donne le lait de vache; s'il faut adoucir & en même temps détremper, comme dans le virus cancreux, dans la goutte, le rhumatisme, dans les hystériques, les hypocondriaques, on préfère le lait d'ânesse; (voyez ce que nous avons dit ci-devant en parlant des cas où les différentes especes de lait sont indiquées) il faut cependant remarquer qu'il y a des estomacs qui supportent le lait de vache, & qui ne peuvent soutenir celui de chevre,

ni celui d'ânesse & *vice versâ*, alors on ne doit point s'obstiner à donner le lait qui paroît le plus indiqué, & qui, si l'estomac pouvoit s'en accommoder, produiroit de meilleurs effets, mais il faut s'accommoder, pour ainsi dire, à l'habitude de l'estomac, & donner le lait qu'il supporte le mieux & qui ne laissera pas que de produire de bons effets, quoique moins considérables.

T R O I S I E M E P R E C A U T I O N.

Attention qu'on doit avoir sur l'animal qui doit fournir le Lait.

IL faut que l'animal qui doit fournir le lait soit sain & d'un âge médiocre, c'est-à-dire, ni jeune ni vieux, & s'il s'agit d'une vache, il faut qu'on lui ait ôté quelque temps auparavant son veau, & qu'elle n'ait pas été couverte depuis, en sorte que le lait soit pour ainsi dire d'un âge médiocre. En hiver il faut nourrir la vache de foin, d'orge, de paille de froment, de son, en été on doit la nourrir de bonne herbe, d'un lieu qui ne soit pas trop humide ni marécageux; quelques-uns recommandent de nourrir l'animal avec des plantes appropriées à la maladie que l'on traite, par exemple, dans le scorbut, avec des plantes antiscorbutiques. Cela est assez inutile & peut même être dangereux, comme dans le cas de scorbut chaud; car les plantes antiscorbutiques échauffent, & par conséquent elles seroient capables d'attirer & de vicier le lait dans un cas où l'on a besoin d'un remède adoucissant & propre à tempérer l'âcreté des humeurs.

Q U A T R I E M E P R E C A U T I O N.

Moyens qu'il faut prendre pendant l'usage du Lait pour empêcher qu'il ne s'aigrisse dans les premières voies.

IL est bon de prendre quelques précautions lorsqu'on doit faire continuer pendant long-temps l'usage du lait; c'est dans cette vue qu'on recommande de purger de temps en temps les malades de quinze en quinze jours d'abord, & ensuite de mois en mois, & de leur faire prendre de deux en trois jours un bol stomachique pour prévenir l'acescence ou la corruption même & la putréfaction du lait, bol qu'on répète plus ou moins suivant que l'estomac l'exige. On connoît que le lait passe bien lorsque le malade le prend avec plaisir, qu'il le désire même, lorsque
le

le lait n'excite point de rapports , soit insipides , soit aigres , qu'il ne cause point de cours de ventre ni de constipations , qu'il ne pèse pas sur l'estomac , qu'il se distribue bien , comme les malades le savent bien dire eux-mêmes , & qu'ils rendent les excréments à l'ordinaire & colorés comme dans l'état naturel & qu'ils ne sont point altérés d'une soit un peu considérable. Mais si le malade , après avoir pris le lait , éprouve la soif , le vomissement , les nausées ou envie de vomir , s'il se plaint de pesanteur d'estomac , s'il a des diarrhées , ou bien s'il est constipé , il faut tourner son attention vers l'estomac , & avoir recours aux médicaments convénables. Ainsi dans le cas des diarrhées , si elles dépendent du relâchement de l'estomac , comme cela arrive le plus souvent , il faut purger les malades avec les toniques , comme avec la rhubarbe & ajouter les stomachiques chauds ; dans le cas de la constipation , on ajoute aux bols qu'on fait prendre la rhubarbe , c'est un remède polycrèste qui convient dans les diarrhées , dans les constipations , ou bien on fait une légère infusion de rhubarbe ; si malgré ces précautions le lait ne passe pas bien , il faudroit en diminuer les doses ; on commence par diminuer celle du soir ou même on la retranche tout-à-fait , puis celle du matin & ainsi de suite , mais il ne faut pas retrancher le lait brusquement , il faut le faire petit à petit , & en tâtonnant , pour ainsi dire , les forces de l'estomac , parce qu'on a observé que le lait passe quelquefois avec difficulté dans les commencements & qu'ensuite il passe bien : il y en a aussi qui ne peuvent pas supporter la diète forte ou la diète blanche , & qui soutiennent assez bien la diète médiocre ; il faut avoir égard à toutes ces circonstances , couper le lait plus ou moins , donner les stomachiques ; ce n'est qu'après avoir tenté tous ces moyens qu'on doit tenter intérieurement le lait seul , & on ne doit pas le faire brusquement , comme nous avons dit , excepté cependant dans des cas pressants , comme dans le cas de vomissement , de diarrhées , de coliques , &c.

Bouillons adoucissants.

IL y a des personnes qui ne peuvent pas absolument supporter l'usage du lait : on leur substitue alors les bouillons adoucissants , tels que les bouillons de poulet , de grenouille , de tortue , & on en voit souvent de très-bons effets.

Bouillons & eau de poulet.

ON prépare avec les poulets le bouillon & eaux de poulet.

Cas.

LES bouillons de poulet conviennent dans tous les cas où le petit lait & le lait d'ânesse conviennent ou paroissent indiqués, dans toutes les maladies chroniques où les solides sont tendus, le sang épaissi par secheresse, dans les affections hystrériques & hypocondriaques, dans les calculeux, les gouteux, dans la dissolution putride du sang, dans le scorbut chaud, dans la phthisie, dans les ulcères internes, dans les consumptions qui s'ensuivent de ces ulcères, & en général toutes les fois qu'il faut délayer & donner un peu de consistance au sang. L'eau de poulet s'emploie non-seulement dans les maladies chroniques dont nous venons de parler, mais encore dans les maladies aiguës inflammatoires, sur-tout lorsque l'inflammation est érépisplanteuse, & qu'il y a soif & ardeur, on l'ordonne alors pour boisson ordinaire : on s'en sert aussi dans les affections des premières voies qui dépendent des matières âcres, comme dans la dysenterie, mais sur-tout dans le *cholera morbus*, qui est un vomissement joint à la diarrhée : nous avons dit ailleurs qu'il ne faut pas arrêter le vomissement dès le commencement par les narcotiques, mais qu'il faut au contraire l'aider. L'eau de poulet est très-propre pour cela ; *Sydenham* n'employoit gueres que cette eau de poulet, qu'il faisoit prendre, soit par la bouche, soit sous forme de lavement pour guérir le *cholera morbus*, & c'est le remède qui convient le mieux, sur-tout lorsque les solides sont tendus. Le mucilage dont cette eau est imprégnée, est très-propre à les adoucir en même temps qu'elle enveloppe les parties âcres qui irritent les premières voies. Pour faire les bouillons de poulet, on prend un jeune poulet de huit ou dix onces tout au plus, on l'écorche en vie & on l'éventre, c'est-à-dire, on lui ôte les entrailles & les viscères, on le coupe par quartier & on le met tout chaud dans suffisante quantité d'eau ; on peut y ajouter, (& alors on laisse le poulet entier après l'avoir éventré) on peut, dis-je, y ajouter demi-once des semences froides, ou bien cinq ou six amandes douces, ou bien une ou deux cuillerées de riz dont on farcit le ventre, & alors les bouillons sont encore plus adoucissants : on fait bouillir le poulet seul pendant deux heures ou deux heures & demies, ayant soin de bien couvrir le pot, de peur que les parties salines volatiles qui sont extrêmement utiles ne s'exalent, pré-

caution qu'il faut prendre toutes les fois qu'on emploie des parties animales , après quoi on ajoute les autres médicaments , comme les écrevilles & les plantes appropriées , suivant les indications qu'on a à remplir , & on fait bouillir encore pendant demi-heure , ensuite on coule le tout & on le fait prendre. Dans les maladies aiguës on peut ajouter quelquefois un poulet aux autres viandes dont on fait le bouillon , qui devient par ce moyen plus adoucissant.

Maniere de faire l'eau de Poulet.

L'EAU de poulet se fait à peu près comme le bouillon , avec cette différence pourtant qu'on emploie une beaucoup plus grande quantité d'eau , & qu'on fait bouillir moins de temps : on fait bouillir le poulet éventré & coupé par quartier dans trois ou quatre livres d'eau pendant demi-heure seulement ou trois-quarts d'heure tout au plus.

Cas.

DANS le cas de passion hystérique ou hypocondriaque , lorsque les solides sont fort tendus , desséchés & très-irritables , & que les fluides sont extrêmement âcres , on commence ordinairement le traitement par la saignée lorsqu'elle est indiquée , & par une purgation ; mais les purgatifs même les plus légers pourroient exciter dans ce cas-là de trop grandes irritations , des convulsions ; c'est pourquoi on fait précéder pendant deux ou trois jours l'eau de poulet. M. de la Mure s'est très-bien trouvé d'ajouter quelques feuilles de menthe à l'eau de poulet pendant l'ébullition dans les cas de vomissement extraordinaire , soit dans le vomissement qui vient à la suite d'une attaque de passion hystérique , soit dans le *cholera morbus*. La menthe est stomachique , antihystérique & un antivomitif. L'efficacité soit de l'eau ou des bouillons de poulet , dépend du mucilage qui se trouve répandu dans la liqueur où l'on fait bouillir le poulet ; de plus ce mucilage ne tourne pas si aisément vers l'alkali & fermenté plutôt acéteusement.

Les Grenouilles , Ranæ.

ON emploie dans les mêmes cas où nous avons dit que les bouillons de poulet conviennent , les grenouilles , principalement dans les bouillons : on se sert pour cela des cuisses , après les avoir dépouillées de leur peau : on prend les cuisses de trois ou quatre grenouilles , on les joint le plus

souvent au poulet & au veau , il est rare qu'on les emploie seules pour former des bouillons. Le mucilage qu'elles donnent est extrêmement analogue à celui du poulet , mais il est un peu plus rafraîchissant , & donne un peu plus de consistance aux humeurs.

La Tortue , Testudo.

ON se sert principalement des bouillons de Tortue en cas de phthisie , d'ulcère des poumons avec acrimonie , dans toutes les affections cutanées dépendantes d'une lymphe âcre & épaissie par sécheresse , comme dans la gale , la lepre , dans le cas de scorbut chaud où le sang est âcre & dissout , & généralement dans tous les cas où le lait convient. Les bouillons de tortue sont extrêmement gélatineux , ils poussent légèrement vers la peau & par les urines , c'est la raison pour laquelle ils sont recommandés dans les maladies cutanées , dans le scorbut chaud. On emploie rarement les tortues seules , on les ajoute le plus souvent aux bouillons de poulet : on prend une tortue dont on rejette l'écaille , la tête , la queue , les pattes , & on réserve seulement le cœur , le foie , le sang & la chair ; si elle est petite , comme elles le sont dans ce pays-ci , on l'emploie entière ; si au contraire elle est plus considérable , on n'en met que la moitié. La dose ordinaire est de quatre ou cinq onces , on fait bouillir le poulet seul pendant une heure ou une heure & demie , après quoi on y ajoute les parties mentionnées de la tortue , ayant soin de couvrir exactement le pot dans lequel la coction se fait , comme nous avons dit en parlant du poulet. On emploie le plus ordinairement les bouillons de tortue dans le cas de fièvre lente , de phthisie , mais ils ont un inconvénient qui est qu'à cause de leur viscosité ils pesent sur l'estomac , & passent difficilement , on peut parer en quelque façon , à cet inconvénient , en préparant le malade , comme l'on fait pour le lait , avant que de faire usage de ces bouillons ; on peut aussi ajouter aux bouillons même de tortue quelques stomachiques , comme la racine d'Enula-Campana ; les feuilles de menthe , de lierre terrestre sur-tout dans la phthisie.

S E C T I O N D E U X I E M E.

Altérants particuliers ou spécifiques.

CE sont des médicaments que l'usage a conservé comme propres à combattre quelques vices particuliers de quelques viscères , comme par exem-

ple , les stomachiques , les céphaliques , ou comme appropriés à quelques affections ou à quelques maladies particulieres , comme les antihystériques , les fébrifuges : nous allons en faire le détail en commençant par les stomachiques.

Les Stomachiques.

Nous suivrons ici la même méthode que nous avons suivie dans les autres classes. Nous exposerons d'abord ce qu'on entend par stomachiques , ensuite les effets qu'ils produisent , puis les cas où ils conviennent , ceux où ils sont contre-indiqués , & enfin les précautions qu'il faut prendre dans leur usage. 1°. L'on entend par stomachique en général des médicaments propres à rétablir les fonctions de l'estomac ; pour avoir une idée plus exacte de ce qu'on doit entendre par stomachique , nous considérerons les différentes fonctions de l'estomac que ces médicaments rétablissent , les différentes maladies , ou les différentes vices qui peuvent déranger ses fonctions , & enfin les causes de ces différentes maladies. Les principales fonctions qu'on rapporte à l'estomac , sont la faim & la digestion ; la faim est le desir des aliments solides nécessaires à cette nourriture , desir occasionné par une sensation qu'on rapporte à l'estomac ; la digestion qui se fait dans l'estomac est le changement des aliments en ce qu'on appelle chyle ou matiere chyleuse. La fonction de la faim peut être dérangée de plusieurs manieres ou par plusieurs vices ; car ou elle est entièrement abolie , & c'est ce qu'on appelle inappétence , ou elle est simplement diminuée sans être entièrement abolie , & on l'appelle encore inappétence en françois , parce qu'on n'a pas d'autre terme. Cette fonction peut être dérangée par le dégoût , ou par un appétit dépravé , & c'est ce qu'on appelle dans les pâles couleurs des filles & des femmes *pica* , & dans les femmes grosses , *malacia* , quoique plusieurs Auteurs ne distinguent point ces deux maladies , attendu qu'elles dépendent de la même cause. Enfin la fonction de la faim peut être dérangée par excès ou lorsqu'elle est trop augmentée , comme il arrive dans la faim canine & la boulimie , qui selon quelques Auteurs , n'est autre chose qu'une faim excessive , le mot boulimie se prenant souvent chez les Grecs pour signifier quelque chose de grand , quoique *Bous* signifie bœuf , & qu'on puisse entendre par boulimie , faim de bœuf. La seconde fonction de l'estomac est la digestion qu'on appelle aussi coction ; elle peut aussi être dérangée de plusieurs façons , car elle peut être entièrement abolie , en sorte que les aliments ne souffrent presque aucun changement dans l'estomac & dans les premieres voies , c'est ce qu'on appelle

appepsie qui se trouve dans la lienterie , espece de flux de ventre dans lequel on rend les aliments cruds ou sans être digérés peu de temps après les avoir pris. Les anciens croyoient que cette maladie venoit de ce que les rides de l'estomac & des intestins étoient effacées par des matieres glai-reuses & visqueuses qui enduisoient leurs parois & les rendoient pour ainsi dire polies & glissantes , en sorte que les aliments glissoient & s'échappoient avant d'être digérés , & c'est delà que vient le mot de lienterie. M. *Hecquet* a fait voir ou plutôt a prétendu que la lienterie ne dépendoit pas de ces rides effacées , mais seulement de l'action trop vive & trop précipitée de l'estomac & des intestins , lorsqu'il y a tension & une légère phlogose ; il ne reconnoît pas d'autres causes de la lienterie. Pour prendre un juste milieu entre ces deux sentiments , qui est le parti le plus sûr en fait d'observation , on peut admettre l'une & l'autre cause & reconnoître deux especes de lienterie , l'une dépendante des rides effacées de l'estomac & des intestins , & l'autre produite par l'action augmentée des premieres voies. M. *de la Mure* a vu deux ou trois lienteries dans des vieillards , & il les a observées produites par la cause que M. *Hecquet* reconnoît , ce qui paroïsoit , soit par les symptomes , comme la soif , l'ardeur , la chaleur , soit par les remedes qui les soulageoient , qui étoient les adoucissans , les rafraîchissans. La coction est aussi dérangée par la difficulté de digérer , qu'on appelle *dipepsie* , qui se trouve lorsque la digestion se fait bien à la vérité , c'est-à-dire , que les aliments sont changés en une matiere propre à donner un bon chyle & qu'ils donnent effectivement , mais que le malade pendant le temps de la digestion sent une espece de mal-être , un gonflement & une pesanteur d'estomac. La digestion est encore dérangée par la *bradipepsie* qui est une digestion lente qui arrive lorsque quatre ou cinq heures après le repas , les personnes sentent une pesanteur d'estomac ; cette pesanteur ne dépend point du poids absolu des aliments , puisque peu après le repas , ce poids doit être plus grand que quatre ou cinq heures après , le ventricule ne contenant pas autant d'aliments quatre ou cinq heures après avoir mangé , qu'il en contenoit immédiatement après le repas ; mais cette pesanteur dépend d'un poids relatif aux forces de l'estomac , c'est-à-dire , que les forces de l'estomac sont telles qu'elles peuvent bien supporter les aliments pendant trois ou quatre heures tout au plus sans en sentir le poids , & qu'il est même habitué à cela ; mais ces forces étant pour ainsi dire épuisées au bout de ce temps , si les aliments se trouvent bornés encore dans ce viscere , ils doivent peser , & cette pesanteur dépend aussi du poids relatif aux forces de l'estomac. Dans ce cas qui arrive

assez souvent , le chyle ne laisse pas d'être bon , quoique travaillé lentement. Enfin la digestion peut être dérangée par diapetore , c'est-à-dire , par crudité ou par corruption d'aliments dans les premières voies ; car par crudité , on entend une coction dans laquelle les aliments souffrent à la vérité des changements dans les premières voies , mais sans être assimilés à nos humeurs & en prenant un mauvais caractère. On distingue plusieurs fortes de crudité qui constituent tout autant de coctions lésées , 1°. la crudité insipide dans laquelle les rapports ne sont ni aigres ni nidoreux , mais insipides , les malades se plaignent en même temps de beaucoup de pesanteur d'estomac ; 2°. la crudité acide lorsque les aliments contenus dans l'estomac tournent vers l'acide , ce qu'on connoît par les rapports amers ou brûlants ; 4°. enfin la crudité nidoreuse ou putride qu'on connoît par les rapports nidoreux ; tels sont les vices qui dérangent les deux principales fonctions de l'estomac : passons aux causes. La digestion de la part de l'estomac dépend de l'action des solides & de celle des fluides ; les aliments se dissolvent dans l'estomac , & cette dissolution est aidée d'abord par un commencement de mouvement intestinal , soit acide , soit putride : ce mouvement dépend du mélange qui se fait des aliments avec les suc gastriques , ces suc doivent être salins & savonneux. Quant à l'action des solides de la part de l'estomac , les fibres de ce viscere doivent être agitées d'un mouvement successif improprement appelé péristaltique , ce mouvement agite légèrement les aliments d'un côté à l'autre , les retourne de plusieurs façons , afin qu'ils soient mieux exposés à l'action des suc digestifs & qu'ils en soient pénétrés : il faut donc à l'estomac dans l'état naturel , une certaine sensibilité , une certaine irritabilité & contractibilité , voilà pour la digestion. A l'égard de la faim , quelques-uns ont prétendu qu'elle dépendoit de l'acrimonie des suc de l'estomac produite par leur séjour dans les rides de ce viscere , acrimonie qui irrite les fibres de l'estomac ; les autres l'ont déduite du frottement de la membrane veloutée de l'estomac dont les rides augmentent à proportion qu'il est plus vuide ; d'autres enfin l'ont déduite de l'augmentation du sang dans les vaisseaux gastriques dans son état d'inanition , prétendant que le sang accumulé ainsi dilatoit les vaisseaux , agissoit *ad latera* , & pressoit les nerfs. Toutes les causes de cette espece peuvent concourir , mais il faut toujours la sensibilité de la part des fibres nerveuses , la seule irritation ne suffit pas même : il y a des irritations qui bien loin d'exciter la sensation de la faim , l'abolissent au contraire , il faut cependant une irritation qu'on ne sauroit déterminer. Il est évident que les fibres trop relâchées , la sérosité trop abondante , les fluides

trop épaissis enveloppant & aglutinant les membranes de l'estomac , doivent diminuer la sensibilité & empêcher la digestion ; d'un autre côté des solides trop actifs , des suc viciés , bilieux , âcres , peuvent aussi l'empêcher ou la troubler , & communiquer aux aliments ou au chyle qui en est exprimé un mauvais caractère. Ainsi les causes qui peuvent produire des dérangements , soit dans la coction , soit dans la faim , peuvent se réduire , 1°. à l'atonie des solides , à la ~~v~~apidité des fluides , à leur épaississement visqueux , ou bien à leur trop grande aquosité ; 2°. à la trop grande tension des solides & à la trop grande activité des fluides. Ces différentes causes peuvent se connoître aisément , en faisant attention aux signes suivants : un tempérament pituiteux , la diminution de l'appétit sans fièvre , sans chaleur , sans soit un goût de fadeur , des rapports insipides , une bouche pâteuse , indiquent l'atonie des solides & la rapidité des suc ; un tempérament bilieux , vif , des rapports bilieux , amers , brûlants , l'ardeur , la chaleur , la soif , donnent des indices de la trop grande tension , de la trop grande sensibilité des solides & de la trop grande activité , de l'âcreté ou même de l'alkalescence des fluides , delà suit naturellement la distinction des stomachiques ~~chauds~~ ^{en chauds et froids} . La raison s'en présente d'elle-même , en faisant attention à ces différentes causes ; lorsque le dérangement des fonctions de l'estomac dépend de l'atonie des solides , il est évident que pour y remédier , il faut employer des médicaments capables d'augmenter le ton trop diminué : or ces médicaments ne peuvent produire cet effet qu'en échauffant , ce sont les stomachiques chauds ; & au contraire lorsque ce dérangement dépend de la trop grande tension des solides , il faut diminuer le ton & le ressort des fibres de l'estomac : les médicaments que produisent cet effet , sont les stomachiques froids. Nous ne parlerons pas ici de ces derniers , parce qu'ils sont les mêmes que les diurétiques froids & les béchiques incrassants dont nous avons déjà parlé ; nous ne parlerons que des stomachiques chauds qui sont les stomachiques proprement dits , car quand on dit simplement stomachique , il faut entendre les stomachiques chauds. 2°. Les effets généraux des stomachiques chauds ou des stomachiques proprement dits , se réduisent à donner plus de ton & de ressort aux solides & plus d'activité aux fluides. 3°. Quant aux indications des stomachiques chauds , en se rappelant ce que nous avons dit des différents vices qui peuvent déranger les fonctions de l'estomac , des différentes causes d'où dépendent ces vices , & enfin des signes qui font connoître les causes de cette nature , il est aisé de voir les cas où ces médicaments sont indiqués. 4°. A l'égard des contre-indications , il est évident par tout ce que

nous avons dit , que les stomachiques chauds sont contre-indiqués dans les cas où les stomachiques froids sont indiqués, & *vice versa*. 5°. Pour ce qui est des précautions que l'on doit prendre dans l'usage des stomachiques , elles roulent principalement sur la distinction exacte que l'on doit faire des cas où les stomachiques chauds doivent avoir lieu ; il ne faut pas trop insister sur l'usage des stomachiques chauds quand on voit qu'ils ont produit leur effet : on peut en continuer l'usage pendant un ou deux jours , mais cesser après cela de peur de produire dans l'estomac un vice contraire à celui qu'on vient de combattre en augmentant trop le ton & le ressort ; enfin une autre précaution qu'on doit prendre dépend de la préférence qu'on doit donner à un stomachique chaud sur un autre ; préférence qui ne peut se faire que par la connoissance détaillée de ces médicaments à laquelle nous sommes par conséquent conduits naturellement. Nous avertissons auparavant que , sous cette classe , nous renfermons tous les médicaments carminatifs & les anthelmentiques , en remarquant seulement ceux que l'usage a consacré plus spécialement comme stomachiques ou carminatifs , ou enfin comme anthelmentiques. Les stomachiques chauds sont en même temps carminatifs & anthelmentiques & *vice versa*. La raison en est que les vers ainsi que les vents s'engendrent ordinairement par les crudités ou par des matières glaireuses ; les médicaments propres à donner plus de ton aux fibres de l'estomac & à diviser les matières , sont également propres à chasser les vents & les vers.

Stomachiques chauds , ou Stomachiques proprement dits.

NOUS avons déjà parlé d'un grand nombre de médicaments qu'on pourroit rappeler à la classe des stomachiques chauds , car on peut y rappeler tous les diurétiques chauds , de même que quelques purgatifs , tels que la rhubarbe , les mirobolans , les stimulans , comme la cannelle , le macis , les absorbans qui conviennent sur-tout dans le cas de crudité tournant vers l'aigre , les stegnotiques , excepté cependant le sang de dragon & l'alun. Pour se convaincre que les médicaments dont nous venons de parler , peuvent être rapportés aux stomachiques chauds , il suffit de faire attention aux effets généraux qu'ils produisent , ils augmentent le ton des solides , ils divisent les fluides trop épaissis. Nous parlerons encore en d'autres endroits de certains médicaments qu'on pourroit pareillement rappeler à cette classe , comme lorsqu'il sera question des fébrifuges. Nous

ne parlerons ici que de ceux qui sont le plus en usage sous ce point de vue , soit des stomachiques chauds , soit des carminatifs , soit des anthelmentiques.

L'Aloès ou Aloë.

IL est rare qu'on emploie l'aloès comme purgatif , c'est pourquoi nous le rangerons plutôt parmi les stomachiques : l'aloès est un suc épaissi tiré des feuilles d'une plante qui porte le même nom : on en distingue trois especes , savoir , l'aloès succotrin , l'aloès hépatique & l'aloès caballin : on ne trouve dans les boutiques des apothicaires que les deux premières especes ; on abandonne l'autre aux maréchaux pour l'usage des chevaux & autres animaux , d'où lui est venu le nom de caballin. Selon quelques Auteurs , on retire ce suc des fruits de la même plante ; le premier qu'on retire c'est l'aloès-succotrin qui est l'aloès le plus pur , ensuite vient l'aloès hépatique & enfin l'aloès caballin qui est le moins estimé , & qui est comme la lie des autres. D'autres , comme M. *Geoffroi* , prétendent qu'on ne tire point ces différentes especes d'aloès de la même plante , mais de deux plantes différentes ; selon ces Auteurs l'aloès succotrin est tiré de la plante appelée aloë , *succotrina angust spinosa flore purpureo* ; on coupe ses feuilles & on en exprime le suc dans un vaisseau ; on l'expose au soleil afin qu'elle s'épaississe & se durcisse , c'est l'aloès succotrin qu'on apporte , disent-ils , de *Succotora* : ils disent qu'on retire l'aloès hépatique de la plante appelée *aloë vulgaris* , on coupe fort menues les feuilles de cet aloë , on les pile & on les met dans un vaisseau approprié & on les y laisse pendant quelques jours , après quoi on en sépare la partie la plus claire qu'on fait épaissir au soleil , c'est l'aloès hépatique. La lie dont on la sépare forme , étant sèche , un extrait moins pur , qu'on appelle aloès caballin : quoi qu'il en soit de ces disputes , l'aloès succotrin est noirâtre , brillant & luisant , c'est pourquoi on l'appelle aussi aloès brillant ou luisant , il a une odeur forte , aromatique , qui n'est pas cependant désagréable , son goût est amer , astringent. L'aloès hépatique est plus foncé , moins brillant , plus compacte & plus sec , d'une odeur plus forte & plus désagréable , d'un goût plus amer , il a été ainsi appelé à cause de sa couleur qu'on a cru ressembler à celle du foie : nous aurons occasion de parler ailleurs de l'usage qu'on en fait à l'extérieur , nous ne parlerons ici que de son usage intérieur.

Cas.

L'ALOËS convient dans le cas de coction lésée dépendante de l'atonie avec tournure des fluides vers l'aigre , dans les cachexies , les pâles couleurs où il y a beaucoup de relâchement , dans la suppression des regles & des hémorroïdes , dans des corps cachétiques. L'aloès a la propriété pour ainsi dire , spécifique d'exciter des évacuations sanguines ; c'est pourquoi plusieurs Médecins n'osent pas s'en servir : on peut cependant l'employer lorsque les solides sont dans une grande atonie , que la bile n'est pas active & que les autres fluides sont aussi épais , vapides. On l'ordonne quelquefois comme purgatif , mais le degré de sa vertu purgative n'est pas bien déterminé , quelques-uns le rangent parmi les laxatifs ou les écoprotiques , d'autres parmi les purgatifs médiocres , d'autres enfin parmi les drastiques , il est rare qu'on l'emploie sous ce point de vue.

Vertus.

C'EST un bon stomachique , mais seulement dans le cas d'un grand relâchement des solides , un bon anthelmentique , bon apéritif lorsqu'il faut rétablir les excrétions sanguines qui sont supprimées contre l'ordre de la nature , pourvu cependant que cette suppression dépende du relâchement des solides & de l'épaississement visqueux des fluides. On doit l'éviter très-soigneusement dans ceux qui sont sujets aux excrétions ou évacuations sanguines.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON ne l'ordonne gueres seul à cause de son amertume , ni en infusion ni en décoction , on le prépare soit par la lotion , soit par la nutrition , comme l'on dit.

Lotion.

ON le lave de cette maniere : on le réduit en une poudre très-fine , on le délaye dans suffisante quantité d'eau , ensuite on le laisse précipiter pendant un quart-d'heure ou davantage , alors on verse dans un autre vaisseau par inclination ce qui est plus clair & ce qui surnage , & on le laisse sécher au soleil : si cette première lotion n'est pas suffisante , on la répète plusieurs fois , mais les meilleurs Auteurs regardent cette lotion comme inutile , & même elle diminue la vertu purgative de l'aloès qui réside dans la partie gommeuse,

Aloès préparé par nutrition.

ON dissout l'aloès pulvérisé dans le suc de roses ou de violettes ; on fait ensuite sécher à un feu doux sans faire de colature , on répète cela deux ou trois fois & on a un aloès rosat , c'est-à-dire , un aloès modéré & tempéré , avec l'extrait de roses ou de violettes. Ainsi préparé , l'on prétend qu'il n'excite point d'hémorragie , ce qui n'est pas cependant assez constaté. On n'est pas d'accord sur la dose de l'aloès , les anciens le donnoient comme altérant depuis dix grains jusqu'à vingt , & comme purgatif depuis une drachme jusqu'à trois : les modernes trouvent cette dose trop grande & ne le donnent que depuis dix grains jusqu'à vingt ou vingt-cinq ; il seroit encore plus prudent de commencer par une dose plus petite comme depuis trois ou quatre grains jusqu'à dix , on l'associe très-souvent à la myrrhe , à l'acacia , à l'hypociste : on l'incorpore avec quelque sirop approprié pour en former des bols ou des pillules. La dose de chacun de ces médicaments pour chaque prise , doit être de trois ou quatre grains. L'aloès entre dans presque toutes les pillules stomachiques , bien des gens croient que les fameuses pillules de Francfort ne sont autre chose que l'aloès préparé par nutrition , ainsi que nous l'avons déjà dit , la dose par conséquent en doit être la même.

Pharmacologie rationnelle.

L'ALOÈS est un composé de parties gommeuses. M. Bouleduc en faisant l'extrait des différentes espèces d'aloès , a observé que l'aloès succotrin contenoit moins de parties résineuses & plus de parties gommeuses que l'aloès hépatique. De plus il a observé que la partie résineuse n'est presque pas purgative , & qu'il n'y a que la partie gommeuse qui le soit , & même plus fortement lorsqu'elle a été séparée de la substance résineuse ; il assure que l'aloès succotrin purge plus doucement que l'hépatique , ainsi lorsqu'il est question de purger , on doit préférer l'aloès succotrin , mais si on veut l'employer comme stomachique , ou même pour l'usage extérieur , l'aloès hépatique doit avoir la préférence.

Aunée , Enula-Campana aut Helinium ou Helenium vulgare.

LA racine de cette plante est fort en usage comme stomachique , propre à donner du ton aux fibres de l'estomac. Cette racine est épaisse ,

charnue , partagée en plusieurs branches , brune en dehors , blanche en dedans , d'une faveur âcre , un peu amère , d'une odeur aromatique , douce & agréable lorsqu'elle est sèche ; c'est la seule partie de cette plante dont on se sert en médecine.

Cas.

ON s'en sert avec succès dans tous les cas où les fonctions de l'estomac sont dérangées par le relâchement des solides & par l'épaississement visqueux & la vapidité des humeurs , dans les affections vermineuses , dans les fièvres intermittentes qui sont ordinairement entretenues par le relâchement des solides , dans la cachexie œdémateuse , dans la chlorose , dans l'asthme humide , dépendant d'une lymphe épaisse & visqueuse , pour diviser cette lymphe & faciliter l'expectoration , dans les obstructions des viscères produites par des humeurs épaisses & visqueuses , dans les maladies qui dépendent de ces sortes d'obstructions , comme dans l'ictère froid , dans la suppression des règles dépendante du relâchement des solides & de la viscosité des fluides : quelques Auteurs la regardent comme un bon spécifique pour ceux qui ont fait un trop grand usage du mercure dans les véroles , & pour ceux qui sont atteints du tremblement des membres , à cause des exhalaisons mercurielles.

Vertus.

C'EST un bon stomachique , anthelmentique , carminatif , fébrifuge , apéritif , diurétique , béchique , emmenagogue.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON l'ordonne en substance , en infusion & en décoction. On en prépare aussi une conserve ; la dose de cette racine en substance réduite en poudre est depuis dix grains jusqu'à vingt-cinq ou demi-gros dans une ou deux cuillerées d'eau de cannelle , ou d'orge , ou dans du vin blanc. En infusion , on l'ordonne ordinairement depuis demi-once jusqu'à une & demie , on la fait infuser toute la nuit dans cinq ou six onces de vin , le matin on coule & on fait prendre au malade , mais cette dose nous paroît un peu forte , on ne devrait pas aller au-delà de demi-gros ou d'un gros tout au plus ; on la donne en infusion lorsqu'on la prescrit comme anthelmentique , & comme carminatif en décoction , on l'ordonne à la dose de demi-gros ou d'un gros dans huit onces de vin. On la prescrit de

cette façon dans le tremblement par les exhalaisons mercurielles , & dans le cas de ceux qui ont fait un trop grand usage du mercure ; on se sert de cette même décoction extérieurement pour laver le corps dans les affections cutanées , comme dans la gale : on l'ordonne aussi à la dose d'un gros jusqu'à deux ou trois dans les bouillons stomachiques qu'on fait prendre pour préparer à l'usage du lait : on en fait avec le sucre , une conserve qui s'ordonne à la dose d'une once ; la pulpe de cette racine , mêlée avec une suffisante quantité de beurre frais , forme un onguent recommandé contre la gale , mais on ne doit pas s'en servir avant d'avoir fait précéder les remèdes internes , la racine d'aunée agit par sa partie huileuse , aromatique.

Racine de Gentiane , Gentiana off.

C'EST la racine d'une plante qu'on appelle *Gentiana major lutea* ou *gentiana vulgaris major hellebori albi folio* : on ne se sert en médecine que de la racine de cette plante ; elle est épaisse , longue d'un pied plus ou moins & se partage en plusieurs branches , elle est fongueuse , brune en dehors , d'un jaune roussâtre en dedans , d'une odeur aromatique , d'un goût fort amer.

Cas.

ON s'en sert dans tous les cas où les stomachiques chauds conviennent , dans les maladies de l'estomac dépendantes de l'atonie des solides & de la viscosité des fluides , ou de leur trop grande sérosité ; dans les fièvres intermittentes , dans les obstructions du foie , de la rate , dans l'ictère , mais il faut toujours remarquer qu'on ne doit s'en servir que dans les cas où ces maladies dépendent de l'atonie des solides & de l'épaississement visqueux des fluides , principalement dans le cas des fièvres , on s'en sert aussi dans la suppression des règles & du flux hémorroïdal , & toujours avec relâchement des solides & épaississement visqueux des fluides. Les anciens , comme *Dioscoride* , recommandoient beaucoup cette racine pour la morsure des animaux enragés , sur-tout des chiens.

Vertus.

CETTE racine fournit un médicament stomachique , carminatif , antihelmentique , fébrifuge , apéritif , emmenagogue.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON ordonne cette racine en poudre depuis dix grains jusqu'à vingt ou vingt-cinq dans l'eau de chardon béni , de fumeterre , de genievre, &c. En infusion la dose en est depuis un scrupule jusqu'à trois dans l'eau commune ; on met , par exemple , trois scrupules de cette racine à infuser dans huit onces d'eau. En décoction , on la donne en plusieurs verrées , on prend six ~~onces~~ ^{*Drachmes*} de cette racine qu'on fait bouillir dans dix-huit onces d'eau jusqu'à diminution de trois onces , on donne cette décoction de quatre en quatre heures à la dose de six onces , de même que l'on prescrit le quinquina lorsqu'il n'a pas opéré , sur-tout dans les fièvres quartes rebelles. La vertu de la gentiane réside dans sa partie résineuse , huileuse & aromatique.

Chamædrys , la Germandrée ou Petit-Chêne.

ON se sert en médecine des fleurs ou des feuilles de cette plante. Les feuilles sont un peu ameres & aromatiques.

Cas.

ON s'en sert dans les maladies de l'estomac dépendantes du relâchement des solides & de l'épaississement visqueux ou de la vapidité des fluides , mais sur-tout dans les obstructions du foie , de la rate , toujours quand la bile est dans un état de vapidité & d'inertie & que la lymphe est épaisse & visqueuse. On s'en sert aussi dans les fièvres intermittentes tierces & même dans les fièvres quartes rebelles , & on les substitue au Quinquina. Les fièvres , comme nous le dirons en parlant des fébrifuges , doivent être distinguées , non-seulement par rapport à leur type , mais encore par rapport au vice des humeurs. Par rapport à leur type , on les divise en quotidiennes , tierces , quartes ; par rapport au vice des humeurs , en quotidiennes légitimes , en quotidiennes bâtarde , tierces légitimes , tierces bâtarde , quartes légitimes , quartes bâtarde , c'est dans les fièvres tierces , quartes bâtarde , rebelles , opiniâtres que convient la germandrée. Elle est célèbre chez les Egyptiens pour les fièvres intermittentes , selon Prosper Alpin , on la regarde spécialement comme fébrifuge. La germandrée est aussi bonne pour la goutte ^{*après*} ~~la~~ *Pic de la Mirandole*. On raconte que l'Empereur Charles-Quint passant par Gênes , les Médecins lui conseilloient comme un spécifique pour la goutte , la décoction de cette plante , dans du vin ou dans de l'eau dis-

tillée. M. de la Mure connoît des personnes goutteuses qui se trouvent très-bien du petit lait où l'on fait infuser la germandrée & qu'elles prennent plusieurs fois l'année. Elle est bonne encore contre les écrouelles, on s'en sert alors en décoction, on fait bouillir, par exemple, demi-poignée de fleurs de germandrée dans deux livres de vin blanc, jusqu'à diminution de la moitié & on en fait prendre six cuillerées par jour. On la recommande aussi dans la suppression des regles. M. Ray dit que les femmes d'Angleterre font un grand usage de la décoction de cette plante dans ce cas-là, & que dans quelques cantons de ce pays, on l'appelle la thériaque d'Angleterre.

Vertus.

LA germandrée fournit donc un médicament stomachique, carminatif, anthelmentique, apéritif, fébrifuge, hépatique, splénique, antipodagrique, antiscrophuleux, emmenagogue.

Maniere de s'en servir, Doses.

ON donne la poudre de Germandrée depuis dix grains jusqu'à vingt ou vingt-cinq dans du vin d'Alicante ou dans du bon vin vieux, ou dans l'eau de genievre ou de fumeterre, ou bien de chardon bénit, ou on l'associe aux autres stomachiques & on les incorpore avec quelque sirop convenable pour en former des bols; le sirop le plus approprié dans ce cas-là est celui d'absynthe: on l'ordonne ordinairement en infusion théiforme dans les fièvres intermittentes; on fait infuser par exemple une ou deux pincées de germandrée dans six ou sept onces d'eau. M. de la Mure l'a vu réussir de cette façon chez des personnes qui ne pouvoient supporter le quinquina; en décoction on l'ordonne depuis une poignée jusqu'à une & demie dans deux livres de liqueur qu'on fait bouillir jusqu'à diminution de moitié. La germandrée agit par sa partie huileuse aromatique.

Bayes de Genievre.

CE sont les fruits d'un arbrisseau qu'on appelle génévrier, *Juniperus vulgaris fructifera*. Le bois de cet arbrisseau est sudorifique, mais on ne s'en sert gueres que pour brûler, pour dissiper les mauvaises odeurs & corriger l'air-corrompu par les mauvaises exhalaisons. Les bayes de genievre sont des fruits sphériques, deux fois plus gros qu'un grain de poivre, noirs & couverts d'une poussière bleue, remplis d'une pulpe rousse d'une saveur âcre, aromatique, résineuse, douce, contenant trois osselets oblongs remplis d'une amande ou d'une graine oblongue.

Cas.

Cas.

LES bayes de genievre & leurs différentes préparations conviennent dans les différentes maladies de l'estomac dont nous avons parlé ci-devant; dans les cas de douleurs rapportées à l'orifice supérieur de l'estomac qui dépendent souvent des matieres glaireuses dans lesquelles sont renfermés des vents, dans les ventosités de l'estomac & des intestins; dans les coliques néphrétiques produites par des matieres sablonneuses, mais enveloppées par des parties glaireuses, visqueuses & tenaces, & qui, par conséquent, ne sont ni vives, ni tensives, ni inflammatoires; dans la difficulté d'uriner, à laquelle les vieillards sont sujets; dans la cachexie œdémateuse; dans l'hydropisie commençante; dans les pâles couleurs des filles. M. Chomel recommande fort pour la teigne des enfants un onguent fait avec les bayes de genievre pilées & bouillies avec du saindoux, mais il faut en même temps prendre des remedes internes, & évacuer les humeurs par un doux purgatif fait avec six ou huit grains d'aquila alba & trois ou quatre grains de diagrede purgatif qu'il faut employer avant, & pendant l'usage de l'onguent dont nous venons de parler.

Vertus.

LES bayes de genievre fournissent un médicament stomachique assez assuré, carminatif, anthelmentique, fébrifuge, apéritif, hydragogue, emmenagogue, lithontriptique, diurétique, mais seulement dans les cas où il n'y a point de chaleur, d'ardeur, de fièvre, ni de douleurs vives & encore moins d'inflammation.]

Maniere de s'en servir, & ses Doses.

ON prescrit les bayes de genievre à la dose d'une drachme jusqu'à trois & demies que l'on mange de temps en temps pendant la journée. On assure qu'elles ont produit de très-bons effets de cette façon dans les coliques néphrétiques; on prépare l'eau des bayes de genievre, distillée au bain marie, & on se sert de cette eau pour base des potions stomachiques à la dose de deux ou trois onces; on peut aussi la donner seule depuis trois onces jusqu'à six, soit avant le repas, soit plusieurs fois le jour. Le vin de genievre se fait avec les bayes que l'on pile & que l'on fait fermenter avec l'eau, jusqu'à ce qu'elle ait acquis une odeur & une sa-

veur vineuse , il est stomachique & anthelmentique. L'extrait ou le bol de genievre se prépare de deux façons , l'on pile les bayes , on en exprime le suc , on fait évaporer jusqu'à consistance de miel sans rien ajouter , ou en ajoutant de sucre , ou bien on prépare cet extrait ou ce bol de cette maniere : on prend huit onces de bayes de genievre récentes & succulentes , on les fait macérer pendant deux ou trois jours en un lieu chaud dans vingt-quatre onces d'eau ; on distille à un feu violent & on retire environ trois drachmes d'huile essentielle , très-pénétrante & d'une couleur jaune qui sort avec l'eau : on passe ce qui reste dans le vaisseau à travers une étoffe avec expression , on le fait épaisir à une douce chaleur jusqu'à consistance d'extrait. Cet extrait , comme stomachique & comme diurétique s'ordonne chez les vieillards qui ont difficulté d'uriner , depuis demi-gros jusqu'à un dans du vin vieux , dans l'eau de chardon bénit ou dans quelqu'autre liqueur convenable le matin à jeun , avant ou même après le repas : on peut prendre aussi cet extrait au bout d'un couteau. Il faut observer que les bayes de genievre ou une goutte de leur huile essentielle prise intérieurement , donne aux urines l'odeur des violettes , de même que la térébenthine. La vertu des bayes de genievre réside dans leur partie huileuse , aromatique , qui se manifeste en elle assez évidemment.

La Menthe , Mentha.

IL y a plusieurs especes de menthe qui sont d'usage en médecine ; la plus usitée cependant est celle qu'on appelle commune , ou le baume des jardins , *Mentha hortenſis rubra* , on se sert de ses feuilles dans les cas suivants.

Cas.

DANS l'inappétence soit parfaite soit imparfaite ; dans les coctions lésées par acidité , elle est regardée spécialement dans ce dernier cas comme spécifique , & en effet de tous les stomachiques , c'est celui qui corrige le mieux l'aigre. Elle est regardée par la même raison comme spécifique dans les vomissements & dans les diarrhées où les matieres sont acéscantes ; dans les affections hystrériques accompagnées de vomissement , dans la suppression des regles , dans les coliques venteuses.

Vertus.

C'EST un stomachique antiacide , antiémétique , anthelmentique , emmenagogue , carminatif , antihystrérique , apéritif.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON se sert du suc de menthe dépuré , soit par résidence tout simplement , soit après une légère ébullition ; on se sert aussi des feuilles en infusion & en décoction. Le suc de menthe s'ordonne depuis demi - once jusqu'à une : on l'adoucit avec un peu de sucre , on l'ajoute aux potions antihystériques qu'on fait avec le *Castoreum* & les gouttes anodines , on l'ajoute encore au petit lait : après la clarification on y en met deux cuillerées , c'est - à - dire , environ demi - once jusqu'à une ; le petit lait passe mieux. On ordonne les feuilles en infusion : on fait infuser théiformément cinq ou six feuilles de menthe dans six ou huit onces d'eau qu'on donne au malade pendant l'usage du lait , sur-tout lorsqu'il est à la diète blanche. Nous avons dit qu'il falloit alors prévenir la corruption du lait ; c'est dans cette vue qu'on fait prendre cette infusion tous les jours ou de deux en deux jours , ou de trois en trois jours , suivant l'état de l'estomac , demi-heure avant le lait. On les donne aussi en décoction ; on ajoute , par exemple , six ou sept feuilles de menthe à l'eau de poulet sur la fin de l'ébullition , sur-tout dans les cas où l'on donne l'eau de poulet ; dans les vomissements accompagnés d'ardeur , cas où l'on est obligé de continuer pendant quelque temps l'usage de cette eau. Les feuilles de menthe ajoutées à l'eau de poulet empêchent qu'elle ne relâche trop , & d'ailleurs corrigent la fadeur qui est insupportable à plusieurs personnes. La vertu de la menthe réside aussi dans sa partie huileuse , aromatique.

La petite Centaurée , Centaurium minus , Centaurea fel terræ.

ON se sert principalement des sommités fleuries , ou des feuilles , ou des fleurs de cette plante.

Cas.

ON les emploie avec succès dans tous les cas de coction lésée par atonie des solides & par viscosité ou par vapidité des fluides ; dans les cas d'inappétence , soit que l'appétit soit entièrement aboli , soit qu'il soit seulement diminué , toujours avec les conditions que nous venons de marquer de la part des solides & des fluides ; dans les fièvres intermittentes. Dans ce cas bien des gens les regardent comme spécifiques , quoiqu'en général tous les stomachiques soient fébrifuges ; dans les obstructions du foie , de la rate qui entretiennent ces fièvres intermittentes & qui sont produites

par le relâchement des solides & par l'épaississement visqueux des fluides ; dans la suppression des regles , du flux hémorroïdal avec le même caractère , car s'il y avoit tension des solides , chaleur , ardeur , soif , elles seroient nuisibles ; on s'en sert aussi avec succès dans les affections vermineuses dépendantes de coction lésée ; on regarde encore la petite centaurée comme très-bonne contre la morsure des animaux enragés.

Vertus.

C'EST un très-bon stomachique , très-bon fébrifuge , anthelmentique , apéritif , emmenagogue.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON s'en sert en substance , en infusion , en décoction : en substance , réduite en poudre , on l'ordonne depuis dix grains jusqu'à vingt ou vingt-cinq , ou seule ou délayée dans du vin d'Espagne , dans l'eau de fumeterre ou dans quelqu'autre eau appropriée , ou bien associée aux autres fébrifuges & incorporée avec le sirop d'absynthe. En infusion , on fait infuser théiformément une ou deux pincées des sommités fleuries de petite centaurée dans sept ou huit onces d'eau , on coule & on adoucit la colature avec un peu de sucre. En décoction , on en fait bouillir trois pincées dans une livre d'eau jusqu'à diminution d'un tiers ou d'un quart , on coule & on en fait prendre au malade cinq ou six onces dans les fièvres intermittentes de quatre en quatre heures , comme le quinquina , après avoir fait précéder les remèdes généraux , comme les cathartiques ou les émétiques , ou bien les cathartico-émétiques suivant les indications. Il y a beaucoup de Praticiens qui donnent la centaurée de cette façon au lieu du quinquina , dans les fièvres intermittentes. La vertu de la petite centaurée consiste dans sa partie huileuse , aromatique , moins volatile que dans la menthe , ce qui paroît en ce que la centaurée conserve mieux son amertume après la décoction.

La Camomille , Chamæmelum ou Chamomilla.

IL y a trois especes de Camomille , savoir , la Camomille ordinaire , *Chamæmelum vulgare* ; la camomille romaine & la camomille puante : on se sert des deux premières ordinairement & le plus souvent de la première seulement : on en emploie les sommités fleuries & les feuilles dans les cas suivants.

Cas.

LA Camomille convient dans tous les cas où les stomachiques en général conviennent : dans le cas cependant de coction lésée acide , on lui préfère les autres stomachiques dont nous avons déjà parlé ; mais comme fébrifuge , on ne peut lui préférer tout au plus que la petite centaurée : c'est un fébrifuge assuré. M. de la Mure a observé que des fièvres intermittentes opiniâtres qui n'avoient pas cédé au kina dispafoissoient par son usage. Elle doit être préférée aux autres stomachiques dans les cardialgies , ou dans les douleurs vives rapportées à l'orifice supérieur de l'estomac , lesquelles sont produites ordinairement par des vents qui distendent l'estomac : elle produit dans ce cas-là de bons effets en augmentant le ton de l'estomac. Par la même raison elle convient préférablement dans les coliques venteuses produites par des matieres aériennes , élastiques , raréfiées & retenues par des matieres glaireuses , visqueuses ; dans les douleurs vives de colique après les accouchements qui dépendent ordinairement des ventosités contenues dans le canal intestinal ; le bas-ventre paroît gonflé & renitent ; & dans le cas des coliques néphrétiques dépendantes des matieres sablonneuses engagées dans les tuyaux sécrétaires & excrétoires des reins , & enveloppées de matieres glaireuses & visqueuses sans caractère d'inflammation , sans chaleur , ni ardeur , ni fièvre ; on la croit encore bonne contre le virus scrophuleux.

Vertus.

C'EST un bon stomachique auquel on ne doit pas donner la préférence lorsque les dérangements de l'estomac ne causent point de douleurs vives flatueuses ; c'est un très-bon carminatif , excellent fébrifuge qu'on substitue au quinquina , & qui opere dans des cas où celui-ci a été quelquefois inutile ; lithontriptique ; diurétique.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON s'en sert en substance , en infusion & en décoction. Les fleurs de camomille en poudre s'ordonnent depuis dix grains jusqu'à vingt ou vingt-cinq ou demi-scrupule dans une ~~eau~~^{liqueur} appropriée , comme dans le vin ; l'eau de fumeterre ou on l'associe au sel d'absinthe & à l'antimoine diaphorétique , par exemple , on prend dix grains de fleurs de camomille pulvérisées , dix grains de sel d'absinthe , autant d'antimoine diaphorétique , & on incorpore le tout avec quelque ~~liquide~~^{sirop} appropriée pour en former des bols ,

qu'on donne de quatre en quatre heures dans les fievres intermittentes ; pourvu qu'elles se rencontrent dans des fujets qui pechent par relâchement dans les solides & par viscosité dans les fluides ou par aquosité , & non dans les tempéraments vifs , ardents & bilieux. En infusion on l'ordonne à pincées. On prend par exemple , une ou deux pincées de sommités fleuries de camomille , qu'on fait infuser théiformement dans six ou huit onces d'eau , qu'on fait prendre au malade dans le cas de cardialgie , de coliques venteuses , de tranchées vives après l'accouchement : en décoction on prend trois demi-poignées de camomille qu'on fait bouillir dans deux onces d'eau jusqu'à diminution de la moitié plus ou moins , suivant le besoin , on coule & on fait prendre cette décoction au malade par verrées de quatre en quatre heures dans les fievres intermittentes. Dans les coliques néphrétiques on a vu de bons effets de l'infusion ou de la légère décoction suivante. On prend deux poignées de fleurs de camomille ordinaire , on verse par-dessus deux livres de bon vin , on fait digérer sur les cendres chaudes pendant deux heures , on passe l'infusion en exprimant fortement , on la verse sur deux autres poignées de fleurs de camomille , on fait digérer de nouveau sur les cendres chaudes pendant le même espace de temps , on exprime fortement & on jette la liqueur sur de nouvelles fleurs pour la troisième fois , & on macere de la même maniere , enfin on fait bouillir légèrement & on passe cette décoction pour la dernière fois. On donne une cuillerée de cette légère décoction au malade de trois en trois heures. Cette décoction paroît si salée au goût , que si quelqu'un en goûtoit , sans savoir ce que c'est , il croiroit qu'on y a mis du sel marin : On peut encore se servir de cette décoction dans le virus scrophuleux. On se sert des fleurs & des feuilles de camomille en décoction pour les lavements dans le cas de coliques venteuses. On emploie aussi de la même façon l'huile de camomille : on prépare deux sortes d'huile de camomille ; l'une se fait par infusion , en faisant simplement infuser les fleurs de camomille dans l'huile commune ; l'autre se fait chymiquement par la distillation. On se sert ordinairement de celle qui se fait par infusion à la dose de demi-once jusqu'à une ou deux , on l'emploie principalement dans les coliques venteuses vives , sur-tout dans celles des nouvelles accouchées. On peut aussi s'en servir dans les lavements qu'on donne en pareil cas. L'huile distillée ne se donne que depuis une goutte jusqu'à trois ou quatre , elle échauffe beaucoup. On ne doit s'en servir que dans le cas où l'huile par infusion , n'auroit pas opéré. La vertu de la camomille réside dans sa partie huileuse , aromatique.

Abfinthium , Abfinthe.

IL y a deux efpeces d'Abfinthe employées dans les boutiques , favoir ; la grande abfinthe ou l'abfinthe à larges feuilles , & la petite abfinthe ou l'abfinthe à petites feuilles. Cette dernière eft plus ufitée , parce qu'elle eft moins amere que la première , & que d'ailleurs elle a à-peu-près les mêmes vertus.

Cas.

ON s'en fert abfolument dans tous les cas où la petite centauree convient , dans l'inappétance dépendante du relâchement des folides , dans les cachexies œdémateufes , dans la chlorofe. On la préfere aux autres ftomachiques dans les affections vermineufes , toujours avec le même caractère de relâchement des folides & d'épaiffiffement visqueux des fluides. Elle produit alors de grands effets , foit par fa grande amertume qui eft contraire aux vers , foit en divifant les humeurs glaireufes & visqueufes qui les entretiennent. On l'emploie auffi avec fuccès dans les fievres intermittentes , dans les obftruétions du foie & de la rate ; elle peut même fuppléer au défaut de la bile , lorsqu'elle ne coule pas par trop d'épaiffiffement , comme dans l'ictère froid.

Vertus.

L'ABSINTHE eft ftomachique , anticachetique , très-bon anthelmentique , bon fébrifuge , apéritif , emmenagogue ; dans le cas où la fuppreffion des regles dépend du relâchement des folides & de l'épaiffiffement visqueux des fluides , il ne faut pas en faire un trop long ufage , non plus que des autres ftomachiques , parce qu'elle donneroit trop de ton & cauferoit des inflammations , fur-tout dans les tempéraments chauds & bilieux qui font très-fufceptibles d'éréthifmes.

Maniere de s'en servir , Dofes.

ON fe fert des feuilles & des fommités fleuries de la petite abfinthe principalement ; les fommités en poudre s'ordonnent depuis dix grains jufqu'à vingt ou vingt-cinq dans l'eau de fumeterre , dans celle d'abfinthe même ou quelqu'autre appropriée , ou bien on l'associe aux autres ftomachiques & on les incorpore avec le fyrop d'abfinthe pour en former des bols. En infufion on en ordonne une ou deux pincées dans fix ou huit onces de vin blanc que l'on fait prendre le matin à jeun dans le cas

d'inappétence ou de coction lésée ; mais il faut remarquer que son long usage cause des vertiges , des engourdissements de tête ; c'est pourquoi plusieurs Auteurs ne les font infuser que dans l'eau , cette façon est moins dangereuse. Dans les fievres putrides où il y a des matieres glaireuses & visqueuses dans les premieres voies , on ajoute avec succès aux purgations , une pincée d'absinthe , elle n'est pas purgative , mais elle aide beaucoup l'action des purgatifs. *M. de la Mure* a souvent observé que dans ces sortes de fievres , les purgatifs les plus forts ne réussissoient pas toujours , & que des purgatifs plus doux produisoient de grandes évacuations en y ajoutant des fleurs de pêcher , & sur-tout de petite absinthe. Elle donne du ton à l'estomac trop relâché dans les cas que nous avons déterminé. Elle en augmente la sensibilité & fait que les purgatifs operent , au lieu que tout étant relâché , les médicaments purgatifs qui sont ordinairement résineux , se colent aux parois de l'estomac & des intestins , & causent des tranchées sans évacuations. On se trouve donc très-bien d'ajouter une pincée de petite absinthe aux purgations dans les fievres putrides principalement lorsqu'elles sont vermineuses. On peut l'ajouter sur la fin de la décoction , ou la faire simplement infuser avec les autres médicaments qui doivent composer la purgation , à la dose d'une ou deux pincées. On peut aussi se servir des sommités fleuries de petite absinthe en décoction : on prend une ou deux pincées de ces sommités qu'on fait bouillir dans deux livres d'eau jusqu'à diminution de la moitié plus ou moins. *M. de la Mure* a employé avec beaucoup de succès cette décoction à l'extérieur dans des ulceres vermineux : l'eau distillée d'absinthe sert de base aux potions stomachiques , vermifuges anthelmentiques , ou se donne seule depuis une once jusqu'à trois ou quatre , on peut ajouter un peu de sucre , soit à cette eau , soit à l'infusion & à la décoction d'absinthe. Le vin d'absinthe se prépare de deux façons , savoir en macérant pendant une nuit dans du vin des sommités seches d'absinthe , ou bien en jettant un faisceau d'absinthe seche coupée fort menue dans une livre de moût & laissant fermenter le tout ensemble. De quelque maniere que le vin d'absinthe soit préparé , on le donne le matin à jeun & même avant & après le repas depuis deux onces jusqu'à quatre , mais l'infusion d'absinthe dans l'eau est préférable pour la raison que nous avons dit ci-devant. Le sirop d'absinthe s'ordonne depuis demi-once jusqu'à une dans quelque liqueur appropriée. On s'en sert principalement pour incorporer les bols stomachiques , anthelmentiques. Le sel alkali fixe d'absinthe se fait par la lessive de cette plante brûlée que l'on passe & évapore jusqu'à siccité. On l'emploie spécialement comme fébrifuge

fuge & comme apéritif à la dose de dix grains jusqu'à vingt : on peut l'incorporer avec quelque sirop approprié. On le recommande aussi contre les vomissements dépendants des matieres aigres ou des matieres épaisses bilieuses ; on le dissout dans le suc de menthe. Il est très-bon aussi dans le *cholera morbus* , dans la passion iliaque & on le joint au suc de limon ; par exemple , on prend un scrupule de ce sel d'absinthe , deux cuillerées de suc de limon , deux cuillerées de suc de menthe , ou ce qui est le même un scrupule de sel fixe de petite absinthe , deux onces de suc de limon , deux onces de suc de menthe , on mêle & on prend le mélange deux ou trois fois le jour , l'ajoutant au bouillon que l'on fait prendre au malade , à la dose d'une cuillerée ou d'une cuillerée & demie. L'absinthe agit par son huile essentielle , aromatique.

La Poudre à Vers ou Contre-vers , Semen contra ou Sementina , Santolina , Barbotine.

C'EST une poudre composée de petites têtes oblongues , écailleuses , d'un verd jaunâtre , d'un goût désagréable , amer , d'une odeur aromatique , dégoûtante , avec de petites feuilles , de petits rejettons , ou de petites branches cannelées. Nous n'avons rien de certain sur la plante dont on la retire , & sur le pays où elle croît ; on doute même si c'est une poudre ou une capsule semilunaire ; quelques-uns croient que c'est la graine d'une espece d'absinthe ; quoiqu'il en soit c'est un très-bon anthelmentique , bon stomachique : on s'en sert principalement dans les affections vermineuses ; dans les fièvres putrides vermineuses , dans ce dernier cas , on l'ajoute souvent aux purgatifs ; dans les affections vermineuses , on la donne de la même façon que le petite absinthe , en poudre , c'est-à-dire , depuis dix grains jusqu'à vingt dans l'eau de fumeterre , ou dans celle d'absinthe , ou bien incorporée avec quelque sirop approprié sous forme de bol : elle est plus utile quand on la donne avec l'aquila alba ou la rhubarbe , par exemple , on prend dix ou quinze grains de poudre à vers , six ou huit grains d'aquila alba & quinze ou dix-huit grains de rhubarbe en poudre , on mêle avec suffisante quantité de sirop d'absinthe & on forme un bol que l'on fait prendre le matin à jeun & que l'on réitere pendant quelques jours : on la donne aussi en infusion & on décoction , comme la petite absinthe.

Les huit Semences chaudes.

SAVOIR, les quatre semences chaudes majeures, qui sont l'anis, le fenouil, le cumin & le carvi; les quatre semences chaudes mineures, qui sont l'ammi, l'ammome, le daucus & l'ache, on les appelle aussi les semences carminatives.

Cas.

CES semences conviennent dans la cardialgie, dans la tympanite ou dans l'hydropisie sèche, espèce de fausse hydropisie ainsi appelée, parce que dans cette maladie la peau du ventre est si fort tendue qu'elle rend du son comme un tambour, en frappant dessus: elle est produite par des matières aériennes, renfermées dans le bas-ventre, mais sur-tout dans la cavité de l'estomac & des intestins, comme la dissection des cadavres l'a souvent démontré; il arrive assez souvent que la tympanite succède à l'hydropisie invétérée, ce qui vient de la putréfaction des eaux épanchées; ces semences agissent en donnant du ton à l'estomac & aux intestins, & en atténuant les matières visqueuses & tenaces qui retiennent les matières aériennes: elles fournissent une huile essentielle, aromatique.

Maniere de s'en servir, Doses.

ON les donne en poudre, en infusion & en décoction: en poudre depuis dix grains jusqu'à vingt ou vingt-cinq incorporés avec le sirop d'absinthe, ou délayés dans du vin d'Espagne, dans du vin vieux, dans l'eau de camomille, de fumeterre, d'absinthe: en infusion depuis vingt grains jusqu'à trente ou quarante; on les pile grossièrement & on les fait infuser dans l'eau, ou le plus souvent dans du vin: en décoction depuis demi-gros jusqu'à un gros & demi sur douze ou quinze onces d'eau: qu'on fait bouillir jusqu'à diminution d'un tiers, d'un quart ou de la moitié, suivant le besoin: on en fait aussi des émulsions; par exemple, on prend deux gros de ces semences, on les pile dans un mortier, versant par-dessus l'eau d'orge ou l'eau d'absinthe, à la dose de six onces pour une prise. Si on veut donner cette émulsion pour boisson ordinaire, comme en cas de tympanite, la dose de ces semences doit être plus grande: on en prend, par exemple, demi-once pour sept ou huit verrées de ptisane émulsionnée. M. de la Mure les a vu réussir de cette façon dans le cas que nous venons d'indi-

quer : il ne faut pas trop insister sur l'usage de ces remèdes , non plus que sur celui des autres stomachiques , de peur de trop augmenter le ton de l'estomac.

Autres Spécifiques.

LES anciens Médecins fondés sur l'observation réitérée , reconnoissoient des médicaments spécifiques , c'est-à-dire , des médicaments appropriés aux différentes maladies de quelque partie ou de quelque viscere particulier , de-là venoit la distinction qu'ils en faisoient en stomachiques , hépatiques , spléniques , céphaliques , &c. Les modernes n'ont pas fait difficulté d'admettre l'action spécifique des stomachiques dont nous venons de parler , parce que ces médicaments étant immédiatement portés dans l'estomac , on conçoit très-bien comment ils agissent spécialement sur ce viscere , & comment ils sont propres à combattre les différents vices auxquels il est sujet : il n'en est pas de même des autres spécifiques ; il s'en trouve plusieurs parmi les modernes qui tournent en ridicule l'action spécifique de certains médicaments sur certains viscères , n'étant pas possible , disent-ils , que les médicaments soient portés par un privilege particulier , vers certaines parties déterminées. Mais outre que la doctrine des anciens est fondée , comme nous avons dit , sur des observations réitérées , & que pour cette seule raison on ne devoit pas la rejeter , si on prend la peine de l'approfondir un peu , on ne la trouvera pas si ridicule , & au fond elle n'a rien de bien extraordinaire : en effet tout le monde sait que les cantharides prises intérieurement , ou appliquées extérieurement , agissent spécialement sur les voies urinaires ; n'y a-t-il pas certains poisons , tel que le lierre marin , qui affectent spécialement le poulmon ? De plus , quoique les différentes humeurs qui se séparent de la masse du sang , soient portées dans tout le corps par la voie de la circulation , ne se séparent-elles pas cependant dans des viscères particuliers ? Pourquoi donc certains médicaments , quoique portés dans toutes les parties du corps par la voie de la circulation , n'agiroient-ils pas sur certaines parties ou sur certains viscères particuliers plus que sur d'autres ? Nous suivrons donc l'ordre des anciens , en continuant de parler des spécifiques , d'autant plus volontiers que quoique les modernes turlupinent les anciens sur l'action spéciale de ces médicaments , relativement à certaines parties déterminées , cependant dans la Pratique ils se conduisent comme les anciens , en donnant dans l'occasion , la préférence à ces médicaments ; & assurément on seroit moins porté à

traiter leur doctrine de ridicule , si on étoit aussi attentif & aussi exact qu'eux à faire des observations. Nous allons parler d'abord des hépatiques & des spléniques. Les noms d'hépatique & de splénique font assez voir que ce sont des médicaments propres à combattre les maladies du foie & de la rate ; nous les réunissons sous la même classe , parce que l'observation a montré que les médicaments propres à remédier aux maladies de l'un de ces viscères , sont propres à remédier aussi aux maladies de l'autre. Nous remarquerons cependant ceux qui sont le plus spécialement appropriés à chacun de ces viscères en particulier.

Hépatiques & Spléniques.

LE foie est peut-être de tous les viscères du corps humain celui qui est le plus exposé aux obstructions ; la rate est à-peu-près dans le même cas. Si on fait attention à leur structure , aux vaisseaux qui les composent , & à l'humeur qui se sépare dans le foie , on concevra sans peine que ces viscères peuvent être obstrués plus facilement que les autres : le cours du sang , son impulsion , sont beaucoup moindres par les veines que par les artères ; de plus le sang veineux ne circule pas dans le foie comme dans les autres parties. Le tronc qui fournit principalement au foie , est veineux ; les ramifications de ce tronc décroissent & dégèrent en petits vaisseaux propres à augmenter les frottements : ainsi le sang s'arrête plus facilement dans le foie , soit parce qu'il y est apporté par un tronc veineux , soit parce qu'il y est distribué par des ramifications veineuses. D'ailleurs la bile est une humeur visqueuse , épaisse , très-propre à se coller aux parois des tuyaux sécrétoires & excrétoires , par conséquent à s'arrêter plus facilement. Enfin les vaisseaux lymphatiques qui sont répandus en grand nombre dans le foie , tirent , pour la plus grande partie , leur origine des ramifications de la veine-porte dans lesquels le sang coulant plus lentement , la lymphe qui en est séparée doit participer de cette lenteur & couler plus difficilement dans les vaisseaux : ainsi la première & en même temps la plus fréquente maladie à laquelle le foie est sujet , ce sont les obstructions dépendantes des causes que nous venons de désigner : on peut en dire autant à proportion , de la rate , parce qu'il est évident que quand le sang est épais & coule difficilement , les obstructions doivent avoir plutôt lieu dans les viscères que par-tout ailleurs ; ces obstructions donnent lieu à d'autres maladies qui peuvent survenir à ces viscères , par exemple , aux tumeurs , qui deviennent sensibles lorsque les vaisseaux les plus extérieurs de ces viscères sont affectés : ces maladies arrivent sur-tout dans les tempéraments pituiteux , chez les mélancoliques. Les tumeurs dont

nous parlons, peuvent être flasques, lâches, & c'est proprement ce que les anciens appelloient tumeurs; ou bien elles peuvent être dures, schirreuses, & elles dépendent alors de la secheresse de la bile ou de la lymphe; enfin elles peuvent être inflammatoires. Le foie est plus sujet aux tumeurs inflammatoires que la rate: or il faut bien distinguer deux especes de ces inflammations; dans l'une la douleur est extrêmement vive, dans l'autre elle est sourde, la premiere est accompagnée des symptomes suivants: le malade ressent une douleur extrêmement vive & forte qu'il rapporte à l'hypocondre droit, il a une fièvre aiguë ardente, il est tourmenté par une soif presque inextinguible, le pouls est petit, la langue est enduite d'une croûte jaunâtre, qui devient noire dans le cours de la maladie, la bouche est amere, la respiration est difficile, courte, lente, la toux est seche, fréquente, ce qui peut venir de ce que le sang circulant difficilement par le défaut de respiration, agit fortement contre les parois des vaisseaux pulmonaires, l'acrimonie bilieuse peut y concourir aussi, il survient assez souvent un ictère jaune, mais chaud: il y a aussi une autre espece d'inflammation du foie qui fait des progrès sourdement, & qui occupe la partie concave & la partie convexe du foie; celle-ci est accompagnée d'une douleur gravative que les malades sentent quand ils marchent, qu'ils font de l'exercice, & quand on leur presse avec un peu de force, la partie affectée. Un meilleur moyen de découvrir cette affection ou de s'en assurer, est de faire faire une grande inspiration aux malades, car s'il y a inflammation, le foie se trouvant alors plus pressé par le diaphragme, la douleur augmente; outre cela on observe des symptomes qui marquent que la bile n'est pas bien distribuée, comme l'inappétence, les coctions lésées, le ventre est paresseux, les déjections n'ont pas leur couleur naturelle, elles sont cendrées, le blanc des yeux prend une teinte jaune, les malades se plaignent d'un goût amer; tels sont les signes de cette inflammation sourde. L'inflammation du foie peut se terminer par résolution, par induration ou bien par abcès & ulcères. Elle se termine alors souvent de cette dernière maniere, c'est ce qu'on connoît par les signes suivants; les symptomes augmentent d'abord, mais ils disparaissent ensuite peu-à-peu; il reste toujours une douleur gravative; il survient des frissons, des horripilations, la maigreur, les déjections sereuses semblables à la lavure de chair, c'est-à-dire, un flux hépatique. Quelquefois les déjections sont accompagnées de douleur & sont teintées de sang, & c'est alors une espece de dysenterie hépatique; les matieres paroissent être d'une substance paranchimateuse, corrompue, ou de la substance des visceres affectés, ce que la dissection des cadavres a fait

voir être vrai. Il survient ensuite un état cachectique, des leucophlegmaties, des enflures aux jambes, ensuite à tout le corps; les urines sont rouges, le visage prend la couleur d'un jaune verdâtre, ou bien quelquefois une couleur très-jaune, c'est la jaunisse qu'on appelle *aurigo*; enfin l'hydropisie ascite succède à tous ces symptômes: l'inflammation de la rate est beaucoup plus rare que celle du foie, on l'observe très-rarement; on la connoît à peu près par les mêmes symptômes que celle du foie, c'est-à-dire, par la douleur rapportée à l'hypocondre gauche, la fièvre, la soif, l'état cachectique, la suppuration survient aussi, & elle se termine comme l'inflammation du foie: de ce que nous venons de dire, il suit qu'on peut diviser les médicaments hépatiques en chauds & en froids: car les tumeurs dont nous avons parlé, peuvent être accompagnées de chaleur, douleur, de fièvre, de soif, d'âcreté dans les premières voies, & alors les hépatiques indiqués sont les diurétiques froids qu'on pourra regarder dans ces circonstances comme hépatiques froids. Mais si les maladies du foie dépendent d'un dessèchement des solides & de l'épaississement visqueux des fluides, qu'il n'y ait ni douleur ni ardeur ni soif, ce sont les hépatiques chauds ou hépatiques proprement dits qui sont indiqués; nous ne parlerons ici que de ces derniers, ils ont les propriétés générales des stomachiques, mais ils portent principalement leur action sur les viscères dont nous parlons.

Indications & contre-indications.

EN faisant attention aux maladies qui s'ensuivent des vices dont nous avons parlé ci-devant, on voit aisément les cas où les hépatiques sont indiqués & où ils sont contre-indiqués.

Précautions.

ELLES sont les mêmes que celles qu'on doit prendre dans l'administration des stomachiques. Il faut aussi bien distinguer les cas par rapport aux causes qui produisent les maladies, où ces médicaments conviennent. On peut ranger sous la classe des hépatiques, les cinq racines apéritives, les martiaux & les diurétiques chauds dont nous avons parlé. Il nous reste à examiner les médicaments qu'on a observé produire les meilleurs effets dans les maladies du foie & de la rate.

Fumaria, Fumeterre ou Fiel de terre.

C'EST un médicament très-usité dans les maladies du foie & de la rate.

Cas.

LA fumeterre convient dans les obstructions du foie & de la rate , dépendantes du relâchement des solides & de l'épaississement visqueux des fluides , comme par exemple , de la bile ou de la lymphe , avec inappétence & déjections des matieres blanchâtres , ce qui prouve la vapidité de la bile ; dans le gonflement ou la tumeur molle de la rate ; dans l'ictère jaune produite par les obstructions du foie , que nous avons dit plus haut être occasionnées par l'épaississement de la bile qui ne peut pas couler dans les intestins , ou du moins si elle y coule , elle est trop épaisse pour y produire les effets auxquels elle est destinée : on regarde aussi la fumeterre comme un remede excellent & presque spécifique dans les maladies cutanées , dans la gale , la gratelle , les dartres invétérées , &c.

Vertus.

LA fumeterre est un médicament hépatique , splénique , stomachique , qui convient dans l'inappétence , dans la coction lésée lorsqu'il faut donner du ton aux solides & diviser les fluides ; elle est spécialement diaphorétique , très-propre à dépurar le sang par la peau , suivant les Auteurs , & suivant les observations qu'ils ont donné là-dessus.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON ordonne les feuilles de fumeterre en poudre depuis dix grains jusqu'à vingt-cinq dans quelqu'eau appropriée , comme l'eau de menthe ; ou sous forme de bol en l'incorporant avec un sirop convenable comme les autres stomachiques ; en infusion on prend une ou deux pincées de ces feuilles , on les fait infuser théiformement dans sept ou huit onces d'eau ; cette infusion est fort amere , on peut l'adoucir avec un peu de sucre ; en décoction on l'ordonne sous forme de ptiſane & d'apozeme : on l'ajoute aussi aux bouillons apéritifs & hépatiques ; dans les bouillons on la prescrit à la dose de deux pincées , dans les apozemes apéritifs & hépatiques , on l'ajoute aux autres plantes à la dose de demi-poignée pour une prise , ou d'une poignée pour plusieurs ; mais il ne faut l'ajouter , soit dans les bouillons , soit dans les apozemes que sur la fin de la coction , parce qu'elle perd aisément sa vertu par une grande ébullition : ces apozemes conviennent dans les obstructions qui ne sont pas schirreuses , ni dures , de même que

les bouillons ; si les obstructions étoient tant soit peu durcies , si elles dépendoient d'un sang épais & âcre , il faudroit bien se garder de donner la fumeterre de la maniere que nous venons de dire , parce qu'elle échauffe beaucoup , mais on pourroit l'employer alors dans le petit lait , par exemple , en faire bouillir demi-poignée dans douze onces de petit lait : on se sert aussi du suc exprimé & dépuré des feuilles récentes , soit simplement par résidence , soit après une légère ébullition : la dose est depuis une once jusqu'à trois ou quatre de quatre en quatre heures , & on recommande au malade de marcher ou de monter à cheval. M. de la Mure a réussi par l'usage de ce suc dans un cas d'obstruction du foie avec inappétence & avec ictère jaune , à la suite d'une fièvre tierce mal guérie. On fait deux sortes de sirop de fumeterre , le composé & le simple : le simple se fait avec le suc de cette plante & le sucre simplement : on s'en sert pour incorporer les poudres hépatiques & stomachiques : seul on l'ordonne depuis demi-once jusqu'à une once & demie : le composé se fait avec les mirobolans , les feuilles de séné , &c. Les principes actifs de la fumeterre paroissent être les mêmes que ceux de la petite absinthe.

Aigremoine , Agrimonia seu Eupatorium.

Cas.

ON se sert de l'aigremoine dans tous les cas où les hépatiques proprement dits conviennent : on l'emploie plus spécialement dans l'inflammation sourde du foie , dont les symptômes ne paroissent pas d'abord fort considérables & qu'on connoît par ces signes : savoir , par une fièvre légère , par une douleur sourde , obscure , qui n'est sensible que lorsque le malade fait de l'exercice , ou qu'on lui presse l'hypocondre droit , ou enfin qu'on lui fait faire une forte inspiration ; qui est accompagnée d'inappétence & de dérangement dans les premières voies , la langue est enduite d'une croûte jaune ou noire ; il y a une teinte jaune sur toute l'habitude du corps , ou seulement sur le blanc des yeux. M. de la Mure l'a employé deux fois en pareil cas , & il a observé qu'elle pousse alors copieusement par les urines. On s'en sert aussi avec succès dans les ulcères du foie , lorsqu'il suppure sourdement à la suite d'une inflammation , dans les ulcères internes des autres parties , sur-tout dans les ulcères des reins , avec épanchement de sang. Par analogie , on pourroit l'employer dans les autres hémorragies , par exemple , dans l'hémoptisie dépendante du relâchement des vaisseaux pulmo-

naires, dans les regles immodérées, pareillement dépendantes du relâchement des solides, & de l'épaississement visqueux des fluides.

Vertus.

C'EST un très-bon hépatique, splénique, spécialement dans les cas que nous avons indiqués; c'est un bon détersif dans les ulcères du foie, des reins, flegmatique qui convient dans les hémorragies, vulnéraire.

Maniere de s'en servir, & ses Doses.

ON emploie l'aigremoine en infusion principalement. On peut aussi l'employer en décoction; on se sert encore de son suc; on pourroit aussi donner la poudre comme celle de fumeterre. On l'ordonne en infusion à la dose d'une pincée ou de deux sur sept ou huit onces d'eau; on fait infuser théiformément, & on ajoute, si on veut, un peu de sucre: c'est de cette façon que M. de la Mure l'a employé dans le cas ci-devant. En décoction à la dose de demi-poignée ou d'une poignée, on l'ajoute aux apozèmes & aux bouillons apéritifs sur la fin de la cuisson. Lorsque les fluides sont épais & visqueux, les solides extrêmement relâchés sans aucun caractère d'inflammation, il faut préférer la fumeterre qui est plus active. On se sert aussi du suc d'aigremoine de la même manière & à la même dose que celui de fumeterre. Ses principes paroissent être les mêmes que ceux de la fumeterre, mais ils sont un peu moins énergiques.

Le Cerfeuil, Cerefolium ou Chærophylum.

Cas.

ILS sont les mêmes que ceux où l'aigremoine convient. On s'en sert spécialement dans les obstructions du foie & de la rate qui tendent à la production de la cachexie; quelques Auteurs le regardent même comme spécifique dans les hydropisies dépendantes des obstructions des viscères du bas-ventre. On s'en sert aussi dans le cas de sang extravasé, après une contusion, ou après une chute, pour résoudre le sang grumelé. Le cerfeuil haché & appliqué extérieurement produit cet effet. On peut s'en servir aussi intérieurement dans le même cas. Par la même raison, on l'emploie dans le cas des tranchées ou des douleurs vives des nouvelles accouchées, & on lui donne même la préférence sur la camomille, lorsque ces douleurs ne dépendent pas tant des matières aériennes, que de quelques

grumeaux de sang qui empêchent le cours libre des vuidanges. On s'en sert aussi pour provoquer les urines, & les Auteurs assurent qu'il produit cet effet, non-seulement quand on le prend intérieurement, mais même appliqué extérieurement sur la région hypogastrique. On le fricasse avec le beurre frais dans la poêle, & on l'applique ainsi sur l'hypogastre dans le cas d'ischurie vraie. M. Chomel dit que M. Tournesort lui a assuré que cette plante jointe à égale quantité de bétoine & appliqué sur l'hypogastre dans l'ischurie vraie, avoit produit une excrétion de quatre livres d'urine.

Vertus.

LE Cerfeuil est un très-bon hépatique qui doit être préféré aux autres, dans le cas où les embarras du foie tendent vers la production d'enflure, de bouffissure œdémateuse, antihydropique, atténuant, dans les cas d'extravasation de sang, emmenagogue, diurétique assez actif, quoiqu'il échauffe peu : il ne faut cependant pas en continuer l'usage trop longtemps, il exciteroit la toux & d'autres symptômes fâcheux ; on ne doit pas non plus le prescrire à ceux qui crachent le sang.

Maniere de s'en servir, & ses Doses.

ON emploie les feuilles de cerfeuil principalement en décoction, dans les bouillons apéritifs, & extérieurement de la façon que nous avons dit ci-devant ; on se sert aussi du suc de cette plante. Le suc exprimé de cerfeuil & dépuré par simple résidence, ou après une légère ébullition, s'ordonne depuis deux onces jusqu'à quatre ou cinq deux fois par jour, le matin & le soir. On peut le donner seul, ou bien ce qui est encore mieux, y joindre les cloportes. Pour cela on pile bien les cloportes dans un mortier, & on y verse par dessus ce suc. On peut l'employer ainsi dans la cachexie œdémateuse, dans l'hydropisie commençante, dépendante des obstructions des viscères du bas-ventre : c'est aussi un bon fébrifuge dans le cas des fièvres erratiques qui surviennent vers la fin de l'été, ayant fait précéder les purgatifs. M. de la Mure s'en est servi avec succès dans ces circonstances. Si on attaquoit ces sortes de fièvres par le kina, elles se fixeroient en fièvres intermittentes, quotidiennes ou quartes. On emploie les feuilles de cerfeuil en décoction, on en fait bouillir légèrement demi-poignée ou une poignée dans une livre d'eau, & on prend de cette décoction par verrées depuis six onces jusqu'à huit. On s'en sert de cette façon

dans les coliques des nouvelles accouchées , que nous avons désigné ci-devant. On l'ajoute aussi aux bouillons apéritifs à la dose d'une ou de deux poignées sur la fin de l'ébullition. Dans le cas d'hydropisie , M. Geoffroi recommandoit extrêmement le remede suivant qu'il regardoit comme spécifique : il prenoit six poignées de cerfeuil récemment cueilli , une livre de veau coupé par tranches & une drachme de sel de prunelle ; il les mettoit dans un pot de terre ; couche sur couche ; il couvroit bien le pot , & faisoit bouillir au bain marie pendant quatre ou cinq heures dans un chaudron plein d'eau ; ensuite il exprimoit le suc de cette décoction , & le donnoit à la dose de six onces de quatre en quatre heures. Les principes dans lesquels réside la vertu du cerfeuil , sont plus volatils encore que ceux de l'aigremoine ; c'est pourquoi on doit avoir attention de ne le pas trop faire bouillir & de couvrir exactement le pot.

Le Houblon , Lupulus mas & femina.

ON se sert des racines , des jeunes tiges de cette plante & de ses feuilles.

Cas.

LE houblon convient dans tous les cas où les hépatiques en général conviennent , & dans ceux en particulier où le cerfeuil est approprié , comme dans les obstructions du foie qui tendent à la cachexie œdémateuse , à la leucophlegmatie , à l'anasarque , à l'hydropisie ; dans l'hydropisie commençante : dans tous ces cas cependant on lui préfère le cerfeuil. Le houblon est recommandé spécialement dans l'alopécie ou chute des cheveux occasionnée par la vérole , le scorbut , la phthisie ; il pousse principalement par les urines.

Vertus.

C'EST un médicament hépatique , splénique , diurétique chaud , sudorifique.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON ordonne le houblon en poudre , en infusion & en décoction ; les racines de houblon réduites en poudre se donnent depuis dix grains jusqu'à vingt ou vingt-cinq ou même demi-gros , dans l'alopécie , dans les obstructions du foie , de la rate , dans l'hydropisie commençante. Voici de quelle façon on s'en sert dans l'alopécie : on prend une once de racines de

houblon ratissées & lavées , on les fait macérer pendant une nuit dans huit onces d'eau , le lendemain on les fait bouillir à un feu lent dans la même eau jusqu'à diminution d'un tiers ou même de la moitié , si l'alopecie est considérable. On garde cette décoction pour l'usage , on en donne huit onces au malade le matin à jeun , ensuite on le couvre bien pour le faire suer ; il y a apparence que la sueur nettoie & débarrasse les bulbes du poil & des cheveux , & que c'est par-là que le houblon est utile dans l'alopecie : on peut se servir de la même décoction dans l'hydropisie commençante , mais sans couvrir le malade & sans le faire suer , & alors elle pousse par les urines. On donne en infusion les tendrons de cette plante ; on en fait infuser demi-once dans un verre de petit lait qu'on fait prendre au malade. On prétend que cette façon est très-convenable dans les obstructions qui tendent à l'hydropisie.

*Scolopendre ou Langue de Cerf, Scolopendrium vulgare , ou
Lingua cervina.*

C'EST une plante dont les racines sont capillaires & qui vient dans les puits & les fontaines , dans les fentes des pierres & sur les rochers humides & à l'ombre.

Cas.

ILS sont les mêmes que ceux des plantes ci-devant : on s'en sert surtout , & on la recommande dans les obstructions du foie & de la rate , telles que nous les avons plusieurs fois désignées.

Manière de s'en servir , & ses Doses.

LA scolopendre en poudre s'ordonne depuis dix grains jusqu'à demi-gros , il est plus ordinaire de l'employer en infusion ou en décoction légère ; on l'ajoute aussi aux bouillons apéritifs , sur-tout en cas d'obstruction de la rate plutôt que du foie. On l'ordonne en infusion théiforme ; on prend deux ou trois feuilles de scolopendre sur lesquelles on verse sept ou huit onces d'eau bouillante , dans laquelle on les laisse infuser ; on coule & on fait prendre au malade. Cette infusion convient sur-tout dans les obstructions de la rate. On peut s'en servir aussi dans celles du foie , & dans l'hydropisie récente qui en dépend. Dans les bouillons hépatiques , spléniques , on ajoute deux ou trois feuilles de scolopendre sur la fin de la décoction.

La Fougere , Filix.

IL y a trois sortes de fougères qui sont d'usage en Médecine , savoir , la fougère mâle , *filix mas seu non ramosa* , la fougère femelle ou commune , *filix femina seu ramosa* , & la fougère fleurie , *filix florida*. On emploie ces trois espèces indifféremment , mais sur-tout les deux premières. On se sert des feuilles & des racines.

Cas.

ON emploie la fougère dans les cas généraux où les hépatiques & les spléniques conviennent. La fougère mâle pulvérisée ou son eau distillée , est recommandée dans les affections vermineuses , & sa décoction dans le cas de gonflement de la rate , produit par l'amas du sang qui séjourne dans les vaisseaux de ces viscères. On applique cette décoction en guise de fomentation sur l'hypocondre gauche ; on recommande sur-tout la fougère dans le rachitis ou la chartré des enfants , maladie chronique qui consiste dans un amaigrissement de toutes les parties du corps au dessous de la tête , dans une courbure de l'épine & de la plupart des os longs , dans un gonflement des épiphyses & des os spongieux , dans des nœuds qui se forment à leur articulation , dans un relâchement des jointures , dans une dépression des côtes dont les extrémités paroissent nouées , dans un retrécissement de la poitrine , pendant que la tête est fort grosse , que les sutures du crâne sont quelquefois écartées , que le visage est plein & vermeil , & que le ventre est gonflé & tendu. Cette maladie est presque particulière aux enfants : on appelle noués , ceux qui en sont atteints. On observe que la décoction des racines de fougère réussit très-bien dans cette maladie.

Vertus.

LA fougère fournit un médicament hépatique , splénique , anthelmentique , apéritif , antirachitique.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON emploie les feuilles de fougère comme les capillaires , en infusion théiforme , ou on la fait bouillir légèrement ; on en met , par exemple , demi-poignée dans deux livres ou deux livres & demies d'eau. La racine réduite en poudre s'ordonne depuis demi-gros jusqu'à un gros dans

l'eau de fumeterre ou dans celle de petite absynthe. On peut aussi l'associer aux autres médicaments hépatiques, & en former des bols avec quelque sirop approprié, comme celui d'absynthe. On peut aussi donner la même racine en décoction. On en fait bouillir demi-once ou une once dans deux livres ou deux livres & demies d'eau jusqu'à diminution d'un tiers ou de la moitié, selon qu'on veut rendre la décoction plus ou moins forte. On fait prendre trois onces ou quatre de cette décoction de quatre en quatre heures en cas de gonflement de la rate, & dans le rachitis. L'eau distillée de la fougere mâle s'ordonne dans les affections vermineuses à la dose de trois ou quatre onces de quatre en quatre heures.

La grande Chelidoine.

L'EAU distillée de cette plante est fort vantée pour les affections inflammatoires des yeux qui dépendent d'un sang épais & qui séjournent dans les vaisseaux de cet organe, pourvu qu'il n'y ait pas beaucoup d'ardeur : son suc jaune qui découle de la tige qu'on a rompue, introduit dans l'œil, est recommandé par quelques-uns, pour déterger les ulcères de la cornée ; mais comme il est fort âcre, on doit le mêler alors avec quelque liqueur convenable, par exemple, avec l'eau de rose, de plantain. On peut aussi l'employer seul dans les taies, c'est-à-dire, les tâches de la cornée, mais on doit l'éviter soigneusement toutes les fois qu'il y a chaleur, & à plus forte raison ardeur dans les yeux, à cause de son âcreté. Intérieurement on emploie la grande chelidoine dans tous les cas où les autres hépatiques conviennent, spécialement dans les obstructions du foie qui produisent l'ictère, pourvu qu'il n'y ait ni chaleur ni ardeur : on la regarde même comme spécifique dans ce cas-là.

Maniere de s'en servir, Doses.

ON se sert de la racine & des feuilles. On ordonne les feuilles en infusion : on fait infuser, par exemple, une pincée de feuilles écrasées dans six ou huit onces d'eau bouillante ou dans le petit lait, en cas d'ictère froid. La racine en poudre s'ordonne depuis dix grains jusqu'à vingt ou vingt-cinq délayée dans quelque liqueur appropriée, ou associée avec quelque autre médicament hépatique, sous forme de bol. On donne aussi la racine de grande chelidoine en décoction, & on l'associe aux autres médicaments apéritifs. La dose ordinaire est depuis demi-once jus-

qu'à une. Cependant comme elle est pleine d'un suc âcre , piquant , tonique , nous croyons qu'il vaut mieux en diminuer la dose & la réduire à un gros ou deux tout au plus. Une plus grande dose est capable de procurer l'inflammation. On ajoute aussi la grande chelidoine aux bouillons apéritifs où elle produit des merveilles. On l'associe aux autres plantes hépatiques & spléniques , à la dose de deux ou trois gros ou de demi-once tout au plus.

Le Tamarisc , Tamariscus.

IL y a deux especes de Tamarisc d'usage en médecine , savoir , le tamarisc d'Espagne & le tamarisc de Narbonne ou tamarisc ordinaire , *tamariscus vulgaris* , qu'on pourroit ainsi appeller *tamariscus nostras*.

Cas.

ON emploie l'écorce du bois & de la racine , comme médicament hépatique & splénique dans toutes les maladies dont nous avons parlé au commencement de cette classe , & sur-tout dans les obstructions du foie , qui menacent d'un état cachectique œdémateux ou d'hydropisie.

Maniere de s'en servir , Doses.

LA poudre de l'écorce , soit du bois , soit de la racine de tamarisc ; s'ordonne depuis dix grains jusqu'à vingt ou vingt-cinq , seule ou associée , comme les poudres des autres plantes hépatiques ; en décoction , comme la racine de fougere , depuis demi-gros jusqu'à un gros , dans deux livres ou deux livres & demies d'eau qu'on fait bouillir jusqu'à diminution du tiers ou de la moitié. On fait prendre cette décoction à la dose de trois ou quatre onces plusieurs fois par jour : elle pousse par les urines. On se sert aussi quelquefois de l'écorce de tamarisc extérieurement ; on l'ajoute à la racine de caprier , & on les fait bouillir ensemble jusqu'à putrilage , comme on dit ; on applique cette décoction sur la rate dans le cas de gonflement de ce viscere , pourvu cependant que la tumeur ne soit pas schirreuse.

Les Céphaliques.

ON appelle médicaments céphaliques , ceux qui sont propres à rétablir les fonctions du cerveau , ou plutôt à combattre les maladies de la tête. On rapporte aux maladies de cette partie , 1°. les maladies soporeuses. 2°. Les maladies paralytiques. 3°. Les maladies convulsives ou spasmodiques. 4°. Les maladies dolorifiques. Pour avoir une idée exacte des médica-

ments céphaliques, il faut examiner chacune de ces maladies en particulier.

1°. Les maladies où les affections soporeuses sont marquées par un profond sommeil contre-nature, ou par un penchant au sommeil contre-nature, accompagné de diminution de l'exercice des fonctions animales, comme de l'exercice des sens, tant internes qu'externes, & de l'exercice des mouvements volontaires; les fonctions vitales ne diminuant pas du moins dans la même proportion que les fonctions animales. La maladie soporeuse la plus marquée & la plus dangereuse, est l'apoplexie: elle est marquée par la cessation subite de l'exercice des sens tant internes qu'externes, & du mouvement volontaire, dans tout le corps, accompagnée de ronflement & de difficulté de respirer, avec résolution ou relâchement de tous les membres soumis à la volonté; en quoi l'apoplexie differe de la catalepsie, dans laquelle, quoique l'exercice des sens & du mouvement volontaire soit entièrement aboli, il n'y a pas cependant cette résolution ou ce relâchement des membres; mais au contraire une espece de roideur: ainsi lorsqu'il se présente dans la pratique quelque affection soporeuse, avant d'en déterminer l'espece & de décider si c'est une apoplexie, il faut remuer les membres du malade, pour voir s'ils sont dans cet état de relâchement; si on trouve qu'ils soient entièrement relâchés, c'est l'apoplexie; mais si malgré la cessation du mouvement volontaire, les membres ont une espece de roideur jointe à une certaine flexibilité, & conservent la situation où l'attitude qu'on leur donne, même quoiqu'elle soit contraire aux loix de la gravité, c'est alors la catalepsie, maladie dans laquelle il y a tout à la fois quelque chose de soporeux & quelque chose de spasmodique; enfin s'il y a une lésion subite des sens internes & externes, que les membres se remuent très-difficilement, & qu'il y ait en même temps une roideur dans quelque partie, sur-tout dans la mâchoire inférieure, c'est alors l'épilepsie; ainsi l'apoplexie est caractérisée par la cessation subite des fonctions animales, avec relâchement ou résolution des membres, les fonctions vitales restant les mêmes, ou même augmentant quelquefois. L'apoplexie est ou sanguine ou pituiteuse. Dans l'apoplexie sanguine la respiration est forte, le pouls est vigoureux, augmenté & mol, le visage est rouge, les veines jugulaires sont extrêmement gonflées, toute l'habitude du corps est chaude: elle se trouve dans des tempéraments pléthoriques sanguins. Dans l'apoplexie pituiteuse il y a un plus grand relâchement dans les solides, produit par la sérosité qui surabonde dans le tissu du cerveau, comme il est démontré par la dissection des cadavres; la face est pâle, blême, cadavereuse, le pouls est fort petit & fréquent,

les

les extrémités paroissent refroidies : elle affecte les gens d'un tempérament pituiteux. Les affections soporeuses n'ont pas toujours à un si haut point, les signes marqués ci-dessus. Si le malade étant appelé à haute voix, ou fortement agité, ou enfin pincé vivement, ouvre les yeux, retire le membre pincé, sans répondre aux interrogations qu'on lui fait, s'il retombe tout de suite dans le sommeil & que la respiration se fasse sans ronflement, c'est alors la petite apoplexie, qu'on appelle proprement *carus*. Le *carus* est ou essentiel ou symptomatique, c'est-à-dire, symptôme de la fièvre maligne à *coagulo*, de la fièvre putride, &c. Dans la léthargie les malades s'éveillent assez difficilement ; il semble cependant que quand on les pique, ils ouvrent les yeux & répondent même, mais hors de propos. Ils oublient ce qu'ils ont fait ou même demandé, quoique ce soient des choses nécessaires. La léthargie est principalement essentielle ou symptomatique, c'est-à-dire, symptôme de la fièvre maligne à *coagulo*. 2°. Les affections soporeuses après leur guérison, sont souvent suivies de la *paralyse* qui est la privation du sentiment & du mouvement, ou de l'un des deux, privation qui ne peut être attribuée ni à la douleur ni à la convulsion, & sans que l'esprit soit lésé. Elle est parfaite ou imparfaite ; parfaite quand le paralytique est privé du mouvement & du sentiment tout ensemble ; imparfaite quand le sentiment & le mouvement sont considérablement diminués, ou que le sentiment reste, le mouvement étant aboli & *vice versâ* ; car le mouvement peut rester dans une partie paralysée, le sentiment étant aboli. Il y a là-dessus une observation touchant un soldat dont le bras & la main exécutoient les mouvements, quoique le sentiment fût entièrement aboli, puisqu'ayant pris un fer chaud, il se brûla la main jusqu'aux parties aponevrotiques sans le sentir. La paralyse est aussi universelle ou particulière ; la paralyse universelle est celle qui affecte un grand nombre de parties. Il est rare qu'on guérisse de l'apoplexie, & ceux qui en guérissent tombent ordinairement dans une paralyse universelle : quelquefois c'est tout un côté ou la moitié du corps, quelquefois la moitié de la langue qui est paralysée, & c'est ce qu'on appelle proprement hémiplegie. Quelquefois ce sont les parties placées sous la tête qui sont paralysées, & c'est-là la paraplégie. La paralyse particulière est celle qui affecte une partie déterminée, comme la langue, un bras, &c. La paralyse n'est pas cependant toujours la suite des affections soporeuses. La cause de la paralyse réside dans le cerveau & dans les nerfs ; c'est pourquoi les médicaments qui remédient à cette maladie, sont rangés parmi les céphaliques. 3°. On range parmi les maladies de la tête, les maladies convulsives. On définit la convulsion, en disant que

c'est une contraction involontaire des muscles. Selon cette définition tout mouvement des muscles qui se fait dans le corps & que la volonté ne peut arrêter, devroit être regardé comme un mouvement convulsif; ainsi le mouvement des muscles qui ne sont pas soumis à la volonté, seroit un mouvement convulsif. De plus selon cette définition ne pourroit-on pas dire que l'estomac & les intestins sont en convulsion, puisque leur mouvement n'est point soumis à la volonté : c'est pourquoi nous définissons la convulsion, tout mouvement violent qui se fait dans le corps contre l'ordre de l'économie animale; ainsi tout mouvement qui se fait contre l'ordre naturel, soit dans le cœur, soit dans l'estomac, soit dans les intestins, peut être rangé parmi les mouvements convulsifs. Il y a deux especes de convulsion, une qu'on appelle convulsion simplement, ou ce qui est mieux, convulsion tonique, qui est lorsque la contraction des muscles extenseurs & fléchisseurs d'une partie, est constante & permanente, en sorte que la partie se tient roide & immobile : cette convulsion s'appelle aussi *spasme*; dans l'autre les parties sont agitées successivement & alternativement, c'est pourquoi on l'appelle convulsion spasmodique, ce qui signifie secousse ou mouvement tumultueux, on l'appelle aussi mouvement convulsif, mouvement spasmodique; comme ces mouvements dépendent de l'origine des nerfs, on range ces maladies parmi celles de la tête, & les médicaments qui y remédient parmi les céphaliques. La maladie convulsive la plus considérable, & contre laquelle on emploie le plus les céphaliques, c'est l'épilepsie proprement dite, ou l'épilepsie des adultes, car nous ne parlons pas ici de l'épilepsie des enfants, ou de celle qui survient aux femmes, à l'occasion ou à la suite de quelque *insultus* de passion hystérique; nous parlons de l'épilepsie qui est une maladie chronique, périodique, de laquelle les malades étant saisis, tombent subitement à terre, & sont privés de l'exercice des fonctions animales, c'est-à-dire, de l'exercice des sens & du mouvement volontaire dans le temps du paroxysme, ils éprouvent en même temps des mouvements convulsifs, soit dans une partie déterminée, soit même dans tout le corps. Quelquefois cependant on ne s'apperçoit pas d'abord de ces mouvements convulsifs; mais en examinant soigneusement, on trouve quelque partie en convulsion ou en spasme, comme la mâchoire inférieure : on appelle cette maladie, *mal caduc*, *mal de la terre*; les anciens l'appelloient *mal d'Hercule*, sans doute, parce qu'on croyoit qu'Hercule y avoit été sujet; *mal sacré*, comme s'il étoit envoyé de Dieu par une punition spéciale, ou bien parce que c'est un mal abominable, car *morbus sacer* a aussi la même signification, comme quand on dit, *auri sacra fames*, la passion insatiable, abominable des

richesses. Il faut bien distinguer l'épilepsie des simples mouvements épileptiques qui sont arrivés une fois , & qui n'ont plus paru , depuis qu'ils sont venus à la suite de quelqu'autre cause , & enfin de l'épilepsie puérile. L'épilepsie est essentielle ou symptomatique : l'épilepsie essentielle ou idiopatique dépend de quelque affection constante, de quelque vice du cerveau ou de l'origine des nerfs : elle ne se guérit presque jamais. L'épilepsie symptomatique ou sympathique dépend d'une cause qui a son siege dans une autre partie que dans le cerveau. On a vu des épilepsies symptomatiques qui dépendoient d'un ulcère à la jambe , & dans ce cas l'attaque épileptique étoit précédée d'une espèce de froid qui montoit à la tête. On en a vu qui dépendoient de quelque corps étranger qui irritoit quelque partie du corps humain. *Fabricius Hyldanus* a observé une épilepsie qui dépendoit d'un petit globe de verre qu'une jeune fille s'étoit introduit dans l'oreille , dans son jeune âge ; tous les remèdes ayant été inutiles , *Fabricius Hyldanus* sut que l'époque des paroxysmes épileptiques étoit la même que celle de l'introduction de ce globe de verre , il le tira & la fille fut guérie. Dans les Mémoires d'Edimbourg il est parlé d'une épilepsie sympathique qui dépendoit d'un ganglion formé à l'insertion des muscles extenseurs du pied : on fit couper cette petite tumeur & le malade fut guéri ; ainsi il y a des épilepsies sympathiques qui peuvent en imposer pour des essentielles : les sympathiques peuvent se guérir. 4°. Les maladies douloureuses de la tête sont internes ou externes ou moyennes : on les divise aussi en aiguës , en gravatives ; c'est dans toutes ces maladies que conviennent les céphaliques , qui sont en même temps antiapoplectiques , antispasmodiques , antiparalytiques , & antidouloureuses. Toutes les maladies dont nous avons parlé peuvent se trouver jointes ou avec l'irritabilité des solides & l'acrimonie des fluides , ou avec le relâchement des solides , sur-tout du système nerveux , & l'épaississement visqueux des fluides ; d'où il suit qu'on peut diviser les médicaments céphaliques en chauds & en froids : par le détail que nous avons fait des maladies de la tête où les céphaliques conviennent , on voit clairement tous les cas ils sont indiqués , & ceux où ils sont contre-indiqués.

Précautions.

ELLES se réduisent à faire attention aux premières voies , à rétablir les digestions lorsqu'elles sont dérangées : dans les tempéraments pléthoriques il faut faire précéder la saignée ; dans les autres tempéraments les purgatifs , les émétiques , les diurétiques , &c. Après les remèdes généraux , on vient aux céphaliques dont le choix dépend de la connoissance détaillée

de ces médicaments. Les céphaliques sont tirés des trois regnes. Nous suivrons l'ordre de ces regnes dans le détail que nous en allons faire.

Médicaments Céphaliques tirés du regne végétal.

TOUTES les plantes aromatiques , les hépatiques , les spléniques , fournissent des céphaliques chauds ou des céphaliques proprement dits ; ainsi nous avons déjà traité d'un grand nombre de ces médicaments dans les classes précédentes. Nous allons parler ici de ceux qui sont le plus en usage sous ce point de vue.

La Valeriane.

OUTRE les différentes especes de valeriane , on en compte deux qui sont principalement d'usage en médecine. La valeriane de jardin ou la grande valeriane , & la valeriane sauvage. Celle-ci est plus usitée , mais à son défaut , on se sert de celle de jardin : on emploie la racine de cette plante qui est fibreuse , rampante , grisâtre en dehors , blanchâtre en dedans , d'un goût amer , âcre , d'une odeur aromatique , forte , désagréable , sur-tout lorsqu'elle est seche.

Cas.

ON s'en sert dans les maladies soporeuses , dans l'apoplexie ; mais pour prévenir les paroxysmes , car dans les paroxysmes il faut des remedes plus actifs & plus prompts , comme les saignées , les vésicatoires , les émétiques ; on l'emploie dans ceux qui ont déjà éprouvé l'apoplexie pituiteuse , ou même l'apoplexie sanguine si le sang est épais. On s'en sert aussi dans les vertiges , maladie dans laquelle il semble que les objets tournent & changent de place , quoiqu'ils soient toujours réellement en repos. Le vertige a coutume de précéder l'apoplexie sanguine ; chez les pléthoriques il dépend de la même cause que l'apoplexie. On s'en sert encore dans les maladies paralytiques qui suivent l'apoplexie : on l'emploie spécialement dans les maladies convulsives , sur-tout dans l'épilepsie essentielle , dans laquelle les solides sont relâchés , le sang épais , visqueux , & roule difficilement dans les vaisseaux , principalement dans ceux du cerveau. M. Stahl a observé cette viscosité dans le sang d'un épileptique , à qui il fut obligé de faire ouvrir la veine : dans ce cas-là la racine de valeriane est un remede excellent & presque spécifique. On s'en sert aussi dans les maladies qui sont marquées de quelque mouvement convulsif ou spasmodique , comme dans

la passion hystérique & hypocondriaque , lorsque ces affections sont accompagnées de mouvements convulsifs , & alors on la préfère à la pivoine. Enfin on l'emploie dans les cas de suppression des regles chez les hystériques , soit que cette suppression dépende d'un état spasmodique , soit qu'elle dépende d'un sang épais & visqueux.

Vertus.

C'EST un bon céphalique dans les maladies soporeuses , très-propre à en prévenir les paroxysmes , un bon antispasmodique , spécialement un bon antiépileptique , emmenagogue. Il faut cependant remarquer qu'il échauffe beaucoup , & qu'il faut être circonspect dans son usage , sur-tout dans les cas de passion hystérique ; c'est pourquoi dans les tempéraments vifs & bilieux , il vaut mieux se servir de la pivoine mâle.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON ordonne la racine de la valeriane en substance ou en poudre , en infusion & en décoction : en poudre depuis dix ou quinze grains jusqu'à vingt-cinq ou demi-gros , ou même un gros ; cependant comme c'est un médicament assez actif , nous croyons que demi-drachme suffit : en cas d'épilepsie , des Auteurs de grande réputation se sont très-bien trouvé de la méthode suivante : ils faisoient saigner le malade , puis purger & émétiser suivant les indications ; ensuite ils leur faisoient prendre tous les matins à jeun pendant trois jours consécutifs , demi-gros de la racine de valeriane en poudre délayée dans l'eau de tilleul ou dans celle de pivoine , ou dans une cuillerée de lait si c'étoit à des enfants ; après quoi ils repurgeoient le malade , & répétoient l'usage de la valeriane de la même façon : les mêmes Auteurs assurent avoir guéri radicalement les épileptiques par cette méthode : on l'ordonne aussi en infusion. M. Tournefort prenoit une drachme de racine de valeriane ratifiée , versoit par-dessus une once d'eau bouillante , & laissoit infuser théiformement ; il couloit ensuite l'infusion , & la donnoit par cuillerée en cas de passion hystérique avec des convulsions bien marquées , en cas d'asthme avec convulsion ; on pourroit aussi la donner par cuillerée plusieurs fois dans la journée , comme préservative de l'épilepsie , comme emmenagogue , &c. en décoction , on peut l'ordonner à la dose de demi-gros ou d'un gros sur environ trois livres d'eau , & la faire prendre par verrées. On fait bouillir jusqu'à diminution d'un tiers , ou de la moitié , suivant qu'on a intention de rendre la décoction plus ou

moins forte. On ajoute aussi la racine de valeriane aux bouillons céphaliques, à la dose de demi-~~once~~^{Drachme} jusqu'à une, en cas de passion hystérique ou hypocondriaque. Comme ce médicament échauffe, il y en a qui conseillent de le faire infuser dans le petit lait, à la dose de demi-drachme dans le même cas de passion hystérique.

La Pivoine, Pæonia.

LA pivoine échauffe moins que la grande valeriane : il y en a de deux especes qui sont en usage en médecine, la pivoine mâle & la pivoine femelle ; le mâle est préféré à l'autre, & vaut mieux. Sa racine dont on se sert, est grosse, oblongue, droite, ridée, de couleur rougeâtre en dehors, blanche en dedans, d'un goût amer.

Cas.

C'EST un médicament des plus anciens & des plus vantés. Autrefois on la regardoit comme un spécifique plus assuré que la valeriane, contre l'épilepsie. *Galien* rapporte qu'un jeune enfant épileptique à qui on avoit attaché cette racine au col, n'étoit plus sujet aux accès d'épilepsie, & que lorsqu'on la lui ôtoit, il y retomboit, & n'étoit délivré de ses convulsions que lorsqu'on lui remettoit la racine au col. Elle convient absolument dans les mêmes cas que la valeriane, mais on la préfère à celle-ci lorsqu'on craint d'échauffer, comme sont les femmes hystériques lorsqu'elles éprouvent une suppression des vuidanges ou des regles dépendantes de spasme.

Vertus.

C'EST un bon céphalique, anticonvulsif, antiépileptique, antihystérique, emmenagogue.

Maniere de s'en servir, Doses.

ON l'ordonne en poudre depuis dix grains jusqu'à demi-gros ; en infusion depuis demi-gros jusqu'à un dans ^{sept ou} sept onces d'eau bouillante ; en décoction sous forme de ptisane ; on fait bouillir trois gros ou demi-once de racine de pivoine dans environ deux livres ou deux livres & demies d'eau jusqu'à diminution d'un tiers, & on en fait boire au malade par verrées. On peut aussi faire bouillir la pivoine dans l'eau de poulet ; dans le cas de passion hystérique, on s'en trouve très-bien. On l'ajoute aussi aux bouillons & aux opiatés céphaliques avec la valeriane.

Gallium luteum , le Caille-lait ou le Petit Muguet.

ON l'emploie dans les mêmes cas que la valeriane & la pivoïne. Il échauffe moins que ces derniers médicaments ; c'est pourquoi on le préfère dans les maladies convulsives , lorsque le sang est âcre & desséché , & que le système nerveux est extrêmement tendu & irritable , comme il arrive souvent dans la passion hystérique & hypocondriaque.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON se sert des sommités fleuries de cette plante , en substance ou en poudre depuis dix grains jusqu'à vingt , dans quelque liqueur appropriée , ou bien associé avec quelqu'autre céphalique sous forme de bol. On l'emploie plus ordinairement en infusion ; on en fait infuser théiformement une ou deux pincées dans sept ou huit onces d'eau : on peut adoucir cette infusion avec un peu de sucre. En décoction on l'ordonne à la dose de demi-poignée dans environ trois livres d'eau qu'on fait bouillir jusqu'à diminution d'un quart ; on se sert de cette décoction par verrées , en cas de passion hystérique accompagnée de mouvement convulsif. On peut aussi dans le même cas de passion hystérique & dans le cas de vertige , & en général toutes les fois qu'on craint d'échauffer , l'ajouter au petit lait à la dose d'une pincée pendant la clarification. On ajoute aussi le caille-lait aux bouillons céphaliques à la dose d'une ou deux pincées.

Le Tilleul , Tilia.

ON emploie les fleurs de tilleul dans les mêmes cas où l'on se sert des sommités fleuries du *Gallium luteum* , de la même façon & à la même dose ; on les joint souvent ensemble. Le tilleul échauffe encore moins que le *Gallium luteum*. Celui-ci est un antiépileptique plus assuré. M. Chomel recommande contre l'hydropisie la décoction du bois de tilleul , sur-tout des jeunes branches de deux ans ou environ. On jette pour cela une poignée de ce bois coupé menu dans quatre livres d'eau , & on fait bouillir jusqu'à diminution de la moitié , on coule , & on fait prendre cette décoction au malade par verrées.

Le vrai Marum , Marum verum.

ON se sert principalement des feuilles de cette plante ; elles sont aromatiques , & ont une amertume très-considérable.

Cas.

ON emploie le Marum dans les affections soporeuses & dans les maladies qui y tendent , dans le vertige , dans la somnolence , dans l'apoplexie , dans le carus pour en prévenir les retours , dans les paralysies qui suivent l'apoplexie , dans le tremblement des membres qu'on connoît par leur mouvement involontaire , petit à la vérité , mais presque continuél , sur-tout lorsque les malades veulent soutenir quelque poids. Ce tremblement est ordinaire aux vieillards ; il suit les affections soporeuses , & est une disposition à la paralysie , & même est une paralysie imparfaite. On se sert aussi du marum dans les maladies convulsives , dans l'épilepsie , dans les affections hystériques & hypocondriaques ; on doit cependant en redouter l'action dans ce dernier cas , lorsqu'il se présente dans des personnes d'un tempérament bilieux. On se sert encore du marum pour provoquer les regles.

Vertus.

LE Marum est céphalique , antiépileptique , antihystérique , emmenagogue , anthelmentique.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON l'ordonne en poudre principalement à cause de son amertume , à la dose de dix grains jusqu'à vingt-cinq , seul ou associé avec quelqu'autre médicament céphalique & incorporé avec le sirop de stechas ; c'est presque la seule façon dont on s'en sert ici. Il est peu d'usage ; il entre dans la composition de la thériaque.

Le Dictame de Crete , Dictamnus Creticus , Dictamnium Creticum.

CE sont des feuilles arrondies de la longueur d'un pouce , tirañt sur le verd , couvertes d'un duvet & d'un poil épais , d'une odeur aromatique , pénétrante & agréable , d'un goût âcre & brûlant ; on les apporte de l'isle de Crete. La plante dont on retire ces feuilles s'appelle *dictamnus Creticus*.

Cas

Cas.

ON emploie le dictame de Crete dans tous les cas où l'on se sert du marum & des autres céphaliques , spécialement dans les maladies qui tendent aux affections soporeuses , & qui dépendent du relâchement des solides & de l'épaississement du sang. On s'en sert aussi en cas d'accouchement difficile : *Hippocrate* le recommande beaucoup pour chasser l'arrière-faix & le fœtus mort : on le recommande dans la passion hystérique & hypochondriaque, comme aussi contre la morsure des animaux enragés , & contre les traits empoisonnés. Il y a même une ancienne fable qui dit que les chèvres de l'île de Crete mangent de cette plante , pour faire tomber les traits dont elles ont été blessées.

Vertus.

C'EST un bon céphalique , antihystérique , emmenagogue , stomachique.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON l'ordonne en poudre depuis dix grains jusqu'à vingt-cinq , seul ou associé avec quelqu'autre céphalique , comme avec le marum , &c. En infusion la dose en est d'une ou de deux pincées dans suffisante quantité d'eau bouillante ; on peut le donner de cette façon en cas d'épilepsie essentielle avec atonie des solides. On s'en sert aussi pour base des potions dans la passion hystérique.

Stechas.

CE sont des sommités fleuries ou des petites têtes desséchées tirées d'une plante appelée *stechas*. Elles sont oblongues , écailleuses , purpurines , d'un goût un peu âcre , amer , d'une odeur pénétrante qui n'est pas désagréable.

Cas.

LES sommités fleuries conviennent dans les mêmes cas que le dictame de crete : elles sont même recommandées par quelques Auteurs comme un bon antiépileptique , mais elles sont moins usitées que le dictame de crete.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON les donne en poudre depuis dix grains jusqu'à demi-gros , seules ou associées avec quelque médicament céphalique , & incorporées même avec

le sirop de stechas. En infusion on les donne à la dose d'une ou deux pincées sur sept ou huit onces d'eau. On en retire une huile essentielle qu'on donne intérieurement à la dose de trois ou quatre ou cinq gouttes ; on s'en sert rarement.

La Sauge , Salvia.

IL y a plusieurs especes de Sauge qui sont d'usage en médecine ; la grande sauge , *salvia major* ; la petite sauge , *salvia minor* , & la sauge d'Espagne , *salvia Hispanica*. On se sert principalement de ces deux dernières.

Cas.

LA sauge est extrêmement recommandée dans les maladies de la tête avec relâchement des solides ; dans le cas de somnolence ; de paralysie , & dans ce cas-ci , on s'en sert tant intérieurement qu'extérieurement ; dans le vertige ; dans le tremblement des membres ; dans les douleurs de tête , soit gravatives , soit aiguës , soit qu'elles occupent une petite partie de la tête , soit qu'elles en occupent la moitié , comme la migraine ; dans les douleurs rhumatismales des parties externes de la tête ; dans le cas de flatuosités , d'affections vermineuses ; dans la suppression des regles dépendantes du relâchement des solides & de l'épaississement visqueux des fluides ; dans le catarre ; dans l'hémophthisie , dans lequel cas on donne ou simplement l'infusion de sauge , ou le suc de sauge mêlé avec le miel.

Vertus.

C'EST un médicament céphalique , stomachique , anthelmentique , carminatif , emmenagogue ; en un mot la sauge a tant de vertus , qu'elle passe dans l'esprit de plusieurs comme un remede polycreste , d'où vient qu'on a dit qu'on étoit surpris qu'on mourût dans le pays où elle croît.

Maniere de s'en servir , Doses.

La sauge réduite en poudre s'ordonne depuis dix grains jusqu'à vingt-cinq ; on s'en sert le plus souvent en infusion. On prend pour cela huit ou dix feuilles de sauge qu'on fait infuser théiformément dans huit onces d'eau : on coule cette infusion , & on la fait prendre au malade après l'avoir adoucie avec un peu de sucre. On peut aussi se servir intérieurement de la décoction de sauge dans du vin. On l'emploie cependant plus ordinairement à l'extérieur , comme résolutif , pour dissiper les enflures qui paroî-

sent sur les bords des ulcères ; on en tire aussi une huile essentielle qu'on donne depuis deux gouttes jusqu'à quatre. On peut encore ranger parmi les céphaliques , les autres plantes aromatiques , comme la marjolaine , le thym , la lavande & le serpolet.

Médicaments céphaliques tirés du regne animal.

Ungula Alcis , Ongle de Pied d'Élan.

L'élan est un animal assez semblable au cerf , plus gros cependant & un peu plus haut. On se sert de l'ongle du pied de cet animal dont la vertu est assez analogue à celle de la corne de cerf. On pourroit conséquemment l'employer comme un diaphorétique & sudorifique dans tous les cas où nous avons dit que convenoit la corne de cerf. On recommande beaucoup l'ongle de pied d'élan dans le cas d'épilepsie , & on regarde ce médicament comme spécifique contre cette maladie. Peut-être que la superstition a eu plus de part que la vérité aux éloges que les Anciens lui avoient donné. On prétend que l'élan tombe tous les jours du haut mal , & qu'il se délivre des paroxysmes en mettant son pied droit postérieur dans l'oreille gauche. D'autres disent qu'il met son pied gauche dans l'oreille droite. Quoi qu'il en soit de cette fable , on emploie l'ongle du pied d'élan en poudre ou râpée ; on en fait des décoctions , comme avec la corne de cerf : par exemple , on en prend demi-gros ou un gros qu'on fait bouillir dans deux livres d'eau jusqu'à la diminution de moitié ; on fait prendre cette décoction par verrées. On donne aussi cette râpüre ou cette poudre seule ou associée avec le crâne humain préparé , ou bien avec le dictame de Crete , & on incorpore cette poudre avec le sirop de *Stechas* pour en former des bols. La dose est alors de dix grains jusqu'à vingt-cinq ; on pourroit aussi en tirer un esprit volatil , & un sel volatil qui pourroit se donner dans les mêmes cas , & à la même dose que le sel volatil & l'esprit volatil de corne de cerf.

Le Crâne humain préparé.

ON regarde aussi le crâne humain comme un bon antiépileptique ; cependant ces os ne paroissent pas avoir plus de vertus pour cette maladie que ceux des autres parties du corps humain , mais l'usage les a consacrés. Bien plus , il y en a qui ne se servent pas indifféremment des os qui composent le crâne , mais qui choisissent spécialement certains petits os qui se trouvent par fois entre les sutures lambdoïdes & sagittales , qu'on nomme

os vormiens , *ossa vormiana* , *ossa triquetra*. Peut-être que ce qui a donné lieu à cette préférence que l'on donne dans l'épilepsie aux os du crâne sur tous les autres os du corps , vient de ce qu'on s'est imaginé que cette maladie affectant la tête principalement , les os de la tête sont plus propres à la combattre. On prépare le crâne humain de cette façon : on prend le crâne des personnes mortes d'une mort violente , comme de ceux qui ont été pendus ou roués , ou bien de ceux qui sont morts dans un combat singulier ; on calcine ces os , puis on les porphyrisé , & on les humecte avec l'eau des feuilles de tilleul ou avec l'infusion des fleurs de *Stechas* , & on en fait une espece de pâte qu'on fait sécher , & qu'on garde pour l'usage. Le crâne humain ainsi préparé s'ordonne en poudre depuis dix grains jusqu'à vingt ou vingt-cinq , ou seul ou délayé dans cinq ou six onces d'eau de *Stechas* ou de tilleul , une ou deux fois par jour selon le cas , ou bien on l'associe aux poudres d'ongle du pied d'élan ou de dictame de Crete , ou de quelqu'autre céphalique , & on les incorpore avec quelque sirop approprié pour en former des bols.

Céphaliques du regne minéral.

Le Cinabre , Cinnabarīs.

LE cinabre est une substance fossile , métallique , assez pesante , un peu dure , luisante ; on y voit comme de petites aiguilles brillantes : il est d'un rouge foncé quand il est en masse , d'un rouge vif lorsqu'il est pulvérisé. On distingue trois sortes de cinabres , le cinabre naturel qu'on retire des mines , le cinabre factice ou le vermillon , & le cinabre d'antimoine. Le cinabre factice se fait en mêlant peu-à-peu trois parties de mercure avec une partie de soufre fondu au feu , & en remuant continuellement jusqu'à ce que le cinabre soit bien fait ; on laisse ensuite refroidir cette masse , & on la pulvérisé ; puis on la met dans un vaisseau sublimatoire ; le feu étant augmenté peu-à-peu , elle se sublime en une masse rouge & brillante , c'est le cinabre factice ou le vermillon. Pour faire le cinabre d'antimoine , on prend parties égales d'antimoine crud & de sublimé corrosif triturés ensemble , on les fait digérer dans un lieu frais pendant la nuit , ensuite on les distille dans une cornue dont le col soit large & court , placé à un feu doux , & à laquelle on a adapté un récipient : il vient d'abord une huile claire qu'on appelle huile glaciale d'antimoine , ensuite une huile blanche plus épaisse , qui est le beurre d'antimoine. Dès qu'il vient une matiere rouge , on

change le récipient , & on pousse le feu encore pendant quelque temps , alors ce qu'on trouve au haut de la cornue est le cinabre d'antimoine. Ces trois especes de cinabre sont composées de soufre & de mercure ; on se sert principalement du cinabre d'antimoine dans les maladies de la tête , dans les affections soporeuses , dans les douleurs gravatives de la tête , & sur-tout dans l'épilepsie. Il y a quelques Auteurs qui prétendent que le cinabre ne peut produire aucun bon effet dans le corps humain , parce qu'il est insoluble dans les humeurs animales , & qu'il ne peut passer des premieres voies dans les secondes ; mais l'expérience de presque tous les Médecins prouve le contraire : ainsi , fondés sur leurs observations , nous pouvons employer le cinabre. D'ailleurs , il n'est pas bien sûr qu'il ne passe des premieres voies dans les secondes ; & quand même cela seroit , il ne s'enfuivroit pas qu'il ne produisît aucun effet sur le corps humain : sans perdre rien de son poids sensible , il peut se faire qu'il agisse tout simplement sur les premieres voies. L'*opium* selon quelques Auteurs produit le sommeil en agissant seulement dans les premieres voies. Il y a aussi certains poisons qui ne laissent pas de produire des effets bien marqués & bien funestes , quoiqu'ils ne passent pas des premieres voies dans les secondes , comme on l'a observé par l'ouverture des cadavres. Ainsi ces raisonnements au fond ne prouvent rien contre l'observation.

Cas.

ON donne le cinabre en poudre associé avec les autres céphaliques ; à la dose de trois grains jusqu'à six dans le cas spécialement d'épilepsie.

Poudre de Guttete.

C'EST un remede céphalique composé de la plupart des médicaments dont nous avons parlé , soit dans cette classe , soit dans celle des stomachiques. Il entre dans sa composition le dictame de crete , les racines de pivoine mâle , de valeriane , de *contrayerva* , l'ongle du pied d'élan , le crâne humain , le bézoard qui est de deux especes , l'animal & le minéral. Il y entre encore les coraux rouges , le gui de chêne qui est aussi bon dans les maladies convulsives , la serpentinaire de virginie. On pulvérise tous ces médicaments , & on mêle toutes ces poudres ; c'est ce mélange qu'on appelle poudre de guttete.

Cas , Doses.

ON se sert de la poudre de guttete à la dose de dix grains jusqu'à vingt ou vingt-cinq, dans les maladies convulsives, dans les affections soporeuses avec relâchement des solides & épaisissement visqueux des fluides. On la délaye dans quelque liqueur appropriée, comme dans l'eau de tilleul, ou dans l'infusion de sauge. On s'en sert aussi pendant l'usage du petit lait dans le cas de passion hystrérique ou hypocondriaque; on la substitue alors aux bols composés avec le cachou & les coraux. On s'en sert encore dans les épilepsies des enfants, dépendantes des matieres vermineuses. Les plantes céphaliques dont ce remede est en partie composé, sont aussi stomachiques, anthelmentiques, carminatives, anticonvulsives.

Les Lithontriptiques.

1°. NOUS donnerons une idée des lithontriptiques. 2°. Nous exposons les cas où ils sont indiqués. 3°. Ceux où ils sont contre-indiqués. 4°. Les précautions qu'il faut prendre pour les administrer.

Ce qu'on entend par Lithontriptiques.

POUR avoir une idée exacte de ce qu'on entend par lithontriptiques, il faut connoître les calculs & la maniere dont ils se forment. Il se produit en général dans toutes les parties du corps humain des concrétions plus ou moins dures, qu'on appelle proprement *calculs*; mais principalement dans la vésicule du fiel & les conduits biliaires, dans les reins & les voies urinaires. Les anciens ont cru que tous les calculs étoient produits par des matieres glaireuses, visqueuses, tenaces qui se desséchant ensuite & se durcissent; ils croyoient que les matieres glaireuses, dont les urines des calculeux sont chargées, en se durcissant, étoient les principes du calcul. Mais ces matieres visqueuses sont plutôt détachées des parois de la vessie & des voies urinaires, par l'irritation que cause le calcul, & elles sont ensuite entraînées avec les urines, à-peu-près comme dans la dysenterie, les matieres visqueuses qui revêtent les parois des intestins, sont détachées par l'irritation des matieres âcres & corro-dantes. *Van-Helmont*, grand ennemi de la doctrine des anciens, qu'on soutenoit de son temps dans les écoles, s'est élevé le premier contre ce sentiment. Il a fait plusieurs expériences pour le combattre, le détruire,

& il a montré que c'étoit sans fondement que la formation des calculs étoit attribuée à une matiere visqueuse. D'abord il a passé l'urine à travers un linge fin, & il a observé que cette urine ainsi passée, n'en étoit pas moins propre à former des calculs, puisqu'en la gardant quelque temps, elle produit des incrustations aux parois des vaisseaux dans lesquels on la garde. Bien plus, il a distillé l'urine, & l'a gardée ensuite pendant quelque temps, & il a observé qu'elle produit également des concrétions pierreuses. De plus il a observé, & d'autres l'ont aussi observé après lui, que l'urine gardée dans des vaisseaux n'y produisoit des incrustations, que lorsqu'elle commençoit à se pourrir. Or les matieres calculeuses se produisent plus souvent dans les parties du corps où les humeurs sont plus proches de la putréfaction : savoir, dans la vésicule du fiel & dans les voies urinaires ; car tout le monde fait que la bile & l'urine sont les humeurs du corps humain les plus proches de la putréfaction. En faisant attention d'une part à l'observation touchant les lieux où se forme le plus ordinairement le calcul, & de l'autre aux expériences de M. *Van-Helmont*, que nous avons cité, nous serons portés à croire que la matiere du calcul est une espece de tartre animal qui ne se forme que par le mouvement de la fermentation, comme le tartre du vin, avec cette différence cependant que la fermentation vineuse produit le tartre du vin, & la fermentation putride, le tartre animal ou le calcul. L'analogie qui se trouve entre le calcul & le tartre végétal confirme cette opinion. Plus le mouvement de fermentation vineuse est avancé, plus le tartre se porte vers les parois des vaisseaux, où il est enfermé ; de même plus les principes actifs de l'urine sont développés, ou ce qui est le même, plus les urines sont troublées par le mouvement de fermentation putride, plus elles sont propres à produire le calcul. De plus, selon les observations de M. *Hales*, de toutes les substances végétales, il n'y en a aucune qui fournisse plus d'air que le tartre ; de même parmi toutes les substances animales, il n'y en a aucune qui en contienne plus que le calcul, qui en contient la moitié de son poids. Voilà ce qu'on peut dire de plus vraisemblable & de plus appuyé sur l'expérience, au sujet de la formation du calcul. Delà on voit pourquoi le calcul se forme plutôt dans les voies urinaires & dans la vésicule du fiel ; c'est parce que l'urine & la bile sont plus susceptibles de la fermentation putride ; pourquoi les femmes sont-elles moins sujettes au calcul que les hommes ? C'est que les humeurs sont moins agitées chez elles que chez les hommes. Voyons à présent les causes qui peuvent donner lieu à des

concrétions calculeuses. Si les voies urinaires, par exemple, sont obstruées, & que l'urine ne coule pas avec aisance dans les différentes parties des reins, si elle y séjourne, elle devient plus âcre, plus rancie dans la partie dans laquelle elle coule avec moins de facilité, & alors la matière calculeuse se portera plus aisément vers les parois des tuyaux, comme on voit que le tartre se porte plus aisément, plus promptement & plus abondamment vers les parois d'un vaisseau déjà chargé de tartre. Ces matières calculeuses ainsi formées dans les tuyaux des reins, peuvent être portées dans le bassinet, ou plutôt (dans l'homme) dans les cavités ou calices qui entourent les mamelons des reins, delà dans l'urètre, de l'urètre dans la vessie, & y être un noyau propre à former le calcul : plus l'urine sera âcre, rancie, alkalescente, plus ce noyau grossira : aussi remarque-t-on qu'en été, où nos humeurs sont plus alkalescentes qu'en hyver, le calcul augmente plus. Après avoir exposé ce qu'on peut dire de plus raisonnable sur la formation du calcul, il sera aisé de concevoir ce qu'on entend par médicament lithontriptique. Les lithontriptiques sont des médicaments propres à guérir les maladies qui dépendent des concrétions calculeuses, soit qu'ils les empêchent de grossir, soit qu'ils les chassent avec l'urine avant qu'elles aient pris assez d'accroissement pour ne pouvoir pas passer par le canal de l'urètre ; mais on appelle plus proprement & plus spécialement lithontriptiques, les médicaments qui peuvent briser ou dissoudre le calcul. Les lithontriptiques de la première classe, sont les diurétiques, tant chauds que froids, qui provoquent l'excrétion de l'urine, donnent un véhicule aqueux, délayent les matières âcres, calculeuses, sablonneuses, & les entraînent avec les urines. Il n'est pas douteux qu'il n'y ait des lithontriptiques de cette classe ; mais on est encore à en chercher de la seconde, c'est-à-dire, à chercher des médicaments capables de dissoudre les calculs déjà formés. On a attribué cette propriété à plusieurs remèdes ; mais si on examine de près les choses, on verra qu'il n'y en a pas qui aient réellement cette vertu, du moins constamment & généralement dans toutes sortes de sujets. Ce qui rend même la découverte d'un tel remède difficile, c'est qu'on observe qu'une menstrue qui dissout une espèce de calcul, n'en peut dissoudre une autre. Nous parlerons cependant de ces médicaments auxquels on a attribué la vertu lithontriptique, parce que, quoiqu'ils n'aient pas toujours les succès qu'on en attend, ils produisent cependant de bons effets, & qu'ainsi il est bon de les connoître.

Indications.

Les lithontriptiques sont indiqués dans les cas d'embarras des reins & des voies urinaires , produits par des concrétions calculeuses ; on connoît ces embarras par les signes suivans. Les malades se plaignent d'une douleur vive fixe , qu'ils rapportent à la région lombaire : les urines coulent difficilement. Si outre ces signes les douleurs sont périodiques , si les malades sont nés de parents sujets aux calculs ou à la goutte qui dépend d'une matière analogue au calcul , on a encore plus lieu de les soupçonner. Ce soupçon deviendra plus certain , si les malades rendent avec les urines , des matières sabl^{ou}seuses , & si après l'excrétion de ces matières , les douleurs cessent , ou du moins diminuent. Lorsqu'après les douleurs rapportées à la région lombaire , la douleur cesse dans cette partie , mais qu'elle se fait sentir dans toute l'étendue qu'il y a des reins à la vessie , & que l'évacuation de l'urine diminue ; s'il y a en même temps les autres signes dont nous avons parlé , on a lieu de soupçonner la présence du calcul dans les ureteres ; enfin lorsque les malades après avoir éprouvé tous ces symptômes , sentent une douleur tantôt gravative , tantôt aiguë , rapportée à la vessie , & que les urines coulent avec peine , & sont ou sablonneuses ou même quelquefois sanguinolentes , on peut soupçonner la présence du calcul dans la vessie. Nous disons qu'on peut la soupçonner , parce qu'il peut arriver , & qu'il arrive même quelquefois que les malades éprouvent tous ces symptômes , sans avoir de calcul dans la vessie : la seule preuve indubitable qu'on puisse en avoir , est celle qu'on acquiert par le moyen de la sonde : sur quoi il faut cependant remarquer qu'il est bien certain qu'il y a un calcul dans la vessie , lorsqu'on le touche avec la sonde ; mais que , quoiqu'on ne le trouve pas par ce moyen , on ne peut pas en conclure qu'il n'y en ait point. On a vu des malades calculeux qui avoient été fondés , chez qui on n'avoit point trouvé de calcul , & qui cependant en avoient comme il a paru ensuite par l'ouverture de leur cadavre. Cela dépend alors de ce que la pierre est enkistée dans quelque coin de la vessie , ou nichée dans quelques rides & enveloppée de beaucoup de matières muqueuses ; en sorte qu'on ne peut connoître sa présence par un tact médiate , tel que celui que l'on fait par le moyen de la sonde , parce que dans ce cas on croit toucher simplement une membrane.

Contre-indications.

1°. Les lithontriptiques sont contre-indiqués, lorsque les concrétions pierreuses sont déjà un peu considérables, & qu'elles sont dans les ureteres ; dans ces cas, les lithontriptiques nuiroient. En augmentant l'impression de ces concrétions, ils causeroient une plus grande douleur & même l'inflammation : alors les adoucissants, les humectants intérieurement & extérieurement, les bains, les demi-bains, avec les plantes émollientes, avec l'huile, sont les remèdes qui conviennent le mieux. 2°. Les lithontriptiques sont contre-indiqués, lorsque les concrétions excitent des douleurs vives, des inflammations : alors il faut avoir recours aux saignées, aux calmants, aux émollients, aux adoucissants, soit sous forme de bain, soit sous forme de fomentation, de cataplasmes, &c.

Précautions.

Elles roulent sur la distinction des cas où ces médicaments conviennent, d'avec ceux où ils sont contre-indiqués : elles dépendent aussi du choix qu'on ne peut faire que par le détail de ces médicaments. Il y a beaucoup d'analogie entre la goutte & le calcul. Cela nous doit aussi faire sentir l'analogie qu'il y a entre les moyens propres à combattre l'une & l'autre de ces maladies : or on ne doute pas que le lait ne soit un bon remède dans la goutte ; pourquoi donc ne le seroit-il pas dans le calcul ? Cette raison devrait suffire pour nous faire rejeter le préjugé des anciens à cet égard. D'ailleurs l'observation fait voir que le lait est très-utile dans les calculeux. *Boerhaave* a observé qu'en Hollande on trouve beaucoup de calculs dans les bœufs qu'on tue en hiver, & qu'ils se dissipent en été, temps où ils ont une diarrhée séreuse, & où ils rendent beaucoup d'urine, ce qui ne peut venir que de la différence des aliments de ces animaux qu'on nourrit avec de la paille & du foin sec en hiver, & qui broutent l'herbe de la campagne dans les autres temps de l'année : cela prouve que les sucs les plus voisins de la fermentation putride, sont aussi les plus propres à la formation du calcul, & qu'au contraire ceux qui en sont plus éloignés, sont aussi plus convenables pour combattre les concrétions calculeuses. Les médicaments diurétiques sont très-propres à empêcher la formation de la pierre. Ils excitent une grande excrétion d'urine, & entraînent les petits calculs ou les matières sableuses ; ils sont donc en un sens lithontriptiques. Enfin il y a des médicaments qui ont ou qu'on a cru avoir la vertu de dissoudre la pierre, &c.

de la faire sortir par petits morceaux : ce sont ces médicaments qu'on pourroit proprement appeller lithontriptiques , supposé qu'il y en eut réellement de tels ; mais comme nous l'avons déjà dit , on est encore à en chercher qui aient cette propriété , & il est même très-difficile qu'on en trouve , par la raison donnée , que le même menstue qui dissout un calcul , ne peut en dissoudre un autre. Nous allons cependant rapporter ceux qui sont les plus utiles sous ce point de vue.

La Verge d'or , Virga aurea.

Il y a deux especes de verge d'or , qui sont d'usage en médecine. La petite verge d'or , ou la verge d'or à feuilles étroites , & la verge d'or à larges feuilles , ou la grande verge d'or. Elles ont toutes deux les mêmes vertus : on les trouve en quantité parmi les vulnéraires de Suisse , & c'est peut-être d'elles que viennent les bons effets qu'on éprouve de leur infusion.

Cas.

On emploie depuis long-temps la verge d'or avec succès dans les coliques néphrétiques , dans les embarras produits par des concrétions calculeuses , lorsque les malades rendent avec les urines , des matieres fableuses ; on la recommande pour des calculs plus durs , engagés dans la vessie. MM. *Hoffman* & *Boerhaave* disent l'avoir donné avec grand succès dans les obstructions des viscères du bas-ventre , comme du foie , de la rate ; dans les hydro-pisies naissantes qui en résultent , parce qu'elle déterge & fortifie le ton des viscères : on la donne aussi dans les bouillons & les ptisanes antidyssentériques. *Arnauld de Villeneuve* , Professeur de cette Université , se servoit avec succès de la poudre des fleurs de cette plante , dans le calcul. M. *Chomel* assure avoir vu de très-bons effets de sa simple infusion , dans les maladies de la vessie. *Charles Pison* prétend être le premier qui s'en est servi dans les coliques néphrétiques.

Vertus.

C'est un diurétique chaud , apéritif , stomachique.

Maniere de s'en servir , Doses.

On donne les feuilles & les fleurs de la verge d'or en infusion théiforme à la dose d'une pincée sur deux tasses d'eau bouillante ; on fait prendre

cette infusion le matin à jeun. *Arnauld de Villeneuve* en donnoit en poudre la dose de deux gros dans 3 ou 4 onces de vin blanc , tous les matins à jeun pendant 4 ou 5 jours. *Barclé* ne donnoit cette poudre qu'à la dose d'une drachme dans 4 onces de vin blanc , ou dans un œuf frais : il prétend que dans l'espace de trois jours , elle produit de bons effets , en cas de colique néphrétique. On peut aussi employer l'infusion de la verge d'or dans le cas d'obstructions des viscères , ou bien ajouter la feuille & la fleur de cette plante aux bouillons apéritifs.

Chardon étoilé ou Chauffetrape , Carduus stellatus seu Calcitrapa.

Cas.

ON se sert de l'écorce de la racine pulvérisée , dans les maladies des reins & de la vessie , dépendantes des matieres calculeuses ; dans les douleurs néphrétiques , pourvu qu'il n'y ait point de caractère d'inflammation. On prétend que le suc exprimé des feuilles , dépuré par résidence , & donné à la dose de quatre , cinq ou six onces au commencement de l'accès , guérit les fievres intermittentes.

Vertus.

LA Chauffetrape est un diurétique chaud , fébrifuge , vulnéraire , lithontriptique ; le suc des feuilles est fébrifuge ; l'écorce de la racine est diurétique.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

C'EST avec l'écorce de la racine de cette plante que *M. de Baviile* , Intendant du Languedoc , composoit le remede qu'il regardoit comme spécifique contre les douleurs néphrétiques , & dont il se servoit lui-même pour se délivrer de ses douleurs. Voici comment il le préparoit. Il prenoit demi-once de racine de chauffetrape qu'il infusoit pendant la nuit dans quatre ou cinq onces de vin blanc , il faisoit avaler cette infusion trouble le matin à jeun le vingt-huitieme jour de la lune , ce qui est peut-être superstition ; le lendemain il faisoit prendre la potion suivante : il prenoit une poignée de pariétaire , une once de sassafra , autant de semences d'anis , demi-gros de cannelle ; il faisoit bouillir le tout dans huit onces d'eau commune ; il faisoit infuser pendant la nuit ; le lendemain il faisoit échauffer cette liqueur , la passoit en exprimant , & ajoutoit à la colature , deux gros de sucre candi : il faisoit prendre cette potion aussi chaude qu'il étoit possible ;

Il répétoit tous les mois ce remede , & en voyoit de bons effets , car il se délivroit par-là des douleurs néphrétiques auxquelles il étoit sujet. Le chardon étoilé se donne aussi dans les obstructions des viscères , & dans l'hydropisie commençante , pourvu qu'il n'y ait ni fièvre , ni soif , ni ardeur.

La Boufferoie , Uva ursi.

Cas.

ON l'emploie dans les mêmes cas que la chaussetrape ; on a vu même qu'elle dissolvoit la pierre. Ceux qui en ont fait usage , ont été foulagés , quoiqu'ils n'aient pas été guéris radicalement.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON peut s'en servir en poudre , en infusion & en décoction : en infusion , la dose en est d'une pincée pour une tasse d'eau bouillante , qu'on fait infuser théiformement : on peut en donner deux tasses par jour , une le matin & l'autre le soir. En décoction , on en met demi-poignée sur une livre ou une livre & demie d'eau , on donne cette décoction par verrees pendant la journée. La poudre des feuilles s'ordonne depuis un gros jusqu'à deux dans une ou deux cuillerées de vin blanc , ou dans un œuf frais , comme faisoit *Barclé* de la verge d'or. On peut aussi ajouter l'*uva ursi* à la dose de demi-poignée aux bouillons apéritifs , diurétiques , dans les maladies des reins.

La Saxifrage , Saxifraga.

IL y a plusieurs plantes qu'on appelle saxifrages , parce que les anciens croyoient qu'elles avoient la vertu de briser ou de dissoudre le calcul ou la pierre , peut-être parce qu'elles croissent ordinairement dans les endroits pierreux & dans les fentes des murailles : quoiqu'elles n'aient pas cette propriété , cependant elles produisent de bons effets dans les maladies des reins & de la vessie , elles poussent les graviers par les urines ; c'est pourquoi on peut s'en servir dans ce cas-là. On les emploie de la même façon que l'*uva ursi* , & à la même dose. Il y a une espece de saxifrage qu'on recommande contre les écrouelles : c'est la petite saxifrage rouge , qu'on donne en infusion dans la biere ou dans le vin blanc. On peut se servir de ce remede , puisque nous n'en connoissons aucun contre

ce vice. M. *Hales* qui a recherché avec soin des médicaments capables de dissoudre le calcul, assure qu'il n'a pas trouvé de suc végétal dans lequel le calcul se dissout plus promptement que dans le suc d'oignon ; ainsi selon lui, ce suc pourroit être très-utile dans les maladies dépendantes des concrétions calculeuses.

Remede de Mademoiselle Stephens.

LES cruelles douleurs que cause le calcul, ont porté bien des personnes à chercher un remede assuré contre ce mal. Le Parlement d'Angleterre avoit promis une grande récompense à celui qui trouveroit un vrai Lithontriptique. Mademoiselle *Stephens* attirée par l'appas du gain, proposa le sien. On fit des expériences réitérées en présence de vingt-deux Commissaires nommés par le Parlement. Le remede réussit & fut approuvé, & la Dlle. *Stephens* reçut la récompense promise. C'est de ce remede dont nous allons parler. Nous exposerons, 1°. sa composition, 2°. les effets qu'il produit, 3°. les expériences qu'on a fait pour savoir en quoi consiste sa vertu, 4°. La façon de l'administrer. 1°. Mlle. *Stephens* propose une poudre, & ensuite une décoction sous forme de ptisane pour les personnes attaquées du calcul. En second lieu elle propose des pillules pour des personnes qui n'ont pas encore de calculs bien formés, mais qui sont seulement attaquées de coliques néphrétiques, produites par des matieres sablonneuses. La poudre n'est autre chose que des coquilles d'œufs & des coquilles de limaçons avec l'animal, calcinées & réduites en poudre. La ptisane se fait ainsi : on prend une poignée de fleurs ou de feuilles de camomille, de persil, de fenouil & de bardane, on les fait bouillir ensemble, on y ajoute quatre onces de savon d'Alicante. Les pillules pour la gravelle sont composées de quatre onces de savon d'Alicante & de la poudre de limaçon, le tout incorporé avec suffisante quantité de miel. On retranche les coquilles d'œuf, & on y ajoute les semences de daucus, d'aubepin, le fruit de glantier, le tout calciné à noirceur. 2°. MM. *Geoffroi* & *Morand* furent chargés à Paris par l'Académie de faire l'épreuve de ce remede. M. *Morand* l'a fait sur quarante malades de tout sexe, de tout âge, chez qui la présence du calcul avoit été constatée par le moyen de la sonde : il a été observé que les premiers jours que les malades faisoient usage de la poudre & de la ptisane dont nous avons parlé ci-devant, sentoient une chaleur, une légère ardeur à la gorge, des envies de vomir, ou même qu'ils éprouvoient des vomissements. Ces symptomes dispa-roissoient quelques jours après. L'usage

de ce remede , quoique continué pendant long-temps , quelquefois même pendant un an , ne produisoit point d'altération sensible dans l'économie animale ; mais quelque temps après avoir usé de ce remede , les malades rendoient des urines épaisses , bourbeuses , plâtreuses , glaireuses avec de petits fragments de pierre. Ensuite en continuant ce même remede , les urines devenoient claires , limpides , & le malade se trouvoit alors soulagé ou guéri. M. Morand n'a pu s'assurer si la pierre étoit entièrement détruite , ou si elle subsistoit encore dans ceux qui étoient soulagés ou guéris par l'usage de ce remede , les malades n'ayant plus voulu se soumettre à la sonde , après avoir été soulagés. Parmi ceux sur qui on a éprouvé ce remede , la plupart ont été soulagés , d'autres n'en ont ressenti aucun bon effet , d'autres en ont été plus malades , enfin quelques-uns en sont morts ; mais ces derniers avoient tous des ulcères aux reins. Parmi ces malades il y avoit cinq enfants dont il n'y eut qu'un seul qui ressentit les bons effets de ce remede ; aussi avoit-on observé en Angleterre qu'il étoit rarement utile pour les enfants , & que plus on s'éloignoit de l'enfance , plus on en étoit soulagé , y ayant peu d'enfants qui s'en trouvaient bien , & au contraire beaucoup d'adultes & beaucoup plus de vieillards encore qui en ressentoient les bons effets. 3°. On a essayé de trouver dans quelle partie réside la vertu de ce remede. Pour cela on a fait les expériences suivantes : on a mis des pierres tirées des vessies humaines dans l'urine des personnes saines & dans l'urine des personnes calculeuses pendant le temps qu'elles faisoient usage de la ptisane décrite , quand les urines étoient plâtreuses & glaireuses , & quand elles étoient claires , limpides. Enfin , on en a mis dans la ptisane même & dans la simple dissolution de savon , & on a observé ce qui suit. Les pierres mises dans les urines des personnes saines , augmentoient sensiblement de poids. Celles qui avoient été mises dans celles des personnes qui prenoient actuellement le remede , mais qui étoient encore chargées , plâtreuses , glaireuses , augmentoient aussi de poids dans l'espace d'un mois. Celle qu'on avoit mis dans les urines des personnes qui faisoient usage des remedes , mais dans le temps qu'elles étoient devenues claires & limpides , diminueoient de poids , & avoient de petits trous à leur surface. Ces pierres mises dans la ptisane diminueoient aussi considérablement de poids. Enfin celles qu'on avoit mis dans la simple dissolution de savon , diminueoient aussi de poids , mais moins que celles qui avoient été mises dans la ptisane. D'où il paroît suivre naturellement que la vertu de ce remede réside principalement dans le savon & dans les terres alcalines , c'est-à-dire , dans la chaux des coquilles d'œuf & dans celles du limaçon & de sa coquille. La

décoction des plantes paroît aussi concourir , puisque les pierres mises dans la ptisane imprégnée de la vertu de ces plantes , diminuoient davantage de poids , que celles qu'on mettoit dans la simple dissolution du savon.

Les expériences que nous venons de rapporter ont engagé les Anglois à simplifier ce remede qui , tel que Mademoiselle *Stephens* le propose , & que nous l'avons décrit , excite beaucoup de rebut aux malades. On l'a réduit au savon & à la coquille d'œuf. Un Médecin Anglois faisoit prendre le savon en substance à la dose de demi-gros coupé par tranches , le matin à jeun , faisant boire par dessus un ou deux verres d'une ptisane faite avec la lessive des coquilles d'œuf calcinées , ou bien il le dissolvoit dans l'eau : on s'est très-bien trouvé de ce remede donné de cette façon. Le même Médecin a observé qu'on a les mêmes effets en se servant de la seconde eau de chaux. Cependant la chaux en substance animale a plus de vertus. Le savon d'Alicante est fait avec l'huile , la soude & la lessive de chaux. *M. de la Mure* a donné la lessive des coquilles d'œufs ou d'huîtres , dans une ischurie invétérée , sans marques de calcul , mais où les urines étoient blanchâtres , glaireuses. Il a éprouvé que le malade en ressentoit d'heureux succès , mais que cette lessive échauffoit peu , & ne produisoit aucun inconvénient fâcheux. 4°. Quant à la façon d'administrer le remede de Mademoiselle *Stephens* , elle est toute simple : on prend trois prises par jour de la poudre, deux le matin & une le soir. Chaque prise est de cinq ~~grains~~ ^{à six} grains délayés dans quatre ou cinq onces de vin blanc , & par dessus cinq ou six onces de la ptisane dont nous avons parlé. Pendant l'usage de ce remede , il ne faut pas manger beaucoup , & on doit faire peu d'exercice. Voilà la façon de s'en servir & le régime qu'on doit garder. Pour le temps qu'il faut en continuer l'usage , il n'est pas limité, un , deux , trois mois , &c. plus ou moins , suivant l'effet qu'il produit. Nous remarquerons en finissant que ce remede est presque inutile pour les enfans , très-nuisible à ceux qui ont des ulceres aux reins , & qu'il ne convient pas à tous les calculeux : ainsi il nous reste toujours à chercher un vrai lithontriptique universel.

Les Fébrifuges.

O U T R E les médicaments altérants particuliers qui sont propres à combattre les vices de quelque viscere ou de quelque partie du corps humain en particulier , il y en a encore d'autres qui sont appropriés à quelques maladies particulieres. Or , entre ces maladies , une des plus fréquentes est la
fièvre.

fièvre. Les médicaments qui conviennent & qui sont propres à combattre cette maladie sont appelés fébrifuges. C'est de ces médicaments que nous allons parler, après avoir fait quelques réflexions sur les différentes espèces de fièvres. Les fièvres sont ou continues ou intermittentes; les fièvres continues sont celles qui affligent le malade, depuis le commencement jusqu'à la fin, sans laisser aucun intervalle: elles sont ou continues simples & sans redoublement, ou continues composées & avec redoublement; les continues simples sont celles dans lesquelles les symptômes n'augmentent pas sensiblement; les continues composées sont celles dans lesquelles on remarque des redoublements & des remissions ou relâches, c'est-à-dire, des temps où les symptômes augmentent, & d'autres où ils diminuent. Le temps où les symptômes paroissent augmenter, est appelé redoublement, exacerbation, paroxysmes, par quelques-uns accès. Le temps où les symptômes diminuent, est appelé remission. L'ordre selon lequel les paroxysmes reviennent, ou l'intervalle qu'il y a entre deux paroxysmes, est appelé type; ainsi par rapport aux types, on divise les fièvres, en continues quotidiennes, tierces, & quartes. Les continues quotidiennes, sont celles dont le paroxysme revient tous les jours; les continues tierces sont celles dont le paroxysme revient tous les trois jours: les quartes sont celles dont les paroxysmes reviennent tous les quatre jours, ou qui laissent deux jours dans lesquels les symptômes ne paroissent pas augmenter. Les ~~fièvres~~ intermittentes sont celles qui laissent des intervalles dans lesquels le malade paroît se bien porter: le retour de la fièvre est proprement appelé accès, & le temps qui est sans fièvre, s'appelle intermission. Les anciens distinguoient aussi les fièvres intermittentes par rapport à leurs types, en intermittentes quotidiennes, tierces, quartes. Les intermittentes quotidiennes sont celles dont les accès reviennent tous les jours à la même heure; les tierces sont celles dont les accès reviennent tous les trois jours, & les quartes celles dont les accès reviennent tous les quatre jours. On distingue encore les fièvres intermittentes par rapport à leurs types en doubles tierces, en doubles quartes: les doubles tierces sont celles dont les accès reviennent tous les jours, de sorte que l'accès du premier jour répond à celui du troisième, l'accès du second à celui du quatrième, &c. la double quarte est celle dont les accès reviennent tous les deux jours, en sorte que l'accès du premier jour répond à celui du quatrième, & l'accès du second jour à celui du cinquième, &c. les anciens ne distinguoient pas seulement les fièvres par rapport à leurs types, mais encore par rapport à l'humeur qui les entretenoit. Ainsi ils croyoient que les fièvres quotidiennes étoient

entretenuës par une humeur visqueuse , tenace qu'ils nommoient la pituite ; & par le relâchement des solides , parce qu'ils avoient remarqué que ces fievres étoient ordinairement produites par cet état , tant des solides que des fluides. Ils avoient aussi observé que les fievres tierces étoient entretenues par une humeur bilieuse , qui péchoit , soit en qualité , soit en quantité , & qui étoit jointe à une grande irritabilité des solides ; enfin ils avoient remarqué que les fievres quartes se trouvoient ordinairement dans des personnes d'un tempérament mélancolique , dans lesquelles les fluides étoient âcres & épaissis par secheresse , & les solides fort tendus. Cela posé , ils distinguoient les fievres intermittentes , en *légitimes* & *bâtardes* : ils appelloient fievres légitimes , celles qui étoient produites par une humeur qui répondoit aux types , & fievres bâtarde , celles qui étoient produites par une humeur qui ne répondoit pas aux types ; par exemple , la fièvre quotidienne étoit ordinairement produite par la pituite ; ainsi lorsqu'une fièvre quotidienne avoit les symptomes qui caractérisoient la pituite , ou plutôt une humeur visqueuse & tenace , ils l'appelloient fièvre quotidienne légitime , & au contraire si la fièvre quotidienne avoit des symptomes qui caractérisoient une humeur différente , la bile , par exemple , ou bien ce qu'ils appelloient humeur mélancolique , ils l'appelloient fièvre quotidienne bâtarde , ainsi des autres fievres qui avoient le type de la fièvre tierce , ou quarte : il est aisé de connoître que ces termes de légitimes , de bâtarde , n'étoient point dépourvus de sens chez les anciens , & que cette distinction des fievres par rapport aux différents états des fluides , d'où elles dépendoient , étoient extrêmement utiles pour la pratique : elle conduit en effet naturellement aux remèdes convenables. Les modernes ont conservé ces termes , de légitimes & de bâtarde ; mais ils n'en ont pas retenu le sens qui est cependant très-utile à la pratique. Les anciens avoient aussi remarqué que dans les différentes especes de fievres , il y avoit différentes parties affectées , par exemple , que dans la fièvre quotidienne légitime l'estomac paroissoit principalement dérangé , ce qu'ils connoissoient par les nausées , par l'inappétence , par le dérangement des digestions ; que dans les fievres tierces légitimes bilieuses , le foie étoit ordinairement attaqué , & c'est ainsi que M. de la Mure a eu occasion de l'observer ; que dans les fievres quartes légitimes , la rate étoit principalement affectée : outre cela ils donnoient les signes qui caractérisent les fievres , soit légitimes , soit bâtarde. Dans les fievres quotidiennes légitimes , ils observoient que le froid étoit très-long , quoique ce ne fût qu'une espece de réfrigération absolue de toute l'habitude du corps ; que

la chaleur qui succédoit au froid venoit lentement , paroissoit naturelle , n'étoit pas âcre , mais vaporeuse , comme ils disoient , & aliteuse , c'est-à-dire , que les malades éprouvoient une espece de moiteur par tout le corps , pendant la chaleur qui duroit cinq ou six heures ; que les malades se plaignoient pendant le froid de douleur d'estomac , de cardialgies , de nausées , d'inappétence , d'abattement de force ; qu'ils éprouvoient même de vomissemens , qu'enfin les accès de fièvre revenoient ordinairement sur le soir , ou même dans la nuit , d'où vient qu'on appelloit aussi ces fièvres , *fièvres nocturnes*. Voilà les symptomes qui caractérisoient les fièvres quotidiennes légitimes. Celles qui n'avoient pas ces symptomes , quoiqu'elles eussent les types de quotidiennes , c'est-à-dire , quoique les accès revinssent chaque jour , étoient appelées quotidiennes bâtardes. Dans les fièvres tierces légitimes bilieuses , ou comme parloient encore les anciens dans les fièvres exquisés , le froid est plus vif , avec un sentiment de ponction , rapporté à toute la surface du corps , c'étoit ce que les anciens appelloient , *frigus punctorium* ; c'est quelquefois un froid absolu , c'est-à-dire , que les personnes présentes peuvent le sentir ; d'autres fois il est seulement relatif , c'est-à-dire , que les personnes présentes trouvent le malade chaud , quoiqu'il se plaigne d'un grand froid par tout le corps. Sur la fin du froid , il prend au malade des envies de vomir , & il vomit , entre le froid & le chaud , des matieres bilieuses ; la chaleur qui succède est vive , brûlante , âcre , accompagnée d'une grande soif , de maux de tête considérables , de douleurs rapportées à la région du foie : elle dure trois ou quatre heures , après quoi elle diminue peu-à-peu , & il survient alors des sueurs. Les fièvres intermittentes bilieuses & légitimes reviennent ordinairement le matin vers les sept à huit heures. Les fièvres tierces qui ont les symptomes que nous venons de rapporter , étoient appelées par les anciens *fièvres tierces légitimes* : celles qui ne les ont pas , étoient appelées *tierces bâtardes*. Dans la fièvre quarte légitime , le froid est beaucoup plus vif & beaucoup plus long , il dure cinq ou six heures ; c'est un froid absolu dont les assistans s'apperçoivent , & qui va jusques *ad languorem* , comme disoient les anciens. Quelquefois les membres sont plus froids que la glace , les malades éprouvent des secousses vives , avec des craquemens des dents , & des mouvemens convulsifs de la mâchoire inférieure ; sur la fin du froid ils ont des cardialgies , des envies de vomir , des vomissemens : à cela succède une chaleur ardente accompagnée de beaucoup de soif , & d'une douleur vive & profonde qu'ils rapportent aux os , & que les anciens appelloient pour cette raison *osteocopes* : cette chaleur n'est pas terminée par

des sueurs abondantes , du moins dans les premiers accès. La fièvre quarte légitime revient , selon l'observation , sur le soir vers les trois à quatre heures : tels sont les symptômes qui caractérisent les fièvres quartes légitimes ou exquises ; celles qui ayant le type des quartes , ne sont cependant pas accompagnées de ces symptômes , étoient appelées quartes bâtarde. En faisant attention à cette distinction des fièvres en légitimes & bâtarde , on verra aisément qu'il ne peut y avoir des spécifiques contre toutes ces fièvres en général , ni même contre les fièvres qui ont le même type : par exemple , il est évident que la fièvre tierce légitime qui est la même , par rapport au type , que la fièvre tierce bâtarde , ne peut être guérie par les mêmes remèdes , parce qu'elle est entretenue par un état des fluides & des solides , tout différent de celui qui se trouve joint à la fièvre tierce bâtarde , ce qui paroît par les symptômes différents qu'on trouve dans l'une & dans l'autre , quoique le type soit le même. Or c'est au vice des solides & des fluides qu'on doit avoir égard dans l'administration des remèdes. Ceci doit nous faire sentir de plus en plus l'utilité de cette distinction , puisque par-là nous sommes avertis de faire attention , non-seulement au type des fièvres , mais encore à l'état des solides & des fluides. Les médicaments dont on a éprouvé l'efficacité , principalement contre les fièvres intermittentes , sont appelés fébrifuges. En faisant attention à cette définition , on voit aisément dans quel cas ils sont indiqués. Nous parlerons des effets généraux qu'ils produisent sur le corps humain , & des précautions que l'on doit prendre dans leur administration , en parlant du quinquina. On peut ranger parmi les fébrifuges , les stomachiques chauds , les stimulants , les astringents , & plusieurs diurétiques chauds dont nous avons déjà parlé ; il ne nous reste qu'à parler du quinquina , & de la cascarille.

Le Quinquina , Kinakina , seu Cortex Peruvianus.

LE Quinquina est extrêmement célèbre ; c'est le fébrifuge par excellence. Pour procéder avec quelque ordre dans ce que nous avons à dire de ce médicament important , 1°. nous en ferons une courte description ; 2°. nous examinerons ce qu'il produit sur le corps humain ; 3°. nous exposerons les cas où il est indiqué ; 4°. ceux où il est contre-indiqué ; 5°. les différentes manières de s'en servir , & enfin les précautions à prendre selon les différents cas , dans son administration.

Description du Quinquina.

LE Quinquina qui n'est connu en France que depuis l'année 1649 , est une écorce extrêmement sèche , de l'épaisseur de deux ou trois lignes , très-rude , couverte quelquefois d'une mousse blanchâtre , un peu résineuse , de couleur rousse , ou de rouille de fer , d'une amertume très-grande , un peu astringente , & d'une odeur aromatique qui n'est pas désagréable. Quelquefois on apporte le quinquina en écorce assez grande , longue de trois ou quatre pouces au moins , & large d'un pouce , non roulée ; ce sont les écorces arrachées du tronc de l'arbre. Quelquefois elles sont minces , roulées en petits tuyaux , extérieurement brunes , marquées de lignes circulaires couvertes de mousse , intérieurement rouges ; ce sont les écorces de petites branches : d'autres fois elles sont par morceaux très-petits ou coupés fort menus , jaunes en dedans & blanchâtres en dehors ; on dit que c'est le quinquina que l'on a levé des racines : il est fort estimé par les gens du pays. Il faut choisir celui qui est rouge , ou qui tire sur le rouge , dont la couleur ressemble à celle de la cannelle , qui est friable sous la dent , & dont l'odeur & la saveur sont un peu aromatiques : on doit rejeter celui qui est visqueux , gluant , dur comme le bois , vieux , passé , insipide , falsifié. L'arbre du Pérou dont on retire cette écorce s'appelle *Quinquina* ou *Kinakina*. Sa vertu fut découverte par hasard. Dans le pays où il croît les fièvres sont fort communes : un sauvage qui en étoit attaqué , étant fort altéré , but d'une eau dans laquelle tomboient les feuilles de cet arbre , qui lui donnoient l'amertume qu'on y trouvoit ; il s'en trouva soulagé : on fit attention à cela , & les naturels du pays ne manquèrent pas de faire usage de ce remède dans l'occasion ; mais ils tinrent sa vertu long-temps cachée aux Espagnols qu'ils haïssoient. Un Médecin l'enseigna à un gouverneur Espagnol , en reconnaissance de quelque service qu'il en avoit reçu. Celui-ci à son tour en fit part au vice-Roi dont la femme étoit atteinte de la fièvre. C'étoit le Comte de *** , qui étoit à Lima , capitale du Pérou. Cette Dame en fit usage , & recouvra la santé. Cet événement rendit en peu de temps ce remède très-fameux , & on lui donna le nom de poudre de la Comtesse. Vers l'année 1645 , le Provincial des Jésuites d'Amérique , étant de retour en Italie pour l'assemblée générale de son ordre , & ayant porté avec lui une grande quantité de cette écorce , en distribua à plusieurs Religieux de cet ordre qui se trouvoient alors assemblés à Rome ; ce qui contribua à faire connoître ce remède dans les diffé-

rentes parties de l'Europe ; on lui donna le nom de poudre des Peres , & les Anglois l'appellent encore aujourd'hui , *Poudre Jésuitique*. On l'appelle aussi la Poudre du Cardinal de *Lugo* , parce que ce pieux Cardinal en fit distribuer *gratis* une grande quantité aux pauvres de la ville de Rome. Cependant , soit qu'on lui substituât d'autres écorces , soit qu'on ne l'administrât pas dans toutes les regies , on s'aperçut que les accès de fièvre cessoient à la vérité , mais qu'ils revenoient ensuite , & que ce remede caufoit des hydropiques , des obstructions , & changeoit quelquefois les fievres intermittentes en fievres continues ; ce qui lui fit perdre beaucoup de son crédit , & fut cause même qu'on en négligea l'usage pendant quelque temps , jusqu'à ce que *Robert Talbot* , chevalier Anglois , le renouvela. Ce Chevalier en fit d'abord un secret , ayant masqué ce remede qu'il présentoit sous une nouvelle forme. Louis XIV lui donna une grosse somme d'argent pour avoir connoissance de ce secret , & ordonna qu'on fit porter du Quinquina dans tout son Royaume : depuis ce temps-là l'usage du quinquina commença à revivre en France sous le nom de remede Anglois.

Effets généraux du Quinquina sur le corps humain.

1°. PAR rapport aux solides , il les resserre , il augmente leur force fistaltique ; 2°. il divise & atténue les fluides ; c'est ce qui résulte des expériences de MM. *Hales & Freind*. 1°. M. *Hales* fit une décoction de quinquina , qu'il passa à travers un linge fin & ferré , en sorte que la liqueur étoit très-claire & très-limpide. Il ouvrit un chien , fendit une portion du canal intestinal , & de l'artere méésentérique , dont il fit sortir le sang grumelé ; ensuite il fit couler de l'eau chaude par cette même artere méésentérique , & il mesura le temps qu'elle employoit à passer dans toutes les ramifications qu'il avoit coupé en ouvrant le canal intestinal : il en fit de même à l'égard de la décoction de quinquina , & il trouva qu'elle employa beaucoup plus de temps à passer par ces ramifications , que l'eau chaude , & que les derniers pots de cette même décoction mirent plus de temps à passer que les premiers , ce qui ne pouvoit venir que de ce que la décoction de quinquina resserroit toutes les ramifications ; car , comme nous l'avons remarqué , cette décoction avoit été filtrée , étoit très-limpide , & d'ailleurs au même degré que l'eau premièrement injectée ; d'où il suit que le quinquina est astringent. 2°. Sa vertu atténuante par rapport aux fluides , n'est pas moins certaine. 1°. Nous savons qu'en général les médicaments qui resserrent les solides & augmentent l'action oscillatoire des vaisseaux ,

doivent atténuer les fluides ; ainsi le quinquina atténue médiatement les fluides en tant qu'il augmente l'action fistaltique des solides. 2°. Il divise encore & atténue les fluides immédiatement, c'est-à-dire, en agissant immédiatement sur eux ; c'est ce qui paroît par l'expérience suivante. M. *Freind* a mêlé de la poudre de quinquina avec du sang récemment tiré, & il a remarqué qu'il restoit beaucoup plus long-temps fluide, & demeurait beaucoup plus à se coaguler, que celui qui avoit été laissé à lui-même. Cette force atténuante du quinquina a paru si bien prouvée à M. *Freind*, qu'il a regardé ce médicament comme un bon emmenagogue, qu'il en a fait usage sous ce point de vue, & en a vu de très-bons effets. Ceci est encore prouvé à *posteriori* ; car on observe qu'après l'exhibition du quinquina, la chaleur, & les forces de la circulation augmentent, le poulx devient plus élevé & plus plein, & qu'outre cela il purge : quelquefois même donné seul dans les cas que nous indiquerons ci-après, il pousse aussi par les urines, & cela avec beaucoup de succès. Il arrive cependant que le quinquina guérit les accès de fièvre sans produire d'évacuations sensibles, soit par les selles, soit par les urines ; mais cela est rare, & même on doit craindre alors la récidive, ou bien on peut croire que l'excrétion de la peau a été augmentée. M. *de la Mure* a observé que dans les fièvres intermittentes bilieuses, qui se terminent par des sueurs copieuses, l'usage du Kina diminueoit ou supprimoit même les sueurs, mais il survenoit alors des éruptions érisipélateuses, & les accès de fièvre en devenoient plus longs. Tels sont les effets généraux que produit le quinquina sur le corps humain : nous verrons ses effets particuliers, en parlant des précautions que l'on doit prendre en l'administrant.

Cas où le Quinquina est indiqué.

1°. LE Quinquina convient dans toutes sortes de fièvres, c'est-à-dire, dans les fièvres continues, & dans les fièvres intermittentes. 2°. dans les douleurs périodiques quelconques. 3°. Dans les dérangements d'estomac. 4°. Dans la suppression des règles, mais dans les cas où l'on emploie les emmenagogues proprement dits. 5°. Dans les affections gangreneuses. 6°. Dans les plaies d'armes à feu. Tels sont les cas où l'on peut dire en général que le quinquina convient ; nous allons parler de chacun en particulier, & nous ferons sur quelques-uns les explications & les réflexions nécessaires. I. Nous avons dit que le quinquina convient, en général, dans les fièvres, soit continues, soit intermittentes. Pour ce qui est des fièvres con-

continues ; cela doit s'entendre des deux cas suivans. 1^o. Dans les fièvres continues qu'on appelle *subintrantes*, c'est-à-dire, dans lesquelles à peine un redoublement est fini, qu'un autre recommence, comme on ne trouve pas de tems pour placer les purgatifs qui sont indiqués, on prescrit alors le kina avec succès, pour deux raisons : la première c'est qu'il purge par lui-même : la seconde c'est qu'il éloigne les redoublements dans les fièvres continues exacerbantes, de même qu'il dissipe les accès dans les fièvres intermittentes. De même quand l'intervalle qu'il y a entre les redoublements est un peu considérable, mais qu'il n'est pas encore suffisant pour placer les purgatifs, comme par exemple, lorsqu'il est seulement de deux ou trois heures, alors on anticipe de deux heures sur le redoublement qui précède, & qui est sur son déclin : ces deux heures jointes aux trois d'intervalle qu'il y a entre les redoublements, donnent un temps suffisant pour placer le purgatif, & pour qu'il ait produit son effet avant que le second redoublement commence. Dans ces deux cas, la meilleure méthode d'administrer le kina, est de le joindre aux autres purgatifs. 2^o. Dans les fièvres putrides marquées par un grand relâchement des solides, & épaisissement des fluides, sur la fin, lorsque les redoublements, quoique peu considérables, subsistent pourtant malgré tous les purgatifs qu'on a employés, on observe quelquefois une espèce de fièvre lente : alors il est très-prudent de faire prendre le quinquina, qui abrège le temps de la curation ; mais dans les fièvres putrides marquées de beaucoup d'ardeur, il seroit nuisible, aussi il faut s'en abstenir : ce n'est que sur la fin des fièvres putrides, dans les circonstances que nous avons marquées ci-devant, qu'on peut l'employer. A l'égard des fièvres intermittentes, on peut dire en général que le quinquina convient dans ces sortes de fièvres. Cependant il y a des fièvres intermittentes où il convient plus directement & plus spécialement ; d'autres où l'on doit craindre son usage, & n'y avoir recours qu'avec beaucoup de ménagement ; d'autres enfin où il seroit nuisible. D'abord, le quinquina convient spécialement dans les fièvres intermittentes quotidiennes légitimes. C'est ce que l'observation fait voir tous les jours. L'on en sentira la raison, si on se rappelle ce que nous avons dit ci-devant de ces sortes de fièvres, dans lesquelles les solides sont relâchés, & les fluides épais & visqueux, & si on fait en même temps attention aux effets que le quinquina produit sur le corps humain. Il convient aussi spécialement dans les autres fièvres intermittentes qui sans avoir le type des quotidiennes, en ont cependant le caractère, c'est-à-dire, dans lesquelles les fluides sont

épaissis

épaissis par viscosité, & les solides relâchés, soit qu'elles aient le type de la tierce, soit celui de la quarte. A l'égard des fièvres tierces légitimes bilieuses, nous avons vu qu'elles supposent beaucoup d'activité de la part des fluides, & beaucoup d'irritabilité de la part des solides; ainsi on ne doit administrer le quinquina dans ces sortes de fièvres qu'avec beaucoup de ménagement, & en le mitigeant même: si c'étoient des fièvres doubles-tierces légitimes, il seroit plus prudent de s'en abstenir totalement. Enfin dans les fièvres quartes légitimes, les fluides sont âcres, & épaissis par sécheresse, les solides très-tendus: il est visible que dans ces circonstances, un remède qui resserre comme fait le quinquina, ne sauroit convenir; on doit donc alors s'en abstenir absolument, ou du moins être fort circonspect dans son usage. Il faut remarquer que nous ne disons pas que le quinquina soit contre-indiqué dans les fièvres qui ont tel ou tel type, mais dans celles qui dépendent de tel ou tel vice, soit de la part des solides, soit de la part des fluides, quel que soit le type qu'elles portent. Nous n'ignorons pas au reste que quelques auteurs disent, qu'on peut donner le quinquina dans toutes sortes de fièvres intermittentes; voici comment ils raisonnent: le quinquina par sa vertu spécifique arrête un accès, or un accès échauffe & affoiblit bien plus qu'une prise de quinquina: d'où ils concluent qu'on doit l'employer dans toutes sortes de fièvres intermittentes indistinctement. L'observation est contraire à ce beau raisonnement. On observe tous les jours que l'usage inconsideré du quinquina procure des obstructions, des hydropisies, & que quelquefois des fièvres intermittentes se changent par son usage, en fièvres continues; ainsi on ne sauroit avoir trop d'attention à l'état des solides & des fluides, avant d'administrer le quinquina. II. Le quinquina convient dans les douleurs périodiques: on a employé ce médicament dans ce cas-là, d'abord par analogie, parce que voyant qu'il produisoit des bons effets dans les fièvres intermittentes, on a jugé qu'il pourroit aussi être utile dans les maladies périodiques qui laissent des intermissions, & effectivement on en a vu de très-bons effets dans les maux de tête périodiques, dans les rhumatismes périodiques, & en général dans toutes les maladies périodiques, quoiqu'il n'y eût pas de fièvre; ce qui peut venir de ce que le quinquina donnant du ton à l'estomac, & en général aux solides, perfectionne les digestions, & corrige ainsi les vices d'où dépendent souvent ces douleurs périodiques. On doit cependant dans ces circonstances user de la même circonspection que nous avons dit qu'il falloit avoir dans le cas des fièvres intermittentes. III.

Dans les dérangements d'estomac , & en général dans toutes les maladies des premières voies , où nous avons dit ailleurs que convenoient les stomachiques chauds : la raison en est évidente par tout ce que nous avons dit des effets que produit le quinquina sur le corps humain.

IV. Dans la suppression des regles , pourvu qu'elle dépende de l'atonie des vaisseaux & de l'épaississement visqueux des fluides , en un mot où nous avons dit que les emmenagogues proprement dits , convenoient. *M. Freind* l'a employé dans ce cas-là , & s'en est très-bien trouvé.

V. Depuis quelque temps l'observation a appris que le kina est un très-bon remède pour la gangrene , principalement des parties externes. Dans plusieurs maladies , comme par exemple , dans les fièvres malignes à *coagulo* , il survient souvent des gangrenes que le quinquina prévient & détruit en rétablissant la circulation. Un des amis de *M. de la Mure* eut occasion de traiter une gangrene survenue à la vulve chez une femme : il fit prendre le quinquina intérieurement , & en appliqua la décoction sur la partie gangrénée , & il réussit très-bien. *M. de la Mure* a eu lui même occasion d'employer la décoction de quinquina dans une gangrene survenue à la suite d'une inflammation hémorroïdale , & qui faisoit de progrès si rapides , que dans quatre ou cinq heures elle s'étendit de la largeur d'un écu de six livres , en attendant le secours du Chirurgien qu'il fallut aller chercher dans la ville voisine. *M. de la Mure* après avoir fait scarifier la partie , fit appliquer dessus une fomentation faite avec la décoction de quinquina , & par ce moyen il arrêta les progrès de la gangrene. Il y a plusieurs observations dans les Mémoires d'Edimbourg qui prouvent la vertu antiseptique ou antigangreneuse du quinquina. Il faut remarquer cependant que le quinquina ne produit pas ces bons effets dans toutes sortes de cas , & même qu'il augmente quelquefois le mal ; ainsi il faut distinguer les cas , & les circonstances. Si la gangrene dépend simplement du relâchement des solides & de l'épaississement visqueux des fluides , & que d'ailleurs les forces ne soient pas épuisées ; le quinquina ne peut produire alors que des bons effets ; mais si elle vient à la fin d'une fièvre putride qui a épuisé les forces du malade , ce médicament peut en produire de mauvais , en resserrant les vaisseaux ; car le quinquina ne peut bien agir en resserrant , qu'autant que les forces vitales sont capables de surmonter les résistances qu'il augmente : il faut donc que les forces ne soient pas entièrement épuisées , pour qu'il produise des bons effets.

VI. Enfin le quinquina convient dans les plaies d'armes à feu. C'est à *M. Rambi* , Chirurgien de l'armée dans les dernières guerres , que nous devons la découverte de cette pro-

priété du quinquina : il a observé constamment que ce médicament employé seul , soit intérieurement , soit extérieurement , remplissoit alors toutes les indications dans le cas où le pouls étoit petit , & où il survenoit des convulsions , & que les malades guérissent promptement. Tels sont les cas où le quinquina s'emploie avec succès.

Cas où le Quinquina est contre-indiqué.

EN faisant attention aux effets généraux que le quinquina produit sur le corps humain , il est aisé de se représenter en général , les cas où il est contre-indiqué. Il donne du ton aux solides , divise , atténue les fluides , il échauffe : il est donc contre-indiqué dans tous les cas où le ton est trop augmenté , où il y a une grande tension , & où l'on craint d'échauffer ; & s'il est nécessaire de le donner dans ces circonstances pour remplir certaines indications , il est visible qu'on doit le faire avec beaucoup de circonspection. Ainsi pour en venir aux cas particuliers , le quinquina est contre-indiqué ; 1°. dans les maladies inflammatoires sur-tout érépisélateuses , dans lesquelles le mouvement du sang est augmenté , les solides très-faciles à irriter , & à plus forte raison si l'inflammation se porte vers le bas-ventre. 2°. Dans les fièvres continues accompagnées de beaucoup d'ardeur , de soif , dans lesquels les fluides ont une certaine tournure vers la putridité , & les solides très-susceptibles d'irritation. Il est cependant des cas où l'on doit le donner dans les fièvres continues , ainsi que nous l'avons déjà remarqué ci-devant , comme par exemple , dans le cas des fièvres *subintrantes* pour éloigner les redoublements , & pour pouvoir placer les purgatifs ; comme aussi sur la fin des fièvres putrides , lorsqu'il y a inappétence , & que la fièvre subsiste toujours malgré les purgatifs qu'on a employé. 3°. Dans les fièvres intermittentes tierces bilieuses légitimes. Elles sont marquées par un sentiment de froid assez vif , souvent absolu , par une chaleur âcre accompagnée de violents maux de tête , par une soif inextinguible , le malade éprouve des douleurs qu'il rapporte à la région du foie : dans ces fièvres les solides sont extrêmement irritables , & il y a dans les fluides une âcreté rance qui tourne vers la putréfaction ; aussi ces fièvres ne se trouvent-elles que dans les personnes d'un tempérament bilieux , après des violents exercices : dans ce cas on sent qu'il y a beaucoup à craindre d'un médicament qui échauffe , sur-tout si ces fièvres sont doubles tierces : on doit donc s'en abstenir alors , quoiqu'en général ce soit un excellent fébrifuge dans les fièvres intermitten-

res ; cependant dans les fievres tierces simplement , on peut s'en servir , mais en le mitigeant de la façon que nous le dirons en parlant de la maniere d'administrer ce médicament. 4°. Dans les fievres quartes légitimes ; celles-ci sont marquées par un froid encore plus vif qui va jusques *ad languorem* . & qui dure cinq ou six heures , étant accompagné de craquement des dents , de mouvemens convulsifs de la mâchoire inférieure , & auquel succede une chaleur ardente , une soif inextinguible. Dans ces fievres le bas-ventre s'obstrue aisément , le sang & la lympe sont épaissis par sécheresse , le tissu des solides entièrement reserré ; ainsi le quinquina dans ces circonstances , ne peut qu'augmenter le mal , sur-tout s'il est donné à haute dose , aussi Sydenham le regardoit-il alors comme nuisible. Il le donnoit cependant dans ce cas-là , mais seulement comme palliatif pour suspendre les accès , & calmer des symptomes qui auroient pu causer de plus grands inconvénients. On doit donc être alors plus circonspect dans l'administration du quinquina , & son usage doit être moins continué. On nous citera des fievres tierces , & des fievres quartes guéries par l'usage du quinquina ; mais cela ne prouve rien contre nous , parce que les fievres peuvent avoir le type des tierces , par exemple , ou des quartes , sans en avoir le caractère , c'est-à-dire , sans qu'on y remarque les vices des solides & des fluides qui caractérisent , soit la fièvre tierce légitime , soit la fièvre quarte légitime. Or ce n'est que par rapport à l'état des fluides & des solides qu'on doit se régler dans l'usage des remèdes qu'on veut employer , & non par rapport au type seulement , comme nous l'avons déjà remarqué. 5°. Le quinquina est contre-indiqué dans les cas des fievres lentes , sur-tout symptomatiques , dépendantes d'ulcere des poudrons , &c. Il y a cependant des auteurs qui prétendent qu'on a vu des phthysies guéries par l'usage du kina : mais il est certain , (du moins l'observation le prouve dans ce pays-ci , & dans les climats chauds où les tempéraments sont vifs , ardents & bilieux) il est , dis-je , certain que dans ce cas le quinquina porte sur la poitrine , augmente la toux , & produit quelquefois des crachements de sang. Dans les pays froids au contraire , il peut se faire que le climat , le tempérament , le genre de vie , &c. rendent son usage moins dangereux dans les cas dont nous parlons. A ces fievres lentes symptomatiques , il peut se joindre des fievres intermittentes qui exigent le quinquina ; dans ce cas-là on doit être très-circonspect dans son usage. Il peut se trouver des phthysies , sur-tout chez les scrophuleux , & les scorbutiques , où les solides sont relâchés , & les ulceres baveux : dans ce cas on peut donner le quinquina ; mais dans le troisième degré de la phthysie où le sang est dissout par putridité , la toux vive , les ma-

tières acres, nous croyons qu'il seroit nuisible. 6°. Par la même raison il est contre-indiqué dans les personnes qui ont la poitrine délicate, qui ont une petite toux, dans ceux qui ont craché le sang, ou qui ont une disposition héréditaire à l'hémoptisie. Si on le donne dans ces circonstances, il en résulte des hémoptisies, des inflammations qui sont suivies d'ulcère & de phthisie. Dans ce pays-ci nous regardons cette délicatesse de poitrine, comme une contre indication très-considérable du quinquina. 7°. Dans les personnes d'un tempérament vif, ardent & bilieux : dans ce cas on observe que le kina produit souvent des coliques, des vomissements, des flux de ventre. Enfin il se trouve souvent des personnes qui ne peuvent pas supporter le quinquina de quelque manière que ce soit ; c'est pourquoi il faut consulter l'idiosyncrasie des particuliers.

Maniere de donner le Quinquina, Doses, Précautions.

On donne le quinquina en substance ou en poudre, en infusion & en décoction. Quelquefois on se sert du sirop préparé avec le quinquina ; on peut aussi en donner l'extrait, mais il est peu en usage. 1°. En substance : on donne le quinquina en substance à la dose d'une drachme, pour chaque prise. Dans les tempéraments pituiteux, on peut aller jusqu'à une drachme & demie ou à deux, pour diviser & atténuer les glaires ; on en fait prendre trois ou quatre prises par jour dans l'intermission de la fièvre : on le donne ou delayé simplement dans l'eau de chicorée, ou dans celle de petite absynthe, ou bien incorporé avec quelque sirop sous forme d'opiat, par exemple, on prend demi-once de kina en poudre, on l'incorpore avec un sirop approprié pour en former un opiat qu'on partage en quatre ou cinq prises. Si on craint d'échauffer, on se sert du sirop de capillaire, ou ce qui est encore mieux de celui de limon ; si on ne craint pas d'échauffer, & qu'au contraire on veuille augmenter sa force, comme lorsqu'on le donne comme remède palliatif dans les fièvres quarten légitimes où l'on ne doit pas en continuer long temps l'usage, on l'incorpore avec le sirop de roses rouges ou d'absynthe, comme faisoit Sydenham dans ce cas-là. On donne cet opiat, comme nous avons dit, en quatre ou cinq prises, de quatre en quatre ou de trois en trois heures, ce qui revient à un gros ou environ pour chaque prise : c'est ainsi qu'on fait prendre le quinquina, quand on le donne seul. Suivant les circonstances on l'associe avec d'autres médicaments, soit pour augmenter ou aiguïser sa vertu, soit pour la diminuer & la mitiger : par exemple, dans les fièvres intermit-

teutes bilieuses où l'on craint sa force, lorsqu'on est obligé de le donner, on y joint quelque médicament rafraîchissant, comme le nitre purifié, ou la crème de tartre. On ajoute vingt ou vingt-cinq grains de l'un ou de l'autre à chaque prise, & on incorpore le tout avec le sirop de limon ou de capillaire; c'est de cette façon qu'on le donne dans les fievres intermittentes bilieuses, pourvu qu'elles ne soient pas doubles tierces tournant vers la fièvre continue: si au contraire on veut aiguïser son action, on y ajoute le sel ammoniac, comme par exemple, dans le cas d'épaississement du sang, qu'on connoît par le froid absolu qu'éprouve le malade, & qui est apperçu par les assistants, (car le froid absolu caractérise un épauississement très-considérable du sang & de la lymphe) alors sur chaque prise de quinquina on ajoute six, huit, dix ou douze grains de sel ammoniac, & on incorpore le tout avec le sirop de fumeterre, ou de petite absynthe. Le sel ammoniac est incisif, apéritif, diurétique, sudorifique, antigangreneux. On peut aussi, suivant les indications, y ajouter la poudre de petite centauree, de petite absynthe, de fleurs de camomille, &c. aux doses que nous avons marquées ailleurs, en parlant *ex professo* de ces médicaments. 2°. En infusion: le quinquina en infusion est moins actif qu'en substance; on peut le faire infuser dans l'eau commune, ou dans l'eau de chicorée, de scorfonere; par exemple, on prend trois ou quatre gros de kina qu'on fait infuser sur les cendres chaudes dans dix ou douze onces d'eau pendant six ou sept heures, & on partage cette infusion en deux prises: on pourroit en donner pour chaque prise en infusion deux gros ou même trois. On fait infuser le quinquina dans du vin qui le dissout mieux, à cause des parties résineuses dont ce médicament est composé. Le vin de quinquina se prépare de cette maniere.

c'est

Vin de Quinquina.

On fait infuser à chaud pendant deux jours, deux onces de quinquina dans deux livres de vin, ayant soin d'agiter de temps en temps le vaisseau dans lequel se fait l'infusion: on décante ensuite la liqueur; on la verse par inclination, & on la garde pour l'usage; c'est le vin de quinquina. On l'ordonne à la dose de trois ou quatre onces pour chaque prise de quatre en quatre heures. Cette infusion est très-efficace dans les cas où les fievres intermittentes sont accompagnées de vices des premieres voies, comme dans l'inappétence, dans la chlorose, dans la cachexie. Si on veut la rendre encore plus active, on peut ajouter sur chaque prise de cette infusion demi-gros, ou un gros de quinquina en poudre; mais on ne

doit l'ordonner ainsi que dans le cas d'un grand relâchement des solides & d'un grand épaisissement des fluides.

Décoction du Quinquina.

LA décoction dissipe beaucoup de parties du quinquina ; c'est pourquoi on peut le donner à plus haute dose , c'est-à-dire , depuis deux gros jusqu'à demi-once pour chaque prise , si on ne craint pas d'échauffer , ou depuis un gros & demi jusqu'à deux , si on craint d'échauffer. On fait , par exemple , bouillir une once de quinquina concassé grossièrement , dans une livre d'eau commune , ou dans l'eau de chicorée ; on coule la décoction , & on la partage en deux ou trois prises qu'on donne de quatre en quatre heures. On peut donner le quinquina de cette façon , dans les fièvres continues avec redoublement que nous avons appellées subintrantes ; dans les fièvres intermittentes dont l'intermission est très-courte , & sur la fin des fièvres putrides dans les circonstances marquées ci-devant. On peut aussi faire bouillir le quinquina , la petite centauree , la petite absynthe , la camomille , la racine d'énula-campana ; ou le sel d'absynthe , & donner cette décoction à la dose de cinq ou six onces de quatre en quatre heures ; mais il faut remarquer que cette façon d'ajouter les plantes stomachiques au quinquina , ne peut convenir qu'en cas d'un grand relâchement des solides , & d'épaisissement visqueux des fluides. On ajoute le quinquina à l'eau de poulet ; on fait l'eau de poulet de la façon que nous avons dit ailleurs , & sur une livre de cette eau , on ajoute deux gros ou demi-once de quinquina concassé qu'on fait bouillir pendant un quart d'heure pour deux ou trois prises. On coule cette décoction , & on a une eau de poulet quinquinacée ; de cette façon le quinquina est imprégné du mucilage de l'eau de poulet : on peut le donner de cette façon dans les fièvres subintrantes pour éloigner les redoublements , & dans tous les cas où l'on craint d'échauffer. On peut aussi l'ordonner dans les bouillons de poulet de cette façon : on prend un jeune poulet éventré qu'on farcit avec une cuillerée de ris mondé ou demi-once de semences froides , & quatre ou cinq amandes douces pilées : on fait bouillir dans suffisante quantité d'eau pendant une heure & demie ou deux heures , après quoi on y ajoute deux gros ou deux gros & demi de quinquina ; on fait bouillir encore un quart ou une petite demi-heure tout au plus ; on coule , & on a un bouillon de poulet quinquinacé qu'on peut faire prendre au malade de trois en trois heures. De cette façon le quinquina est très-temperé. On pourroit aussi s'en servir

chez les personnes qui ont la poitrine délicate , dans le cas des fièvres intermittentes. On peut encore le donner en émulsion qu'on prépare ainsi : on prend , par exemple , demi-gros ou un gros de chacune des semences froides , qu'on pile en versant par dessus une décoction d'orge , à la dose de deux livres , on coule , & à la colature , on ajoute cinq ou six gros de quinquina ; on fait bouillir légèrement , & on coule de nouveau : on a une émulsion quinquinacée , dont on peut faire prendre au malade une verrée de trois en trois heures pour écarter les redoublements dans les fièvres subintrantes lorsqu'il y a chaleur , ardeur , & dans les fièvres intermittentes bilieuses. On peut aussi le donner en lavement dans les fièvres intermittentes , aux enfants & à ceux qui ne peuvent pas le prendre par la bouche. On en fait alors la décoction dans quelque eau appropriée , comme dans l'eau de chicorée , l'eau de scorfonere , de poulet , &c. on donne deux ou trois de ces lavements par jour. Par-là on supplée en quelque façon à l'usage du quinquina par la bouche , & on réussit souvent chez ces personnes à qui il est impossible de le prendre sous aucune autre forme.

Sirop de Quinquina.

ON le prépare ainsi : on fait infuser deux onces de quinquina réduit en poudre dans deux livres de bon vin rouge : on laisse macérer pendant deux ou trois jours remuant de temps en temps ; ensuite on sépare la liqueur par inclination , & on y ajoute encore deux onces de quinquina : on digère de nouveau pendant deux ou trois jours , on passe plusieurs fois l'infusion jusqu'à ce que la liqueur soit limpide ; alors on la mêle avec suffisante quantité de sucre dissout dans l'eau de scorfonere , & cuit jusqu'à consistance d'électuaire ^{liquide} ~~sirop~~. Voilà la composition du sirop de quinquina , dont on se sert principalement pour les enfants & pour les personnes délicates. La dose de ce sirop est depuis demi-once jusqu'à une once & demie ou deux , de trois en trois ou de quatre en quatre heures. Il échauffe moins que le quinquina en substance , en infusion , & en décoction. Les bouillons de poulet quinquinacés , aussi-bien que les émulsions , échauffent encore moins que ce sirop , & sont moins à craindre.

Précautions.

OUTRE celles que nous avons indiqué pour les différentes façons d'administrer le quinquina suivant les différens cas , il faut avant d'en venir à l'usage de ce médicament , faire précéder les remèdes généraux , c'est-à-dire ,

dire les saignées , les purgatifs ou simples ou associés aux émétiques , ou même donner les émétiques seuls , suivant les indications , afin de diminuer la masse du sang , & de nettoyer les premières voies : il faut aussi que la dernière prise de quinquina qu'on donne au malade , précède l'accès de trois ou quatre heures.

La Cascarille , Cascarilla , cortex peruvianus aromaticus.

C'EST une écorce mince , roulée en petits tuyaux à-peu-près comme la cannelle ; elle est à l'extérieur de couleur cendrée tirant sur le blanc , & intérieurement de couleur de rouille de fer. Elle a un goût amer , & quand on la brûle , elle a une odeur aromatique qui approche un peu de celle de l'ambre. Les expériences ont montré que c'est un bon fébrifuge dans les fièvres intermittentes , moins actif pourtant & moins échauffant que le quinquina. La cascarille convient aussi dans les diarrhées qui surviennent vers la fin des fièvres aiguës : c'est aussi un bon antispasmodique. On doit la préférer au quinquina dans les personnes hypocondriaques , & dans les tempéraments vifs , ardents , bilieux , & lorsqu'on craint d'échauffer. On la prescrit de la même façon que le quinquina ; on l'ajoute aussi à la dose de quinze ou de vingt-cinq grains aux opiat stomachiques qu'on fait prendre aux hypocondriaques & aux hystériques , pour les disposer au lait.

Les Antivénériens.

ON appelle antivénériens les médicaments propres à guérir radicalement , ou à pallier la vérole. Avant d'entrer dans le détail de ces médicaments , l'ordre que nous avons suivi jusqu'à présent , exige que nous fassions quelques réflexions sur cette maladie. Il faudroit un traité entier , si nous entreprenions de dire tout ce qui concerne cette maladie. Pour en avoir une connoissance parfaite , nous renvoyons au traité de M. Astruc , qui est celui de tous les Auteurs qui a le mieux traité cette matière , & qui semble n'avoir rien laissé à désirer là-dessus. Quant à nous , nous réduirons à trois chefs , ce que nous avons à dire à cet égard : nous dirons un mot , 1°. de son histoire , 2°. de la façon dont elle se communique , 3°. des moyens de s'assurer de sa présence.

Histoire abrégée de la Vérole.

LA Vérole étoit inconnue aux anciens Médecins : on a commencé à en parler seulement sur la fin du quinzième siècle. Ce fut au siege de Na-

ples sous Charles VIII. qu'elle parut , l'an 1494. La plus grande preuve de la nouveauté de cette maladie , est que , dès ce temps-là , tous les Médecins la regardoient comme nouvelle. Or , il n'est pas possible que tous eussent porté ce jugement , si on l'avoit observé auparavant. Elle fut transportée de l'Amérique où elle a pris naissance , en Europe par les Espagnols qui la communiquèrent aux François au siege de Naples. Elle n'a pas toujours paru avec les mêmes symptômes , & on peut distinguer à cet égard plusieurs époques.

Premiere époque.

PENDANT les vingt premieres années , elle ne parut guères qu'avec des ulcères aux parties génitales de l'un & de l'autre sexe , & des pustules répandues sur tout le corps , qui pénétoient & cavoient les os.

Seconde époque.

PENDANT les dix années suivantes , il survint d'autres symptômes , comme des exostoses ou des tumeurs osseuses souvent accompagnées de carie , des douleurs , des excroissances verruqueuses , c'est-à-dire , charnues , dures & indolentes , élevées sur la peau autour de l'anus & des parties génitales.

Troisieme époque.

VERS l'an 1640 , il parut de nouveaux symptômes ; savoir , des tumeurs schirreuses , quelquefois œdémateuses , le plus souvent inflammatoires , appelées bubons qui venoient ordinairement aux glandes conglobées des aînes , & l'alopecie , c'est-à-dire , la chute des cheveux.

Quatrieme époque.

ELLE fut marquée par la gonorrhée , symptôme très-commun aujourd'hui , & par lequel la vérole commence ordinairement , mais dont on n'a commencé à parler que vers l'an 1650.

Cinquieme époque.

LES symptômes qui ont paru dans cette dernière époque , sont des tumeurs ou des pustules cristallines , aux environs des parties génitales , & sur-tout autour de l'anus. Plusieurs de ces symptômes ne paroissent pas au-

jourd'hui , ou au moins sont très-rares : c'est ce qui fait croire à M. Astruc que la férocity de cette maladie s'énervé de jour en jour , & lui fait conjecturer en même temps que ce virus s'éteindra peu-à-peu.

Comment la Vérole se communique.

LA vérole est une maladie contagieuse ; 1°. elle se communique le plus ordinairement par le commerce d'un homme avec une femme vérolée , ou d'une femme avec un homme vérolé. 2°. Elle se communique des nourrices aux enfants , ou bien des enfants aux nourrices. Ces deux façons dont le virus se communique sont constatées par l'observation. De plus , on conçoit très-bien comment ce virus passe des nourrices aux enfants , parce que les humeurs d'une nourrice vérolée étant infectées du virus vérolique , le lait doit l'être par conséquent , & infecter l'enfant qui le reçoit. On conçoit aussi très-bien comment un enfant vérolé peut communiquer le virus à sa nourrice , parce que le sang de cet enfant étant infecté , les humeurs qui s'en séparent doivent l'être aussi , & par conséquent la salive qui peut être repompée par les pores absorbants du mamelon de la nourrice , être portée dans les voies de la circulation , & par-là infecter les humeurs du virus dont elle est elle-même infectée. 3°. Par les baisers lascifs. Ce moyen est presque certain selon l'observation. 4°. En couchant simplement avec des personnes infectées du virus vérolique. On ne voit rien d'impossible dans ce moyen , il paroît même raisonnable , puisqu'il est certain que la gale , les virus de la petite vérole , &c. se communiquent ainsi ; mais il n'y a pas d'observations suffisantes pour constater indubitablement ce fait. 5°. On a cru que la vérole se communiquoit simplement par le tact : cela peut arriver aux Chirurgiens qui pansent les vérolés , aux accoucheurs , aux accoucheuses qui accouchent des vérolées , sur-tout si leurs doigts sont coupés ou ouverts par quelques blessures. 6°. Le virus peut être héréditaire , c'est-à-dire , qu'il peut passer , & qu'il passe effectivement des parents à leurs enfants. C'est ce qu'on conçoit facilement , & ce que l'observation démontre d'ailleurs. De toutes ces manières dont nous venons de voir que la vérole se communiquoit , ou peut se communiquer , il n'y a que les deux premières , & la dernière qui soient incontestables.

Moyens de s'assurer de la présence du virus vérolique.

ILS se prennent , 1°. des symptômes , 2°. de ce qui a précédé. Quant aux symptômes , il n'en est aucun qui soit un signe pathognomonique ou uni-

voque de la vérole , puisqu'il n'en est pas un seul sans exception même de la gonorrhée , qui ne puisse être produit par quelque maladie. Nous disons sans excepter même la gonorrhée qui paroît cependant un signe assez sûr , parce qu'on l'avoit déjà observé avant que la vérole eût paru. Il y a cependant des symptômes qui sans caractériser essentiellement la vérole , la font du moins soupçonner. Nous en distinguerons de deux classes ; les uns qui font naître de violents soupçons ; les autres qui donnent lieu à des soupçons moins forts. Parmi les symptômes de la premiere classe , on doit ranger d'abord , 1°. la gonorrhée qui est un des principaux signes du virus vérolique : il est même rare qu'elle paroisse aujourd'hui sans être produite par ce virus ; 2°. les chancres ou ulceres qui viennent au gland , au corps de la verge , à l'anus ; 3°. les excroissances verruqueuses dans les mêmes parties ; 4°. les bubons ou tumeurs , soit phlegmoneuses , soit cedémateuses , soit schirreuses , qui viennent aux glandes conglobées des aines : il est rare , excepté en temps de peste , de voir de ces bubons qui ne soient pas véroliques. Tels sont les symptômes de la premiere classe. Parmi ceux de la seconde classe , on peut compter , 1°. les pustules inflammatoires ou non , qui naissent très-souvent dans les différentes parties du corps ; 2°. les ulceres qui viennent pareillement dans les différentes parties du corps , qu'on ne peut attribuer , ni au virus scorbutique , ni écrouelleux , ni à aucun autre , & qui résistent aux remedes ordinaires ; 3°. les douleurs de tête , fixes , constantes & opiniâtres , periodiques ; 4°. les douleurs osteocopes , profondes , dans lesquelles il semble aux malades qu'on leur rompt les os , & qui se font sentir pendant la nuit , pourvu cependant que ces douleurs ne dépendent pas du virus scorbutique ; 5°. les lassitudes spontanées ; 6°. enfin toutes les maladies qui ne peuvent pas être rapportées aux autres virus , & qui ne cèdent pas aux autres remedes , qui ont coutume de guérir les symptômes dépendants des causes générales. Voilà les signes de la seconde classe ; mais comme , ni ces derniers , ni les premiers ne sont point des signes univoques de la vérole , comme nous l'avons déjà dit , pour s'assurer de sa présence , il faut non-seulement avoir égard à ces symptômes , mais encore à ce qui a précédé , ou ce qui est la même chose , il faut avoir recours aux signes commémoratifs. Pour cela on doit demander au malade , s'il n'a jamais eu la gonorrhée , des chancres , des bubons , s'il ne s'est pas exposé au commerce impur : s'il répond qu'il a eu les symptômes mentionnés , il faut s'informer de la façon dont il a été traité , & voir s'il l'a été méthodiquement ; s'il dit qu'il n'a eu aucun commerce impur , il faut remonter plus haut , & s'informer de la nourrice qui l'a

alaité , pour favoir si elle étoit saine ou vérolée , & dans ce dernier cas s'informer des symptomes qui ont paru en elle dans le temps qu'elle nourrissoit , & de ceux qui ont paru dans la personne même vérolée , dans le même-temps ou pendant son enfance. Supposé que la personne ait été infectée du virus vérolique dans le temps qu'elle étoit chez la nourrice , il faut tâcher de favoir comment elle a été traitée , supposé qu'on puisse avoir des éclaircissements là-dessus. Si la nourrice étoit très-saine , il faut remonter encore plus haut , & aller jusqu'aux parents , puisque , comme nous l'avons déjà remarqué , cette maladie peut être héréditaire. On doit tâcher de découvrir s'ils ont été sujets à cette maladie avant le mariage , & s'ils ont été traités méthodiquement ; car il arrive quelquefois que la curation des parents n'a été que palliative , & alors le virus peut se communiquer aux enfants. Si le malade répond que ses parents ont été toujours sains , il faut lui demander si ses freres , ses sœurs , sont parfaitement en santé , s'ils l'ont toujours été , ou bien s'ils ont été attaqués de quelque virus , s'ils ont eu des tumeurs au col. Il arrive quelquefois qu'on ne retire aucun éclaircissement de toutes les questions qu'on fait , le malade ne voulant pas en faire l'aveu , soit par honte , soit par des raisons particulières ; alors s'il y a quelques-uns des symptomes de la premiere classe , c'est-à-dire , de ceux qui font naître des soupçons violents , & que d'ailleurs les remedes ordinaires n'aient produit aucun bon effet , ou aient été insuffisants , on peut être assuré de la présence de la vérole , & se déterminer pour l'usage des antivénériens. Dès que la vérole parut , les Médecins l'attaquerent par les remedes ordinaires , mais ce fut inutilement ; cependant vers le commencement de 1525 , Jacques *Carpi* , Médecin de Bologne , & *Vigo* , très-célebre Chirurgien , employerent les remedes que nous regardons aujourd'hui comme spécifiques. Ce Médecin & ce Chirurgien faisant attention aux symptomes de la vérole , & à ceux des différentes maladies de la peau , contre lesquelles on employoit dès-lors le mercure , jugerent par analogie qu'il pourroit bien convenir dans la vérole , & ils s'en servirent très-heureusement : mais les mauvais succès qu'eurent ensuite ceux qui voulurent l'employer , sans doute parce qu'ils ne prirent pas les précautions requises dans son administration , en firent abandonner l'usage. On commença dans ce temps à connoître le bois de gayac , les racines de squine & de felsepareille , & l'on s'en servit pour traiter cette maladie , en excitant des sueurs ; mais on reconnut que ces remedes ne suffisoient pas pour la guérir radicalement. On revint donc au mercure , qu'on employa avec plus de circonspection. Nous avons déjà parlé dans

la classe des fudorifiques , du gayac , de la squine , & de la falsepareille , qui ont eu vogue pendant quelque temps dans le traitement de la vérole , & qu'on peut regarder comme le remède palliatif de cette maladie. Il ne nous reste à parler que du mercure qu'on regarde , avec raison , comme spécifique dans ce même cas.

Le Mercure ou Vif-Arget , Mercurius seu hydrargirus.

NOUS réduirons à six chefs , ce que nous avons à en dire : nous exposerons d'abord ce que c'est que le mercure. 2°. Ses différentes préparations. 3°. Ses effets. 4°. Les cas où il convient. 5°. Ceux où il est contre-indiqué. 6°. La façon de l'administrer , & les précautions qu'il faut prendre pour cela.

A R T I C L E P R E M I E R.

Ce que c'est que le Mercure.

LE Mercure ou vif-argent , est une substance métallique , fluide , froide au toucher , brillante comme l'argent , très-volatile : c'est le plus pesant de tous les corps que nous connoissons après l'or. Il ne mouille que les corps métalliques , & sur-tout l'or auquel il s'unit avec avidité. On choisit pour l'usage en médecine celui qui est pur , très-fluide , & qui étant exposé sur le feu dans une cuiller d'argent , s'envole dans l'air sans qu'il y reste rien.

A R T I C L E I I.

Préparations du Mercure.

ON fait différentes préparations du Mercure , dont voici les principales. 1°. On l'unit au soufre , soit par le moyen du feu pour faire le cinabre factice , soit sans feu pour former l'æthiops minéral. Le cinabre factice se prépare ainsi : on mêle peu-à-peu trois parties de mercure avec une partie de soufre fondu au feu ; on remue continuellement jusqu'à ce que tout le mercure disparoisse ; on pulvérise la masse lorsqu'elle est refroidie , & on la met dans un vaisseau sublimatoire : le feu étant augmenté peu-à-peu , elle se sublime en une masse rouge , brillante & en forme d'aiguilles ; c'est-là le cinabre factice. L'æthiops minéral se prépare avec quatre parties de mercure revivifié du cinabre , & trois parties de fleurs de soufre , qu'on remue ensemble dans un mortier de verre ou de marbre , jusqu'à ce que toutes les

globules du mercure se dissipent entièrement, & que la masse soit réduite en une poudre jaune très-fine, qui étant un peu gardée, devient fort noire, d'où est venu à cette préparation, le nom d'æthiops minéral. 2°. Le sublimé doux ou le mercure doux, en latin *aquila alba* ou *draco mitigatus*, se prépare ainsi : on prend quinze onces de sublimé corrosif [qui n'est autre chose que le mercure dissout par l'esprit de nitre ou par un sel acide & uni avec l'esprit de sel marin] on prend, dis-je, quinze onces de sublimé corrosif, on le triture exactement dans un mortier de verre ou de marbre, en versant peu-à-peu douze onces de mercure revivifié du cinabre : on continue la trituration jusqu'à ce que le mercure ne paroisse plus. Il se fait une poussière de couleur de plomb qu'on met dans des vaisseaux sublimatoires, alors on fait sublimer à un feu lent qu'on augmente par degré ; on sépare la masse blanche qui est sublimée, de la crasse que l'on rejette. On pulvérise de nouveau cette masse, & on la sublime une seconde fois ou même jusqu'à trois ou quatre fois. On a alors le sublimé doux, ou le mercure doux. 3°. La panacée mercurielle a été regardée pendant longtemps comme spécifique dans la vérole : on en fit d'abord un secret que Louis XIV. acheta, & rendit public. Ce n'est autre chose qu'un sublimé doux, plus adouci encore que celui dont nous venons de parler : voici comme on la prépare. On fait sublimer pendant huit fois le sublimé corrosif avec le mercure revivifié du cinabre, savoir, deux fois avec le sel marin & le vitriol, cinq fois avec le sel marin seul, & une fois sans aucun intermédiaire. On prend alors une partie de ce sublimé ainsi préparé, & on en revivifie le mercure, au moyen du régule d'antimoine : on prend ensuite ce mercure ainsi revivifié, & on le mêle avec l'autre portion de sublimé corrosif, selon les règles de l'Art, & on le fait sublimer trois fois : on a alors un mercure doux. On fait ensuite digérer ce mercure doux pendant trois semaines dans l'esprit de vin aromatisé ; après quoi on décante la liqueur, & on fait sécher le mercure : c'est la panacée mercurielle. On emploie le mercure crud, mais cependant mêlé avec de l'huile dans le cas de passion iliaque où le ventre est totalement constipé & où le malade vomit souvent les excréments. Elle dépend le plus souvent de quelques embarras qui se trouvent dans le canal intestinal, & qui empêchent les matières de passer jusqu'à l'extrémité des intestins. Dans ce cas-là on donne le mercure crud à la dose d'une livre & même quelquefois de deux, & on ne perd rien, car en le lavant ensuite, on en a à-peu-près le même poids. Mais on a observé que si le mercure ne force pas l'obstacle, & qu'il demeure trop long-temps dans les intestins, il excite

la salivation. Il est aussi à craindre qu'il n'échauffe trop, qu'il ne pèse trop sur les intestins, & qu'il ne leur nuise. On peut aussi faire une décoction de mercure qu'on appelle eau mercurielle : pour cela on fait bouillir une livre de mercure dans six livres d'eau pendant une heure. On donne cette liqueur dans les maladies vénériennes, en attendant que les malades puissent passer par les grands remèdes. On s'en sert aussi dans les affections vermineuses. Il y a cependant des Médecins qui prétendent que cette eau mercurielle n'a pas plus de vertu que l'eau simple ; d'autres au contraire assurent en avoir observé de bons effets. L'æthiops minéral s'ordonne dans les affections vermineuses ; dans les maladies cutanées ; dans la vérole, depuis dix grains jusqu'à vingt-cinq, ou demi-gros tout au plus. Il purge assez souvent : il excite quelquefois des sueurs ; mais rarement ou presque jamais la salivation. Il y a des Médecins qui prétendent qu'il ne passe pas dans les ~~seules~~ ^{seules} voies, ce qui est faux. Le mercure doux s'ordonne pareillement dans les maladies vénériennes, dans les maladies cutanées, dans les affections vermineuses, & de plus dans le rhumatisme produit par une lymphe extrêmement épaissie par viscosité, & âcre en même-temps, & même dans les affections écrouelleuses : il purge plus sûrement que l'æthiops minéral, & c'est le purgatif qu'on emploie le plus souvent dans la gonorrhée, & en général dans les maladies vénériennes : il excite aussi la salivation. On le donne depuis six grains jusqu'à quinze ou vingt tout au plus. Dans les enfants on ne doit pas passer douze grains, il faut même être assuré de l'habileté de l'artiste, parce qu'autrement il pourroit retenir beaucoup de sublimé corrosif, & empoisonneroit. La panacée mercurielle s'ordonne à la même dose & dans les mêmes circonstances que le mercure doux. Elle soulage beaucoup dans les maladies qui dépendent d'une lymphe épaissie, même avec quelque âcreté.

A R T I C L E I I I .

Effets du Mercure.

ON peut dire en général que le mercure échauffe, qu'il augmente la circulation ; ce qu'on connoît par l'élévation du pouls, par la chaleur : il porte sur-tout vers les parties supérieures, & pousse principalement par les glandes salivaires.

ARTICLE IV.

Cas où il est indiqué.

NOUS avons déjà vu les cas où conviennent les différentes préparations du mercure. L'onguent mercuriel, dont nous donnerons ci-après la composition, sert pour les frictions qu'on appelle ordinairement le grand Remède : on s'en sert pour guérir radicalement la vérole.

ARTICLE V.

Cas où l'onguent mercuriel & les frictions sont contre-indiqués.

NOUS le verrons, lorsque nous parlerons de l'administration du mercure.

ARTICLE VI.

Façon de l'administrer, Précautions.

NOUS pouvons réduire à trois chefs, ce que nous avons à dire à cet égard, savoir, aux choses auxquelles on doit faire attention avant l'administration du mercure, à celles qu'on doit observer pendant l'administration, & enfin à celles qui doivent suivre l'administration.

Choses à observer avant l'administration du Mercure.

IL y a cinq choses auxquelles on doit faire attention avant de commencer les frictions, savoir, 1°. l'état actuel du malade, 2°. la saison, 3°. les préparations qui doivent précéder les frictions, 4°. la composition de l'onguent mercuriel, 5°. la méthode que l'on doit suivre. 1°. Nous avons dit que le mercure échauffe, qu'il augmente la circulation : il est donc évident qu'un homme attaqué de la vérole, quoiqu'il soit dans le cas de passer par les grands remèdes, ne doit cependant par le faire quand il est attaqué d'une maladie aiguë, comme de pleurésie, de péripneumonie, &c. le mercure agitant extrêmement les humeurs, augmenteroit les symptômes de la maladie aiguë, & conduiroit le malade au tombeau. Ainsi les maladies aiguës contre-indiquent l'usage des frictions mercurielles. Il y a aussi des maladies chroniques qui les contre-indiquent, comme l'hydropisie de poitrine, l'hydropisie du bas-ventre, parce que dans ce cas les eaux épanchées pour-

roient prendre une tournure à la putridité ; le schirre au foie , parce qu'il pourroit dégénérer en cancer ; la fièvre lente ; la phthisie , sur-tout si elle est dans son troisième degré. Il faut cependant remarquer par rapport aux maladies chroniques , dont nous venons de parler , qu'il peut arriver , & qu'il arrive même quelquefois qu'elles sont entretenues par le virus vérolique : dans ce cas-là le mercure est indiqué d'une part , & contre-indiqué de l'autre. Alors quel parti prendre ? On doit tâtonner pour ainsi dire dans ces circonstances. Supposé que les symptômes soient pressants , il faut donner des frictions légères , & éloignées les unes des autres : il faut sur-tout consulter les forces du malade , & voir s'il est en état de supporter les grands remèdes , faisant attention que le mercure dissipe beaucoup les forces , en même-temps que la diète légère , auquel le malade est astreint pendant les frictions , est peu propre à les réparer : c'est d'après ces réflexions qu'on doit se déterminer pour ou contre l'administration des frictions , dans le cas dont nous parlons. 2°. Après s'être assuré que le malade est en état de supporter l'action du mercure , il faut avoir égard à la saison où l'on doit employer le grand remède. Le printemps , & l'automne sont les plus convenables pour cela , & le printemps l'est encore plus que l'automne , parce que les malades après les remèdes entrent dans les beaux jours , au lieu que quand on donne les frictions en automne , les malades en sortant des linges , comme l'on dit , se trouvent dans la rigueur de l'hiver ; ce qui ne laisse pas d'être un inconvénient ; cependant dans le cas où l'on est pressé , & où on ne peut faire autrement , on peut administrer les frictions dans toutes les saisons de l'année , en été , en hiver ; mais alors on doit user de beaucoup de précautions , & si c'est en hiver avoir soin de placer le malade auprès du feu , dans le temps qu'on donne les frictions , faisant attention cependant de ne pas l'exposer à une trop grande chaleur , de peur de perdre une partie de l'onguent mercuriel. 3°. Il faut ensuite passer aux préparations du malade. Elles sont différentes suivant la différence des cas. On doit préparer autrement les personnes simplement attaquées de la vérole , & autrement celles dont le virus vérolique est compliqué avec d'autres maladies. Nous ne pouvons entrer ici dans le détail des différentes préparations qu'exigent les différents cas : outre que cela nous meneroit trop loin , ce ne seroit point de l'objet que nous nous sommes proposés dans ce cours ; c'est pourquoi nous renvoyons au traité de M. Astruc sur cette matière. On y trouvera le détail de toutes les différentes précautions que l'on doit prendre , selon les différentes maladies , avec lesquelles la vérole se trouve compliquée. Nous

nous contenterons d'indiquer les préparations que l'on doit employer le plus ordinairement dans les cas de vérole simple. Le but de ces préparations est de prévenir les inconvénients qui pourroient provenir des ~~mauvais~~ *Mauva* sucs dans les premières voies, qui risqueroient de causer de grands ravages, d'occasionner des fièvres putrides, ce qui obligeroit de suspendre les frictions, & seroit même un obstacle à la cure de la vérole. On se propose en même temps de disposer les malades à pouvoir supporter le mercure qui augmentant la circulation, & raréfiant le sang, font qu'il a besoin d'un plus grand espace pour se mouvoir : on satisfait à cette double fin par la saignée, par la purgation, par les bains, & par une diète convenable : c'est pourquoi on commence par faire saigner ; de quelque bras que ce soit, c'est assez indifférent. On fait tirer huit, dix ou même douze onces de sang dans les tempéraments pléthoriques, plus ou moins suivant les circonstances : le lendemain on purge le malade avec les minoratifs. Dans ce pays-ci il est d'ordinaire de purger dans ce cas-là en deux verrées avec une ptisane royale, dont nous avons donné ailleurs la composition. La saignée diminue le volume du sang, prévient les engorgements, les inflammations qui pourroient s'ensuivre de son mouvement augmenté, fait que les vaisseaux & le sang cèdent plus facilement à l'action du mercure. La purgation chasse les mauvais sucs des premières voies, & de plus en déterminant une plus grande quantité d'humeurs vers les intestins, elle débouche les tuyaux sécrétoires, & fait qu'ils ne sont pas ensuite sujets à s'engorger facilement. Après la purgation on fait baigner le malade : par ce moyen les parties aqueuses s'insinuant dans le corps à travers les pores, se mêlent intimement avec les humeurs, les détrempe, les rend plus douces, plus fluides, & les solides plus flexibles, plus souples, afin que tout puisse mieux prêter, mieux céder au mouvement & à l'action du mercure, & que les liqueurs ne soient pas en même de se dessécher, & d'acquérir de l'acrimonie. On fait donc baigner les malades une ou deux fois par jour. Il est plus prudent de commencer par un bain le matin à jeun : si le malade le supporte bien, trois ou quatre jours après, on peut en faire prendre deux par jour. Le nombre des bains n'est pas fixe : M. Astruc dit qu'on ne doit pas en donner moins de dix, ni aller au-delà de seize ; ici on ne suit pas cette règle, on en donne ordinairement vingt ou trente ou même quelquefois jusqu'à quarante, selon le besoin & le tempérament. Il faut faire attention que si le malade a la poitrine foible & délicate, s'il est asthmatique, ou sujet à la toux, on ne donne que des demi-bains, se contentant de le faire plonger dans l'eau jusqu'à la ceinture environ, & alors

on en augmente le nombre à proportion. Le temps que les malades doivent demeurer dans le bain n'est pas plus fixe que le nombre des bains. Cela dépend de leur situation ; il y a des malades qui les supportent plus longtemps , d'autres moins ; il y en a d'autres qui ne peuvent pas y rester plus d'un quart d'heure le premier jour , & qui quelquefois le supportent mieux le lendemain. Ainsi on ne peut rien déterminer à cet égard , cependant on ne reste pas dans le bain plus d'une heure. A l'égard du degré de chaleur que doit avoir l'eau , on ne fauroit non plus le déterminer : tout ce que l'on peut dire , c'est que la chaleur ne doit pas être trop grande , mais modérée relativement au sentiment du malade , parce qu'il peut se faire qu'elle soit modérée au sentiment des assistants , & qu'elle soit en même temps trop grande au sentiment du malade. Il faut que le malade ne sente pas la chaleur , ou qu'il ne s'en apperçoive pas. Après le bain on fait mettre le malade au lit. Si c'est le matin , on lui fait prendre le lait ou pur , mais décrémé , ou coupé avec le capillaire , le thé , &c. si son estomac peut s'en accommoder. S'il ne peut le supporter , on lui fait prendre du bouillon de poulet avec la chicorée. Pendant l'usage du bain la diete doit être forte , à midi une soupe à la viande , du bouilli ou du roti , mais en petite quantité ; le soir pareillement une soupe à la viande , ou bien une crème de riz. Entre le repas de midi & celui du soir , on permet quelques biscuits , un échaudé , ou une croûte de pain. Après les bains on saignera encore le malade , & on le purgera le lendemain de la saignée , dans la même vue que nous avons exposé ci-devant. Dans les tempéraments secs & vifs , bilieux , mélancoliques , il est bon après cette purgation de faire prendre encore un bain au malade le matin , & le soir même on commence les frictions. 4°. Avant d'administrer les frictions mercurielles , il faut encore faire attention à l'onguent mercuriel qu'on doit employer. Cet onguent se prépare ainsi.

Onguent Mercuriel.

On prend du mercure révivifié du cinabre : on le remue dans un mortier en y ajoutant un peu de térébenthine , (il la faut beaucoup ménager , & n'en mettre que ce qui est nécessaire pour éteindre le mercure) ; alors on ajoute peu-à-peu un poids égal de sain-doux qui ne soit pas ranci , si on veut le faire à moitié ; ou bien deux fois le poids du mercure , si on veut le faire au tiers ; ou enfin trois fois le poids du mercure , si on veut le faire au quart. A Paris on le fait à moitié , ici on ne le fait

qu'au tiers. On mêle exactement pendant assez long-temps : on juge que le mélange est assez fait , lorsque l'œil armé d'une loupe , ne peut appercevoir aucun atome mercuriel. Tel est l'onguent mercuriel dont on se sert pour les frictions : pour être excellent , il faut soutenir l'épreuve de la loupe. 5°. Après toutes ces précautions , il est encore nécessaire de se décider sur la méthode qu'on doit suivre dans l'administration du mercure. Il y en a deux qui ont chacune leurs partisans , savoir la méthode de la salivation , en latin , *hydrargirasis plenior* , & la méthode d'extinction , *hydrargirasis parcior*. Dans la première méthode , il faut faire les frictions de façon à exciter une salivation abondante. Dans la seconde au contraire , il faut tâcher d'éviter la salivation. Les médecins de Montpellier sont partisans de la méthode d'extinction , ceux de Paris avec M. Astruc sont partisans de la méthode de la salivation. Pour juger laquelle de ces deux méthodes mérite la préférence , on peut faire ces trois questions : 1°. peut-on guérir les maladies vénériennes sans le secours de la salivation ? 2°. La méthode de la salivation n'emporte-t-elle pas plus d'inconvénients que celle d'extinction ? 3°. La méthode de la salivation est-elle praticable dans tous les cas ? Si nous prouvons que la méthode de la salivation non seulement n'est pas nécessaire pour guérir radicalement la vérole , mais même qu'elle souffre plus d'inconvénients que celle d'extinction , & de plus qu'elle n'est pas praticable dans tous les cas , nous serons en droit de conclure que la méthode d'extinction mérite d'être préférée à celle de la salivation ; or c'est ce qu'il est aisé de démontrer. 1°. Nous avançons que la méthode de la salivation n'est nécessaire pour aucune des raisons qu'on prétend. Nos adversaires disent que la salivation est nécessaire pour la guérison radicale de la vérole , sur-tout lorsqu'elle est confirmée : en second lieu ils prétendent qu'elle est une espece de boussole qui nous guide dans l'administration des frictions , & qui nous avertit que le malade a assez de mercure. Or nous soutenons qu'elle n'est nécessaire , ni pour la guérison radicale de la vérole , même invétérée , ni pour nous servir de boussole. D'abord , que la salivation ne soit pas nécessaire pour la cure de la vérole , c'est un fait qu'on ne sauroit contester raisonnablement. Pour le prouver , nous ne citerons pas une foule d'exemples , & d'observations innombrables faites par les Praticiens de Montpellier , ni celles que nous avons faites nous-mêmes ; elles pourroient paroître suspectes. Nous ne voulons d'autre preuve de ce fait , que le témoignage de M. Astruc lui même qui convient qu'on guérit quelquefois la vérole sans qu'il paroisse de salivation , & qu'il y a des personnes qui ne salivent point

du tout , lesquels doivent cependant être en repos sur leur parfaite guérison. Qu'on ne dise pas que la vérole peut être guérie sans salivation , lorsqu'elle est encore récente ou tendre , comme l'on dit ordinairement : M. *Astruc* parle des véroles invétérées , & l'on trouve dans son *Traité* , deux observations qui prouvent ce que nous avançons. Dans la première , il s'agit d'une personne qui avoit un ulcère au nez , & dont les os du nez étoient même cariés. Cette personne avoit été traitée par *Boerhaave* , soit par les sudorifiques , soit par le mercure , & avoit été manquée ; on ne peut pas nier que ce ne fut une vérole confirmée ; cependant M. *Astruc* entreprit le traitement de cette personne , évita soigneusement la salivation à cause de l'ulcère au nez & de la carie des os , & il la guérit radicalement. Il en est de même de la seconde observation qu'on trouve dans M. *Astruc* : il étoit question d'un seigneur Espagnol dont les dents étoient cariées , lequel avoit passé par les grands remèdes en Espagne , & avoit même resté quelque temps chez un chirurgien à Montpellier. C'étoit , comme l'on voit , une vérole confirmée. M. *Astruc* la guérit radicalement , ayant évité soigneusement la salivation à cause de la carie des dents , & de la foiblesse du malade. Quant à ce qu'on dit qu'il faut que le virus soit chassé hors du corps par quelque voie , & que celle des glandes salivaires est la plus commode , c'est une objection que M. *Astruc* se fait , à laquelle il répond lui-même ; le virus s'est introduit dans le corps sous une forme insensible , ne peut-il pas en sortir de même ? ne peut-il pas aussi être chassé par les selles , par les urines , par l'insensible transpiration : d'ailleurs le mercure ne peut-il pas changer la consistance de nos humeurs , leur nature , sans qu'il soit nécessaire de rien chasser hors du corps ? Mais la salivation est-elle nécessaire pour nous servir de boussole ? nous répondons négativement. Nous savons bien que les Médecins de Montpellier qui ne croient pas la salivation nécessaire pour la curation radicale , aiment cependant à voir sur la fin du traitement une légère salivation , un gonflement des gencives , quelques crachements un peu fétides ; mais c'est le reste d'un ancien préjugé , car cette prétendue boussole est très-infidèle. La salivation paroît quelquefois après la première ou la troisième friction ; peut-on dire dans ce cas-là que le mercure ait assez agi ? Croit-on en avoir donné assez ? Non , sans doute. Les Praticiens se croient obligés de donner malgré cela de nouvelles frictions. D'ailleurs , cette salivation , l'engorgement des glandes salivaires , le gonflement des gencives , les ulcères de la bouche ou du gosier , prouvent seulement l'action du mercure , sur les glandes salivaires , dans la bouche , dans le gosier : or , ce n'est pas là seule-

ment que nous voulons que le mercure porte , mais encore dans les extrémités de toutes les petites arteres du corps , dans toutes les plus petites filieres. Ainsi , de ce que la salivation paroît , bien-loin d'en conclure que le mercure a assez agi par tout le corps , on pourroit bien en conclure plutôt qu'il se porte trop déterminément sur une partie particuliere , tandis qu'il devroit se distribuer également par tout le corps. Sans compter que par la salivation , il s'échappe toujours une partie du mercure , & qu'ainsi il en reste moins pour agir dans les autres parties : la salivation n'est donc pas nécessaire pour servir de bouffole , pour faire juger si le mercure a assez agi. La meilleure bouffole pour cela , est la disparition des symptomes , & la quantité du mercure qu'on a observé être ordinairement requise pour la curation de la vérole ; ainsi la méthode de la salivation n'est point nécessaire. 2°. Cela posé , en donnant à nos adversaires l'égalité de la certitude des deux méthodes , (c'est tout ce qu'on peut leur donner) il est certain qu'on doit préférer celle qui a le moins d'inconvénients. Or , la méthode de salivation n'entraîne-t-elle pas plus d'inconvénients que celle d'extinction ? En suivant cette premiere méthode , on voit survenir des inflammations des gencives , de la langue , des augines , des ulceres , des crachements de sang , d'autres hémorragies , symptomes très-fâcheux auxquels on n'est pas toujours maître de remédier. D'ailleurs , le mercure qui passe par la salivation est un mercure perdu : il faudroit donc employer dans le traitement , une plus grande quantité de mercure pour suppléer à cette perte ; c'est cependant ce qu'on ne fait pas , & ce qu'on ne doit pas faire à cause des symptomes qui surviennent , & qui empêchent la continuation d'aussi fortes frictions. La méthode d'extinction n'est pas sujette à ces inconvénients : elle agit lentement , déracine mieux le virus cantonné dans des parties éloignées des principes de la circulation , & guérit non-seulement les véroles récentes , comme tous nos adversaires même l'avouent , mais même les véroles invétérées , de l'aveu & selon les observations de M. Astruc. 3°. Enfin il y a des cas où il faut nécessairement employer notre méthode , & où celle de la salivation est impraticable , comme dans les cas d'inflammation , de gonflement , d'ulceres des gencives , de la langue , de la bouche , du gosier , dans les phthifiques , les épileptiques , les écouelleux ; on trouve tous les jours des malades qui sont dans le cas que nous venons d'indiquer , & alors la méthode d'extinction est conseillée comme nécessaire , même par nos adversaires. De tout ce qui vient d'être dit , il suit évidemment que la méthode d'extinction suffit pour guérir radicalement la vérole ; qu'elle ne souffre pas les inconvénients

auxquels celle de la salivation est sujette ; qu'elle est praticable , & pratiquée dans des cas où celle de la salivation ne sauroit avoir lieu ; qu'elle est plus générale , & que pour toutes ces raisons , elle mérite la préférence.

Choses à observer pendant l'administration du Mercure.

APRÈS s'être déterminé pour la méthode qu'on doit suivre , & avoir pris les autres précautions marquées ci-devant , il est temps de passer à l'administration du grand remède. Si on suit la méthode d'extinction , qui est celle qui nous paroît la plus sûre , on doit tâcher d'éviter la salivation , & avoir attention que le mercure ne porte vers les parties supérieures ; pour cela , il faut tâtonner pour ainsi dire , commencer par des frictions légères & éloignées , parce que tel qui paroît pouvoir supporter beaucoup de mercure à cause de son tempérament robuste , ne peut cependant en supporter que très-peu ; & qu'au contraire il arrive quelquefois que des personnes d'un tempérament foible en supportent beaucoup plus. Il faut donc être très-circonspect dans le commencement , pour ne pas jeter tout-à-la-fois trop de mercure dans les vaisseaux. Pour ce qui est du temps où l'on doit donner les frictions , il est assez indifférent que ce soit le matin ou le soir , pourvu qu'on observe de le donner à jeun si c'est le matin , ou quatre heures après le repas si c'est le soir. Si on les administre en hiver , il faut faire placer le malade auprès d'un feu clair , & éviter en même temps qu'il ne sue. Si c'est en été , il faut faire pareillement attention qu'il ne sue pas. Avant d'appliquer l'onguent mercuriel , on frotte avec les mains , la partie sur laquelle on doit faire la friction , jusqu'à ce qu'elle devienne rouge , & que le malade y sente une certaine chaleur. Ensuite le Chirurgien étend la dose de l'onguent qu'il doit employer , sur la partie , & la frotte jusqu'à ce qu'elle soit sèche , après quoi il frotte ses mains aux bas ou aux linges du malade. A la première friction on emploie demi - gros , ou un ou deux tout au plus de l'onguent mercuriel fait au tiers. Dans les cas douteux , il vaut mieux commencer par la plus petite dose , par demi-gros seulement. La première friction se fait à un pied , indifféremment à l'un ou à l'autre : on frotte tout le pied jusques par dessus la cheville. On met un jour d'intervalle entre la première & la seconde friction ; on peut même en mettre deux ou trois dans les cas douteux. La seconde friction se fait à l'autre pied , de la même manière. La troisième depuis par-dessus la cheville jusqu'à trois ou quatre travers de doigt au dessous de l'articulation de la jambe avec la cuisse , du côté où l'on a fait la première friction

tion si le malade n'a pas été encore ému par le mercure , on peut faire celle-ci depuis deux gros jusqu'à deux & demi. La quatrième se fait à la même partie du côté opposé. La cinquième se fait jusqu'à trois ou quatre travers de doigt au dessus du genou , à la dose précédente. La sixième au côté opposé. La septième depuis quatre travers de doigt du genou jusque vers l'aîne , & les plis des fesses. La huitième au côté opposé. La neuvième dans toute l'étendue d'une fesse , & la région lombaire correspondante. On va alors jusqu'à trois gros ou même quelquefois jusqu'à six. La dixième à l'autre fesse & à la région lombaire correspondante. La onzième se fait à l'épaule. La douzième du côté opposé. La treizième depuis l'articulation de l'omoplate jusqu'à l'avant-bras , & la dernière du côté opposé. Par où l'on voit qu'on donne en tout quatorze frictions. Quelquefois on n'en donne que douze , & alors on couvre tout à la fois l'épaule & le bras. Aux dernières frictions on emploie ordinairement cinq ou six gros d'onguent mercuriel : on peut mettre plus ou moins d'intervalles entre ces différentes frictions , suivant les différents cas. On ne peut pas déterminer au juste la quantité d'onguent qu'il faut employer en tout. Il est pourtant vrai qu'il n'en faut pas moins de huit onces : dans ce pays-ci on le fait au tiers , ce qui revient à-peu-près à une once & demie de mercure qu'on jette dans le corps. Si l'onguent étoit fait à moitié , comme à Paris , une moindre dose pourroit suffire. S'il y a des exostoses , des fics , des verrues , si le tempérament est phlegmatique on va jusqu'à dix ou douze onces : la plus petite dose est de six ou de huit , la plus haute ne va pas au delà de douze. Cependant il arrive quoique rarement que les symptômes disparaissent après la deuxième friction : c'est ce que M. de la Mure a eu occasion d'observer , mais alors il ne faut pas cesser de donner la friction. Pour ce qui est de la diète , elle doit être plus sévère que durant les préparations. Pendant les frictions il faut interdire absolument la viande ; on se contente de donner à midi une soupe & deux œufs frais dans lesquels on peut permettre au malade de tremper un peu de pain , ou bien on lui donne une soupe au lait si son estomac peut s'en accommoder , ou une crème au riz , à l'orge ; entre le repas de midi & celui du soir , on lui permet de manger un échaudé ou quelques biscuits. On lui interdit entièrement l'usage du vin ; si cependant sa coutume étoit si forte qu'il ne put s'en sévrer entièrement , on pourroit le lui permettre , en lui recommandant de le tempérer encore plus que pendant l'usage des bains. Durant le cours de la journée on lui fait boire quelque ptisane ; par exemple , dans les tempéraments qui ont le sang épais , une

ptisane faite avec le capillaire ; dans les tempéraments vifs , ardents & bilieux , l'eau de riz pour boisson ordinaire ; & dans les tempéraments qui participent de l'un & de l'autre , comme cela arrive quelquefois , on peut faire infuser le capillaire dans l'eau de riz. Comme dans l'extinction on évite soigneusement la salivation , il faut être extrêmement attentif aux symptomes qui marquent l'action du mercure vers les parties supérieures , & qui annoncent une salivation prochaine , afin de la prévenir. Voici quels sont ces symptomes. Quelques jours avant que la salivation paroisse les malades sont plus inquiets qu'à l'ordinaire , leur estomac se déränge , la tête leur fait mal , ils sentent une espece d'ardeur dans la bouche , les orifices excrétoires des glandes salivaires se gonflent ; quand on regarde dans leurs bouches , on sent une espece d'odeur métallique dont les malades ne s'apperçoivent pas toujours eux-mêmes ; enfin ils commencent à crachoter. Il est rare au reste que la salivation paroisse à la quatrième , cinquième ou sixième friction. C'est ordinairement vers la huitième , pourvu qu'on ménage les frictions. Il arrive cependant quelquefois quoique rarement qu'elle paroisse après la première. On doit donc interroger le malade sur les symptomes dont nous venons de parler , & sur-tout regarder l'intérieur de la bouche qui doit être à cet égard notre boussole. On sent souvent s'exhaler cette odeur métallique dont nous avons parlé ; on voit les gencives , les glandes salivaires , les orifices excrétoires gonflés ; au moindre de ces signes qu'on apperçoit , n'y en eût-il qu'un seul , il faut mettre un plus grand intervalle entre les frictions , les éloigner les unes des autres de deux ou trois jours ; & quoiqu'en cela il semble qu'on allonge la curation , on l'abrege cependant , puisque sans cette précaution on est obligé de suspendre les frictions pendant les huit ou dix jours en attendant que la salivation soit finie. Si après deux ou trois jours d'intervalle les symptomes n'ont pas augmenté , s'ils ont au contraire diminué , on peut donner une légère friction. Si malgré la précaution que nous venons d'indiquer , la salivation survient , alors pour l'arrêter on suspend entièrement les frictions , & on fait boire en plus grande quantité la décoction d'orge ou de riz , & si l'on a jusqu'alors donné la ptisane de capillaire , il est bon de lui substituer l'eau de riz , & donner le soir des émulsions , mais sans ajouter le sirop de pavot qui pourroit suspendre trop brusquement la salivation & causer de plus grands engorgements , des inflammations. On fait donc ces émulsions avec les semences froides , comme nous avons dit ailleurs , & on y ajoute demi-once , ou une once de sirop de nymphæa qui est rafraîchissant. Si malgré ces précautions les

symptomes augmentent , & que la salivation continue ou augmente dans l'espace de deux ou trois jours , il faut dépouiller le malade de ses linges , le changer de chemise , de calçons , de bas. Alors on peut le faire saigner une ou deux fois , suivant les forces & l'intensité des symptomes , & lui donner des lavements , d'abord avec l'eau & l'huile simplement , ensuite avec les plantes émollientes , & si cela ne suffit pas , on peut les rendre purgatifs en y ajoutant le *Catholicum* , ou une once ou deux de pulpe de casse. Si ces symptomes persistent encore , on le purgera avec une décoction de casse & de tamarin en deux verres : dans le premier on dissout deux onces de manne , & dans le second une once seulement. Enfin si la salivation ne cede pas à tous ces remedes , il faut faire prendre un ou deux bains , allant ainsi peu-à-peu & par degré , & commençant toujours par les remedes les plus doux. A l'égard des ulceres qui arrivent dans la bouche , on peut les déterger avec le collyre de *Lanfranc* , dans la composition duquel entre l'orpiment , le verdet , la myrrhe , l'aloès ; ou bien on peut les toucher avec quelques gouttes de l'esprit de vitriol , & faire en même temps un gargarisme avec la décoction d'orge & le miel de Narbonne ou du meilleur qu'on peut trouver. Il faut aussi faire attention aux excrétiens , & voir si le malade va du ventre. Il arrive quelquefois pendant les frictions que le ventre se resserre , ce qui occasionne des mouvements fébriles ; alors il faut donner de deux en deux jours , un lavement émollient. Il y a une attention particuliere à faire par rapport au sexe , c'est de ne commencer à administrer les frictions , autant qu'il est possible , qu'un ou deux jours après l'écoulement des regles. Dans le cas cependant où l'on est pressé on peut les donner sans attendre ce temps-là , pourvu qu'on ait attention de les suspendre un ou deux jours avant qu'elles paroissent , jusqu'à deux jours après que l'écoulement est fini. On évite par-là de grands inconvénients , comme des regles immodérées , des pertes de sang très-considérables ; c'est pourquoi on doit interroger les malades sur les symptomes qui ont coutume de précéder chez elles l'évacuation des menstrues , afin de suspendre à propos les frictions. Si malgré cette attention l'hémorragie survenoit & étoit trop abondante , il faudroit suspendre les frictions & donner des émulsions. Pour ce qui regarde la preuve que le mercure agit suffisamment , elle se tire , 1°. de la quantité d'onguent mercuriel qu'on a employé , 2°. de la disparition de tous les symptomes vénériens. Si après avoir employé une certaine quantité d'onguent , tous les symptomes disparoissent , on cesse les frictions ; mais s'ils persistent encore , on va jusqu'à dix ou douze onces , & si les symptomes ne disparoissent pas , il

ne faut pas passer outre , parce que le mercure étend son action au delà du temps qu'on reste dans les linges. M. de la Mure a vu une fille qu'on avoit passé par les grands remèdes chez laquelle tous les symptômes avoient disparu , qui cependant deux mois après étant en service , eut une salivation des plus abondantes : ainsi quand on a employé une quantité raisonnable de mercure , quoique tous les symptômes n'aient pas disparu , on peut être assuré de la guérison des malades , & cesser les frictions.

Choses qui doivent suivre les Frictions.

APRÈS avoir cessé les frictions , on peut laisser le malade encore trois ou quatre jours dans les linges : on le purge ensuite , puis on le lave , & on le frotte avec des linges trempés dans du vin chaud ou dans de l'eau-de-vie mêlée avec de l'eau. On lui fait prendre l'air peu-à-peu ; les fenêtres qui avoient été fermées jusqu'alors peuvent s'ouvrir aux plus belles heures du jour , & s'il y a plusieurs appartements dans la maison , il est bon d'en faire changer. Il peut ensuite sortir pendant quelques heures de la journée , & par un beau temps , évitant au commencement le froid & la trop grande chaleur. A l'égard de la diète , il faut le remettre peu-à-peu à sa diète ordinaire. On peut alors lui faire prendre le lait , sur-tout s'il est d'un tempérament vif , sec , ardent & bilieux.

Pharmacologie Rationnelle.

POUR expliquer la manière dont le mercure guérit la vérole , les uns ont recours à une vertu spécifique , ce qui n'explique rien ; les autres à des acides ou à des alkalis suivant leurs préjugés au sujet de la nature du virus vérolé. Ceux qui croient que ce virus est un acide , jugent que le mercure fait fonction d'alkali , & qu'il guérit la vérole par un principe alkali : au contraire ceux qui pensent que le virus vérolé est alkali , croient que le mercure agit par un principe acide. Mais , 1^o. on ne connoît pas bien la nature du virus vérolé : on ne voit pas même qu'il altère le sang , c'est-à-dire , sa partie rouge , car les vérolés sont sujets aux mêmes maladies que les autres , à la pleurésie , à la péripneumonie , & ces maladies chez eux se traitent & se guérissent de la même manière , & par les mêmes médicaments que chez les autres : d'ailleurs , le sang qu'on tire des vérolés n'est pas différent , ou du moins on ne remarque aucune différence entre ce sang & celui des personnes saines. On ne connoît que les effets de ce virus , qui sont des concrétions lymphatiques qui se forment

dans les plus petites filieres du corps humain. Enfin les principes actifs du mercure ne sont guères plus connus que la nature du virus vérolique. 2°. Qu'est-il besoin d'avoir recours à une vertu spécifique , à des principes soit alkalis , soit acides , pour expliquer les bons effets du mercure dans la vérole ? Le mercure est le plus pesant de tous les corps que nous connoissons après l'or. Il pèse quatorze fois plus que le sang : de plus , il est extrêmement divisible , & plus il est divisé , plus il affecte la figure sphéroïde. En voilà assez pour concevoir comment il agit. Sa divisibilité & sa sphéricité le rendent très-propre à pénétrer jusques dans les plus petites filieres , & sa gravité le met en état de conserver plus long-temps son mouvement , de diviser les concrétions qui y sont formées , & de faire entrer les matieres ainsi divisées dans les voies de la circulation , d'où ensuite elles sont chassées par les selles , ou par les urines , ou par les sueurs.

Les Antihystériques.

POUR avoir une idée exacte de ce qu'on entend par médicaments antihystériques , il est nécessaire de connoître la passion hystérique ; c'est pourquoi avant d'entrer dans le détail de ces médicaments , nous donnerons la définition de cette maladie : nous dirons ensuite un mot de ses causes , de son diagnostic , de son pronostic & de sa curation , ce qui nous amenera naturellement au détail des antihystériques. La définition symptomatique des maladies est la plus certaine , & en même temps la plus incontestable , parce qu'elle se tire des symptomes qui tombent sous les sens , & qu'on ne sauroit contester. Il n'en est pas de même de la définition qu'on tire des causes des maladies ; par exemple , tout le monde convient que le concours d'une fièvre aiguë avec un point de côté , la difficulté de respirer & la toux , constituent la maladie qu'on appelle pleurésie ; au lieu que si on veut définir cette maladie par sa cause , les sentiments seront partagés , & la définition sera différente selon la diversité des sentiments , les uns mettant le siege de cette maladie dans la portion de la plevre qui revêt immédiatement les poumons , les autres dans la plevre intercostale , d'autres enfin dans les muscles intercostaux. On ne peut donc pas douter que la définition symptomatique d'une maladie ne soit la plus certaine , la moins contestée. Cependant il y a des maladies dont les symptomes sont si variés & si bizarres , qu'il est très-difficile & presque impossible d'en donner une définition même symptomatique , qui soit parfaitement exacte , ou qui renferme tous les symptomes. Or , on peut assurément placer parmi ces maladies , la passion hystérique ; ainsi on ne doit pas s'attendre à une défi-

nition qui renferme tous les symptômes. Nous nous contenterons d'indiquer ici les principaux & les plus constants.

Description de la Passion hystérique.

LA passion hystérique est une maladie chronique , périodique , dont les symptômes les plus constants sont les suivants. 1°. Les attaques de passion hystérique sont ordinairement précédées par une excrétion d'urine plus abondante , sans que les malades aient pris auparavant plus de boisson qu'à l'ordinaire , les urines en même temps sont claires & limpides. C'est à ce signe principalement que Sydenham reconnoissoit la maladie dont nous parlons : c'est aussi un des signes les plus sûrs , il n'est pas cependant toujours certain ; mais dans les sciences , où l'on ne peut avoir qu'une certitude morale , comme dans la médecine , on doit se contenter de ce qui arrive le plus ordinairement. 2°. Le bas-ventre se gonfle , & souvent même est tendu par des flatuosités ; les malades font des efforts pour rendre des vents , soit par le haut , soit par le bas ; & lorsqu'ils les ont rendus , ils sont soulagés. 3°. Ils sentent comme les mouvements d'un corps qui roule dans le bas-ventre , & quelquefois même d'un corps rond ou d'une boule qui se porte depuis la région hypogastrique jusqu'à la poitrine , & même jusqu'au gosier ; alors les malades craignent d'être suffoqués , & c'est aussi un des symptômes les plus caractéristiques de la passion hystérique qui lorsqu'il ne se trouve pas , en son absence les malades sentent ordinairement comme un corps qui se transporte dans différentes parties du bas-ventre ou du corps , car ils ne disent pas toujours qu'ils sentent une espèce de boule qui se meut dans leur corps. 4°. Ils ont une crainte perpétuelle de la mort , & sont dans un désespoir de guérison. Quelques-uns même ont cru que la présence de ce dernier symptôme étoit nécessaire pour constituer la passion hystérique : il paroît au moins plus constamment , & se rencontre presque toujours dans cette maladie. Voilà les symptômes qui caractérisent ordinairement la passion hystérique. Cette maladie a été appelée passion hystérique , parce que les anciens en attribuoient les symptômes à l'uterus. Cependant tous ces symptômes se rencontrent dans les hommes ; ainsi on ne peut pas dire qu'ils dépendent de l'uterus. Il est pourtant vrai que chez les femmes hystériques il y a assez souvent quelque vice dans cet organe , mais cela n'est pas constant. Au reste il faut être prévenu que la passion hystérique prend toutes sortes de formes , en sorte qu'on ne sauroit être trop attentif pour reconnoître & distinguer ces symptômes qui se déguisent sous le masque de plusieurs maladies , com-

me de l'épilepsie , des coliques néphrétiques , quelquefois même des symptômes du calcul ; c'est ce que *Sydenham* a observé : *M. de Sauvages* l'a aussi observé à Alais. Dans ce cas on étoit naturellement porté à faire l'opération de la taille , du moins à en juger du premier coup d'œil ; cependant quelques potions antihystériques dissipoient tous ces symptômes. Quelquefois aussi la passion hystérique se joint aux maladies aiguës ; c'est aussi ce que *M. de la Mure* a eu occasion d'observer , ayant vu de ces maladies dans lesquelles la passion hystérique se mettoit de la partie , & sembloit en faire augmenter les symptômes , dans le temps ou selon le cours ordinaire , ils devoient diminuer ; c'est à quoi il faut bien être attentif pour avoir recours dans ce cas-là aux antihystériques & non aux médicaments propres à combattre la maladie aiguë , sous laquelle la passion hystérique se trouve masquée. Parmi les signes qui caractérisent essentiellement la passion hystérique sous quelle forme qu'elle se présente , il faut compter les symptômes dont nous avons parlé ci-devant. De plus le pouls des malades est naturel , du moins ne change pas proportionnellement à l'intensité des symptômes , même dans les coliques les plus violentes. *M. de la Mure* a vu dans ce cas le pouls conserver sa mollesse , son égalité , & le même degré d'élévation que dans l'état de santé , au lieu que dans les coliques & les douleurs vives qui ne dépendent pas de la passion hystérique , le pouls est inégal , concentré & dur. Tels sont les signes auxquels on peut reconnoître cette maladie à laquelle les femmes sont plus sujettes que les hommes.

Causes.

Le chagrin , la tristesse , les peines d'esprit , produisent le plus souvent la passion hystérique. Ainsi si nous savons qu'une personne qui en éprouve les symptômes , en qui ils ne sont pas fort apparents , a eu des chagrins , nous avons lieu de conjecturer que les symptômes sont ceux de la passion hystérique. Les exercices immodérés , les jeux , les veilles peuvent aussi y contribuer & les produire. Il est très-difficile ou plutôt impossible de déterminer l'état des solides , & des fluides dans cette maladie , parce qu'on l'observe dans tous les tempéraments ; il est vrai cependant qu'elle se rencontre plus souvent dans des sujets d'un tempérament vif , ardent & bilieux , où les solides sont extrêmement tendus , & les principes des fluides plus développés. Ce qu'il y a de certain , c'est que cette passion suppose toujours un degré de sensibilité beaucoup plus grand que dans

l'état naturel , ce qui est prouvé par les mouvements convulsifs auxquels les personnes hystériques sont sujettes , & que la moindre cause renouvelle. Cette grande sensibilité se trouve dans les personnes d'un tempérament bilieux , & elle dépend chez elles de la grande tension des solides. Elle se trouve aussi chez les personnes d'un tempérament pituiteux , & chez celles-ci elle dépend assurément d'une autre cause , savoir , de l'attention de l'ame à ce qui se passe dans le corps. On voit tous les jours que plus l'ame est attentive aux sensations , plus elle en est vivement frappée ; par exemple , si nous mangeons , ou si nous buvons , il est certain que nous goûtons & savourons mieux les mets & la boisson lorsque nous y faisons attention , que lorsque nous sommes distraits. Il en est de même des organes des sens ; si nous sommes attentifs , nous entendons distinctement ce qu'autrement nous n'entendons que confusément. Il n'est donc pas douteux que l'attention de l'ame ne produise une plus grande sensibilité ; aussi voit-on que les femmes hystériques sont plus tranquilles lorsqu'elles se dissipent , & que si elles viennent à réfléchir sur leur état , les symptômes augmentent , leur imagination grossit les objets , & une légère indisposition leur paroît souvent un mal dangereux : c'est à quoi il faut faire attention pour ne pas prononcer en général que dans toutes les femmes hystériques , les solides sont tendus & les fluides âcres , puisque cet état des solides & des fluides ne se trouve pas dans celles qui sont d'un tempérament pituiteux. Finissons en disant qu'il est nécessaire d'interroger les malades sur les symptômes qu'ils éprouvent , sur la manière dont ils les prennent , sur ce qui a précédé : par-là on connoît qu'une maladie qui n'a pas quelquefois au premier coup d'œil les apparences de la passion hystérique , n'est pourtant que cette maladie déguisée. Tout ce que nous avons dit de la passion hystérique , on doit l'entendre de la passion hypocondriaque. Il est rare de guérir ces maladies , on peut cependant en diminuer les symptômes. On appelle en général médicaments antihystériques , ceux qu'on donne dans la vue de combattre cette maladie ; mais on entend plus spécialement par antihystériques , ceux que l'on donne à la même fin dans les paroxysmes mêmes. Nous avons déjà parlé de beaucoup de médicaments qui peuvent être rapportés à cette classe , tels sont les emmenagogues , la myrrhe , l'armoïse , la matricaire , le *castoreum* principalement , les stimulants , comme le girofle , la cannelle , le macis. On pourroit aussi y rapporter les stomachiques , les plantes aromatiques dont nous avons déjà parlé. Nous allons exposer ceux qui sont le plus en usage sous ce point de vue , après ceux dont nous avons déjà parlé ailleurs.

Le Succin , Succinum , Ambarum Citrinum , Electrum ou Carabé.

C'EST une substance bitumineuse , minérale , dure , acide , fragile , transparente , inflammable , de différente forme & de différente grandeur , qui repand une odeur agréable lorsqu'on la brûle. On nous l'apporte de la Prusse , ou on le retire des entrailles de la terre , ou bien on le recueille sur le bord de la mer ou il est apporté d'ailleurs , & d'où ensuite il est rejeté sur le rivage par les flots. Il y en a de deux especes , le blanc & le jaune ; le blanc contient plus de sel , & le jaune plus d'huile.

Cas.

LES anciens & sur-tout *Fernel* recommandoient le succin dans les maladies de la tête , principalement dans les douleurs gravatives ; dans les catharres dépendants d'une lympe âcre , accompagnés de difficulté de respirer ; dans les affections soporeuses ; dans les affections de l'uterus ; dans la suppression des regles ; dans les pertes de sang immodérées , soit des filles , soit des femmes ; dans les vidanges immodérées. *M. de la Mure* l'a employé dans ce dernier cas avec succès ; dans les fleurs blanches , dans les ulcères fongueux de la matrice , & alors on s'en sert , soit intérieurement , soit extérieurement sous forme de fumigation ; dans les maladies convulsives , dans la passion hystérique & hypocondriaque , pendant & après les paroxysmes ; dans les écrouelles tant intérieurement , qu'extérieurement.

Vertus.

C'EST un médicament astringent stegnotique , tonique , détersif , antispasmodique , antihystérique.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON se sert du succin préparé , du sel volatil , de l'huile de succin & de la liqueur de corne de cerf succinée. Le succin préparé n'est autre chose que le succin porphyrisé , ou réduit en une poudre très fine : on l'ordonne de cette façon depuis huit ou dix grains jusqu'à vingt-cinq tout au plus. Il ne se dissout pas dans les menstrues aqueux. On l'associe avec la myrrhe , l'*assa fetida* & les autres médicaments de cette classe , & on l'incorpore avec le sirop d'armoise , ou bien on le donne seul & simplement

délayé dans l'eau de menthe , de matricaire , d'armoise , ou bien dissout dans un œuf frais en guise de sel : c'est de cette dernière façon que M. de la Mure l'a employé avec succès. Le sel volatil de succin qu'on retire par l'analyse chymique , agit plus promptement : on s'en sert dans les paroxysmes de la passion hystérique , à la dose de huit ou dix grains jusqu'à vingt tout au plus. Il est diurétique ; on peut le donner dans quelque eau appropriée ; on peut aussi composer une potion antihystérique avec la teinture de castoreum , le laudanum liquide , l'eau de cannelle orgée , l'eau de menthe & quinze grains ou vingt de ce sel volatil , & alors on fait prendre la potion à cuillerée. L'huile de succin qu'on retire aussi par l'analyse chymique , s'ordonne intérieurement depuis deux gouttes jusqu'à trois ou quatre dans les potions antihystériques. Extérieurement on en frotte les tempes , le nez des personnes pendant les paroxysmes de la passion hystérique : on en frotte aussi les membres paralysés. La liqueur de corne de cerf succinée se prépare ainsi : on prend de l'esprit volatil de corne de cerf dans lequel on met partie égale de sel volatil de corne de cerf & de sel volatil de succin autant que l'esprit volatil en peut dissoudre , c'est la liqueur de corne de cerf succinée : on s'en sert dans les cas de mouvements convulsifs , dans l'épilepsie des enfants ; on l'emploie extérieurement dans les tumeurs écrouelleuses , on en conduit la fumée par le moyen d'un entonnoir sur la tumeur ; on s'en sert aussi sous forme de fumigation dans les cas d'ulcère de la matrice , dans les fleurs blanches lorsque les matieres qui s'écoulent sont tenues , âcres , de mauvaise couleur , c'est-à-dire , jaunâtres ou verdâtres , & qu'elles excorient les parties voisines. Dans ce cas , on en fait recevoir la fumée à la malade , ou ce qui vaut mieux encore , on conduit cette fumée dans les parties affectées par le moyen d'un entonnoir.

Assa Fætida.

QUELQUES-uns lui ont donné le nom de *stercus diaboli* , à cause de son odeur désagréable. C'est une espèce de gomme-résine , compacte , molle & obéissante comme la cire , composée de différents grumeaux brillants , en partie jaunâtres ou roussâtres , en partie blanchâtres. Elle est en gros morceaux , & a une odeur forte , désagréable au jugement de plusieurs : les Perses cependant chez qui on la recueille s'en servent pour assaisonner les mets. Son goût est amer , âcre , mordicant , & approche de celui de l'ail , mais il est encore plus fort ; ce qui fait qu'il en est (du moins

dans la Perse) de cette gomme , comme chez nous de l'ail que quelques-uns recherchent dans tous les assaisonnements , & que d'autres ne peuvent souffrir. On la recueille dans la Perse où on la fait découler par incision de la racine d'une plante que les Grecs appelloient *silphium* , & les latins *laserpitium*. La tige de cette plante est semblable à celle de la fêrûle.

Cas.

LES anciens recommandoient beaucoup l'assa fœtida , tant pour assaisonner les mets , que pour l'usage de la médecine. Aujourd'hui on l'emploie en médecine seulement dans les cas suivans , savoir , dans la suppression des regles , soit qu'elle dépende du relâchement des solides & de l'épaississement visqueux des fluides , soit qu'elle dépende du spasme de la matrice dans le cas de vuidanges retenues , d'arrière-faix retenu , de fœtus mort pour faciliter l'accouchement ; dans la passion hystérique & hypocondriaque pendant les paroxysmes. Quelques-uns l'emploient dans le cas d'asthme sec , convulsif. On s'en sert aussi pour remédier aux mauvais effets produits par l'*opium* ou les autres narcotiques lorsqu'ils sont donnés à trop haute dose.

Vertus.

C'EST un médicament emmenagogue , béchique , antispasmodique , antihystérique.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON la donne en substance depuis douze grains jusqu'à vingt-cinq ou demi-gros , ou associée à la myrrhe , au safran , au succin , & incorporée avec le sirop d'armoïse , ou seule dans un œuf à la coque. On s'en sert extérieurement dans les paroxysmes de la passion hystérique , soit en l'approchant du nez , soit en la brûlant , & en en faisant recevoir la fumée.

Le Galbanum.

C'EST un suc gommo-résineux , concret , assez visqueux & tenace , ductile comme la cire , à demi-transparent , blanc lorsqu'il est récent , ensuite jaunâtre ou roux , d'un goût amer , avec une odeur forte & pénétrante. On nous l'apporte de Syrie , il découle ou de lui-même ou par incision d'une certaine plante fêrulacée ou ombellifere.

Cas.

LE *Galbanum* convient dans tous les cas où les emmenagogues proprement dits & en particulier l'assa fœtida conviennent ; dans la suppression des regles , dans le cas des vuidanges ou d'arrière-faix retenus , de passion hystérique : ses vertus sont les mêmes que celles de l'assa fœtida.

Maniere de s'en servir , Doses.

ON le prescrit comme l'assa fœtida , à la dose de douze grains jusqu'à vingt-cinq ou demi gros , on l'associe aussi aux autres médicaments de cette classe , qu'on incorpore avec le sirop d'armoise. Extérieurement il est recommandé comme émollient & résolutif , très-propre à résoudre les tumeurs du foie & de la rate. Dans le cas de passion hystérique , *Sydenham* faisoit avec la myrrhe , le galbanum & le safran , un emplâtre qu'il faisoit appliquer sur l'ombilic. On peut aussi dans le même cas en faire flairer la fumée , en le mettant sur une pelle rougie au feu qu'on approche du nez. Tels sont les médicaments antihystériques les plus usités , encore même ne sont-ils pas d'un grand usage. On se sert le plus souvent du castoreum dont nous avons parlé dans la classe des emmenagogues : on peut aussi rapporter à la classe des antihystériques , les autres sucs gomme-résineux , tels que la gomme *ammoniac* , le *bdelium* , l'*opoponax* , le *sagapenum* ; mais ces médicaments sont encore moins usités que ceux que nous venons d'indiquer.

Les Antiscorbutiques.

IL est plus nécessaire d'avoir une idée du scorbut pour savoir ce qu'on entend par médicaments antiscorbutiques , qu'il ne l'est de connoître la passion hystérique pour savoir ce qu'on entend par antihystériques ; mais en même temps les symptômes du scorbut sont si multipliés & si variés , qu'il est pour le moins aussi difficile de définir cette maladie que la passion hystérique. Nous sommes donc obligés de suivre la même route que nous avons pris en parlant de cette dernière maladie , & de nous contenter d'indiquer les principaux symptômes. Le scorbut , selon quelques Auteurs , est une maladie nouvellement décrite par les modernes : d'autres croient qu'elle est trouvée décrite dans les plus anciens Auteurs & dans *Hippocrate* même , sous le nom de *Lienosi* & de *Stomacace*. Le mot scorbut suivant *Boerhaave* , vient du mot Flamand , *skorbec* , qui signifie *déchirement de bouche* ; ce qui répond assez à la signification du mot *stomacace* , composé de deux mots

grecs , *stoma* , bouche , *kakia* , vice , mal ; comme qui diroit mauvaise bouche , parce qu'un des principaux symptômes de cette maladie est le gonflement des gencives , & la puanteur de la bouche. Cette maladie est très-fréquente en Hollande , en Norwege , en Laponie , dans la basse Allemagne , & sur les bords de la mer dans les pays froids où elle est endémique. On l'observe aussi ailleurs , mais plus rarement. Nous allons exposer les principaux symptômes dont nous distinguerons trois classes , selon les trois degrés qu'on reconnoît dans cette maladie.

Symptomes du premier degré du Scorbut.

LE scorbut s'annonce d'abord par ces signes. Un homme qui se portoit bien auparavant , se trouve tout-à-coup abattu , sans qu'il ait précédé aucune autre maladie , en sorte qu'il ne peut faire aucun exercice qu'avec peine , & qu'il ne se trouve bien que lorsqu'il est couché ; il a beaucoup de difficulté de marcher , sur-tout lorsqu'il faut monter ou descendre ; les urines sont pâles , crues , le plus souvent rouges , plus ou moins fétides ; les gencives commencent à se gonfler , l'haleine devient puante.

Symptomes du second degré.

ENSUITE les jambes commencent à s'enfler , mais cette enflure n'est pas constante , au contraire tantôt elle paroît , tantôt elle disparoît , en quoi elle diffère de l'enflure des jambes qui survient dans l'hydropisie , laquelle est constante ; alors il survient des douleurs vagues par-tout le corps , sur-tout dans les articulations. Ces douleurs augmentent pendant la nuit , comme les douleurs véroliques ; mais *Boerhaave* y fait cependant remarquer une différence qui consiste en ce que ces douleurs disparaissent le matin chez les vérolés , au lieu qu'elles persistent toujours chez les scorbutiques. On remarque outre cela des tâches livides , noirâtres , des ulcères sur toute l'habitude du corps ; les gencives sont plus gonflées , & pour peu qu'on les presse , elles jettent du sang qui est tantôt grumelé , tantôt dissout & noirâtre ; les dents branlent , le visage devient pâle ou même jaunâtre ; on voit des aphthes ou des petits ulcères dans l'intérieur de la bouche.

Symptomes du troisieme degré.

DANS le troisieme les tâches livides ou noires sont répandues en plus grande quantité sur toute l'habitude du corps , le foie est comme pourri ,

enforte que si l'on ouvre les cadavres de ceux qui sont morts dans ce dernier degré , on éprouve que le foie s'écoule pour ainsi dire comme une matiere fluide , pour peu qu'on le touche : de plus il se forme des ulceres internes en différentes parties du corps ; les forces s'abattent de plus en plus , & enfin les malades périssent, soit par des diarrhées colliquatives , soit par des hémorragies. Tels sont les principaux symptomes qu'on observe dans le scorbut lorsqu'il est dans le troisieme degré. Le scorbut se déguise aussi sous la forme de bien des maladies , car il y a des colliques scorbutiques , des phthysies scorbutiques , des douleurs de tête scorbutiques.... Pour les reconnoître , il faut être attentif aux signes qui caractérisent le virus scorbutique. En général on peut dire que les lassitudes spontanées , les gencives gonflées & qui jettent le sang pour peu qu'on les presse , les dents livides & peu affermies , sont les signes qui font le mieux connoître la présence du virus scorbutique : c'est pourquoi on doit tourner sa principale attention du côté de la bouche , pour examiner les symptomes que nous venons d'indiquer. Si on pese bien les différents symptomes qu'on a observé dans le troisieme degré du scorbut , on sentira aisément la raison de la différence que l'on fait ordinairement du scorbut en froid & en chaud. En effet nous avons observé que dans le scorbut , tantôt les urines sont pâles , tantôt elles sont rouges , tantôt elles sont fétides. Quelquefois le sang que les gencives laissent échapper , est âcre , dissout & sort avec impétuosité ; quelquefois au contraire il est épais , grumelé ; enfin on observe quelquefois des diarrhées , des dysenteries , quelquefois on n'en observe pas. Il est visible que la différence de ces symptomes établit incontestablement la distinction que l'on doit faire du scorbut , en scorbut chaud & en froid. Le scorbut froid est celui dans lequel le visage est pâle , de même que les gencives qui jettent peu de sang , lequel est même souvent grumelé , épais , les urines sont pâles & sans puanteur. Le scorbut chaud au contraire est celui dans lequel les gencives sont fort gâtées & gonflées , & répandent beaucoup de sang âcre , dissout. Il y a des ulceres dans l'intérieur de la bouche , les urines sont rouges , fétides , & souvent on a observé des vomissements , des cardialgies , des diarrhées , des dysenteries. Cette distinction est très-importante pour la pratique , parce qu'il est bien évident qu'on doit choisir les remedes , suivant les différentes especes de scorbut qu'on a à traiter. Les personnes qui habitent sur les côtes de la mer dans les pays froids sont plus sujetes au scorbut que les autres , sur-tout si elles mangent de viandes salées & endurcies à la fumée , des poissons salés : il en est de même de ceux qui

voyagent sur mer ; ils sont ordinairement sujets au scorbut chaud , à cause des viandes salées qu'ils mangent , & des eaux pourries & infectées des vers , qu'ils sont souvent obligés de boire : enfin ceux qui ont eu pendant long-temps des fièvres quartenes , & ceux qui ont fait un trop long usage du quinquina y sont sujets ; car c'est l'inconvénient que trouvoit *Sydenham* dans le trop grand usage du quinquina , de produire le scorbut : sur quoi *Boerhaave* observe qu'il ne produit ce mauvais effet que lorsqu'il guérit les fièvres sans procurer aucune évacuation sensible , soit par les urines , soit par les selles. Maintenant nous sommes en état de faire concevoir ce qu'on entend par antiscorbutiques. On appelle ainsi les médicaments qu'on croit propres à combattre le scorbut , mais sur-tout le scorbut froid , ou tout au plus le scorbut chaud lorsqu'il n'est encore que dans son premier degré : ainsi les antiscorbutiques proprement dits , sont des médicaments qui divisent , atténuent , échauffent , & qui seroient nuisibles par conséquent dans le scorbut chaud , excepté lorsqu'il n'est encore que dans son premier degré , dans lequel cas il ne diffère pas encore beaucoup du scorbut froid. Selon l'idée que nous venons de donner des antiscorbutiques , il est aisé de comprendre qu'on pourroit rapporter à cette classe les diurétiques chauds , les apéritifs chauds , les stomachiques chauds ; on y range principalement la *roquette* , le *raisfort* sauvage , la *passerage* ou *lepidium vulgare majus*. Nous ne parlerons ici que de ceux qui sont en usage sous ce point de vue.

Le Cresson , Nasturtium.

ON connoît deux espèces de cresson dans les boutiques , savoir , le cresson de jardin , *nasturtium hortense* , & le cresson d'eau , cresson de fontaine , *nasturtium aquaticum* ; c'est le plus usité.

Cas.

ON se sert avec succès du cresson d'eau dans les affections scorbutiques lorsque le sang n'est point dissout par putridité , & que les urines ne sont ni rouges ni puantes , en un mot dans le scorbut froid ; dans les ulcères scorbutiques , soit qu'ils occupent l'intérieur de la bouche , soit qu'ils se trouvent dans quelqu'autre partie du corps ; dans les dartres invétérées , & autres éruptions cutanées scorbutiques , pourvu que le sang ne soit point âcre & dissout ; dans les obstructions des viscères du bas-

ventre qui tendent à la leucophlegmatie ou à l'hydropisie , pourvu qu'elles dépendent du relâchement des solides , & qu'il n'y ait point des marques de chaleur , d'ardeur dans les hydropisies récentes.

Vertus.

ON peut regarder le creffon comme un bon antiscorbutique , diurétique , apéritif , antihypotique.

Maniere de s'en servir , & ses Doses.

ON emploie le creffon sous différentes formes , mais sur-tout en salade. Outre que les malades le prennent avec plaisir de cette façon , l'huile & le vinaigre dont on l'affaïsonne alors , sont très-propres à corriger sa trop grande âcreté. 2°. En décoction : on l'ajoute aux bouillons antiscorbutiques , à la dose d'une demi-poignée , ou d'une poignée , observant de couvrir exactement le pot dans lequel se fait le bouillon , parce que la vertu de cette plante réside dans un principe subtil extrêmement volatil. On peut préparer ces bouillons au bain-marie. 3°. En infusion : le creffon conserve mieux sa vertu de cette manière , qu'en décoction. 4°. On se sert aussi du suc du creffon exprimé & épuré , soit simplement par résidence , soit après une légère ébullition. On ajoute ce suc au petit lait , à la dose d'une ou deux cuillerées , dans les cas où le tempérament du malade sembleroit indiquer le scorbut chaud , quoique cependant les symptômes soient les mêmes que dans le froid. On emploie le suc de creffon sous forme de gargarisme dans les cas d'ulceres scorbutiques baveux de la bouche , dont la matiere est épaisse , tenace , ou seul , ou avec la décoction d'orge & le miel. On recommande encore ce même suc dans le cas de polype ou d'excroissance charnue , qui vient aux narines ; on en baigne souvent le polype , ou bien on le fait renifler. 5°. On se sert aussi de l'eau distillée du creffon qu'on prépare de cette manière : on prend une certaine quantité du creffon que l'on hâche bien menu ; on ajoute sur chaque livre de la plante deux livres d'eau commune , & on distille. On donne cette eau depuis deux onces jusqu'à quatre. On s'en sert aussi pour base des potions antiscorbutiques. 6°. On se sert enfin de l'esprit urinaire de creffon qui se fait en pilant la plante fraîche , & la laissant fermenter pendant huit jours avec le levain , on distille ensuite le tout au bain-marie. La dose en est d'une ou deux cuillerées. On peut aussi l'ajou-

ter au petit lait. Il n'est pas fort usité dans ce pays-ci. La vertu du cresson réside dans un principe âcre , mordicant , subtil , extrêmement volatil.

Cochlearia , l'Herbe aux Cuillers.

CETTE plante est fort recommandée dans le scorbut ; elle est plus active que le cresson , ce qu'on connoît même par son goût qui est beaucoup plus âcre & plus mordicant. Elle a d'ailleurs les mêmes vertus , & convient dans les mêmes cas ; mais elle exige plus de précautions , & on ne doit pas la donner dans le cas douteux de scorbut où nous avons dit que le cresson convenoit. *Boerhaave* rapporte que plusieurs malades ont péri par des hémorragies après avoir fait usage de cette plante : sans doute que ces malades étoient dans le deuxième ou troisième degré du scorbut où cette plante ne peut être que nuisible. Elle convient principalement dans le scorbut froid lorsqu'il y a un grand épaissement de sang , autrement on doit préférer le cresson. Dans la basse Allemagne où l'on fait un grand usage de ce médicament , on lui associe l'oseille qui se trouve dans le même terroir que l'herbe aux cuillers , comme si la nature en plaçant dans les mêmes endroits ces deux plantes , invitoit à tempérer la trop grande âcreté de l'une par l'acide de l'autre. Quoi qu'il en soit , il est bon de tempérer ainsi la trop grande âcreté de l'herbe aux cuillers , en faisant bouillir avec elle l'oseille , ou quelque autre plante pleine de principes acides : l'expérience justifie cet usage. On se sert de l'herbe aux cuillers de la même façon que du cresson , excepté cependant en salade. On en emploie pareillement le suc , l'eau distillée , l'esprit urinaire. On le donne en infusion dans la bière , le vin , l'eau , après l'avoir un peu hâchée.

Le Beccabunga.

IL y en a de deux espèces , le grand & le petit.

Cas.

CETTE Plante est plus tempérée dans son action que le cresson & le cochlearia. C'est un très-bon antiscorbutique qui convient dans les cas où les deux autres plantes ne peuvent convenir ; c'est pourquoi on peut s'en servir dans le scorbut douteux , & le donner , soit seul , soit avec le petit lait , soit avec d'autres plantes antiscorbutiques. On peut aussi le donner seul dans tous les cas où nous avons dit que convenoient le cresson

& le cochlearia. On vante beaucoup le beccabunga dans le cas d'hémorroïdes qui ne sont pas ouvertes. On en pile les feuilles, on les fait cuire dans l'eau, & on les applique extérieurement en forme de cataplasme. On peut s'en servir de la même façon dans les ulcères scorbutiques. Selon *Etmuller*, lorsqu'après un accouchement difficile les aines s'enflent, le beccabunga dissipe ces tumeurs, en le pilant avec les fleurs de camomille pour en former des cataplasmes qu'on applique sur la partie affligée, ou en le faisant bouillir pour en faire des fomentations qui servent au même usage : ces fomentations servent encore dans l'engourdissement des parties produit par le virus scorbutique.

Le Trefle d'eau , Trifolium aquaticum.

IL a à-peu-près les mêmes vertus que le beccabunga : on l'emploie dans les mêmes cas, mais il n'est gueres d'usage. On peut rapporter à cette classe toutes les plantes âcres.

Fin des Médicaments Internes.



SECONDE PARTIE.

Des Médicaments Moyens.

ON appelle médicaments moyens ceux qu'on introduit dans quelque partie pour les en faire sortir bientôt après, tels sont, par exemple, les médicaments qu'on appelle salivants ou sialogogues, les médicaments errhins ou errhines.

ARTICLE PREMIER.

Salivants ou Sialogogues.

LES médicaments salivants sont ceux qui excitent une plus grande excrétion des humeurs de la bouche. Ces humeurs sont au nombre de deux : l'une est fluide, transparente, savonneuse, & ne s'épaissit pas au feu ; c'est la salive proprement dite qui est formée par plusieurs glandes, telles que les parotides, les maxillaires & les glandes sublinguales situées sous la portion antérieure de la langue. L'autre humeur qui se répand dans la cavité de la bouche est plus visqueuse, plus onctueuse ; elle est fournie par les glandes de la membrane du palais, du voile du palais, de la luette, du pharynx & par les amygdales : on confond cependant assez souvent ces deux sortes d'humeurs sous le nom de salive. Il y a des médicaments qui produisent une plus grande excrétion des humeurs de la bouche, étant pris intérieurement, & agissant dans tout le corps, comme le mercure & ses différentes préparations, selon que nous l'avons déjà remarqué ailleurs. Ce n'est pas de ces médicaments dont nous voulons parler ; il est ici question des médicaments qui produisent cette excrétion, en agissant précisément & immédiatement sur les différentes parties de la bouche.

Indications.

Les salivants tels que nous venons de les définir, sont indiqués : 1°. Dans le cas de puanteur de la bouche produite par des humeurs qui croupissent dans les glandes de la bouche. 2°. Dans l'odontalgie ou douleur des

dents , produite par la trop grande âcreté des humeurs salivaires qui corrodent les parties sensibles des dents. 3°. Dans la paralysie de la langue , soit qu'elle survienne après une attaque d'apoplexie , comme cela arrive souvent selon ce que nous avons dit ailleurs , soit qu'elle arrive sans que l'apoplexie ait précédé. Cette paralysie de la langue dépend du relâchement des nerfs qui se distribuent dans cet organe : tels sont les principaux cas où les salivants conviennent en agissant localement sur les parties affectées. Il y a outre cela des maladies qui n'affectent pas l'intérieur de la bouche , & dans lesquelles les salivants conviennent cependant , & sont employés comme révulsifs ; tels sont par exemple les cas où la sérosité surabonde dans le sang : quoique ces maladies n'affectent pas l'intérieur de la bouche , on se sert des salivants pour détourner le cours de cette sérosité surabondante ; ainsi les salivants conviennent dans l'asthme humide proprement dit , sur quoi il faut se rappeler ce que nous avons dit ailleurs , qu'il y a des asthmes qui paroissent humides , & qui ne le sont pas. Cependant ce n'est que dans l'asthme vraiment pituiteux que les salivants conviennent : ils rendent les attaques moins fréquentes & moins fatigantes. On a prétendu pendant long-tems que la salivation étoit nécessaire pour la cure de la vérole , & qu'ainsi les salivants conviennent dans cette maladie. Nous avons déjà vu en parlant des antivénériens ce qu'on doit penser à cet égard. Enfin les salivants conviennent dans les engorgements des glandes lymphatiques.

Ces médicaments sont contre-indiqués dans les personnes d'un tempérament sec , vif , ardent & bilieux , dans lesquelles la sérosité manque , bien loin d'être surabondante. Au reste il ne faut pas croire que l'humeur qui se porte dans les glandes de la bouche à l'occasion de ces médicaments soit la salive proprement dite ; ce n'est qu'une humeur fereuse qui se porte en plus grande quantité vers les glandes salivaires , à-peu-près comme quand on donne les diurétiques , l'humeur qui est déterminée vers les voies urinaires n'est pas de l'urine , mais seulement une sérosité surabondante. Les plus usités sont le gingembre , le zédoaire , &c.

Les Errhines.

Les errhines sont des médicaments propres à produire une plus grande excrétion de la mucoité qui se sépare dans la cavité des narines , qu'on connoît sous le nom de morve. Les anciens croyoient que cette mucoité venoit du cerveau dans les narines , par des trous qui traversoient la lame criblée de l'os ethmoïde. Suivant cette idée les errhines convenoient dans

toutes les maladies dolorifiques de la tête , comme dans la migraine , l'enchiement ou coriza qu'ils faisoient dépendre du débordement des matieres muqueuses dans la cavité des narines ; dans le catarre qu'ils rangeoient aussi parmi les maladies de la tête , parce qu'ils croyoient qu'il dépendoit d'une pituite âcre qui descendoit du cerveau jusqu'aux fauces où elle caufoit des embarras , des engorgements. Quoique les modernes n'aient pas soutenu le système des anciens au sujet de la mucosité des narines , & qu'ils soient convaincus qu'elle est séparée dans les follicules répandues dans la membrane pituitaire , ils ne laissent pas d'employer les errhines dans tous les cas que nous venons d'indiquer. 1°. Parce qu'indépendamment de la théorie , les anciens avoient pour garants de leur pratique , l'observation qui leur apprenoient que ces médicaments étoient employés avec succès dans tous ces cas. 2°. En débarrassant les couloirs de la membrane pituitaire , on dégage les rameaux de la carotide externe distribués sur cette même membrane , & on remédie à plusieurs maladies de la tête , dépendantes de la compression que cause le trop grand abord du sang sur le cerveau. Les errhines conviennent dans l'écoulement continuel des larmes , qui dépend de l'obstruction de ce conduit lacrymal qui s'ouvre dans la cavité des narines. Les anciens divisoient les errhines , en errhines simples & en sternutatoires : ils appelloient proprement errhins , ceux qui procuroient une plus grande excrétion d'humeur muqueuse sans faire éternuer , & ils appelloient sternutatoires ceux qui excitoient l'éternuement. On donne ces médicaments sous forme fluide & sous forme solide : dans les cas de sécheresse des narines , on emploie les errhines sous forme liquide , par exemple l'eau tiède simple , ou dans laquelle on fait bouillir la pariétaire , la mauve. Les errhines émollients conviennent aussi dans le coriza , lorsque les malades sentent une légère douleur qui marque une espece d'inflammation : alors la matiere la plus tenace se sépare , & il reste dans les couloirs ce qu'il y a de plus épais. Il se forme quelquefois dans la cavité des narines des ozenes , c'est-à-dire , des ulceres qu'on connoît par l'odeur puante qu'ils exhalent : dans ce cas il faut bien faire attention au pus & à la douleur : si la douleur n'est pas fort considérable , & que la matiere soit tenace , il faut donner des errhines détersifs , par exemple , une décoction d'orge dans laquelle on délaye un peu de miel de Narbonne. Si cela ne suffit pas on fait une décoction d'orge à laquelle on ajoute la sauge , la lavande ou même la rue : on trempe des linges dans cette décoction , & on les introduit dans la cavité des narines , ou bien ce qui vaut mieux , on la fait renifler , enforte qu'elle pénètre le plus avant qu'il est possible dans la cavité

des sinus qui s'ouvrent dans les arrieres narines. Quand l'ulcere est putride, on peut se servir de la même façon des eaux de Barege & de Balaruc. Dans les migraines invétérées, dans lesquelles il ne se fait point d'excrétion de la mucoſité des narines, on peut dire que la matiere est accumulée dans les sinus frontaux : dans ce cas-là on peut employer les errhins ſtimulants qui ne ſont pas ſternutatoires, & qui conviennent auſſi en général dans toutes les maladies doloſifiques de la tête ; par exemple, le ſuc de lierre terreſtre reniflé, le ſuc de concombre ſauvage qui eſt encore plus irritant, l'eau diſtillée de racine de pain de pourceaux. On emploie auſſi l'*azgarum* dans les maladies doloſifiques de la tête qui dépendent de la mucoſité retenue ; c'eſt un errhin très-aſſuré. On pulvériſe les feuilles ſeches de cette plante, & on prend deux grains de cette poudre le ſoir en ſe couchant. Enfin ſ'il eſt néceſſaire d'employer des errhins plus violents, & d'exciter une plus grande excrétion de mucoſité, ou enfin de ſecouer toute la machine, alors on a recours aux errhins ſternutatoires, parmi leſquels il faut placer le tabac qui eſt un ſternutatoire pour ceux qui n'y ſont pas accoutumés, l'eſlebore blanc qui eſt très-violent, de même que l'euphorbe ; mais on doit éviter ces ſortes d'errhins lorsqu'on craint d'exciter une hémorragie dans les pléthoriques, ſur-tout ſi la pléthore ſe porte vers les parties ſupérieures : on doit auſſi les éviter dans le cas d'ulcère, crainte que les vaiſſeaux ne s'ouvrent. Dans les tempéraments ſecs & bilieux, dans leſquels la ſéroſité manque, ils ne pourroient qu'être nuifibles. On ne doit donc ſ'en ſervir que dans les cas où l'on a beſoin d'une action violente & prompte, comme dans les affections ſoporeuſes ; ou quand on veut exciter une contraction ſubite des muſcles du bas-ventre, comme dans l'accouchement laborieux, ſur-tout lorsque le fœtus eſt mort, & que les douleurs de la mere ont ceſſé, ou ne ſont pas aſſez vives pour chaſſer le fœtus : on doit ſ'en ſervir cependant toujours avec beaucoup de circonſpection, parce que l'ébranlement que cauſent ces médicaments eſt quelquefois très-nuiſible.

Fin des Médicaments Moyens.

TROISIEME PARTIE.

Des Médicaments Externes.

LES médicaments externes sont ceux qu'on applique à la surface extérieure du corps, & qui produisent de cette façon les bons effets que nous en attendons. On applique ces médicaments ou pour guérir quelque maladie locale, ou pour procurer un bien dans toute l'économie animale sans avoir égard à la partie où on l'applique. De là naît naturellement la division des médicaments externes en topiques & en généraux ; les topiques sont ceux qui produisent leurs effets précisément sur la partie sur laquelle on les applique ; les généraux sont ceux qu'on applique pour remédier aux vices généraux qui dérangent l'économie animale.

CHAPITRE PREMIER.

Des Topiques.

POUR traiter des médicamens externes topiques avec méthode, nous suivrons l'ordre que nous fournit l'inflammation ou la tumeur inflammatoire : pour cela nous considérerons l'inflammation dans ses différens progrès. Il est certain que la douleur est dans l'inflammation le symptôme le plus fâcheux & le plus pressant. Les médicaments propres à la calmer étant appliqués extérieurement, sont ceux qu'on appelle proprement anodins : ce sera par ceux-là que nous commencerons. Il ne suffit pas de calmer la douleur, il faut de plus penser à la guérison, & c'est-là le second point de vue sous lequel on traite l'inflammation : or l'observation fait voir que la meilleure façon dont l'inflammation puisse se terminer, est la résolution qui se fait lorsque les matieres accumulées dans les extrémités des arteres, sont divisées, atténuées, & mises en état de passer dans les commencemens des veines : les médicaments topiques propres à produire cet effet ou cette résolution sont appelés médicamens résolutifs. Lorsque l'inflammation ou la tumeur inflammatoire ne peut se résoudre, il faut tâcher de procurer la suppuration, c'est-à-dire, le changement de la matiere accumulée dans les extrémités des arteres, en une matiere blan-

che, visqueuse, qu'on appelle pus. Il y a pareillement des médicaments topiques propres à produire cet effet : ils sont appelés suppuratifs. Lorsque le pus une fois formé dans la partie, est renfermé dans une capsule, on appelle la tumeur proprement abcès : il est alors question de faire sortir le pus de l'abcès. Il y a des topiques propres à procurer cet effet, en rongant & déchirant pour ainsi dire la capsule : on les appelle pour cette raison corrosifs, caustiques, cathérétiques. Lorsque l'abcès est ouvert, s'il n'est pas bien détergé, il se change en ulcère qu'il faut ensuite dégager des humeurs sanieuses, baveuses, afin que les chairs puissent croître. Les médicaments topiques propres à déterger ainsi les ulcères s'appellent détersifs. Après avoir détergé les ulcères, il faut remplir de chairs la solution de continuité. Les topiques qui facilitent cette régénération des chairs sont appelés sarcotiques. Il faut outre cela recouvrir les ulcères d'une pellicule qu'on appelle cicatrice. Il y a aussi des médicaments topiques propres à produire cet effet : on les appelle cicatrisants. Enfin l'inflammation peut se terminer par la gangrene, ou par le sphacèle quoique plus rarement. Il y a des médicaments topiques propres à prévenir cette terminaison, ou bien à en arrêter les progrès : on les appelle antigangreneux ou antiseptiques. Nous en parlerons après avoir traité des précédents. Dans les plaies un des principaux symptômes auquel il faut remédier, est l'hémorragie ; les autres symptômes étant les mêmes que ceux de l'inflammation. Il y a des médicaments topiques propres à arrêter l'hémorragie ; ce sont les astringents qu'on appelle stegnotiques quand ils sont pris intérieurement, & stiptiques lorsqu'on les applique extérieurement. Quant aux médicaments externes que nous avons appelés généraux, nous en parlerons après avoir parlé des topiques.

Les Médicaments Anodins.

LES Anodins proprement dits sont des médicaments propres à calmer les douleurs en agissant immédiatement sur la partie affectée dont ils diminuent la sensibilité. En parlant des médicaments relâchants, nous avons remarqué que la douleur pouvoit être calmée par trois sortes de médicaments : 1°. par ceux qui agissent immédiatement sur la partie affectée, & qui en diminuent la sensibilité en diminuant le ton, on les appelle proprement anodins ; 2°. par ceux qui diminuent le ton des parties en ôtant la cause qui l'avoit trop augmentée, ceux-ci sont appelés proprement paregoriques ; 3°. enfin par ceux qui diminuent la faculté de sentir en agissant sur

sur l'origine des nerfs, & sur tout le système nerveux : ceux-là sont appelés proprement narcotiques. Nous ne parlerons ici que des médicaments de la première classe propres à calmer la douleur, c'est-à-dire, des anodins proprement dits. Pour avoir une idée exacte de l'action de ces médicaments, il faut avoir égard à ce que c'est que la douleur, ou plutôt au matériel, aux causes, aux symptômes de la douleur ; car il est impossible de la définir, & on ne pourroit pas plus faire entendre ce que c'est à une personne qui auroit eu le bonheur de ne la jamais sentir, qu'on peut faire entendre à un aveugle-né ce que c'est que la lumière & les couleurs. Voici ce qui nous paroît plus vraisemblable au sujet du matériel de la douleur. 1°. Nous savons qu'il n'y a que les nerfs dans le corps humain qui soient sensibles : cela se prouve par l'expérience. Si l'on coupe, si on lie ou qu'on comprime les nerfs qui tendent à quelque partie, le sentiment périt dans cette partie : les nerfs sont donc l'organe de la sensibilité. 2°. L'expérience que nous venons de rapporter ne prouve pas seulement que les nerfs sont nécessaires pour qu'une partie soit sensible, mais de plus qu'il faut qu'ils soient entiers, & que l'impression faite sur la partie puisse par leur moyen être transmise jusqu'à l'origine des nerfs. 3°. Il ne suffit pas de savoir que les nerfs sont l'organe de la douleur, & qu'il faut qu'ils soient entiers pour que l'impression de la douleur soit transmise au cerveau ; il faut de plus déterminer quelle est précisément la condition nécessaire dans les nerfs de laquelle dépend immédiatement la douleur. Si l'on distend violemment une partie du corps humain, on sent une douleur vive rapportée à la partie distendue ; si au contraire on distend une partie peu-à-peu, en y attachant des poids qu'on augmente par degrés, alors la douleur augmente à proportion que la force qui distend est plus grande ; enfin si la force qui distend est si grande que les fibres nerveuses viennent à être rompues, la douleur cesse tout-à-coup. Il faut donc que les nerfs soient tirillés, distendus de manière que leur rupture soit prochaine pour que la douleur soit excitée. L'observation d'ailleurs apprend que plus une partie est tendue, plus elle est sensible ; aussi la même cause qui n'excite qu'un chatouillement dans une partie saine, excite une sensation douloureuse, désagréable dans une partie enflammée : le matériel de la douleur est donc cet état des parties qui rend prochaine, & qui fait craindre la rupture des nerfs. Nous disons l'état qui fait craindre la rupture des nerfs ou qui la rend prochaine, & non leur tension qui menace de rupture, parce que la douleur peut être excitée par des causes qui ne distendent pas les nerfs, mais

qui les irritent simplement , comme par exemple , par des médicaments topiques irritants , corrosifs. Voilà ce qu'on peut dire de plus approchant du vrai , & de plus conforme à l'observation au sujet de la douleur. Quant aux effets généraux des médicaments anodins , nous en avons déjà parlé ailleurs ; ils se réduisent à calmer la douleur , soit en ôtant la cause qui l'excitoit , & alors on appelle ces médicaments anodins parégoriques ; soit en relâchant tout le système nerveux & sur-tout l'origine des nerfs , & on les appelle alors proprement narcotiques ; soit en agissant immédiatement sur la partie affectée de douleur , & lui ôtant sa sensibilité , & on les appelle alors anodins proprement dits , ou simplement anodins. En faisant attention aux causes de la douleur , on peut diviser les médicaments anodins en émollients , & en relâchants ou narcotiques. Les anodins émollients sont toutes les plantes qu'on range dans la classe des émollients , comme la mauve , la guimauve , la pariétaire , la brancursine ; les racines visqueuses & mucilagineuses , comme les racines de lys blanc ; outre cela les semences qui contiennent un mucilage , comme la graine de lin , la mie de pain blanc ; les médicaments huileux , soit tirés par expression , comme l'huile de lin , l'huile d'œuf qu'on exprime des jaunes d'œufs durcis , soit préparés par infusion , comme l'huile de lys qu'on prépare en faisant infuser pendant plusieurs jours les fleurs de lys dans de la bonne huile , l'huile de camomille qui est résolutive , l'onguent d'althæa qui est depuis long-temps en usage comme médicament émollient. A l'égard des anodins narcotiques ou relâchants , ce sont différentes plantes narcotiques , parmi lesquelles il y en a quelques-unes qui agissent d'une façon particulière , comme la jusquiame , la morelle , la mandragore. On peut aussi rapporter à ces remèdes le *laudanum* liquide , l'*opium* lorsqu'on s'en sert extérieurement , l'onguent *populeum* dans la composition duquel entre les narcotiques dont nous venons de parler , la jusquiame , la morelle , & les bourgeons de peupliers qui lui ont donné ce nom.

Cas où les Anodins émollients conviennent.

ON doit employer ces topiques dans les tumeurs inflammatoires , comme dans le phlegmon , le furoncle , sur-tout quand ces tumeurs occupent des parties glanduleuses ; dans le cas d'inflammation érépisélateuse ou dans l'érépisèle phlegmoneux lorsque la tumeur est dure & qu'il y a tension , car ils ne conviendroient pas dans l'érépisèle œdémateux où il y a relâchement des parties ; dans l'érépisèle phlegmoneux au contraire , ils sont

utiles , en ce qu'ils enveloppent les parties âcres du sang qui excitent une douleur vive & brûlante. Ces médicaments ne conviennent pas dans les éré-
sipeles proprement dits , sur-tout lorsque la tension n'est pas considérable ,
parce qu'ils relâchent trop les parties , diminuent le jeu , l'action des vais-
seaux , ce qui fait que le sang s'accumule , se pourrit dans les parties , pro-
duit la gangrene ; mais dans les éré-
sipeles simples , s'il y avoit tension &
rénitence , on pourroit employer les émollients en les joignant aux réso-
lutifs. On doit sur-tout se donner de garde d'ordonner des émollients dans
les tumeurs éré-
sipelateuses qui sont symptomes de sievres putrides , au-
quel cas les Médecins prudents défendent l'usage de toutes sortes de to-
piques , soit stimulants qui augmentent la chaleur , soit émollients qui ôtent
ou diminuent le ton , soit résolutifs qui font entrer dans la masse du sang
les matieres âcres qui en avoient été chassées & portées vers la surface. Les
anodins émollients conviennent encore dans les douleurs rhumatiques ,
catarrhales , vives , produites par le froid qui suspend la transpiration
dans les cas où la douleur est fixe ; & alors on se sert des émollients hui-
leux qui sont chargés de quelques parties aromatiques , comme par exem-
ple , de l'huile de camomille : enfin ils conviennent aussi dans les tumeurs
dures , squirrhuses , lorsqu'on craint qu'elles ne dégénèrent en cancer ,
ce qui est marqué par une douleur lancinante.

Cas où les Anodins narcotiques conviennent.

ON ne doit employer cette es-
pece d'anodins que dans le cas de dou-
leurs topiques très-vives & aiguës qui menacent de produire des convul-
sions , des syncopes , comme , par exemple , dans le cas de tumeurs hé-
morrhoidales qui causent une trop grande douleur , & même alors on
doit faire précéder les anodins émollients , parce que l'observation fait
voir que sans cette précaution les anodins narcotiques produisent la gan-
grene dans la partie , en diminuant tout-à-coup le ton.

Maniere d'employer les Anodins.

ON emploie ces médicaments sous forme de fomentations , de liniments ,
de cataplasmes , d'onguent. Sous forme de fomentation : on prend , par
exemple , demi-poignée de chacune des plantes émollientes , pour environ
deux livres d'eau ; on les fait bouillir jusqu'à diminution d'un tiers, ou même
de deux. Sur la fin de la décoction , on ajoute la graine de lin , on coule
la décoction , & on trempe dans la liqueur chaude des linges qu'on appli-

que chaudement sur la partie , ayant soin de les ôter & de les tremper de nouveau dans la liqueur chaude à mesure qu'ils se sechent. Sous forme de liniment : on les réduit à consistance d'huile , ou même un peu plus épaisse , & on s'en sert pour oindre les parties. On emploie de cette façon les émollients huileux , comme l'huile de lin , de camomille , d'œufs , l'huile d'amandes douces , quelquefois on y ajoute le blanc de baleine. Sous forme de cataplasme : le cataplasme est un remède externe qui a la consistance de la bouillie ; on le fait ou sans feu ou avec le feu : quand on le fait sans feu , on le fait avec des plantes récentes qu'on pile jusqu'à consistance de bouillie , ou bien on se sert des plantes seches que l'on réduit en poudre , & on les mêle avec quelques corps gras , huileux. Si on fait les cataplasmes avec le secours du feu , on prend les feuilles , les racines des plantes émollientes , qu'on fait bouillir jusqu'à putrilage comme l'on dit , on passe ensuite par le tamis , alors on peut ajouter à cette pulpe les quatre farines résolatives , l'huile de lys , &c. & on fait encore cuire le tout jusqu'à consistance de cataplasme. On applique les cataplasmes ordinairement chauds sur la partie affectée , & on la recouvre d'un linge. Le cataplasme est une composition magistrale , c'est-à-dire , qu'on ne trouve pas faite dans les boutiques , mais qui sur le champ se fait au besoin. Sous forme d'onguent : l'onguent a un peu plus de consistance que le cataplasme. On le fait d'ailleurs à peu près de la même façon , avec cette différence cependant qu'on y ajoute un peu de cire ou de graisse. On étend l'onguent sur un linge , & on l'applique également chaud sur la partie affectée. C'est une composition officinale , c'est-à-dire , qu'on trouve dans les boutiques. La vertu des plantes qui entrent dans cette composition s'y conserve presque aussi bien que dans les cataplasmes. On emploie encore les médicaments émollients sous forme de *suffitus* ou de fumigation dans les douleurs rhumatiques , dans les tumeurs hémorroïdales , dans les douleurs vives qui se font sentir autour de l'anus. On fait bouillir ces plantes dans suffisante quantité d'eau , & on en fait recevoir la fumée à la partie affectée : dans le cas des tumeurs hémorroïdales , on met toutes ces plantes fumantes dans un bassin , ou dans une chaise percée sur laquelle on fait asseoir le malade pour en recevoir la vapeur , nous ne connoissons rien qui soit plus capable de relâcher promptement. L'onguent populeum est aussi très-recommandé dans les mêmes tumeurs hémorroïdales. M. de la Mure en a vu de très-bons effets ; cependant quelquefois la douleur est si vive qu'on n'en retire pas les effets qu'on en attend. A l'égard des médicaments anodins narcotiques , on ne doit les employer qu'avec beaucoup de cir-

conspection après avoir fait précéder les émollients , de peur de procurer la gangrene , comme nous l'avons déjà dit.

Les Résolutifs.

A P R É S avoir calmé la douleur dans les tumeurs , la seconde indication qu'on a à remplir , ou plutôt la première indication curatoire est d'empêcher ou de dissiper l'engorgement & l'accumulation des humeurs. La Chirurgie a des remèdes propres à produire ce double effet. Il y en a qui dissipent tout-à-coup les humeurs accumulées , & qui empêchent qu'il ne s'y en accumule de nouvelles : ceux-ci s'appellent proprement repercutifs. Les autres dissipent peu-à-peu ces humeurs en les atténuant , & on les appelle proprement résolutifs.

Des Repercutifs en général.

L E S repercutifs sont des médicaments qu'on emploie pour empêcher qu'il ne se fasse un nouvel abord d'humeurs dans la partie & même pour dissiper l'engorgement , mais dans son commencement. On ne doit employer les repercutifs qu'au commencement des tumeurs , lorsqu'on a lieu de craindre que les humeurs n'abondent & qu'elles n'abondent en trop grande quantité vers la partie affectée ; aussi on s'en sert dans les coups extérieurs qui relâchent la partie , & qui par-là menacent d'un engorgement. On les emploie peu après avoir reçu ces coups : ils donnent du ton aux vaisseaux , & préviennent ainsi l'engorgement. Les repercutifs ne conviennent presque que dans les contusions & les coups extérieurs qui affoiblissent le ressort des vaisseaux ; on doit les éviter lorsque les tumeurs sont déjà toutes formées , parce qu'ils procurent souvent l'endurcissement de la matière accumulée , & causent la gangrene quand sur-tout les tumeurs sont inflammatoires. C'est pourquoi on recommande de ne pas employer les repercutifs dans les tumeurs inflammatoires , principalement lorsqu'elles attaquent les parties glanduleuses , parce que l'observation prouve que ces parties se durcissent très-aisément : cependant on les ordonne quelquefois même dans ce cas là , lorsque la tumeur augmente considérablement & pour ainsi dire à vue d'œil ; mais alors on doit les appliquer sur les parties voisines de la tumeur glanduleuse , & non pas sur la tumeur même. On doit à plus forte raison éviter les repercutifs dans les tumeurs critiques qui surviennent à la suite des fièvres malignes , soit que ces tumeurs se trouvent derrière les oreilles , & on les appelle alors paro-

tides , soit qu'elles soit ailleurs. Elles sont appellées critiques , parce que par ce moyen les malades sont soulagés : or les repercutifs dans ces cas là feroient rentrer dans les voies de la circulation les matieres morbifiques ; ainsi plus ils auroient d'effets , plus ils feroient nuisibles. De tout ce que nous venons de dire , nous pouvons conclure que les repercutifs ne sont jamais mieux employés que pour empêcher l'accumulation des humeurs dans les parties.

Des Résolutifs en général.

LES résolutifs sont des médicaments destinés à dissiper peu-à-peu les engorgements déjà formés : on les appelle aussi discutifs, digérants.

Indications.

ILS conviennent principalement dans les tumeurs déjà formées : on pourroit aussi les employer au commencement de ces tumeurs , mais alors on préfère les repercutifs. En général on peut s'en servir dans les tumeurs , soit phlegmoneuses , soit érysipélateuses , mais sur-tout dans les tumeurs froides , principalement lorsqu'elles sont œdémateuses , ce qu'on connoît par la couleur pâle des parties , & parce qu'elles conservent l'impression du doigt. On s'en sert aussi dans les tumeurs squirreuses produites par quelque coup , pourvu cependant que la partie conserve encore une certaine mollesse , & même alors il vaut mieux les associer avec les émollients ; dans les tumeurs enkistées , c'est-à-dire , enveloppées d'une membrane ou vessie , mais dans le commencement lorsqu'elles n'ont pas encore acquis un volume considérable , c'est alors seulement qu'on peut les résoudre.

Contre-indications.

LES résolutifs sont contre-indiqués dans les tumeurs érysipélateuses symptomatiques , c'est-à-dire , qui sont symptômes d'autres maladies , comme de la fièvre putride , de la fièvre maligne qu'on nomme pour cette raison fièvre putride , maligne , érysipélateuse : on ne doit pas les employer dans ces sortes de tumeurs , crainte que la matiere morbifique étant repoussée intérieurement ne se porte sur quelque partie noble , ce qui seroit mortel , comme *Hippocrate* l'a observé , en disant que l'érysipele qui est repoussée intérieurement est mortelle. Les résolutifs sont aussi contre-indiqués dans les érysipeles périodiques qui attaquent régulièrement cha-

que annéé certaine personne , qu'on doit regarder comme critiques. Ils sont contre-indiqués dans les tumeurs phlegmoneuses critiques, comme, par exemple , les parotides ; ils sont alors très-dangereux , parce que s'ils opèrent leur effet , ou le malade périt , ou il survient des diarrhées ou quelqu'autre évacuation par les urines , par exemple ; c'est ce que M. de la Mure a vu arriver : or il est toujours dangereux de repousser la matiere morbifique dans la masse du sang. Les résolutifs sont encore contre-indiqués dans les squirrhes qui ont acquis une certaine dureté , & qui affectent des parties dans lesquelles ils ont coutume de tourner en cancer , comme les mamelles , sur-tout dans les tempéraments mélancoliques , hypocondriaques , bilieux ; mais il faut entendre tout ceci des résolutifs proprement dits , qui agissent en aiguillonnant les vaisseaux & en leur donnant du ton , & qui divisent & atténuent les humeurs , car les émollients produisent quelquefois la résolution des tumeurs fort dures , & deviennent par-là des résolutifs très-appropriés dans les cas où les résolutifs proprement dits sont contre-indiqués.

Énumération des principaux Répercussifs.

ON range parmi les répercussifs , 1^o. l'eau froide , le vinaigre froid , & autres corps fluides qui agissent par le froid qui resserre le tissu des solides & donne du ton aux vaisseaux. 2^o. Les médicaments astringents , comme l'eau de plantain , l'eau de roses avec un blanc d'œuf : on se sert de ce dernier médicament dans l'inflammation érisipélateuse des yeux lorsqu'elle n'est que superficielle. Le vin & les liqueurs spiritueuses qui réveillent le ton des parties , sont aussi répercussifs ; mais on ne doit se servir de ces médicaments que dans les cas où nous avons dit ci-devant que conviennent les répercussifs proprement dits.

Énumération des principaux Résolutifs.

DANS les érisièles essentiels les topiques résolutifs conviennent. On emploie dans ce cas-là le vin tiède , ou bien ce qui est encore mieux , l'infusion des fleurs de sureau faite dans l'eau bouillante ou dans le vin ; l'on fomente la partie affectée avec des linges trempés dans cette infusion , ou bien l'on s'en sert sous forme d'embrocation , c'est-à-dire , qu'on arrose la partie d'une certaine hauteur , après quoi on la couvre avec des linges qu'on y a trempé. On peut aussi se servir dans le même cas des feuilles de sureau ou d'hieble bouillies jusqu'à putrilage , & appliquées sur la partie sous forme de cataplasme ; mais ce dernier topique s'emploie plutôt dans

les tumeurs œdémateuses , mais dans les tumeurs éréspélateuses , on préfère l'infusion des fleurs de sureau dont nous avons parlé. Dans les tumeurs phlegmoneuses avec douleur & tension , on emploie avec succès le cataplasme fait avec la mie de pain. On prend pour cela de la mie de pain blanc réduite en petits morceaux , on la fait bouillir dans l'eau simple jusqu'à consistance de cataplasme , & si la douleur est fort vive on y ajoute le safran qui est anodin. Ce cataplasme calme la douleur vive , & diminue la tension : c'est presque le seul résolutif en usage dans ce cas-là. On peut encore employer dans le même cas les quatre farines résolutes , & celles d'orge , de fève , d'orobe & de lupin auxquelles on substitue quelquefois celles de froment , de seigle , de lentille , de fénugrec & de lin. On les fait bouillir pareillement dans l'eau , ou seules , ou en y ajoutant le safran , jusqu'à consistance de cataplasme ; mais le cataplasme de mie de pain est le plus usité , excepté cependant dans les tumeurs inflammatoires des bourses , dans lequel cas on préfère le cataplasme des quatre farines résolutes , l'usage l'ayant conservé pour ces sortes de tumeurs , & alors on ajoute à ce cataplasme des quatre farines résolutes , demi-once , ou une once de terre cimolée en vue de répercuter. Lorsque les tumeurs inflammatoires sont dures , causent des vives douleurs , & occupent des parties glanduleuses , on fait le cataplasme de mie de pain avec le lait & le safran ; mais alors il faut changer souvent le cataplasme , crainte que le lait ne s'aigrisse , & n'irrite la partie ; c'est pourquoi à moins qu'on ne soit assuré de l'attention des personnes qui sont auprès des malades , il vaut mieux le faire avec l'eau qui n'est pas sujette à cet inconvénient. Lorsque la douleur des tumeurs phlegmoneuses n'est pas si vive , on peut employer l'emplâtre de diachylon , & sur-tout le diachylon gommé qui est très-usité dans les furoncles qui viennent assez aisément à suppuration , mais qui ne suppurent jamais entièrement , & laissent après la suppuration une tumeur dure : pour la résoudre , on y applique avec succès l'emplâtre diachylon gommé : cette emplâtre se fait avec le mucilage des racines de guimauve , des graines de lin & de fénugrec , & les gommés *ammoniac* , *galbanum* , *bdelium* , *sagapenum*. Dans les tumeurs phlegmoneuses avec renitence sans douleur vive , ou qui tendent vers le squirrhe , au lieu de l'emplâtre diachylon , on se sert de l'emplâtre divin , comme , par exemple , dans les tumeurs des mamelles. Moriceau en a vu de très-bons effets sur les mamelles endurcies des femmes. On prépare l'emplâtre divin avec la litharge d'or , l'huile commune , l'eau de fontaine , la pierre d'aimant porphyrisée , la gomme arabique , ammoniac , le galbanum , l'opoponax ,

T'opoponax , le bdellium, la myrrhe , l'oliban , le mastic , le verd-de-gris , l'aristoloche ronde , la cire jaune & la térébenthine. Les résolutifs conviennent encore , comme nous l'avons dit , dans les tumeurs froides : ces tumeurs sont ou œdémateuses ou squirrheuses. Les résolutifs s'emploient principalement dans celles de la première espèce : la tumeur œdémateuse ou l'œdème est une tumeur molle , lâche , blanche , sans douleur , sans chaleur , sans inflammation , dans laquelle l'impression qu'on fait avec le doigt reste quelque-temps ; ensuite la tumeur revient peu-à-peu au premier état : l'œdème est universel ou particulier. L'œdème universel occupe toute l'habitude du corps , & n'est point différent de l'anasarque ou leucophlegmatie. Le particulier n'attaque que certaines parties , comme les jambes les pieds , les bras , les mains , &c. Dans ces tumeurs le tissu de la peau & de la graisse est relâché , la lymphe ou sérosité y est infiltrée ou épanchée : il faut donner du ton aux vaisseaux absorbants pour qu'ils puissent repomper les humeurs épanchées. Pour cet effet on foment la partie avec une lessive de cendres de sarmans dans laquelle on a fait bouillir du soufre , ou avec une décoction de romarin , de sauge , d'absinthe , de roses rouges , de balauftes , de camomille , de thym , de serpolet , de lavande , d'origan , de laurier , en un mot des plantes aromatiques auxquelles on peut ajouter les semences de fénugrec , d'anis , de fenouil ; on en fait une décoction dont on foment la partie : on peut piler le marc , & l'appliquer en guise de cataplasme sur la tumeur œdémateuse. Les feuilles d'hibble & de sureau pilées , avec l'esprit de vin , font un bon cataplasme. On en peut préparer un avec la farine de fèves cuite avec l'oximel , en y ajoutant des roses rouges & de l'alun , ou bien avec les farines de fèves ou d'orbe , la poudre d'Iris de florence , la sauge , la camomille cuites dans l'oximel , y ajoutant des fleurs de soufre & du sel ammoniac. Nous nous sommes souvent servis avec succès dans ce cas-là de la décoction ou infusion de sauge dans du bon vin rouge , qu'on applique sur la partie sous forme de fomentation. A l'égard des tumeurs squirrheuses , dures , indolentes , sans inflammation , si elles se rencontrent dans des tempéraments bilieux ou mélancoliques , on doit éviter soigneusement tous les médicaments stimulants , & par conséquent les résolutifs proprement dits qui irriteroient & pourroient faire dégénérer le squirrhe en cancer ; mais lorsque la tumeur squirrheuse est récente & produite par quelque cause externe , comme lorsqu'elle survient à la suite de quelque coup reçu sur la partie , si elle n'occupe pas les mamelles , ou des parties glanduleu-

ses , on peut employer les topiques résolutifs. On se sert alors avec succès de l'emplâtre *diabotanium* qui est aussi recommandé dans les tumeurs enkistées.

Dans les tumeurs phlegmoneuses sans trop de dureté ni de douleur, produites par le virus vénérien , par exemple, dans le bubon vénérien il faut procurer la résolution , mais avec prudence , & observant de faire passer le malade par les grands remèdes , autrement on lui procureroit la vérole en repoussant intérieurement le virus vérolique. Parmi les résolutifs qui conviennent dans ce cas-là , le plus usité est l'emplâtre de *Vigo cum mercurio*. Dans les contusions , & dans les échymoses qui ne sont pas compliquées avec l'inflammation , on emploie les mêmes résolutifs que dans les tumeurs cedémateuses.

Les Suppuratifs.

EN général les suppuratifs qu'on appelle autrement peptiques sont ceux qui procurent la suppuration. Pour en traiter utilement , nous parlerons en peu de mot de la suppuration & de son mécanisme , ensuite nous verrons les effets que produisent ces sortes de médicaments , puis nous passerons aux cas où on doit les employer.

Du Mécanisme de la Suppuration.

LA suppuration est le changement de la matiere accumulée dans la tumeur inflammatoire , en pus , c'est-à-dire , en une matiere blanche , visqueuse , ni trop tenace ni trop tenue , mais de consistance moyenne , sans goût , & sans odeur désagréable. On ne doit pas comprendre ici la sanie qui est lorsque le sang est mêlé avec le pus , ni la matiere ichoreuse qu'on remarque lorsque le pus est extrêmement dissous & putride , comme cela se voit dans les ulcères : nous parlons ici d'un pus louable , & qui a les qualités requises. L'on n'a pas d'exemples de pus véritablement formé sans que l'inflammation ait précédé. Il n'est pas cependant nécessaire que la partie où se trouve le pus ait été enflammée ; il suffit que l'inflammation ait précédé dans quelqu'autre partie : ainsi on a trouvé dans le cerveau un dépôt de pus en conséquence d'une inflammation au foie. Les anciens croyoient que la suppuration dépendoit , & étoit produite par un mouvement de putréfaction des humeurs. L'observation est contraire à ce sentiment. La putréfaction peut avoir lieu sans qu'il y ait in-

inflammation ; car l'on voit le sang extravasé tourner vers la putréfaction , sans cependant se changer en pus ; ainsi la suppuration est différente de la putréfaction. Les modernes pour expliquer le mécanisme de la suppuration , disent qu'il y a des vaisseaux artériels coupés , déchirés , à cause de la grande quantité de sang accumulé dans la tumeur ; que le sang contenu dans la cavité de ces vaisseaux est la matiere principale de pus ou celle qui se change en pus ; que les vaisseaux déchirés se resserrent , soit à cause de la crispation de leurs fibres , soit parce qu'ils sont comprimés par les vaisseaux voisins restés entiers , en sorte que le sang n'y peut plus couler comme à l'ordinaire , & qu'à mesure qu'il en vient du cœur & du tronc des arteres , il est obligé de refluer dans les arteres voisines , & de les gonfler considérablement , ce qui augmente & fait accélérer leur systole ; que ces vaisseaux entiers ayant une plus grande force oscillatoire agissent avec plus d'énergie sur les vaisseaux déchirés , atténuent le sang qu'ils contiennent , le décomposent , & le changent en pus. Cette supposition paroît fondée sur l'observation : en effet quand une tumeur tend vers la suppuration , la partie devient plus tendue , plus chaude , les vaisseaux ont un plus grand mouvement oscillatoire , & ces symptomes cessent dès que la suppuration est achevée. Il faut remarquer que cette dernière opinion n'admet aucun mouvement de putréfaction sur lequel les anciens fondaient toute leur théorie de la suppuration. Cependant nous croyons que pour se faire une idée exacte de la suppuration , il faut réunir les deux systèmes , c'est-à-dire , admettre le mouvement de putréfaction & le mouvement oscillatoire ; car si l'on n'admet pas un mouvement de putréfaction , il paroît qu'il n'est pas aisé d'expliquer le changement de couleur & de consistance qu'on remarque dans la matiere contenue dans la tumeur. Le mouvement des vaisseaux entiers peut tout-au-plus comprimer les liqueurs contenues dans les vaisseaux déchirés , parce que c'est un mouvement latéral , & tout ce que peut faire cette sorte de mouvement c'est d'épaissir & d'endurcir les humeurs contenues dans les vaisseaux sur lesquels il agit. Ainsi le mouvement oscillatoire seul ne sauroit changer la couleur du sang en le décomposant , puisque bien loin de l'atténuer & de le rendre plus fluxile , il le rend au contraire plus épais ; d'ailleurs les modernes qui excluent du mécanisme de la suppuration le mouvement de putréfaction , & qui n'admettent que le mouvement oscillatoire , prétendent que ce dernier mouvement décompose le sang dont les globules rouges sont composées de six globules blanches selon *Leuwenhoek* , & que ces globules étant ainsi séparées , ne

présentent plus la couleur rouge , mais blanche , ce qui est expliquer le mécanisme de la suppuration par une hypothese contraire à toutes les regles de la physique. Ainsi il faut avoir recours aux mouvements intestins qui tendent vers la putréfaction , & qui sont très-propres à donner au sang la fluxilité ; il faut cependant admettre aussi le mouvement oscillatoire , parce que la putréfaction seule produit l'exaltation des matieres rancides , volatiles , alkalescentes. Ainsi la putréfaction n'agit pas seule dans la suppuration ; mais elle est au contraire empêchée , dans sa trop grande action , par le mouvement oscillatoire qui chasse hors du corps les sels volatils à mesure qu'ils sont développés. On conçoit aisément qu'une cause qui fait transpirer pour ainsi dire les parties volatiles , rancides , & alkalescentes , diminue le jeu de la putréfaction : or cela ne se peut faire que dans une partie vivante , & qui jouit du mouvement oscillatoire ; car lorsque le mouvement vital est trop diminué dans une partie , alors on a à craindre ou la gangrene ou l'induration : ainsi le mouvement de putréfaction est nécessaire pour décomposer le sang ; mais le mouvement oscillatoire ne l'est pas moins pour prévenir les suites fâcheuses du mouvement de putréfaction.

Effets des Suppuratifs.

EN faisant attention à ce que nous venons de dire du mécanisme de la suppuration , il est aisé de voir qu'elle ne peut avoir lieu que dans les circonstances où le sang est très-disposé au mouvement intestin. De plus , le sang ne peut être changé en pus , s'il n'est pas imprégné des parties qui excitent le mouvement intestin , comme des parties aqueuses en certaine quantité , des parties huileuses , subtiles , salines ; enfin le sang laissé à lui-même sans être agité par le mouvement oscillatoire des vaisseaux voisins , ne se change pas en un pus louable , mais en une sanie putride gangreneuse. Delà on peut comprendre quelles sont les conditions requises pour une suppuration louable , & quels sont les effets que produisent les médicaments suppuratifs. Ils augmentent la tendance au mouvement de putréfaction lorsqu'il est trop foible , comme dans les tumeurs phlegmoneuses qui sont rénitentes & tendent vers le squirrhe , ou bien ils augmentent le mouvement oscillatoire comme dans l'état gangreneux où il faut réveiller le mouvement vital. De plus , il y a des médicaments qui fournissent des parties alkalescentes propres au mouvement de putréfaction , & qui étant appliqués sur la partie tuméfiée , empêchent la transpiration des parties volatiles , subtiles , développées de la matiere morbifique con-

tenue dans la tumeur , & par-là favorisent la suppuration. Les mêmes médicaments qui augmentent le mouvement oscillatoire , augmentent aussi assez souvent le mouvement de putréfaction. La suppuration suppose encore beaucoup de vaisseaux entiers qui par leur mouvement oscillatoire , agissent sur les vaisseaux rompus ; ainsi les médicaments qui diminuent l'intensité des symptômes inflammatoires , diminuent aussi le mouvement oscillatoire , & sont opposés aux suppuratifs proprement dits. On doit distinguer les suppuratifs proprement dits , de certains médicaments qui produisent dans certaines circonstances la suppuration. On appelle proprement suppuratifs les médicaments qui produisent la suppuration en augmentant tant le mouvement oscillatoire , que celui de putréfaction , lorsqu'elle est empêchée faute de l'un & de l'autre mouvement. Les médicaments émollients simplement qui produisent quelquefois la suppuration , ainsi que les résolutifs , ne sont pas proprement dits suppuratifs.

Cas.

LES suppuratifs proprement dits conviennent dans toutes les tumeurs phlegmoneuses où le sang est épais , tenace , où il est difficile de le faire passer par les extrémités des vaisseaux. Dans ces cas-là , après avoir employé les résolutifs pendant deux ou trois jours , on en vient aux suppuratifs ; ainsi ils conviennent dans les tumeurs phlegmoneuses , même essentielles , qui se terminent ordinairement par la suppuration ; dans les tumeurs phlegmoneuses critiques qui surviennent sur l'habitude du corps dans les fièvres malignes , par exemple , les parotides ; dans les tumeurs phlegmoneuses qui dépendent d'un virus particulier , comme dans les bubons vénériens qu'il faut faire suppurer , lorsque le malade ne peut passer par les grands remèdes. Telles sont les tumeurs où les suppuratifs conviennent. On les emploie aussi dans les plaies accompagnées de contusion & de déchirure des petits vaisseaux , pour faire séparer les vaisseaux morts des parties voisines ; dans les cas d'ulcères froids pour les déterger. Dans les tumeurs inflammatoires phlegmoneuses , la suppuration peut être empêchée de différente manière : c'est à quoi il faut bien faire attention , afin de choisir les médicaments convenables pour que la suppuration ait lieu : il faut que la chaleur & le mouvement de pulsation soient dans un certain degré ; ainsi quand on voit que la chaleur & l'oscillation manquent dans une partie , comme cela arrive dans certaines tumeurs phlegmoneuses , il faut appliquer les suppuratifs proprement dits. On emploie pour cet ef-

set les emplâtres dans la composition desquelles entrent les gommes, comme le diachylon gommé. Ces médicaments sont très-propres à arrêter l'insensible transpiration qui par son âcreté irrite les vaisseaux, & qui jointe à la chaleur que produisent les médicaments, excite le mouvement de putréfaction. On se sert aussi du *basilicum minus* ou *tetrapharmacum*, ainsi appelé à cause des quatre drogues qui entrent dans sa composition, savoir, la poix, la résine, la cire & ~~la gomme~~ ^{huile d'olive}; il est très-stimulant. On lui préfère le diachylon quand la tumeur tourne vers l'induration, comme dans les tumeurs des glandes, dans les furoncles. Quelquefois au contraire le mouvement oscillatoire est trop grand, ainsi que la chaleur: alors il faut diminuer la trop grande tension des solides, & l'impétuosité des fluides. Dans ce cas-là les médicaments émollients anodins sont les seuls qu'on peut employer: les suppuratifs proprement dits seroient très-préjudiciables. Quelquefois enfin le mouvement oscillatoire des vaisseaux est diminué à la vérité, mais avec relâchement des parties, la tumeur devient livide, noirâtre: il faut alors s'opposer à la gangrene menaçante, & employer des remèdes capables de donner du ton aux solides & de s'opposer à l'alkalescence; pour cet effet, on se sert du *basilicum minus*, & si l'on craint une gangrene plus prochaine, on y ajoute le vieux levain qui est encore plus propre à détruire l'alkalescence: on met parties égales de l'un & de l'autre, & on applique sur la tumeur. Dans les tumeurs inflammatoires extrêmement dures, rénitentes, avec grande douleur, on emploie les émollients huileux, mucilagineux, comme l'huile de lin, les bulbes de lys, les racines de mauve, de guimauve, la pariétaire, &c. les feuilles des plantes émollientes, de mauve, &c. les quatre farines résolutes, le *bdelium*, le *sagapenum*, l'*ammoniac*, le *galbanum*, & surtout le diachylon gommé.

Les Caustiques.

LORSQUE les suppuratifs ont produit leur effet, l'inflammation, la rougeur, la tension, la douleur, & la fièvre s'il y en a, cessent ou diminuent considérablement: la tumeur reste cependant, mais elle devient mollassé, & il paroît à la partie moyenne une petite marque blanche sur-tout dans les tumeurs phlegmoneuses, on sent une fluctuation, & alors la tumeur se change en abcès. Quelquefois le pus se fait lui-même une route, quelquefois on est obligé de lui en faire une, mais dans le temps convenable. Dans les tumeurs qui sont à l'extérieur, il faut attendre le degré parfait de maturité: il y a cependant des abcès dans lesquels on ne doit point attendre la parfaite matu-

rité, comme dans les tumeurs qui viennent aux environs de l'anüs , dans les tumeurs critiques qui surviennent aux fievres malignes : dans ces cas-là , après avoir appliqué les suppuratifs dès qu'on s'apperçoit d'un petit amas de pus , il faut ouvrir l'abcès encore crud , comme l'on dit , sans attendre plus long-temps , crainte que le pus ne ronge intérieurement , au lieu de ronger extérieurement. On se sert de deux moyens pour ouvrir l'abcès , de la lancette , & c'est la façon la plus commune & la plus commode lorsque les malades n'ont pas trop d'horreur du fer , & que la tumeur n'occupe pas des parties glanduleuses ; mais souvent les malades ne veulent pas se soumettre au fer , & alors on se sert des médicaments caustiques qu'on appelle aussi cathérétiques , rongeants ou corrosifs , scarotiques , qui conviennent mieux que le fer , quand il faut ouvrir des tumeurs dans les parties glanduleuses où il est à craindre que les bords ne deviennent calleux. On appelle ces médicaments scarotiques , parce qu'après avoir brûlé la peau & la chair , ils font une croûte noire ou escarre. Il y a beaucoup de médicaments externes rangés parmi les scarotiques. Les plus usités sont la pierre infernale , & la pierre à cauter : le sublimé corrosif est un puissant scarotique , il ronge les chairs baveuses , mais il peut produire des inflammations ; c'est pourquoi il demande à être employé à propos , & à être manié par des mains habiles. On ne l'emploie pas ordinairement seul ; on le mêle à la dose de demi-gros dans une livre d'eau de chaux : ce mélange jaunit , & porte le nom d'eau phagédénique. La pierre infernale se prépare de cette manière : on fait dissoudre de l'argent dans ^{l'acide} nitre , on fait évaporer la dissolution jusqu'à moitié , & on l'expose au feu dans un creuset , elle se gonfle ; alors on jette dans un lingotier , & on a une masse noirâtre qui est la pierre infernale. Il y a plusieurs préparations de la pierre à cauter. La meilleure est celle de M. Heister , célèbre Médecin-Chirurgien : voici comme l'on procède. On prend parties égales de cendres gravelées , & de chaux bien vive : on les pulvérise séparément , ensuite on les mêle , & on les met dans une terrine , on y verse dessus beaucoup d'eau , on laisse tremper une ou deux heures , on filtre ensuite la liqueur , on fait évaporer sur le feu dans une bassine de fer la liqueur filtrée , on prend la masse qui reste après l'évaporation , on la met dans un creuset , & on pousse le feu jusqu'à ce qu'elle se fonde & devienne coulante comme de l'huile : alors on la verse sur une plaque de cuivre ou dans un mortier avant qu'elle soit entièrement refroidie , on la coupe en morceaux longs & pointus qu'on met tout chauds dans une bouteille de verre qu'on bouche hermétiquement. On garde cette préparation pour l'usage : c'est la pierre à cauter faite à la manière de M. Heister ,

Cas.

ON emploie tant la pierre infernale que la pierre à cauter pour ouvrir les abcès lorsque les malades craignent le fer. On doit aussi préférer ces caustiques aux instruments tranchants pour ouvrir les abcès des parties glanduleuses , comme des aînes , &c. ou s'en sert aussi dans les tumeurs critiques , comme dans les parotides , dans le cas d'ulceres fordides dont les chairs sont baveuses , mollasses & presque insensibles : lorsque les bords sont durs , calleux , on les touche avec la pierre infernale ; cependant dans ce dernier cas , si le malade ne redoute pas trop l'opération , il vaut mieux couper les bords avec le fer & rafraîchir , comme on dit , la plaie. On les emploie encore lorsque les chairs quoique de bonne qualité croissent cependant inégalement aux bords & au fond d'un ulcere. Dans ce cas-là si on veut que la cicatrice soit ferme & polie , il est nécessaire d'emporter les chairs superflues ou qui passent le niveau des autres , ce qu'on fait par les scarotiques. Enfin on se sert de la pierre à cauter pour produire des ulceres artificiels qu'on appelle cauteres , en latin *fonticuli*. On est quelquefois obligé d'avoir recours à ces sortes d'ulceres artificiels , & de les entretenir ouverts pendant long-temps , afin de détourner par cette évacuation des matieres âcres qui se jettent sur quelque partie , & qui pourroient troubler toute l'économie animale , comme dans les migraines ; dans les douleurs de tête habituelles produites par des matieres âcres qui se jettent sur cette partie ; dans les ophthalmies rebelles ; lorsque quelque matiere âcre a été rétropulsée vers l'intérieur , comme dans les érisipeles rentrées d'elle-mêmes ; lorsque des ulceres ont été guéris imprudemment , pour prévenir des maladies fâcheuses qui pourroient en arriver.

Maniere d'appliquer le Cautere potentiel ou la Pierre à Cautere.

ON peut se servir du cautere potentiel sur plusieurs parties ; cependant le plus ordinairement on l'applique à la nuque entre la premiere & la seconde vertebre du col , ou au bras , ou bien à la jambe , observant de choisir autant qu'il est possible l'interstice des muscles , parce qu'on a observé que lorsqu'il étoit placé sur le corps des muscles , il tarissoit bientôt. Quand on a déterminé l'endroit sur lequel on doit appliquer la pierre à cauter , on le marque avec de l'ancre , on le couvre d'une emplâtre fenêtrée , de maniere que le trou réponde à l'endroit marqué. On humecte

humecte le cautere , ou la partie sur laquelle on l'applique avec un peu de salive , parce qu'on observe qu'il mord plutôt ; on applique alors la pierre , & on y met par dessus une petite compresse quarrée & mouillée pour la même fin , qu'on couvre d'une plus grande emplâtre , & ensuite d'une autre compresse ; par dessus on met un bandage circulaire qu'on serre un peu afin d'appuyer sur la pierre , & empêcher que l'appareil ne change de place. On laisse la pierre à cautere sur la partie jusqu'à ce qu'elle ait agi , ce qui va ordinairement à quatre ou cinq heures & quelquefois même plus , selon que la peau sur laquelle on l'applique est plus ou moins dure ; après quoi on ôte tout l'appareil , & si l'escarre est en bon état , avec la lancette on fait deux petites incisions en croix sur le corps de l'escarre , qu'on couvre avec un petit linge couvert d'un peu de basilicum ou de beurre frais , & par dessus on pose la même compresse & le même bandage : on continue le même remede jusqu'à ce que l'escarre soit tombée , & pour lors on met dans le trou un corps rond , par exemple , un gros pois , pour entretenir dans une juste grandeur l'ouverture de l'ulcere ; on met par dessus une feuille de lierre qui est propre à procurer une suppuration réglée , & on finit par une compresse & par le même bandage dont nous avons parlé ci-dessus. Il faut avoir soin de panser les cauterés deux fois le jour , & de se servir du linge blanc de lessive , si on veut éviter la mauvaise odeur. Telle est la maniere d'appliquer la pierre à cautere pour faire des ulceres artificiels ou des cauterés. On s'en sert de la même façon pour ouvrir un abcès. Lorsque les chairs ne pullulent pas également , on applique la pierre infernale sur les parties qui excèdent les bords du cautere : on prend pour cela un morceau de pierre infernale qu'on adapte à un tuyau en maniere de crayon pour toucher les parties. Ce sont là les cas où l'on emploie les cauterés potentiels , ainsi appelés pour les distinguer des cauterés actuels qui sont des fers rougis au feu , & qui cautérisent & brûlent dans l'instant tout ce qu'ils touchent. Ces derniers ont été employés par les anciens Chirurgiens , mais ils ne sont plus en usage : on les a rejettés comme trop cruels. Au reste il faut observer de ne pas appliquer le cautere près des tendons , ni près des gros vaisseaux sanguins qui pourroient être ouverts. Outre la pierre infernale , & la pierre à cautere , il y a encore quelques autres remedes rongeants qu'on emploie dans les mêmes cas , comme l'onguent d'Egypte , *unguentum Ægyptiacum* , le baume verd de Metz , *balsamum viride Metensium* , l'eau phagédénique , *aqua phagedenica*.

Les Détersifs.

C'EST une chose reconnue de tout le monde qu'on ne peut réussir à remplir un ulcère de chairs nouvelles , qu'on ne l'aie auparavant rendu semblable à une plaie récente. Il faut donc avoir soin de déterger l'ulcère, c'est-à-dire , de le dégager des différentes impuretés qui sont comme autant d'obstacles qui s'opposent à la régénération des chairs qui doivent remplir la solution de continuité. Les médicaments propres à déterger ainsi les ulcères sont ceux qu'on appelle médicaments détersifs, *detergentia* seu *detersiva*. Plusieurs obstacles, comme nous venons de le dire, peuvent empêcher la production des nouvelles chairs. Quelquefois les bords de l'ulcère sont durs, calleux, ce qui fait que les extrémités des vaisseaux ne peuvent se rapprocher, & que les chairs ne peuvent croître; tantôt une matière épaisse, glutineuse, attachée aux bords & au fond de l'ulcère, empêche la production des bonnes chairs, tandis que le mouvement oscillatoire des vaisseaux voisins de l'ulcère est languissant; enfin quelquefois les bords & le fond de l'ulcère sont couverts de matières putrides fétides, & les chairs qui pullulent sont mollasses, fongueuses, livides: ces différents obstacles demandent différents détersifs. Lorsque les bords de l'ulcère sont calleux, il est évident qu'il faut se servir des médicaments propres à emporter ces callosités; ainsi les détersifs que l'on doit employer dans ce cas-là ne sont autres que les cathérétiques ou scarotiques dont nous avons déjà parlé: on se sert donc de la pierre infernale ou de la pierre à cautère pour ronger ces callosités & former une escarre; mais il faut avoir soin de ne pas la laisser trop long-temps de peur qu'elle ne cave un peu trop, & même il vaut mieux se passer de ces scarotiques, & emporter les callosités avec le fer, lorsque les malades veulent s'y soumettre. Si l'ulcère est rempli de matières baveuses, tenaces, on se sert très-souvent du baume verd de Mets qui se compose de la manière suivante. On prend huile de graine de lin tirée par expression & l'huile d'olive de chacune six onces, huile de laurier une once, térébenthine de Venise deux onces: on les mêle ensemble sur un petit feu, & quand le mélange est refroidi, on y ajoute verd-de-gris subtilement pulvérisé deux onces, aloès sucotrin deux onces, vitriol blanc un gros & demi, huile distillée de genievre demi-once, huile de girofle un gros: on agite la matière quelque-temps avec un bistortier pour faire du tout un baume qu'on garde dans un vaisseau bien bouché. Lorsqu'on veut s'en servir, on en fait chauffer, & on en applique sur l'ul-

cere baveux avec des plumaceaux de charpie. Ce baume a été inventé en premier lieu par un Médecin de Mets : Mme. Feuillet l'a mis en usage à Paris , d'où vient qu'on l'appelle *balsanum vivide Metensium seu domina Feuillet*. Lorsque l'ulcere se remplit de chairs fongueuses , mollasses , livides , & de matieres putrides , fétides , on se sert des médicaments rongeurs , tels que la poudre de sabine , l'euphorbe pulvérisée , la poudre d'hellebore blanc , la décoction d'armoise , d'aristoloche , d'absinthe , de betoine , de fanicle , de persicaire , d'hypericum , de grande scrophulaire , d'orpin , de véronique , de petite centaurée , de millefeuilles , le verd-de-gris , l'alun brûlé , la teinture de myrrhe & d'aloès , &c. on se sert sur-tout dans ce cas-là de l'onguent *Ægyptiac* , *unguentum Ægyptiacum* , ainsi dit parce qu'il a été inventé en Egypte , ou bien encore *unguentum melleum* , à cause du miel qui entre dans sa composition , *unguentum magnum* , à cause de ses grandes propriétés , sur-tout dans le cas dont nous parlons : cet onguent se prépare ainsi. On prend verd-de-gris réduit en poudre cinq onces , miel quatorze onces , vinaigre fort huit onces , on fait cuire le tout jusqu'à consistance d'onguent qui acquiert la couleur d'un rouge foncé. La principale vertu de cet onguent est due au verd-de-gris. Lorsque les ulcères dépendent du virus vérolique , on se sert pour les déterger du précipité rouge qui se fait avec la dissolution du mercure dans l'esprit de nitre dont on enlève par le feu presque tout l'acide nitreux : on l'emploie rarement seul , mais on le mêle avec le *basilicum* , par exemple , demi-gros de précipité rouge sur une once de *basilicum*. Lorsque les bords de l'ulcere commencent à se durcir , que les chairs sont blanchâtres , on se sert de l'eau phagédénique que l'on prépare ainsi : on prend un gros de sublimé corrosif qu'on dissout dans une livre d'eau de chaux ; on s'en sert en la mêlant avec l'esprit de vin , ou avec l'esprit de vitriol. Quelquefois on l'emploie toute seule ; quand on veut se servir de cette eau , il faut l'agiter pour la troubler , parce que sa principale vertu dépend du sublimé corrosif qui se précipite au fond du vaisseau quand l'eau se repose : on appelle encore cette eau , eau ulcéraire , eau jaune à cause de sa couleur. Ce sont là les principaux détersifs qu'on a coutume d'employer pour déterger les ulcères.

Les Sarcotiques.

LORSQUE par le moyen des médicaments dont nous venons de parler , on est venu à bout de déterger l'ulcere , il faut en suite penser à favoriser la régénération des chairs : les remèdes propres à cet effet sont appelés

farcotiques ou incarnatifs. Remarquez qu'à prendre le terme de farcotique ou d'incarnatif selon la force de son étymologie, il faut convenir qu'il n'y a point de remède de ce genre, puisqu'un médicament farcotique seroit celui qui reproduiroit les chairs qui manquent dans la cavité d'une plaie ou d'un ulcère, & qui rempliroit de chairs cette cavité. Or il n'y a aucun médicament capable de produire un tel effet. La régénération des chairs est l'ouvrage de la nature : tout ce que peuvent faire dans ce cas les différents secours qu'on emploie, c'est d'éloigner les différents obstacles qui pourroient empêcher ou retarder l'ouvrage de la nature, & l'heureux succès qu'on a lieu d'en attendre ; d'où il suit évidemment qu'il n'y a point d'autres médicaments farcotiques que ceux qui sont propres à dégager la cavité des ulcères des différentes impuretés qui s'opposent à la régénération des chairs louables, & qu'ainsi les farcotiques ne doivent presque pas être distingués des détersifs dont nous avons déjà parlé, pourvu cependant qu'on les choisisse selon les différents cas, comme nous l'avons ci-devant spécifié : néanmoins l'usage veut qu'on range plus particulièrement parmi les farcotiques les médicaments détersifs légèrement stimulants & suppuratifs mêlés avec les émollients, tels que l'onguent digestif, & le baume d'*Arceus*.

Onguent digestif, ou le Digestif, unguentum digestivum seu digestivum vulgare.

ON le fait avec la térébenthine dissoute dans un jaune d'œuf, & on y ajoute l'huile de lys & d'*hypericum* : pour favoriser la régénération des chairs, on l'applique avec des plumaceaux sur les bords & dans le fond de l'ulcère, lorsque l'ulcère a été bien détergé au moyen des médicaments dont nous avons parlé dans la classe précédente, & qu'il présente déjà un coup d'œil agréable. On peut se servir aussi, & on se sert même très-souvent du baume d'*Arceus* dont voici la composition.

Baume d'Arceus.

On prend graisse de cochon une livre, graisse de bouc deux livres, gomme élémi & térébenthine de Venise de chacun une livre & demie : on fait fondre ou liquéfier toutes ces drogues ensemble dans une bassine sur un feu médiocre, on coule la matière fondue, & on la laisse refroidir. C'est le baume d'*Arceus* qu'on pourroit appeller onguent, à cause de sa consistance,

On l'appelle ordinairement *balsamum* seu *linimentum Arcei*. Il a à peu près les mêmes vertus que le digestif simple dont nous venons de parler, mais il est plus adoucissant; c'est pourquoi on ne l'emploie que lorsque l'ulcère est bien détergé, ou dans les plaies récentes, & on en continue l'usage jusqu'à ce que les grains charnus soient cicatrisés.

Les Cicatrisants.

ON appelle médicaments cicatrisants, épulotiques, ceux qui couvrent d'une cicatrice la cavité des ulcères ou des plaies déjà remplies de chairs louches. La cicatrice ne paroît être autre chose que la surface de l'ulcère rempli de chairs, laquelle est desséchée, endurcie, & pour ainsi dire devenue calleuse. Les sentimens des Médecins - Chirurgiens sont divisés sur la manière dont elle se forme. Quoi qu'il en soit du mécanisme de la cicatrisation qu'on ignore peut-être encore, il paroît par l'idée que nous avons donné de la cicatrice, qu'on doit regarder comme cicatrisants les médicaments qui peuvent rendre ferme & compacte la surface des chairs qui remplissent la cavité de l'ulcère. Il est évident qu'on doit choisir différens cicatrisants suivant différentes circonstances que présentent les ulcères remplis de chairs. Les plus en usage sont les suivans. 1°. Les différens astringents dont nous avons déjà parlé dans la classe des repercutifs, comme le vin, l'esprit de vin, l'eau-de-vie, les roses rouges, l'alun : on emploie ce dernier principalement lorsque la cicatrice est empêchée parce qu'il pullule des chairs mollasses & pour ainsi dire ramollies par la férosité. 2°. La tuthie, le pompholix, la céruse, la térébenthine cuite, le mastic, l'oliban & autres semblables. On se sert de la poudre de ces derniers médicaments pour en saupoudrer les plaies ou les ulcères. Il ne sera peut-être pas inutile de marquer certains cas où l'on doit donner la préférence aux uns sur les autres. On emploie, par exemple, la tuthie lorsque les chairs qui pullulent ne peuvent se couvrir de cicatrices, parce qu'elles sont trop molles. Nous remarquerons ici en passant que la tuthie est un remède excellent pour les inflammations érépisélateuses des yeux accompagnées d'un sentiment âcre & mordant, & dans ce cas-là on applique simplement la poudre de tuthie mêlée avec le sucre candi, ou bien délayée dans l'eau de plantain, de roses, de fenouil, & on s'en sert sous forme de collyre. Le pompholix ou calamine blanche s'emploie dans le mêmes cas, & de la même manière que la tuthie. Il convient sur-tout lorsqu'on craint que les sucs âcres & stimulans empêchent la cicatrice. La céruse convient dans

les mêmes cas que l'onguent pompholix : on la réduit en poudre , & on en saupoudre les ulcères qui sont accompagnés d'un sentiment d'âcreté , surtout lorsqu'ils sont superficiels. On prépare avec deux onces de céruse & suffisante quantité d'huile de roses , un onguent qui est fort recommandé dans les cas d'hémorroïdes accompagnées de douleurs & d'inflammation. *Fernel* recommande beaucoup la céruse dans le cas d'ulcères malins , & il assure qu'au moyen de ce remède , on évite la douleur , on les déterge très-bien , & on les conduit à cicatrice ; il n'excepte pas même les ulcères chancreux. Voici de quelle manière il préparoit ce remède. Il faisoit battre du plomb pour l'étendre en lames très-minces & très-déliées qu'il coupoit & faisoit macérer pendant trois jours dans du vinaigre très-fort , changeant même le vinaigre s'il étoit besoin ; ensuite il le tiroit du vinaigre , le faisoit sécher au feu sans le brûler , & le faisoit broyer dans un mortier jusqu'à ce qu'il fût réduit en une poudre très-fine dont il se servoit pour saupoudrer les ulcères. L'oliban ou encens convient pour procurer la cicatrice dans les cas d'ulcères dont la surface est légèrement mouillée d'une humeur fereuse , & dont les chairs sont un peu mollasses : on l'emploie après l'avoir réduit en poudre de la même manière que les médicaments précédents. On emploie encore de la même façon & dans les mêmes cas la térébenthine cuite , & le mastic. Avant que de terminer la classe des cicatrisants , nous croyons devoir avertir que lorsque les chairs de la surface de l'ulcère sont louables , au lieu d'employer les cicatrisants dont nous venons de parler , il n'y a rien de plus propre pour procurer une prompte & bonne cicatrice que de panser la plaie avec de la charpie bien fine , mettant par dessus un bandage qu'on serre un peu plus , & lorsque les chairs ne pullulent pas également , de les égaliser par la pierre infernale. C'est aussi la méthode que suivent plusieurs habiles Médecins - Chirurgiens , & ils n'ont recours aux médicaments épulotiques , que dans les cas où nous avons marqué qu'ils étoient appropriés.

Les Antiseptiques.

IL arrive souvent que la cavité des ulcères ne peut se remplir de chairs louables , parce que les suc putrides , rancides , s'opposent à la régénération des chairs , ou les rongent , ou les corrompent lorsqu'elles ont été réformées. Cela arrive ou par un vice général , ou par un vice local , ou à cause des mauvais caractères des suc de la partie affectée , qui tournent vers la putréfaction. Quand ce sont des vices généraux qui sont la cause de ce désordre , il est évident qu'on doit avoir recours aux médicaments internes , &

joindre en même temps l'usage des topiques. Au contraire les topiques seuls suffisent lorsque le vice ne se trouve que dans la partie affectée : les topiques qu'on doit employer dans ce cas-là sont des médicaments capables d'empêcher la putridité , ou de la détruire si elle est déjà formée. On les appelle aussi antiseptiques ou antigangreneux. Ces médicaments ne conviennent pas seulement dans les circonstances dont nous venons de parler , mais encore dans le sphacele ou la gangrene , quand même aucun ulcère n'auroit précédé. Les antiseptiques sont propres à prévenir la gangrene , ou bien à en arrêter les progrès. Il ne fera peut-être pas hors de propos de donner une idée de la gangrene par laquelle se terminent quelquefois les tumeurs inflammatoires , & d'en exposer les principales causes , avant que d'entrer dans le détail des topiques qui sont propres à la combattre. La gangrene est un commencement de mortification & de corruption dans les parties molles du corps , accompagnée d'insensibilité , d'une couleur livide , & d'une odeur cadavéreuse. Elle arrive lorsque le jeu de la circulation commence à diminuer dans une partie. Le sphacele est la mortification entière d'une partie du corps , causée par l'interruption de la circulation du sang & des autres humeurs , & par la corruption de la partie. Il y a un grand nombre d'Auteurs qui donnent une autre distinction de ces maladies. Ils disent qu'une partie est gangrénée lorsque le jeu de la circulation est diminué dans la partie , mais seulement dans la superficie ; au lieu que dans la partie sphacélée il l'est jusqu'aux os. La gangrene est ordinairement la suite d'une tumeur inflammatoire : quelquefois cependant elle n'est pas précédée de l'inflammation. Dans les vieillards elle se manifeste aux extrémités par une petite vessie pleine d'eau , qui étant ouverte répand & laisse voir au fond une liqueur jaunâtre de très-mauvaise odeur ; quelquefois la partie devient mollassé & tourne aussi vers la gangrene ; d'autres fois elle est due à une compression violente , ou à la rupture des nerfs ou des vaisseaux sanguins. Lorsque les nerfs qui vont à une partie ont été coupés , il arrive souvent que la partie où ils se distribuent tombe en gangrene : or les nerfs & les vaisseaux sanguins peuvent être coupés par des instruments tranchants , déchirés par des morsures , froissés par des instruments contondants , comprimés par un bandage trop serré , par quelques corps étrangers , par des os déplacés dans les luxations & les fractures ; ils peuvent aussi être liés. La gangrene peut aussi dépendre d'un grand froid qui resserre les fibres & condense les humeurs , ou d'une trop grande chaleur qui augmente l'inflammation. Aussi la gangrene survient-elle souvent à la suite d'un grand froid , sur-tout

lorsqu'imprudemment on approche du feu le membre gelé, & dans les grandes chaleurs de l'été la gangrene survient souvent aux tumeurs inflammatoires. On doit regarder tous ces accidents comme autant de causes de la gangrene ou du sphacèle. La différence qu'il y a entre ces deux maladies, est que dans la gangrene il reste encore quelques vaisseaux libres & entiers par lesquelles la circulation se fait, quoique difficilement, au lieu que dans le sphacèle il n'y a plus de vaisseaux entiers & libres, plus de circulation & de principe de vie, plus de commerce avec le reste du corps, la partie sphacelée étant absolument morte. Il y a des signes qui précèdent la gangrene, & d'autres qui font connoître sa présence : ceux qui la précèdent sont les suivans. S'il s'agit d'une tumeur inflammatoire, après avoir appliqué les remèdes convenables, les symptômes au lieu de diminuer augmentent, la partie devient très-rouge, la douleur plus vive, on observe des inquietudes, la fièvre, l'insomnie, le délire vague, des phlictenes ou vessies qui s'élèvent sur la peau, & d'autres symptômes qui dénotent une grande impureté dans les humeurs, ou un grand obstacle à leur circulation. On connoît la présence de la gangrene lorsque les signes dont nous venons de parler ayant déjà précédés, les symptômes diminuent, la partie devient molle, & on observe l'extinction de la chaleur naturelle dans la partie offensée, sa lividité ou sa noirceur, son insensibilité & la puanteur cadavéreuse. On doit distinguer plusieurs temps dans la gangrene : le premier lorsque la partie devient noirâtre, le second lorsqu'elle est tout-à-fait noirâtre ou livide & molle, & le troisième lorsque l'épiderme se détache aisément & que la partie offensée répand une odeur fétide. Quand la partie est absolument sphacelée, il n'y a point d'autres remèdes que l'amputation. Si elle n'est que gangrenée, & à plus forte raison si elle ne fait que tourner vers la gangrene, on doit avoir recours aux antigangreneux qui sont des médicaments qui empêchent la gangrene, ou qui la détruisent lorsqu'elle est déjà formée. Il faut ici remarquer qu'on appelle proprement médicaments antigangreneux ou antiseptiques, ceux qui détruisent la putridité qui est produite ou qui pourroit l'être dans la suite par le mouvement languissant des solides & par la stagnation des fluides : par conséquent ces médicaments produisent leur effet en stimulant l'action des vaisseaux, & empêchant la putridité spontanée des humeurs ; car la gangrene peut être quelquefois occasionnée par la trop grande impétuosité des fluides, & par la grande ardeur qui en est la suite, comme aussi par l'âcreté des humeurs qui se meuvent avec trop de rapidité, & par la vivacité de la douleur : alors il est évident qu'on doit prévenir la putréfaction

en

en se servant des anodins , des émollients ; car les antiseptiques proprement dits , quoique très-appropriés dans les cas dont nous venons de parler , seroient ici pernicious bien loin d'être utiles. Ces médicaments nous sont fournis par les trois regnes. Le regne végétal nous fournit le scordium , la petite centaurée , la camomille , l'absinthe , en un mot toutes les plantes aïneres , aromatiques , qu'on range ordinairement dans la matiere médicale interne dans la classe des stomachiques & des fébrifuges , parmi lesquels les observations faites depuis peu montrent que le kina excelle par sa vertu antiseptique. On peut ajouter à ces médicaments tirés du regne végétal , les suc résineux , comme la teinture de myrrhe , la teinture d'aloès , le camphre ; on peut aussi y rapporter le vin , le vinaigre , l'esprit de vin. Le regne minéral nous fournit les sels neutres , tels que le sel marin , le sel gemme , le sel ammoniac , le nitre , la chaux vive , l'eau de chaux. Le regne animal nous fournit un très-bon remede antiseptique qu'on a vanté comme spécifique : c'est la fiente de bœuf , & de cheval principalement , bouillie dans le vin. On peut ajouter à tous ces remedes l'esprit de vin camphré fort usité dans le commencement de la gangrene , & l'onguent ægyptiac. Tels sont les principaux antiseptiques dont on se sert : nous n'avons fait que les indiquer ; nous allons dire un mot en particulier de quelques-uns de ces médicaments , & de la maniere de les employer.

On vante beaucoup la vertu de la germandrée , soit pour prévenir la gangrene menaçante lorsqu'elle est froide comme l'on dit , soit pour en empêcher les progrès quand elle est déjà formée , soit pour traiter les ulceres invétérés , mais non chancreux dans lesquelles il pullule des chairs baveuses , putrides. On prescrit avec succès dans ces cas le suc exprimé de cette plante , ou sa décoction faite dans l'eau ou dans le vin. L'absinthe convient dans tous les cas dans lesquels on recommande le scordium : elle nétoie bien les ulceres baveux & putrides , & les empêche de dégénérer en fistules. Elle est très-utile dans les ulceres vénimeux comme nous l'avons observé quelquefois. Le suc vaut mieux que la décoction selon l'observation de *Fernel*. On recommande fort la teinture de myrrhe dans les ulceres malins , putrides , sur-tout lorsqu'ils sont voisins des os cariés , & même dans les cas de carie des os avec effusion d'une matiere sanieuse , rancide. On l'emploie seule , ou bien on l'ajoute aux digestifs dont nous avons déjà parlé. On emploie la teinture d'aloès dans les mêmes cas que la teinture de myrrhe ; cependant quelques grands Médecins prétendent qu'elle a moins de vertus. On joint ordinairement la teinture

d'aloès à celle de myrrhe. Si la gangrene fait quelque progrès, on prend trois onces d'esprit de vin camphré, une livre d'eau de chaud, & demi-gros de sel ammoniac, on mêle toutes ces drogues ensemble, & on y trempe des linges qu'on applique sur la partie gangrenée, ou bien on met trois onces d'esprit de vin camphré, trois gros de myrrhe, autant d'aloès & d'onguent ægyptiac. Au lieu de la myrrhe & de l'aloès on peut ajouter la teinture de myrrhe & celle d'aloès. On peut aussi se servir de la décoction suivante: on prend feuilles d'absinthe, de scordium, de chacune deux poignées, fleurs de camomille une poignée, esprit de vin camphré deux onces, on fait dissoudre un gros de sel ammoniac, & au lieu d'eau commune, on se sert de l'eau dans laquelle on a fait dissoudre du sel marin. Il y a long-temps qu'on connoît la vertu fébrifuge du Kina; & puisque les fébrifuges sont tous antiseptiques, l'analogie auroit dû ce semble porter naturellement à croire que le kina étoit antiseptique; cependant ce n'est que depuis peu qu'on a découvert que ce remède ne surpassoit pas moins les autres fébrifuges, par sa vertu antiputride, que par sa vertu fébrifuge: on l'emploie toutes les fois qu'une partie est menacée de la gangrene, & nous avons reconnu par notre propre expérience que ce que l'on dit de la vertu antiseptique de ce médicament est appuyé sur de solides fondements. Nous pouvons aussi assurer que d'autres Médecins ont fait la même observation. On se sert de la décoction de kina pour faire des fomentations sur les parties gangrenées, ou prêtes à tourner vers la pourriture; mais dans le temps qu'on use ainsi de ce remède extérieurement, il est bon de l'employer intérieurement à différentes doses suivant les différentes circonstances. Par ce seul médicament on a guéri des ulcères gangreneux qui faisoient des progrès rapides, & la vie en est revenue en peu de temps à des parties déjà à demi-mortes. Cependant quoique la vertu du kina soit puissante contre la gangrene & la pourriture, il ne faut pas croire qu'elle produise toujours ce bon effet, au contraire il y a certaines circonstances dans lesquelles ce médicament, sur-tout pris à une dose trop haute, fait plus de mal que de bien, comme chez les personnes affoiblies par les maladies chroniques: c'est pourquoi il faut distinguer soigneusement les cas.

Les Stiptiques.

LES topiques ou les médicaments externes dont nous avons parlé jusqu'à présent, & dont on se sert dans les tumeurs inflammatoires & dans les ulcères, s'emploient aussi dans les blessures, parce que les symptômes

qui se trouvent dans le premier cas se rencontrent aussi dans le second ; mais outre ces symptômes qui sont communs aux tumeurs inflammatoires & aux blessures , il se présente dans les blessures un symptôme très-fâcheux , & qui pourroit avoir des suites funestes , si on n'y remédioit promptement ; c'est l'hémorragie ou effusion de sang , sur-tout lorsque les vaisseaux rompus sont considérables. L'hémorragie peut venir non-seulement de causes externes , mais encore de causes internes ; c'est ainsi qu'on en voit survenir aux jeunes gens par le nez , par les pounons , aux femmes par les voies utérines. De quelque cause que dépende l'hémorragie , on l'arrête toujours de la même façon , supposé qu'il convienne de l'arrêter tout de suite ; mais il faut prendre garde de n'arrêter que celles qui sont contre-nature , & ne le faire que lorsqu'elles paroissent beaucoup affoiblir le malade ; car si on les supprimoit trop brusquement , on pourroit occasionner quelqu'inflammation : il faut sur-tout avoir cette précaution dans les hémorragies critiques , qu'il ne faut songer à arrêter que quand on voit qu'il y a de l'excès. Cela doit s'entendre principalement des pertes qui se font par les voies utérines , soit après l'accouchement , soit dans un autre temps. La pléthore peut être fort considérable , & alors il seroit imprudent & dangereux d'arrêter le mouvement de la nature. Il en est de même des hémorragies produites par quelque cause externe. Il ne faut pas les arrêter trop précipitamment , parce que l'observation , ainsi que la raison , font voir que dans les mêmes circonstances plus il se répand de sang des vaisseaux ouverts par la blessure , moins l'inflammation & la suppuration sont à craindre , & par conséquent la blessure se guérit d'autant plus aisément & avec moins de peine. On ne doit donc non plus arrêter ces fortes d'hémorragies , que quand on voit les forces se trop affoiblir , & du danger par conséquent à les laisser continuer. La nécessité d'arrêter les hémorragies a fait imaginer bien des moyens. Les anciens se servoient pour cela du cautere actuel qui est un fer rougi au feu qu'ils appliquoient sur les vaisseaux coupés. Il se formoit une escarre qui servoit comme de bouchon. Aujourd'hui on ^{ne} emploie guere ce moyen ; mais s'il y a des vaisseaux considérables coupés , & que la main du Chirurgien puisse y parvenir , on en fait la ligature ou simplement la compression , & par-là on arrête sûrement l'hémorragie. On a donc presque entièrement abandonné la méthode des Anciens , parce qu'outre qu'elle étoit trop cruelle , elle étoit sujette à plusieurs inconvénients très-considerables , en ce que l'escarre venant à tomber , il arrivoit souvent que l'hémorragie recommençoit avec plus d'abondance qu'auparavant , les vaisseaux fournissant plus de sang.

On n'emploie aujourd'hui le cautere actuel que dans une grande nécessité lorsque la main du Chirurgien ne peut pas parvenir aux vaisseaux ouverts pour en faire la ligature ou la compression, comme dans l'opération de la fistule à l'anus s'il y a quelque gros vaisseau hémorroïdal interne ouvert; mais quand on peut faire la ligature ou la compression, on doit les préférer au feu. La compression est un des meilleurs moyens pour arrêter l'hémorragie: on la fait en comprimant les vaisseaux ouverts pendant vingt-quatre heures, ou même deux fois vingt-quatre heures s'il est nécessaire. Le cautere actuel ayant été abandonné à cause de sa cruauté, on a inventé d'autres remèdes pour arrêter l'hémorragie, tels que les cauteres potentiels, la pierre à cautere, le vitriol verd; mais on s'est ensuite dégoûté des caustiques, parce que l'escarre venant souvent à se détacher le quatrième ou le cinquième jour, souvent lorsqu'on s'y attendoit le moins, & que le malade étoit sans secours, il en arrivoit une hémorragie mortelle. De plus on a observé que les particules de ces médicaments caustiques, corrolifs, se mêlant avec la masse du sang, l'épaississoient, causoient des froncements, produisoient des inflammations, de grands désordres dans l'économie animale & souvent la mort. Ce n'est donc que dans les cas où il y a seulement des petits vaisseaux ouverts qu'on emploie extérieurement les médicaments styptiques parmi lesquels on compte les astringents, comme l'alun, l'acacia, le sang dragon, la gomme adragant, les balaustes, les écorces de grenade, les racines de bistorte, de tormentille. On doit ajouter à ces styptiques, la pimprenelle dont les feuilles en décoction étant appliquées extérieurement sur le vaisseau ouvert, arrête d'abord l'hémorragie, c'est ce que fait encore mieux la racine de cette même plante selon *Fernel*; la renouée qu'on appelle en latin *Sanguinaria*, à cause de ses bons effets dans les hémorragies. (On applique cette plante soit entière, soit broyée, sur la partie. Elle coagule le sang, & arrête l'hémorragie; la racine de cette plante produit le même effet:) l'ortie dont la racine récente étant mise dans les narines, arrête sur le champ l'hémorragie, c'est ce que font encore les feuilles de cette plante broyées & appliquées sur la blessure; l'équisetum qu'on appelle en françois prêle ou queue de cheval, dont le suc arrête très-efficacement l'hémorragie du nez. On peut aussi compter parmi les styptiques l'esprit de vin alkoolisé. On ne se sert presque à présent que de ce dernier: on l'emploie dans les plaies qui donnent beaucoup de sang, lorsque la compression ni la ligature ne suffisent pas, comme lorsque le sang est dissout; on jette une certaine quantité de cet esprit de vin à froid sur la partie,

& on la couvre outre cela avec des linges trempés dans le même esprit de vin. On doit compter parmi les stiptiques le vinaigre, soit pur, soit tempéré avec l'eau que l'on appelle alors oxycrat. L'oxycrat est plus ou moins fort, selon que l'on mêle plus ou moins de vinaigre avec la même quantité d'eau : on ne l'emploie guere dans l'hémopthisie, à moins que le malade ne soit dans un extrême danger. L'oxycrat opere des guérisons presque miraculeuses dans les hémorragies utérines qui surviennent aux accouchements ; on enveloppe la malade dans des draps trempés dans l'oxycrat ou bien dans le vinaigre. Nous ne devons pas omettre ici un stiptique excellent selon les Auteurs modernes qui nous est fourni par l'amadou qui est un champignon préparé qu'on appelle en latin *fungus ignarius*, aut *pedis equini facie*. L'amadou appliqué sur les vaisseaux ouverts, arrête, dit-on, l'hémorragie ; mais il est incertain si cet effet est dû à la vertu stiptique de l'amadou, ou bien à la compression qu'on fait en l'employant. Enfin on compte parmi les stiptiques les plus en usage, l'eau stiptique de M. ~~Chauss~~ ^{Martin}, qui tire sa principale vertu du vitriol. On peut en voir la composition dans le Cours de Chymie de Montpellier. On verse de cette eau sur la partie, ou bien on y applique des compresses trempées dans cette eau : dans les hémorragies du nez on l'emploie sous forme d'errhine liquide, ou bien on fait des bourdonnets de la mesure de la cavité des nariums, on les imbibe de cette eau, & on les y introduit.

CH A P I T R E S E C O N D.

Des Médicaments Externes généraux.

Nous avons divisé les médicaments externes en particuliers ou topiques qui produisent leur effet précisément sur la partie où on les applique, & en généraux qui sont ceux qu'on applique dans la vue de remédier aux vices généraux qui dérangent l'économie animale. Après avoir parlé suffisamment des topiques, il est tems de passer aux médicaments externes généraux. Nous nous contenterons de parler des vésicatoires & des bains. Nous commencerons par les vésicatoires.

Des Vésicatoires.

ON entend par vésicatoires des médicaments qui étant appliqués & retenus quelque temps sur la peau, y excitent des phlictenes ou vésicules,

ou ampoules pleines d'une humeur sereuse plus ou moins âcre : ils ne diffèrent des synapismes que par leur intensité, car les synapismes sont des médicaments qui bornent leur action à produire la rougeur sans causer des vésicles sur la peau, d'où vient qu'on les appelle en latin *medicamenta rubefacientia* qu'on emploie lorsqu'il ne faut pas tant tirer les humeurs au dehors. Les mêmes médicaments qui sont vésicatoires étant employés à une certaine dose, peuvent n'être que synapismes en diminuant la dose. On compte parmi les vésicatoires toutes les plantes âcres, l'ail, l'euphorbe, l'herbe aux gueux, la rénoncule, le pyrethre, la montarde, &c. mais aujourd'hui on ne se sert presque que des mouches cantharides qui répandent une odeur très-puante quand elles sont récentes.

Cas.

ON emploie les vésicatoires avec succès ; 1°. dans les affections soporeuses essentielles, comme dans l'apoplexie, soit sanguine mais après avoir fait précéder les saignées & les émétiques, soit sur-tout pituiteuse ; dans le carus, le coma, la léthargie ; 2°. dans les fièvres malignes qu'on appelle à *coagulo*, où les solides sont tous relâchés & les fluides visqueux, lents, & pour ainsi dire coagulés, ce qui paroît assez par les symptômes qui accompagnent cette espèce de fièvre maligne, tels sont le grand accablement des forces, le pouls lent, petit, foible, les affections soporeuses, le carus, le coma, les délires obscurs, languissants, la chaleur qui n'est pas plus considérable que dans l'état naturel, ou même qui est quelquefois moindre ; 3°. dans les douleurs de la tête invétérées qui dépendent d'une matière âcre, sereuse, ce qu'on connoît par le tempérament, soit pituiteux, soit mélancolique ; car quoique dans ce dernier tempérament la sérosité n'abonde pas absolument, cependant comme elle ne peut se mêler exactement avec le sang à cause de la sécheresse de celui-ci, elle paroît être abondante ; 4°. dans les ophtalmies invétérées, sur-tout lorsqu'elles succèdent à la petite vérole ou à la rougeole, dans l'épiphora ou l'armoyement qui succède aux mêmes maladies ; 5°. dans les douleurs vives des dents qui sont périodiques, & qui dépendent d'une humeur âcre, sereuse ; 6°. pour faire revenir la matière de la goutte vers les parties sur lesquelles elle doit être portée, c'est-à-dire, vers les articulations lorsqu'elle en a été mal-à-propos rétro-pulsée, ou lorsque n'y étant pas portée, on comprend qu'elle peut faire du ravage dans l'intérieur du corps ; 7°. dans les cas où quelques ulcères

juvétés, soit naturels, soit artificiels comme les cauterés, se sont desséchés & cicatrisés d'eux-mêmes ou par le secours de l'art : pour suppléer à ces ulcères, & prévenir les suites fâcheuses qui pourroient naître de ce que la matière purulente n'a pas d'issue, on applique une emplâtre vésicatoire près de la partie où étoit auparavant l'ulcère ou cautère. Tels sont les cas où l'on emploie ordinairement les vésicatoires : par où il est aisé de voir que quoique quelquefois on s'en serve pour des affections externes topiques, cependant le plus souvent on y a recours pour rétablir la santé lorsqu'elle a été dérangée par des vices généraux ; c'est aussi la raison qui nous a déterminé à ranger les vésicatoires parmi les médicaments externes généraux. Au reste nous ne devons pas omettre qu'il y a des Médecins dans les pays étrangers qui emploient les vésicatoires dans tous les délires, même phrénétiques, dans la petite vérole, la rougeole, les maladies convulsives ; mais leur usage dans ce cas-là ne paroît pas si généralement indiqué, ni même assez sûr : il faut cependant en excepter la petite vérole, lorsque l'éruption ne peut pas se faire à cause de l'épaississement du sang & de l'atonie des solides, car dans ces circonstances on doit les employer. Ces médicaments agissent en donnant du ton aux solides, & en atténuant les fluides : on doit donc les regarder comme stimulants & atténuants, mais qui ne conviennent que dans les cas que nous avons spécifié.

Effets particuliers.

L'ENDROIT de la surface du corps où l'on a appliqué les vésicatoires devient un peu rouge, le malade y ressent une douleur plus ou moins vive, ou bien une espèce d'inquiétude, supposé qu'il ne soit pas attaqué de quelque affection soporeuse. Quelque temps après l'application des vésicatoires, c'est-à-dire, quatre ou cinq heures après plus ou moins selon la disposition du sujet & la composition de l'emplâtre vésicatoire, il s'élève sur la peau des empoules, ou des vessies remplies d'une humeur féreuse plus ou moins âcre.

Effets généraux.

L'ACTION des vésicatoires ne se borne pas à la seule partie sur laquelle on les applique ; mais après avoir stimulé & avoir rongé les petits vaisseaux de la peau, ils pénètrent dans la masse du sang, agissent sur

les organes vitaux qu'ils irritent , excitent de plus fortes oscillations , divisent ainsi les fluides visqueux & tenaces , & enfin détournent vers les vessies qu'ils excitent par leur *stimulus* , les matieres séreuses âcres qui étant portées ailleurs pourroient exciter des symptomes fâcheux : c'est pourquoi ils sont utiles dans les vieilles fluxions , par exemple , dans les migraines invétérées , parce qu'ils évacuent une partie de l'humeur qui se portant vers la tête , y excite la migraine , & qu'ils atténuent les fluides , & empêchent ainsi qu'ils ne causent des engorgements. Il faut remarquer que ces médicaments portent leur action principalement vers les voies urinaires , ce qui nous doit rendre très-circonspects en les employant tant extérieurement qu'intérieurement , sur-tout dans les personnes qui ont des ulcères aux reins , ou qui ont été sujettes à quelque autre maladie des voies urinaires ; car l'usage même externe des vésicatoires a souvent produit de très-grands maux , comme des pissements de sang , des inflammations de la vessie , des ureteres , des reins , symptomes qui ont été quelquefois mortels , quoiqu'on les ait combattu avec les secours les plus appropriés. Si cependant malgré les précautions que l'on a prises en employant les vésicatoires il survenoit quelque'un des fâcheux symptomes dont nous venons de parler , il faut avoir promptement recours aux adoucissants & sur-tout au lait : l'observation fait voir aussi que les bains tièdes ont été très-utiles pour remédier à ces désordres.

Maniere de s'en servir , Doses.

LES mouches cantarides , comme nous l'avons déjà dit , sont presque les seuls vésicatoires dont on se sert à présent. Ce sont des animaux oblongs , ailés , petits , d'une couleur très-belle , verte , azurée , tirant sur le doré , d'une odeur très-puante quand ils sont récents. On doit choisir pour l'usage les mouches les plus récentes & celles qui sont entières , & rejeter les vieilles & celles qui se réduisent en poudre dès qu'on les touche , parce que leur vertu consiste dans un sel extrêmement volatil qui se dissipe lorsqu'elles vieillissent. Il y a des Auteurs qui conseillent d'ôter les ailes , mais c'est un scrupule assez ridicule. On prépare sur le champ l'emplâtre vésicatoire avec les cantarides , de la maniere suivante. On les réduit en poudre , & on les incorpore au nombre de dix ou de douze , avec suffisante quantité de vieux levain ramolli avec du bon vinaigre pour une emplâtre ; quelquefois on les incorpore avec la pulpe des figues. On fait l'emplâtre vésicatoire plus ou moins grande , selon la partie sur laquelle on veut l'appliquer

plier, & on augmente la dose des cantarides à proportion que l'emplâtre est plus ou moins grand. Lorsqu'on doit l'appliquer derrière les oreilles, par exemple, l'emplâtre ne doit pas être plus grand qu'un écu de six livres : si on l'applique entre les deux épaules, il doit être grand comme les deux paumes de la main. Quelque part qu'on applique l'emplâtre vésicatoire, il faut l'y laisser jusqu'à ce qu'il ait assez agi, ce qu'on connoît par les vessies qui s'élèvent sur la peau : on ne sauroit guère déterminer le temps qu'il faut pour qu'il agisse, puisque cela dépend, comme nous l'avons dit déjà de la composition de l'emplâtre & de la disposition des sujets sur lesquels on fait l'application. Plus les cantarides sont récentes & la peau de la personne tendre & délicate, plus l'emplâtre agit promptement, & au contraire, plus les cantarides sont vieilles & la peau dure, plus il faut de temps pour que l'emplâtre produise des vessies. Ordinairement après trois, quatre ou cinq heures plus ou moins suivant les circonstances, on ôte l'emplâtre vésicatoire, & on trouve des vésicules qui quelquefois s'ouvrent d'elles-mêmes : on laisse couler l'humeur séréuse autant qu'il est possible, après quoi on panse la plaie avec les digestifs, & le plus souvent avec le beurre frais & les feuilles de poirée ou de choux. Quelquefois il se forme, soit dans la partie où on applique les vésicatoires, soit aux environs des petites pustules qui causent des démangeaisons, & qui inquiètent beaucoup le malade : dans ce cas-là on se sert du cérat de Galien, & par ce moyen ces petits ulcères se guérissent & se dessèchent comme d'eux-mêmes, dès que l'humeur séréuse cesse d'y aborder. Lorsqu'il est nécessaire d'entretenir l'écoulement de l'humeur séréuse pendant un temps considérable, comme lorsqu'on veut suppléer à quelque ulcère qui s'est fermé, il faut alors à chaque pansement répandre un peu de poudre de cantarides sur la solution de continuité.

Les Bains.

LE bain est l'immersion du corps humain dans quelque fluide. Quand on plonge tout le corps, excepté toutefois la tête, cette immersion s'appelle simplement bain, *balneum*. Si on plonge la moitié du corps jusqu'aux aînes, ou jusqu'aux hypocondres inclusivement, on l'appelle demi-bain, *semi-luvium* ; enfin si on ne plonge que quelque partie, selon la diversité de cette partie on lui donne différents noms : ainsi, si ce sont les pieds qu'on plonge dans le fluide, on appelle cette immersion lotion des pieds, *pedi-luvium*, si c'est la tête, *capiti luvium*. Il n'y a point de fluide déterminé pour les bains ; mais celui dont on se sert le plus souvent pour cet

usage , est l'eau simple , ou l'eau dans laquelle on a fait bouillir diverses plantes , comme les plantes émollientes , aromatiques , selon les différentes intentions du Médecin. Souvent aussi on emploie les eaux thermales. Outre l'eau ou simple ou altérée soit naturellement , soit artificiellement , il y a encore d'autres fluides qui fournissent la matiere du bain , comme l'huile , le lait dont les bains ont été souvent salutaires aux malades. On distingue aussi les bains en froids , en chauds & en tièdes. C'est sous ce dernier rapport que nous les considérons ici , en commençant par les bains tièdes dont on se sert le plus souvent. Par bain tiède , nous n'entendons pas celui qui paroît tel au Médecin ou aux assistants , mais seulement au malade , c'est-à-dire , celui qui n'excede pas la chaleur du malade , ou dans lequel il ne sent point sa chaleur naturelle augmenter , ni diminuer ; par où l'on voit qu'on ne peut déterminer absolument le degré de chaleur , & que quand on parle des bains chauds , tièdes , cela doit toujours s'entendre d'une chaleur ou d'une tiédeur relative au sentiment du malade.

Cas.

LES bains tièdes conviennent dans plusieurs maladies aiguës , comme ; 1°. dans les douleurs néphrétiques , soit qu'elles dépendent du calcul , soit qu'elles dépendent de l'inflammation , dans lequel cas on n'emploie les bains tièdes qu'après avoir fait précéder beaucoup de saignées , & une boisson abondante de ptisanes adoucissantes. Dans ce cas les bains d'huile ou du moins les bains d'eau tiède dans laquelle on a fait bouillir les plantes les plus émollientes , sont plus utiles que les autres ; 2°. dans les cas de coliques vives ; 3°. dans les douleurs rhumatiques ; 4°. quoique dans la manie on emploie les bains froids , cependant dans la phrénésie qui ne diffère de la manie que par la fièvre inflammatoire , on se sert des bains tièdes , mais après avoir fait précéder les saignées , & les ptisanes adoucissantes , humectantes ; 5°. dans plusieurs maladies chroniques , lorsqu'il y a tension spasmodique des solides , & âcreté & sécheresse des fluides , par exemple , dans la passion hystérique ou hypocondriaque ; 6°. lorsque la transpiration est empêchée , & que les humeurs de mauvaises qualités sont accumulées dans les vaisseaux & les glandes de la peau , comme dans les maladies cutanées , par exemple , dans le prurit , la gale , &c. 7°. dans le cas de fièvre qui doit se terminer par une éruption cutanée , par exemple , la petite vérole , lorsque l'éruption est empêchée par le resserrement spasmodique dans les enfants , ou simplement par rigi-

dité , tension de la peau dans les adultes , pourvu cependant que l'impétuosité des fluides ne soit pas grande. Dans ce cas-là on emploie les bains dans la vue de ramollir les solides , & d'adoucir & humecter les fluides. Quoique cette méthode ait réussi assez souvent , il y a néanmoins plusieurs Médecins très-habiles qui la regardent comme douteuse & même peu sûre , non-seulement pour les cas de petite vérole dont nous parlons , mais encore pour le cas de phrénésie ; 8°. lorsque quelques excrétiions sont supprimées , à cause de l'épaississement & de la viscosité du sang dans des sujets qui ne sont pas cachectiques , comme lorsque le flux menstruel est supprimé par une telle cause , & dans les circonstances indiquées ; 9°. lorsque la suppression des regles dépend de l'éréthisme , ce qu'on connoît par les douleurs vives que les malades rapportent à la région de l'uterus. On emploie alors le bain entier , ou plus souvent le pédiluve ; 10°. dans l'ischurie vraie qui dépend de la même cause , c'est-à-dire , de l'éréthisme ; 11°. dans la dysurie ; 12°. dans la gonorrhée virulente ; 13°. pour calmer les douleurs de la vérole , & préparer les voies au mercure dont on doit se servir pour la cure radicale de cette maladie.

Effets.

EN faisant attention aux différents cas où l'on emploie avec succès les bains tièdes , il est aisé de voir qu'ils relâchent le tissu de la peau , ramollissent les solides , ouvrent les pores , s'insinuent par les vaisseaux absorbants jusques dans la masse du sang , divisent , délayent les humeurs , leur donnent du véhicule , les rendent plus propres à la transpiration , & diminuent la sensibilité des parties trop tendues. D'où il suit qu'on peut regarder les bains tièdes comme des remèdes antispasmodiques , relâchants , délayants , émollients ; c'est pourquoi ils conviennent dans les cas d'éréthisme. Il est évident que les bains d'huile sont encore plus émollients ; c'est pourquoi dans les cas de douleurs néphrétiques , de coliques vives , on les préfère aux bains tièdes d'eau simple , parce qu'ils produisent des effets plus marqués : au défaut de bain d'huile , on peut employer dans ce cas-là le bain d'eau tiède altérée par les plantes émollientes. Ils produisent à-peu-près les mêmes effets.

Bains Chauds , effets.

LES bains chauds augmentent la circulation lorsque quelqu'un y a été plongé , son pouls devient plus fort , plus plein , plus fréquent , la cha-

leur augmente & se communique à la tête , les veines s'enflent , la face rougit , la personne se sent portée au sommeil , & quelquefois il survient des délires légers ; ce n'est même qu'en excitant cette espece de fièvre , que les bains chauds produisent de bons effets dans les cas que nous marquerons ci-après : c'est aussi par la même raison que les eaux thermales sont utiles dans les mêmes circonstances , comme aussi les bains d'eau alterée par les plantes aromatiques.

Cas.

ON emploie avec succès les bains chauds , soit d'eau simple , ou alterée par les plantes aromatiques , soit d'eau thermale , 1°. dans les rhumatismes à *causâ frigidâ* , 2°. dans les paralysies qui dépendent de la lenteur des fluides & du relâchement du système nerveux , 3°. quelquefois ils sont utiles dans les asthmes piteux ; en un mot toutes les fois que le tissu des solides est relâché , & que les fluides sont visqueux & languissants.

Bains Froids.

LES bains tièdes agissent de la même manière que les bains chauds , mais dans un moindre degré ; les bains froids par la raison des contraires , produisent des effets opposés aux bains tièdes & aux bains chauds. Ils diminuent la circulation & la rendent plus lente ; c'est pour cette raison qu'on les emploie dans la manie ; si cependant l'érétisme étoit jointe à la manie , il seroit plus prudent de les employer tièdes , ou un peu moins que tièdes. Les bains froids sont encore utiles dans le cas de suppression d'urine lorsqu'elle vient de ce que l'urine a été trop long-temps retenue : ils ont été aussi quelquefois d'un grand secours dans les constipations opiniâtres du ventre , qui causoient des symptômes très-fâcheux ; mais dans ce dernier cas on ne donnoit pas le bain entier , on se contentoit des lotions des pieds.

Précautions.

1°. LES bains chauds doivent être évités par ceux qui ont des obstructions invétérées , squirreuses , dont le sang est sec , âcre , & presque inflammatoire , ou qui ont quelque viscère vicié , 2°. les bains tièdes ne conviennent pas à ceux qui sont cachectiques , enflés , leucoplegmatiques , hydropiques ; & si quelque partie est attaquée de quelques-uns de ces vices , comme cela arrive quelquefois à l'extrémité des membres , & qu'il y ait d'ailleurs nécessité d'avoir recours aux bains , on doit alors éviter de plon-

ger la partie affectée. 3°. On n'emploie pas les bains entiers lorsque les malades sont attaqués de quelques maladies de la poitrine , comme d'asthme, de phthisie , d'hémophtisie , ou qu'ils sont trop foibles ; mais si les bains sont indiqués d'ailleurs , on emploie les demi-bains , ou quelquefois les lotions des pieds seulement. 4°. Dans les petites véroles où l'éruption est empêchée par le resserrement ou la rigidité des solides , & où nous avons dit qu'on pouvoit employer les bains tièdes , comme ces bains augmentent la circulation , & que cette méthode est regardée comme douteuse & peu sûre par d'habiles Médecins , on pourroit y substituer des fomentations en trempant des linges , & les appliquant successivement sur toutes les parties du corps : cette dernière méthode seroit moins dangereuse. 5°. Quant à l'heure du bain , on le prend ordinairement le matin à jeun , & s'il est nécessaire de prendre un second bain le soir , on attend cinq heures après diner. Enfin nous remarquerons en finissant qu'on peut rapporter aux bains considérés en général , non-seulement les fomentations comme nous l'avons dit , mais encore les douches. Par où l'on voit que ce que nous avons dit des effets généraux des bains , peut servir à entendre ce qui regarde les fomentations & les douches.

F I N.

TABLE GÉNÉRALE

Des Matieres contenues dans ce Volume.

P HARMACOLOGIE,	1	Euphorbe, (l') &c.	107
Médicaments internes,	5	Sels Cathartiques, &c.	<i>ibid.</i>
Evacuans, (les)	<i>ibid.</i>	Sel végétal, &c.	108
Purgatifs, (les)	<i>ibid.</i>	Sel de Seignette, &c.	109
Emétiques, (les) 6. Effets des Emétiques,		Sel d'Epson, &c.	110
<i>ibid.</i> Cas où les Emétiques conviennent,		Diurétiques, &c.	111
8. Précautions, 10. Circonstances, 11.		Diurétiques chauds, &c.	121
Temps où on doit les administrer, 13.		Diurétiques chauds tirés du regne végétal, <i>ib.</i>	
Détail des principaux Emétiques,	14	Cinq (les) Racines apéritives, &c.	<i>ibid.</i>
Emétiques végétaux,	<i>ibid.</i>	Ache, (l') &c.	<i>ibid.</i>
Ipécacuanha, (l') &c.	<i>ibid.</i>	Perfil, (le) &c.	123
Azarum,	19	Fenouil, (le) &c.	124
Hellebore blanc,	20	Asperges, (les) &c.	125
Gomme gutte,	<i>ibid.</i>	Petit (le) Houx,	<i>ibid.</i>
Emétiques minéraux,	21	Les cinq Racines apéritives mineures,	126
Antimoine, &c.	<i>ibid.</i>	Chardon (le) roland, &c.	<i>ibid.</i>
Cathartiques (les) ou Purgatifs, &c.	34	Arrête-Bœuf, (l') &c.	127
Cathartiques doux,	48	Caprier, (le) &c.	128
Polypode, (le) &c.	<i>ibid.</i>	Garance, (la) &c.	130
Fleurs de Violettes, &c.	49	Chiendent, (le) &c.	<i>ibid.</i>
Fleurs de Pêchers, &c.	52	Térébenthine, (la) &c.	131
Roses pâles, &c.	53	Baume (le) de Copahu, &c.	135
Mirobolans, &c.	54	Diurétiques chauds du regne animal,	139
Cassé solutive, &c.	57	Cloportes, (les) &c.	<i>ibid.</i>
Tamarins, (les) &c.	61	Crapaud, (le) &c.	142
Rhubarbe, (la) &c.	64	Vers (les) de Terre, &c.	<i>ibid.</i>
Rapontic, (le) &c.	67	Ecrevisses, (les) &c.	143
Manne, (la) &c.	<i>ibid.</i>	Diurétiques chauds du regne minéral,	144
Senné, (le) &c.	71	Sel gemme,	<i>ibid.</i>
Jalap, (le), &c.	76	Sel admirable de Glauber, &c.	145
Mechoacan, (le) &c.	78	Tartre vitriolé,	146
Scammonée, (la) &c.	80	Diurétiques froids,	147
Hermodactes, (les) &c.	83	Diurétiques froids du regne végétal,	<i>ibid.</i>
Turbith, (le) &c.	85	Chicorée (la) sauvage, &c.	<i>ibid.</i>
Semences (les) de Carthame, &c.	86	Oseille, (l') &c.	149
Iris, (l') &c.	87	Patience (la) sauvage,	150
Agaric, (l') &c.	89	Althæa (l') ou Guimauve, &c.	<i>ibid.</i>
Sureau, (le) &c.	91	Nymphæa, (le) &c.	152.
Hieble, (l') &c.	93	Fraisier (le) &c.	<i>ibid.</i>
Nerprun, (le) &c.	<i>ibid.</i>	Semences farineuses, & maniere de s'en	
Cathartiques forts ou Drastiques, &c.	95	servir, Doses,	155
Bryone (la) ou Couleuvrée, &c.	96	Les quatre semences foides mineures,	157
Concombre (le) sauvage, &c.	99	Diurétiques froids du regne minéral,	158
Coloquinte, (la) &c.	101	Nitre, (le) &c.	<i>ibid.</i>
Tabac, (le) &c.	103	Esprits acides minéraux, &c.	161
Hellebore (l') noir, &c.	105	Diaphorétiques & Sudorifiques,	163

Effets des Diaphorétiques & Sudorifiques , &c.	164	Gomme (la) adragant ,	234
Diaphorétiques & Sudorifiques du regne vé- gétal ,	171	Racines mucilagineuses ,	ibid.
Gayac , (le) &c.	ibid.	Racine de Réglisse , &c.	ibid.
Saffafras , (le) &c.	174	Semences (les) mucilagineuses ,	235
Squine , (la) &c.	175	Semences (les) de Psillium , &c.	ibid.
Salépaveille , (la) &c.	176	Semences (les) de coing ,	236
Bardane , (la) &c.	177	Fruits (les) mucilagineux ,	ibid.
Scorfonere , (la)	178	Jurubes , (les) &c.	ibid.
Scordium officinale , &c.	179	Sebestes , (les)	237
Chardon (le) benit , &c.	180	Raisins (les) secs ,	238
Scabieuse , (la) &c.	182	Figues (les) seches ,	ibid.
Diaphorétiques & Sudorifiques du regne animal ,	ibid.	Huile (l') d'amandes douces ,	ibid.
Corne (la) de Cerf , &c.	183	Altérants ,	239
Vipere , (la) &c.	185	Altérants généraux ,	241
Sang de Bouquetin , &c.	187	Stimulants ou Cardiaques , &c.	242
Antimoine Crud , &c.	189	Stimulants ou Cardiaques , tirés du regne végétal ,	247
Antimoine diaphorétique , &c.	ibid.	Santaux , (les) &c.	ibid.
Emmenagogues , &c.	190	Racines (les) Cardiaques ,	250
Emmenagogues tirés du regne végétal ,	197	Racine (la) d'Angélique , &c.	251
Rue , (la)	ibid.	Impératoire , (l') &c.	253
Sabine , (la)	198	Zédoaire , (le)	254
Armoise , (l')	ibid.	Cannelle , (la) &c.	255
Matricaire , (la)	ibid.	Cloux (les) de Girofles , &c.	256
Cas généraux où ces quatre plantes con- viennent ,	ibid.	Noix (la) muscade , &c.	257
Safran , (le) &c.	202	Macis , (le) &c.	259
Myrrhe , (la) &c.	204	Confec tion (la) d'alkermès ,	ibid.
Elixir de propriété de Paracelse ,	205	Sirop (le) de Kermès , &c.	260
Emmenagogues tirés du regne animal ,	ibid.	Confec tion (la) d'Hyacinthe , &c.	261
Castoreum , (le) &c.	206	Lilium de Paracelse ou Teinture des Mé- taux ,	263
Emmenagogues tirés du regne minéral ,	208	Eau de la Reine de Hongrie ,	ibid.
Borax , (le) &c.	ibid.	Thériaque , (la)	264
Béchiques , &c.	209	Relâchans ou Narcotiques , &c.	ibid.
Béchiques incisifs ,	215	Décoction de tête de pavot ,	270
Béchiques incisifs du regne végétal ,	ibid.	Sirop de pavot blanc ou de Diacode ,	271
Camphrée (la) de Montpellier , &c.	ibid.	Opium , (l')	ibid.
Lierre (le) terrestre , &c.	217	Astringents , &c.	275
Benjoin , (le) &c.	220	Astringents pignotiques ou condensants ,	278
Capillaire , (le) &c.	221	Fer , (le) , & ses différentes préparations ,	ib.
Bourrache , (la) &c.	223	Tartre (le) Calybé soluble ,	279
Velar , (le) &c.	224	Fleurs (les) martiales , &c.	ibid.
Béchiques incisifs tirés du regne animal ,	226	Astringents (les) absorbants ,	284
Blanc (le) de Baleine , &c.	ibid.	Craie , (la) &c.	
Béchiques incisifs tirés du regne animal ,	228	Yeux (les) d'Ecrevisses , &c.	286
Soufre , (le) &c.	ibid.	Corail , (le) &c.	287
Béchiques incrassants ,	232	Terres (les) Alkalines animales ,	ibid.
Gommes (les) béchiques ,	ibid.	Astringents stegnotiques , ou Resserrants pro- prement dits ,	288
Gomme (la) Arabique , &c.	ibid.	Astringents stegnotiques tirés du regne ani- mal ,	ibid.
		Alun , (l') &c.	ibid.
		Pillules (les) astringentes d'Helvétius , &c.	289

Bol d'Arménie ,	291	Céphaliques , &c.	ibid.
Astringents stegnotiques végétaux ,	ibid.	Céphaliques tirés du regne végétal ,	366
Sang Dragon , &c.	ibid.	Valériane , &c.	ibid.
Acacia , (l') &c.	292	Pivoine , &c.	368
Hypociste , (l') &c.	293	Caille-lait , &c.	369
Cachou , (le) &c.	ibid.	Tilleul ,	ibid.
Racines astringentes stegnotiques ,	294	Marum vrai , &c.	370
Bistorte , (la) &c.	ibid.	Dictame de Crete , &c.	ibid.
Tormentille , (la)	296	Stechas , &c.	371
Ecorce de grenade , &c.	ibid.	Sauge , &c.	372
Balaustes , (les) &c.	297	Céphaliques du regne animal ,	373
Roses rouges , &c.	ibid.	Ongle du pied d'Elan ,	ibid.
Plantain , &c.	299	Crâne humain préparé ,	ibid.
Symarouba ,	301	Céphaliques du regne minéral ,	374
Ortie , &c.	302	Cinabre , &c.	ibid.
Astringents emphrastiques ou invisquants ,	ib.	Poudre de Guttete , &c.	375
Terre sigillée , &c.	303	Lithontripiques , &c.	376
Grande Consoude , &c.	304	Verge d'or , &c.	381
Emollients , &c.	305	Chardon étoilé ou Chaussetrape , &c.	382
Atténuants ,	306	Boufferole , (la) &c.	383
Incrassants & Adoucissants ,	307	Saxifrage , (la) &c.	ibid.
Lait , (le) &c.	ibid.	Remede de Mlle. Stéphens ,	384
Lait de Femme ,	316	Fébrifuges (les)	386
Lait de Vache , &c.	ibid.	Quinquina , (le) &c.	390
Lait de Chevre ,	319	Cascarille , (la)	403
Lait d'Aneffe , &c.	ibid.	Antivénériens , &c.	ibid.
Bouillons de Poulet , &c.	324	Mercuré ou Vis-Argent , &c.	408
Grenouilles ,	325	Antihystériques , (les) &c.	423
Tortue ,	326	Succin ou Ambre jaune ,	427
Altérants particuliers ou spécifiques ,	ibid.	Asia da , &c.	428
Stomachiques ,	327	Galbanum , (le) &c.	429
Stomachiques chauds proprement dits ,	331	Antiscorbutiques , &c.	430
Aloès , &c.	332	Cresson , (le) &c.	433
Aunée , &c.	334	Herbe aux Cuillers ,	435
Gentiane , &c.	336	Beccabunga , (le) &c.	ibid.
Germandrée ou petit Chêne , &c.	337	Tresse d'eau ,	436
Bayes de Genievre , &c.	338	Médicaments moyens ,	437
Menthe , &c.	340	Salivants ou Sialogogues ,	ibid.
Centauree petite , &c.	341	Errhines , (les)	438
Camomille , &c.	342	Médicaments externes ,	441
Absynthe , &c.	345	Topiques , (les)	ibid.
Poudre à Vers ,	347	Médicaments anodins , &c.	442
Les huit Semences chaudes , &c.	348	Résolutifs , (les) &c.	447
Spécifiques particuliers , &c.	349	Suppuratifs , (les)	452
Hépatiques & Spléniques , &c.	350	Cautiques , (les)	456
Fumeterre , &c.	352	Détergifs , (les)	460
Aigremoine , &c.	354	Sarcotiques , (les)	461
Cerfeuil , &c.	355	Cicatrisans , (les)	463
Houblon , &c.	357	Antiseptiques , (les)	464
Scolopendre , &c.	358	Stiptiques , (les)	468
Fougere , &c.	359	Médicaments externes généraux ,	471
Chelidoine grande , &c.	360	Vésicatoires , (les)	ibid.
Tamarisc , &c.	361	Bains , (les)	475





